


Opera m
ANDERNA

Tomus 1

Guinther.
1.



IOANNIS
GVINTHERII
ANDERNACI MEDICI
CLARISSIMI,

W.1.

DE MEDICINA VETERI ET
noua tum cognoscenda, tum faciunda
Commentarij duo.



CVM CÆSAREÆ ET REGIÆ GALLIA-
rum Maiestatis gratia, & privilegij.

BASILEÆ,
Ex officina Henricpetrina.

Anno M. D. LXXI.



IOANNIS
GVLINTHERII
ANDERNAEI MEDICI
OFARISINAE

DE MEDICINA VETERI ET
nom cum cognoscenda, cum facienda
Commentarij duo.



CVB CHS ARHE ET REGIA CALIA



DZZIS

Ex officina

1138



Vol. III. 892



AD CÆSAREM
MAXIMILIANVM II.
CHRISTIANORVM
Monarcharum optimum,

Ioannis Guintherij Andernaci Medici
PRÆFATIO.



VM SUPERIORIBVS ANNIS MEDICINÆ
scientiam in Lutetiæ Parisiorum academia profiterer,
MAXIME CÆSAR, omnes eius scriptores tum Græcos,
tum Latinos, & Arabicos celebriores diligenter inuicem
contuli examināque: vt quicquid in ipsis inuentuti eru-
diendæ necessarium, memoriāq. dignum deprehendissem, in duos hosce Com-
mentarios redigerem, concluderēq. in dialogos: quō studiosi facilius informa-
ri possent. Tanta enim barbarie artem medicam tunc infuscatam offendi, vt
discipuli nullos fructus ex professoribus ob meliorum literarum ignorantia-
am percipere, & parum commodē institui potuerint: quōd hi etiam, qui olim
illam literis prodidissent, aut breues & succincti nimium, aut prolixiores, aut
confusi, inordinatiquē extiterint. Verum hæc à me non ideō scribi quisquam
iudicet, vt optimos quosque medicinæ auctores, qui posteros labore suo & in-
dustria iuuare conati sunt, reprehendam, sed quōd nullum vnquam adeo per-
fectē illam absoluisse existimem, vt nihil amplius adhuc in ea desiderari, &
aliorum scriptis vel augeri, vel imminui, vel corrigi queat. Non enim sem-
per idem studium & diligentia fuit adhibita, neque idem ordo seruatus: sed
confusa potius plerāq. tradita: vnde obscuritas doctrinæ & difficultas orta
est. Nemo itaque vitio mihi vertere debet, si quædam ex antiquis, vel etiam
recentioribus sim mutuatus, quæ ad institutum nostrum pertinent. Si enim
Aristoteles multa ex Platone, Galenus ex Hippocrate, Dioscorides ex De-
mocrate & alijs transcripserint, cur non mihi etiam nonnulla instituto ido-
nea ex Græcis, Latinis, Arabibus, & Barbaris cuiuscunque linguae in hæc
nostra volumina traducere, veterum inuenta augere, elaborare, & meliora
quocunq. modo reddere liceret? Cur non potius boni omnes hoc nomine iuen-
tuti gratulentur, quōd ego illa, quæ sub singulis ætatibus apud diuersas gentes
in vsum adhiberi solebant, lucubrationibus nostris comprehenderim illustra-
rinque? Nam hac de causâ etiam Commentarios hos de Veteri & noua Me-
dicina tum cognoscendâ, tum faciundâ inscripsi, quōd scilicet non solum ex
Hippocratis, Galeni, & aliorum vetustorum, sed etiam ex recentiorum, Ara-
būque, & nostri temporis professorum artis huius scriptis sint adaucti, cer-
tūque in ordinem quendam redacti. Qui enim salutarem hanc disciplinam à
primâ origine huc vsque literis mandarunt, non vno doctrinæ genere, nec ijs

dem semper remedijs vsi sunt. Præterea aliæ ætates & hominum mores, alios quoque morbos attulerunt: eoque etiam hi alia medicamenta postularunt. Hinc medicina apud veteres duplex appellari consuevit: prima simplex: altera multiplex. Quandiu enim homines bonis moribus præditi moderata victus ratione utebantur, simplex illa satis eis facere utique poterat. Vbi verò desidia luxuriæque, & aliæ graues corruptelæ corpus vitiant, multiplex & operosa requireretur. Ideo vetustiores solis herbis, radicibus, fructibus, & seminibus facili ratione & modo præparatis secundam valetudinem tuebantur: aduersam lenabant. Horum successores, quos iam affectus grauiores affligebant, lacrymas quoque arborum, resinas, gummi, aromata, aliosque terræ & maris prouentus in usum adhibebant. Post istos Arabum familiæ, sicut etiam Indię populi medicinam varijs, & nouis facultatibus antea incognitis adauxerunt, ut omnibus eruditis est manifestum. Tandem ars Chemicæ difficillimis quibusque morbis curandis idonea accessit: quam olim diu obscuratam Paracelsus Eremita nostra tempestate rursus illustrare augereque cepit: non autem primus inuenit: quod discipuli ipsius existimant. Si enim Zosimi, Blamidæ, Olympiodori, & Hebes Mesues, aliorumque monumēta legerint, eam ante multas ætates etiam apud exteros populos in usu fuisse intelligunt: id quod Galenus quoque in Commentario ad Pisonem testatur: Vbi ipse medicamentorum per ignem paratorum usum ostendit commendatque. Sed tamen hoc laudis Paracelsi merito tribuitur, quod eandem artem hoc nostro seculo primus in medicum usum reuocarit ampliarique. Per hanc enim aquæ, liquores, & salia non solum ex herbis, lignis, radicibus, sed etiam ex succis concretis, terræ fossilibus, vnionibus, corallijs, lapidibus preciosis, alijsque id genus solidis corporibus extrahuntur: nec non sublimes quoque spiritus, facultates, & quintæ quasi essentiæ ex iisdem eliciuntur, atque in pessimorum morborum, qui alijs non cedunt remedijs, curationibus: ante illos verò totius corporis tutandi gratia exhibentur. Olim quidem artem hanc doctissimi grauisimique viri exercebant: nunc plerumque illiterati, temerarijque mechanici agitant: quanto autem cum fructu, quotidiana docet experientia. Quemadmodum enim remedia per ignem confecta grauibz vitijs medendis cum iudicio adhibita multum commodi adferre, ita quoque, si affectus, egrigij, & medicamenti natura ac ratione incognita applicentur, summum sepe vitæ periculum inducere solent. Iam præter enumeratas medendi rationes accesserunt etiam quædam ex Caballa, demonibus, vanisque superstitionibus petitæ: per quas olim quidam Ægyptij falsò medicos ementiti morbos curare tentauerunt. Quinetiam hodie extant, qui nihil referre dicunt, DEVS ne, an malignus spiritus ægrotos à morbis liberet vindicetque: imò remedia grauisimorum affectuum à nullo nisi demonum coniunatore, vel spiritu tam maligno, quam bono comparari posse: quasi naturalium rerum scientia ad huiusmodi vitia non potens satis efficaxque esse possit. Talem medendi rationem, ut virum probum & Christianum minimè deceat, ita quoque nulli consulerim: tantum abest, ut commendarim. aliter namque

nos sacrae literae, & CHRISTVS ipse verus medicus docet. Non est igitur quod quidam parum sane mentis affirmant, demones à DEO cogi, vt bonis pijsq; hominibus auxilientur: malis autem sua sponte id officij praestent. Porro si quispiam nonnullis ex arte Chemica rectè paratis vti voluerit, libenter concesserim: modò priùs etiam rationalem Hippocratis, & Galeni medicinam experientiae coniunctam exercuerit, & vitam honestam ac piam agat. Asclepiades enim, licet gentilis, medicamentum, quod à probo medico exhibetur, manum DEI, quod autem ab impio datur, venenum esse prodidit. Ideo etiam DEVS OPT. MAX. hanc artem ante reliquas per initia Adamo, deinde summis optimisq; Israëlitarum principibus viris, prophetis, & sacerdotibus donauit. hi postea, cum in familias essent distributi, mutuo sibi eam per manus, non per literarum monumenta tradiderunt. Vbi iam illi multis etatibus & seculis eandem tractassent, tandem DEVS aliarum quoque gentium regibus, & praeclaris principibus est largitus. Sicut enim Moyses Israëlitarum dux victus rationem illis ex medica arte praescripsit: ita quoque hanc reges, Glaucus Mesiuiorum, Hermes Aegyptiorum, Euax Arabum, Sabor Medorum, & his adhuc potentiores Alexander Magnus, totius ferè orbis terrarum dominator: deniq; Romanorum Imperatores Iulius, Marcus, Adrianus, aliq; plures excoluerunt. Sic etiam postea fortissimi duces Graecorum Achilles, & eius socj: adhuc clarissimi viri Pythagoras, Empedocles, & Democritus hanc medicinalem artem exercuerunt. Huius discipulus Hippocrates Coss, primus quidem ex omnibus memoria dignis illam literis prodidit. ante cuius etatem ipsa tanto fuit in precio habita, vt ij, qui rudem eam adhuc, & vulgarem subtilius excoluissent, in diuorum numerum reciperentur. Post hunc Diocles quoque Carystius, Praxagoras, Asclepiades, Heraclides Tarentinus, aliq; similes successerunt. Multis hinc etatibus Galenus Pergamenus Hippocratem secutus est, eumque ante alios interpretatus, & in succincta eius doctrina explicanda plus ei solus, quam reliqui omnes contulit. Hic, quia veteres & medicos, & philosophos valde dum viueret insectabatur, nimium prolixus enasit. Quamuis autem ille omnia ferè, quae ad medicinam pertinent, attigisse videatur, ordinem tamen in plerisque neglexisse, & non pauca omisisse constat: sicut complures viri eruditi ante me quoque indicauerunt. Multa enim variè tradit: singula sparsim explicat: plurima necessaria praeterit, vir alioquin ingeniosissimus multarumque artium peritissimus. Seculis aliquot interpositis recentiores quidam Graeci exortisunt, vt Aretaeus, Oribasius, Aetius, Paulus Aegineta, Trallianus, & Aetuarus. hi quicquid in illo nimis copiosum prolixumq; visum fuit, contraxerunt, imminueruntque: sic tamen, vt neque ipsi mediocritatem seruauerint, sed in aliud contrarium scribendi genus inciderint, dum nulla principia, nullisq; rerum demonstrationes apponerent. Similes his Latini medicinae scriptores Cornelius Celsus, Scribonius Largus, Plinius, & alij magna ex parte empirici fuerunt, vt qui nullam eorum, quae proposuerunt, rationem reddiderint. In

super à sexcentis circiter annis medicina adeò corrupta fuit, ut professores huius tunc ipsi tenebras potius offuderint, quàm lucem aliquam, vel incrementum attulerint. Post Græcos Latinosq; auctores, Arabici etiam accesserunt: primus quidem Serapio, Rasisque empirici, deinde Halyabas Galeni sinia appellatus: quòd hunc propius quàm alij sectatus fuerit. huic Alpharabius, & postremò Auicenna Princeps successit: is Græcos, licet eorum linguae imperitus, magna ex parte tamen doctorum hominum opera adiutus, imitatus est: in nonnullis Galenum insectatus. At nostro hoc seculo, quo **DEVS OPT. MAX.** græcas literas, quibus ferè omnes scientiæ continentur, & latinas puriores nobis reddidit, tum aliæ quævis disciplinæ, tum medendi ars methodo, & ordine instaurari ceperunt. Hanc ob causam ego studiosos medicinæ ex varijs potius auctoribus inuicem collatis, examinatisque, quàm ex vno quodam etiam præstantissimo docere malui, singulasque medicæ facultatis partes certo rectoque ordine persequi: sic ut rerum naturalium contemplatio, quæ Græcis *φυσολογία*, dicitur, præcedat: deinde affectuum, casuumque superuenientium causæ explicentur: & tandem medendi modus ordine subsequatur. hoc enim neglecto, medicinæ scientiæ rectè absolui non potest, nec iuuentus facilè in ea erudiri. Si quis autem signorum, & sanitatis tuendæ rationes adiungere velit, ex tribus superioribus eas reperire poterit. Postquàm igitur **CLARISSIME IMPERATOR**, te summum nò solum honestarum artium & disciplinarum, sed etiam Medicinæ patronum atque fautorem esse, omnesque viros literatos singulari benevolentia prosequi constet: non alienum fore putavi, si quicquid ego laboris, operæ & industriæ in hisce meis libris ad studiosos in medicina feliciter instituendos impenderim, **MAIESTATI TVÆ** offerrem & dedicarem. Cuius enim sub nomine iustius illos in lucem prodire exoptem, quàm eius, qui sacro suo auspicio, & potestate **ROM. IMPERIUM** feliciter gubernet: idq; non solum iustitia, & æquitate, sed etiam singulari quadam humanitate, clementia, & vitæ integritate? adhæc in quo præter insigne pacis studium, prudentia in consilijs, fortitudo & magnanimitas in rebus arduis atq; periculosis est coniuncta? ita ut tu quasi solus inter Monarchas Christianos hisce seditiosis & turbulentis temporibus, in quibus omnia fatalem quandam mutationem, & ruinam minari videntur, **REMPUBL.** Velut Atlas cælum, moderatis & placidis institutis conatibusq; sustineas. Vnde meritò etiam omnes boni iniurijs oppressi afflictiq; ad te, tanquam **ASTYLUM** vnicum spe salutis confugunt. Quinetiam illa in te virtus, **OPTIME CÆSAR**, laudem & admirationem summam habet, quòd etsi tuapte prudentia & sapientia gubernare omnia possis, rectis tamen etiam aliorum consilijs libenter acquiescas. Quamobrem pijs bonique omnes **DEVM OPT. MAX.** votis & precibus orare debent, ut te totius patriæ Christianæ patrem saluum & fortunatum quàm longissimè conservare: nec non animam ac robur præstare, multosque Nestores & Achilles tibi adiungere dignetur, quò in saluberrimo instituto **REIPUBLICÆ** conquassatæ iuvanda conservandæq; feliciter progredi possis. Sola

namque

P R Æ F A T I O.

namque principum Virtus sine præclarorum virorum adminiculo satis esse nequit: eorum præsertim, qui ingenio, re, & opera necessarios rectissimisque tuos conatus adiuuare, & imminente Turcarum tyrannidem, atque calamitosissimum illud seruitutis iugum à ceruicibus nostris sub felici tuo auspicio repellere possint. Quo nomine MAIESTATI TVÆ & REIPVB. Christianæ iure congratulor virtutem, & rei militaris experientiam, felicitatēque generosi, ac strenui Herois LAZARI à Schwendy, Baronis in Hohenlandß berg, ob res tum pace, tum bello in diuersis regionibus præclare gestas, maxime verò propter superiorem Vngariam nuper fortiter feliciterque recuperatam & defensam. Eius namque fides, & studium erga MAIESTATEM TVAM atque communem REM PVBL. omnibus vbique sunt manifesta: Unde etiam non immeritò singulari gratia, honore, ac dignitate ab illa amplificatur, & ornatur. Quæ tua munificentia & liberalitas in benè meritos, verè Imperatoria virtus æstimari debet. His ergo eximijs animi tui dotibus fretus, hos meos Commentarios MAIESTATI TVÆ dedicandos censi, tum quòd illi tuo favore & patrocinio muniti, calumniatorum malevolentiam & inuidiam facilius sustinere possint: tum quòd ijdem ex ea arte sint conscripti, quam tu diligentissimè excolere consueuisti. Quanto enim totius Philosophie studio & amore afficiaris, cum alij, tum doctissimus IOANNES Crato Vra-
tislauiensis MAIESTATIS TVÆ Archiatrus & consiliarius norunt. Stirpium siquidem, metallorum & lapidum, aliarumque rerum naturalium genera, vires & naturam ita perscrutaris, vt non modò illarum magnam cognitionem antiquorum Imperatorum, Regum & Principum exemplo, ad animi recreationem & cultum amplexeris, verumetiam præ cæteris maiore vsum, & facultates admirabiles habeas cognitatas. Quare MAIESTATEM TVAM, MAXIME CÆSAR, etiam atq. etiam supplex obtestor, vt hos meos labores in communem studiosorum vtilitatem consumptos benigna fronte excipere, patrociniumque eorum clementi animo suscipere digneris. Vale. CLARIS-
SIME IMPERATOR: DEVS OPT. MAX. faustum & letum noui
huius anni auspiciū MAIESTATI TVÆ largiatur, prospe-
ramque IMPERII gubernationem benè fortunet, & sum-
mam denique felicitatem donet. ARGENTO-
RATI Calendis Ianuarij.



ΟΤΒΕΡΤΟΣ ΔΑΜΙΟΣ Ο' ΑΝΔΕΡΝΑ-

κός Φιλιατρός εἰς τὴν εἰκόνα.

Σώματι ὃ ἡ μορφή τῆς ψυχῆς ὅση δόσιν ἔχει
 Πολλὰ γὰρ ἐν καλῶ φαῖναι ἐνεσι νότι.
 Οἱ δὲ Γενδεῖς καὶ αὖ φάνει σώματι εἰκῶν
 Ἐν γέρατι σμῖν, τοῖον δὲ ἐνθε βλεπῆς.
 Νεὺς δὲ καὶ οὐφύαγ' ἐξ αὐτῶ γινώμεν βίβλων,
 Ἐργωντ' ἱατρικῆς, ὡσπερ ἐκαστος ἐργῶ.
 Τῶν φιλόλογοι παρὰ πάντας σέβειτε γέροντας.
 Πολλῶν εἰγ' ἱατρῶν ἐξοχὸς ἐστὶ πάντων.

IOANNIS GVINTHERII ANDERNACI MEDICI

de veteri & noua medicina
cognoscenda

COMMENTARII PRIMI DIALOGVS PRIMVS.



10

15

20

25

30

35

40

MATHESES, Saluus sis honoratissime GERON: Quamuis mirum tibi videri possit, cur ego homo adolescens & peregrinus, nulla insigni doctrina ornatus audeam te virum grauissimum, summis rebus occupatum interpellare, spero tamen, vbi pro humanitate tua, qua prædicaris apud omnes, causam accessus mei intellexeris, equiore te illum animo laturum. GERON, Aduentus tuus, mi adolescens, mihi pergratus, perque iucundus est, verba enim tua te literarum meliorum studiosum esse, & non exiguum iam in eis progressum fecisse testantur. quare dicas liberè, quid te mouerit, quod ex tam longinqua regio ne huc te contuleris? MATHESES, Nouisti, optime Geron, eam in scholis benè institutis esse consuetudinem, vt pueri & adolescentes primùm humanioribus, leuioribusque literis erudiantur: deinde adolescentiæ fines egredi, ad grauiores disciplinas condiscendas destinentur. quod cum mei quoque præceptores obseruare soleant, mihi ante annum rebus naturalibus ut cunctis perceptis, medicinæ studium consuluerunt. His igitur, vt obtemperarem, sicut decet, ad celeberrimos quosque eius artis magistros statim me contuli, audiuique sedulo, & quam potui diligenter, in eam nimirum spem adductus, vt hoc citius, rectius, & absolutius illam perciperem. sed longe aliter quam putaram, res mihi euenit. Nam cum præcipuos rei medicæ professores, nullo penè ordine, nullaque certatione (pace illorum dixerim) sed eruditionis suæ ostentandæ potius, quam auditorum profectus gratia in publicis scholis docere animaduertirem, parumque, aut nihil certè cōmodi ex illis reportarem, coepi dubitare, ab institutōne desistere, an aliam artem sectari deberem. sed ecce, dum sic animi dubius, & perplexus essem, magna inter medicos fama percubuit, te commentarios quosdam de instituenda iuuentute in medicina tum cognoscenda, tum faciunda, multis iam annis in manibus habere, eo ordine, via, & ratione conscriptos, vt quis eam vniuersam breui tempore, & accuratè comprehendere possit. Quod vbi audiuissem, tanta me tui visendi, audiendi que cupiditas, ac desiderium inuasit, vt

*Ratio studiorum
iuuentuti præ
scribendorum.*

*Professores non
nulli ostentatio
nis gratia, in scho
lis hodie docent.*

quamprimum me itineri Argentoratum versus accingerem: ubi præter summos eloquentiæ, & Iuris Cæsarij professores, plerosq; etiam insignes medicos vigere intellexi. Quare te oro, atq; obtestor, optime Geron, vt iuuenili huic meæ audaci, quòd intempestiuus forsan ad te accesserim, ignoscas. GERON. Consilium præceptorum, tuamq; medicinæ discendę voluntatem, non possum non approbare. Cùm enim DEVS OPT. MAX. vniuersis hominibus præcipiat, vt mutuis inter se studijs, & amicitia officijs societatem colant, nullum præstabilius scientiæ genus esse videtur, quàm id, quo homines malè affectos ad meliorem valetudinem reducere, & sanos in bona conferuare possis. Ideo non leuicide causa, institutum tuum protinus tibi deferendum, sed in eo constanter pergendum esse, censeo. quamuis enim primis annis non omnia ex voto successerint: postea tamen meliora fortè sequentur. MATHETES, Credo tibi obseruande Geron. Quis autem in arte tam longa, tam difficili, & ardua, aliquid dignum ipsa, dignum studio & labore, dignum laude & gloria, citra viam fidelium magistrorum vocem, opem & auxilium sperare potest? GERON, Rectè dicis. nam ego id quoq; olim ante annos ferè quadraginta, re ipsa sum expertus, licet præceptoribus eo tempore clarissimis in medicina discenda operam darem. Quanta enim, bone Deus, erat barbaries, quanta rerum, quæ ad hanc artem pertinent, imperitia: nisi enim lucem aliquam ex meliorum autorum cognitione, adeptus fuisset, vix longo tempore, verum medicinæ vsum intellexissem: adeò obscura, barbara, mutila, & deprauata omnium medicinæ scriptorum erant volumina. Quas me putas difficultates, quot molestias, & labores sustinuisse, antequàm ad frugem aliquam peruenirem? O te scelicem, & terq; quaterq; beatum, cui hac tempestate, cùm alias artes, tum verò medicinam licet addiscere: eo quòd illa non modò multarum rerum insignium, quas antiquitas ignorauit, cognitione & vfu auctior, absolutiorq; sed etiam, quòd multò facilior, cultiorq; in ipsis, cùm varijs diuersarum gentium monumentis, sua lingua iam dudum editis, vel in latinum sermonem puriorē translatis, euaserit. Si quis autem dicat, morbos non eloquentia, sed medicamentis (vt ait ille) curari: fateor, addoq; nihil referre, qua quis in prescribendis remedijs oratione vtatur, modò hæc ægrum non offendant. At eum, qui alterum docere velit, quæ ipse nouit, proprijs rerum dictionibus vtī debere affirmo: in quorum vfu perspicuitas quasi meta spectanda erit. Nam qui sic quedam appellare studet, vt quæ discit, clarissimè intelligat, is optimus præceptor dicendus erit: non autem, qui disciplinas per se aliàs difficiles, obscuras

*Medi na inter
alias sciẽtias præ
stan. sima.*

*Præceptorem
proprijs rerum di
ctionibus vtī de
bere.*

*Præceptoribus
eloquentia neces
saria.*

*Quis optimus
præceptor.*

- fcuris, & barbaris suis verbis, & quasi ænigmaticis, vt quorundam chymicorum familiæ solent, adhuc reddit difficiliore; non dico quod eos, squi purius illas tractare conantur, ignominiose grammaticos, barbarè latinistas, aut græcistas nominent. MATHETES, Hæc vera esse quæ dicis, nuper ego, cùm professores aliquot medicinæ audiuissem, re ipsa comperi. GERON, Toleranda quidem esset illorum infantia, & incultus rudisq; sermo, si modò ipsi rerum, quas profitentur, verè essent periti, & conuenientem in docendo ordinem, rationemq; seruarent, & auditorum ingenijs, se accommodarent. MATHETES, Hæc maxime in illis desiderauim, nec alia ferè mihi deferendi ipsos, causa fuit. quare iterum te oro, humanissime Geron, vt me quoq; in discipulorum tuorum gregem, cui commentarios tuos prælegere instituisti, recipere digneris. quantum ad me attinet, promitto tibi debitam meam obseruantiam, omniq; officij genere, & studio, quodcunq; præstare potero, me tibi semper gratificaturum. GERON, Parum abest, quin mihi persuaseris, vt te inter familiares meos, & domesticos discipulos adnumerem. non satis autem est discipulo, ad medicinam rectè cognoscendam, faciundamq; bonum, fidelem, eruditum, & exercitatum obtigisse præceptorem, nisi etiam alia nonnulla præsidia, sine quibus nemo vnquam excellens medicus fuit, simul adfuerint. MATHETES, Quænam sunt ista obsecro? nam si ea vlla ratione & modo comparare potero, nullà in me vel industriad, vel diligentiam, & laborem desiderari, patiar. GERON, In primis sanè DE I timor, ardensq; veritatis, & lucis naturæ desiderium. etenim hæc, animum hominis ad optima quæq; discenda incitant, & ne alias artes, quàm ille permiserit, affectemus, auertunt. Deinde singularis animi ad medicinam inclinatio, quæ ex cœlesti quodam syderum influxu provenit, redditq; discentes ad omnia promptos, dextros, & expeditos, si Astrologis credendum est, ut nullum laborem in rebus diligenter inquirendis, meditandisq; refugiant. non enim Mercurius ex quouis ligno (vt est in prouerbio) fieri potest: & nihil quod inuita Minerva (sicut dici solet) inchoatur, foeliciter succedere solet. postea ingenium foelix, vt adollescentes primas disciplinas, præcipuè Arithmeticâ, Geometriâ, Astronomiam, & Disserendi rationem facilius assequantur. Nouissimè animus pius, benè de hominibus ægris merendi affectus, temperantia, continentiaq; in medico futuro requiruntur. Nam qui ob diuitias & opes comparandas magis, quàm ad sanitatem ægris reddendam, medicinæ professionem suscipit, quiq; gulæ, baccho & veneri deditus est, is veri medici nomen haudquaquam meretur. qui verò in primis annis verum

*Medico futuro
quæ necessaria.*

*Timor Dei, ve-
ritatis desiderium.*

*In medico excel-
lenti futuro quæ
necessaria.*

*Naturalis ani-
mi ad medicinâ
inclinatio.*

Ingenium.

*Pius in ægros af-
fectus, temperan-
tia, & continen-
tia, in medico re-
quiruntur.*

Medicus absolutus.

à falso diiudicare didicit, rerumq; naturalium, & corporis humani cognitionem adeptus est, artemq; honestè & decenter exercere cupit, is omnes philosophiæ partes, ingenuo homini dignas absoluit, summaq; laude cumulatus medicus euadet, & nihil ab-

Medici officium.

*Non diuitibus
& splendidis per
sonis, sed etiam
pauperibus succu-
rere tenetur.*

furdi committet. Talis etiam non magis Reges, & Principes, quàm pauperculos in Cranone curabit: & si quando ab illis mē-

dendi causa accersatur, omnibus ex æquo officium suum præsta-

re, dignabitur. MATHETES, Magna certè à medico excellenti futuro exigit, què profectò in me non esse omnia confiteor: vo-

luntate autem & studio, nulli meorum equalium cesserò: natu-

ramq; semper habui, ad hanc artem amplectendam, si quis alius, inclinatiorem: & nihil ex illa amplius mihi desidero, quàm vt ci-

uibus meis gratificari, valetudinarijs succurrere, & rem tueri fami-

liarem possim. Qua de causa spero, te mihi quoq; permissu-

rum, vt tuis intersim auditoribus, & simul cum illis eodem lectio-

nis tuæ fruar beneficio. GERON, Videris oratione tua, tanquam

medicamento quodam phileterio, animum meum tibi deuinxisse, vt id quod petis, non possim recusare. ne autem te diutius re-

memorer, cras horis antelucanis institutionem medicam meorum,

*Docendi ratio &
modus in hoc
commentario.*

in tuam gratiam exordiar: CHRISTVS cœlestis ille, & summus ge-

neris humani medicus, ac seruator, eam benè fortunet. Porro, vt

facilius eam & felicius assequaris, ingenij tui viribus me attempe-

rabo: primùm medicinam vniuersam in partes ex fine ipsius bre-

uiter resoluam. deinde illam ordine contrario, à primis ipsius ele-

mentis vsq; exordians, rursus componam, veluti si decurso celeri-

us stadij spacio, rursus à calce ad carceres reuertar: omnia quæ

prius in transcurso aspexisti tantùm, ea deinde acrius intuenta

proponam, ne quid mentione dignum omittatur. atq; hanc do-

cendi rationem ex Hippocrate & Galeno sumpturum me esse in-

genue confiteor. MATHETES, Optimè facis, mi præceptor, qui

viam mihi, & ordinem ostendis, quo vsurus sis, ne incertus huc

illucq; uager, & à recto itinere aberrem. GERON,

*Resolutoria doc-
tendi ratio.*

*Medicina ex
quarum artium
genere.*

*Medicina cur à
Deo nobis dona-
ta.*

Cùm itaque medicina ex earum artium ge-

nerè existat, quæ in actione consistunt, & opus non quidem no-

uum, vbi ab illa destiterint, repræsentant, sed vitiatum corru-

ptumq; corrigere ac reficere, integrum autem conseruare solent,

profectò ipsam à DEO OPT. MAX. ad corporis humani valetu-

dinem, veluti finem, vel emendandam si mala, vel conseruandam

si bona sit, donatam nobis esse iudico. ideo etiam primùm disci

debet, quibus ex partibus, tum simplicibus, tum compositis, cor-

poris nostri harmonia constet, & quam hæ naturam, figuram,

magni-

magnitudinem, numerum & situm habeant. MATHETES, Quales sunt natura simplices? GERON, Quæ per omnia sibi inuicem, si diuidantur, respondent, vnde Græcis etiam ὁμοιογενῆ dicuntur, vt vena, arteria, caro, neruus, ligamentum, fibræ, pili, vngues, &

Partes simplices natura quales.

5 id genus aliæ. MATHETES, Quales sunt compositæ? GERON, Quæ ex simplicibus istis conflatae sunt, vt crus, manus, digitus, oculus, lingua, pulmo, iecur, & similes: quæ si inciduntur, varias simplices particulas representant. MATHETES, Eademne omnium sunt actiones? GERON, Minimè, sed singularum propriæ.

Partes compositæ.

10 siquidem & totum crus moueri videtur, & singuli qui in eo sunt muscoli. item motus quidam cruris interit, quouis musculo transuersim per totum dissecto. Præterea primus ipse musculus & cum eo articulus, qui mouebatur, sensus motusque expers redditur, cum neruus, qui in illum peruenit, vulneratus fuerit. Itaque actionis & partium notitia necessaria est. actionis quidem, vt rationi-

Actiones suas singule partes proprias habent.

15 nationis, memoriæ, & motus voluntarij: partium autem, vt cerebri spinalis medullæ, & cordis. Quare omnium quas nouimus actionum partes, & vniuersarum partium actiones inquirere debemus. Totius sanè cruris actio est ambulatio, quæ fit, dum articuli

Actionum partes, & partium actiones inquirenda.

20 per vices inter se extenduntur & flectuntur; verbi gratia, in genu dum muscoli priores patellam conscendunt, & tibiæ ossi, tendinum interuentu, inferuntur: vbi autem tibiæ illic attraxerint, crus extenditur: vbi verò interiores similiter operati fuerint, flectitur. sic etiam in coxa, & pede motiones fiunt, cum articulus flectitur, aut extenditur. Musculus itaque, vbi ambiente ipsum cute

Ambulatio cruris actio, quomodo fiat.

25 nudatus fuerit, licet euidenter contrahatur, & veluti ad caput suum seorsum retrahatur, non tamen neruus, qui ad ipsum peruenit, sensibili quodam motu agit, sed facultatis ex cerebro descenditis via esse videtur. quod autem cerebrum ipsum eiusdem

Cruris extensio & flexura quomodo fiat.

30 ad neruos omnes venientis principium sit, palam ex neruo quocunque diuiso cernitur. Nam qui cerebro continuus est, in superioribus quidem partibus actiones conseruat, in inferioribus autem perdit. MATHETES, Expone hoc in crure apertius:

Facultatis ex cerebro descenditis, via neruus.

35 GERON, Ambulatio quidem totius cruris actio est: huic autem musculorum partium genus præest: ossa verò, cartilagines, pinguedo, glandes, arteriæ, cutis, venæ, membranæ, ligamenta, ex musculis initium motus habent. primum enim ossa, deinde partes omnes, eò quod ossibus vndiquaque adhæreant, simul cum illis mouentur. Itaque pedis motus, musculi est actio: totius autem

Motus pedis musculi actio est.

40 cruris motus, non omnium eius partium functio existit. MATHETES, Ideone duplex genus actionum supra posuisti? GERON, Indubiè, nam vnum est cuiusque simplicis partis, quæ primario, &

Actionum duplex genus.

A 3 prin-

principalissimo munere fungitur: alterum eius, quæ casu, aut secundario, siue non primo agit. **MATHE TES**, Dic obsecro, quibusnam tum compositarum partium, tum simplicium actio in

*Actio utrarumque
partium quibus
absoluatur.*

*Cruentum motu-
nibus necessaria.*

*Ligamenta que
eguntur.*

*Actio partis, v-
sus & status co-
gnoscendus.*

*Integritas, viti-
um & morbus in
quibus consistat.*

*Continuitas, &
eius solutio.*

*Continuationis
diuortium in par-
tibus simplicibus*

Fractura.

Ruptura.

Vulsura.

Vulnus.

Punctura.

Contusio.

cruribus absoluitur, quarum mentionem fecisti? **GERON**, De-
centi ossium numero, magnitudine, figura, & situ: aliâs musculo-
rum motus nihil profecerit. **MATHE TES**, Qua de causa? **GERON**,
Quia in articularum compagibus aliud os excipere, aliud ingre-
di, ligamenta verò extrinsecus circundari oportet, quæ illas con-
stringant, ne sede sua moueantur: non tamen adeò valida & du-
ra, vt motionibus resistent: neq; tam laxa, vt articularum com-
missuras vacillare permittant. **MATHE TES**, Videturne ideo et-
iam opus esse, vt ligamenta congruam quandam magnitudi-
nem, figuram, numerum, & situm habeant? **GERON**, Vtiq; nam
siue minora, vel maiora fuerint, siue plura, vel pauciora quam par
est, siue in alia figura, & alieno in loco inserta, non amplius mo-
tus decens articuli fieri poterit. Quemadmodum autem de liga-
mentis, ossibus, & musculis dictum, ita de omni actione & vsu
censendum est. Nam si nulla pars actione & vsu vacat, sed optimè
sua ipsius natura, magnitudine, figura, numero, & situ constructa
inueniatur, qualis est, seruari ipsa: si verò aliquo modo viciata, 20

corrigi debet. Id autem non antea fieri potest, quam cuiusq; par-
tis actio, vsus, statusq; cognitus fuerit. hæc igitur vt intelligas, o-
mni studio incumbendum est, si corporis sani & morbosî noti-
tiam consideres. **MATHE TES**, In quibus compositarum partium
integritas, vitium & morbus consistit? **GERON**, In quatuor ge-
neribus suprà recitatis, magnitudine scilicet, figura, numero, &
situ. si verò partes naturalem quoq; vñionem & continuationem
recipiant, quintum etiam quoddam genus illis accedet, vt opti-
ma structura prædite, optimas operationes, prauissimas, pessimas
exequantur. & si continuum quiddam solutum fuerit, eiusmodi
affectio non modò reprehensibilis, sed etiam morbus est. **MA-
THE TES**, Is affectus solètur ne etiam simplicibus partibus obueni-
re? **GERON**, Solet, etenim continua ossis, nerui, venæ, arteriæ,
carnisue compages frangendo, rodendo, incidendo, diuellendo,
& rumpendo vitatur. **MATHE TES**, Quo nomine hoc affectus 35
genus in osse vocatur? **GERON**, Fractura nobis, Græcis *νάρκημα*:
in carnosis musculorum partibus ex distentione factum, græcè
ρήγμα appellatur. At cum fibræ similiter tensæ, ruptæq; fuerint,
σάσμα, nostra lingua vulsura. pari modo continui in carne di-
uortium, non ex distentione, vt ruptura, sed incisione ortum, 40
vulnus dicitur. si uerò quod vulnerat, acutū & tenue fuerit, pun-
ctura nominatur: si graue, contusio. id autem diuortium quod ex
erosione

- erosione fit, in osse quidem teredo, in alijs autem vlus. atq; hæc sunt vniuersę quinti morborum generis in simplicibus partibus distinctiones. MATHETES, Quæ sunt in compositis? GERON, Prout diuersa partium genera committuntur, vocanturq; omnia, auulsa, græcè *ὑποκρίματα*. MATHETES, Cuius nam affectus erit, si pars quedam simplex tota diuortium passa fuerit? GERON, Et ipsiusmet diuisę, & vniuersi instrumenti. MATHET. Casūne, an primariò fieri dicitur? GERON, Aliàs casu, cum scilicet vel musculus, vel alia quedam pars affecta fuerit: aliàs primariò, cum ligamentum iniurię patuerit. MATHETES, Quot sint quinti morborum generis, quod in partium continuarum diuortio, & separatione constat, distinctiones, iam intelligo. deinceps compositarum affectionum genera similiter persequere. GERON, Cùm hæc vniuersa totam illarum naturam constituent, nec non figuram in eis & integram, & viciatam efficiant, diligenter inquirenda sunt: sicut etiam singularum simplicium natura: quamuis harum integritatem & vitium nosse, & affectus corrigere potueris. siquidem medicus perspectum habere debet, quenam pars alterius loco substitui, quę verò non possit. MATHETES, Tu ergo id me doceas. GERON, Caro sanè, si affecta excindatur, alia regenerari: si verò neruus, aut ligamentum præcisum fuerit, aliud tale restitui nequit. MATHETES, Qua de causâ? GERON, Quia illa ex sanguine, hæc ex semine gignuntur: sicut etiam os, quamuis simile quiddam in eius locum restitui possit. MATHETES. Dic ergo quenam ex semine, quę verò ex sanguine semper generentur: item simplices partes ex vnare, an ex pluribus consistant, & quomodo inter se connexę sint. GERON, Hę quoq; compositis in numero, figura, magnitudine, & positu eorum, quę ipsas constituunt, proportionem respondent, & integre, vitioq; esse possunt: siquidem eodem modo ipsę generantur. Quemadmodum autem ex confectione anatomica omnes totius corporis particulas, sensu simplicissimas didicimus: ita & hoc ipsum, quales natura primę & simplicissimę existant, inuenire possumus. MATHETES, Qua ratione? GERON, Si non omnes, certè vnā, exempli gratia, carnem inspiciemus, examinabimurq; primū, num id quod ipsam generauit, unum specie sit elementum: deinde, si tale non videatur, an multa: postea, quot ea numero, quę, & quomodo inter se composita. MATHETES, Quotuplex ergo tu carnis elementum esse dicis? GERON, Quadruplex. MATHETES, Cur non unum? GERON, Quia si incidatur, & uehementer incalescat, dolore afficitur. vnum autem in aliud mutari non potest, cū non habeat, in quod mutetur. si verò id mutari, commutariq;

Teredo.
Vlus.

Auulsa.

Casu fieri.

Primariò fieri.

Compositarum
partium quatuor
morborum genes
is.Quæ partes res
stitui, quæ non
possint.Partes ex semina
ne ortæ non regene
rantur, si excisa
se fuerint.Partes sensu sim
plices.
Natura simplis
sima.Elementa carnis
quot.

Quatuor elemen-
ta commutabilia
sunt.

Qualitates ta-
biles.

Acumen quid
praestet.
Gravitas.

Durities.

Calor.
Frigus.
Humor.
Siccitas.

Qualitates essen-
tiales.

Quatuor quali-
tatum corpora.

Terra.
Aqua.
Aër.
Ignis.

& affici nequit: & quod non afficitur, dolore vacat. vtrum nihil
pati posse, in confesso est, id quod etiam sic confirmari potest. Si
caro vno constaret elemento, nunquam doleret: atqui dolet: non
ergo vnum specie elementum ipsius erit. nam si carnis elemen-
tum affici nequit, non dolebit: atqui dolet: non itaque affectus ex-
pers est. **MATHESES**, Quid, si quis plura elementa, sed quæ com-
mutari nequeant, esse dicat? **GERON**, Eius orationem hoc mo-
do subvertes. Si carnis elementa nullis pateant iniurijs, non do-
lebunt: atqui dolore afficiuntur: non possunt igitur carnis ele-
menta ab affectibus esse aliena. **MATHESES**, Cum itaque omnia
elementa per totum commutari possint, quot ipsa numero exis-
tunt? **GERON**, Quæ rem quamcumque commutant, ea attigisse
illam antea, quam commutasse oportet, ut sensus docet, & ipsa re-
rum natura indicat. atque si id quod mutat, tangendo commutat,
certè necesse est, ut tactilibus quibusdam qualitatibus operetur.
MATHESES, Quæ sunt istæ? **GERON**, Acumen, gravitas, duri-
ties, calor, frigus, humor, & siccitas. **MATHESES**, Quid acumen
praestet? **GERON**, Rem propinquam quidem secat, sed essentiam
eius non commutat, quemadmodum nec gravitas: sed hæc qui-
dem etiam rem subiectam contundit, non autem per totum ip-
sam mutat. neque verò durities materiam vicinam adedò potest
commutare, ut in aliam speciem traducat. calor autem, & frigus
essentiam propinquam totam commutare possunt. sic humor &
siccitas: licet non tam subito ut prædictæ, tamen spacio temporis
ipsæ quoque res subiectas transmutant. **MATHESES**, Præter has
quatuor, quas modò recensuisti, restantne alia quædam qualitas
ad commutandum efficax? **GERON**, Has solas nominari & cen-
seri effectrices conuenit, præsertim primas inter se contrarias: atque
in his magis calidam, quæ omnium longè efficacissima: deinde
frigidam: postea humidam & siccam. nulla vero alia, res propin-
quas per totum ipsas commutat. si namque diuellit quippiam, con-
tundit, secat, & pungit, id quidem etiam facit, per totum autem
reipatientis essentiam non commutat, sed in plurima diuidit.
MATHESES, Exemplo indices. **GERON**, Si niuem in minimas
partes diuidis, ipsa permanebit: sin autem eam excalefeceris, nix
esse desinet. si quidem etiam ex aqua ipsa refrigerata, non in vnum
cumulata, generatur. Nam hoc essentiae est incrementum, illud
generatio existit. quinetiam si omnia in parua diuidantur, essen-
tia inminutio est: sin autem calefacta fuerint, alterius essentiae
generatio: quando speciem, quæ prius erat, commutauerit.
MATHESES, Quæ corpora has qualitates in se continent? **GERON**,
Quatuor ista, terra, aqua, aër, ignis. atque hæc sunt & aliarum o-

mnium

- mnium rerum, & carnis elementa, mutuasq; inter se vicissitudines subeunt, nec non omnibus rebus, communi quodam modo subiiciuntur: atq; ex his inter se commixtis, corpus vnum sit simplex ac simile, pro temperationis illorum qualitate, siue sensu præditum, siue illius experts. pari modo sigillatim in vtroq; genere omnes partium distinctiones temperationis differentiam comitantur. siquidem pro huius proprietate, aliud in corporis essentia os, aliud caro, aliud arteria, aliud nervus efficitur. MATHESES, In quibus proprietates istarum partium consistit? GERON, In propria ipsarum temperatione: siccior namq; & calidior leonis caro est, humidior frigidiorq; ouis: media inter vtranc; humana, atque inter ipsos homines Platonis caro, (exempli gratia) calidior est, Hippocratis frigidior. MATHESES, Quot ergo sunt simplicium partium temperationes? GERON, Totidem, quot elementa: simplices quidem calidiores, frigidiores, humidiores, & sicciores: compositæ verò aliæ quatuor, humidiores simul, & frigidiores, calidiores & humidiores: tertia siccior vnâ, & calidior: deinde quarta frigidior simul, & siccior. his accedit princeps omnium temperatissima. MATHESES, In quibus simplicium integritas & vitium consistit? GERON, In elementorum commoderatione, & immoderatione. MATHESES, Qua autem ratione, vitium ipsarum in morbo, distinguere poterit? GERON, Vtrarumq; rerum notione. MATHESES, Quæ, salubris corporis status, quæ item morborum nota existit? GERON, Salubris sanè, quod integritas naturæ functiones: morbosus autem quod offensas habeat, proinde cum sanus quispiam, imbecilliores, quidem, quam alius secunda valetudine præditus, actiones habet, nondum verò læsas, intemperatior quidem est, sed nondum ægrotat. MATHESES, Quot igitur sunt inter salubres corporis habitus temperati? GERON, Vnus est temperatissimus, octo intemperati: totidem nimirum numero, quot salubres temperaturæ. MATHESES, Estne morbus aliquis temperatus? GERON, Nullus, sed vniuersi intemperati. ob quod, tertium corporum statum salubrem, latius quodammodo patere oportet, vt complures sanorum corporum distinctiones, pro vt illa magis, aut minus sana, sub eo comprehendantur. MATHESES, Quot ergo status corporum in nobis omnibus collocandi sunt? GERON, Tres generales, nempe optimus, deprauatus, & morbosus. Sed optimus sanè vnus est, nam deterius perfectissimo non innascitur, reliquorum duorum innumerabilis copia existit, in qua alius alio magis, vel minus valet. MATHESES, Cum itaq; medicinæ scientia nihil in corpore noui, vt prius dixisti, efficiat, sed quod corruptum est, corrigat, quod

*Pars simplex
vnde.*

*Suam singule
partes habent
temperations
elementorum pro-
prietatem.*

*Temperaturæ ele-
mentorum.*

*Simplicium partium
proba, &
vitiosa actio in
quibus consistat.*

*Salubris status
corporis, & mor-
borum nota.*

*Intemperatior
nondum æger dis-
ci debet.*

*Habitus corporis
intemperati octo,
vnus temperatissi-
mus.*

*Intemperatiorum
magna latitudo.*

*Status corporum
tres.*

Valetudo bona et mala in homine vnde cognoscatur.

Simplicium partium operationes dextre.

Sinistra.

Compositarum actiones bone & male.

Simplicium & compositarum status communis.

Vnio.

Solutio.

Temperatura- rum cognitio ne- cessaria.

Curatio ex quibus fiat.

Morbi simplicium ex intemperie quomodo curandi.

Morbi compositarum partium.

Contraria contrariorum remedia.

quod integrum tueatur, vnde valetudo tum secunda, tum improspere cognosci poterit. GERON, Ex partium corporis, tum simplicium, tum compositarum operationibus bene, vel perperam peractis. MATHETES, Quando dextrè simplices partes operantur. GERON, Cum aptam quatuor elementorum, vnde constant, qualitarum misturam habent. MATHETES, Quando sinistrè. GERON, Cum ineptam sortitæ sunt. MATHETES, Quando compositæ, muneribus suis rectè funguntur. GERON, Cum situm, figuram, magnitudinem, & numerum habent decentem. MATHETES, Quando minus commodè officium, suum præstant. GERON, Cum ea, quæ iam dixi, vitiosa obtrinent. MATHETES, Vnde omnes tum simplices, tum compositas, in salubri aut contrario statu esse, deprehendam. GERON, Inde, quod antè inter se connexæ, vel inuicem dissolutæ, turpiter existant: atq; sic omnes ferè partes tum sanas, tum ægras faciliè cognoscēs. MATHETES, Non satis est ergo medico futuro nosse, singulas partes ex humido, frigido, sicco, calidoq; mixtis, oriri. GERON, Nequaquam: sed ipsas etiam distinctè inspicere oportet, quæ ossium sit temperatura, quæ carnium, neruorum, venarum, aliarumq; simplicium omnium, similiter & compositarum, quæ cuiusq; sit constructio, veluti manus, cruris, iecoris, pectoris, pulmonis, cordis, & cerebri. MATHETES, Vbi iam omnes corporum status, ex hac partium notitia didicero, dic quæso, qua ratione salubris conseruari, & morbosus curari, debeat. GERON, Cum pars siue simplex, siue composita bene sana, sit omnino moderata, ægra autem immoderata, huius immoderationi, altera quadam aduersaberis, & obstitēs: in simplicium particularum vitioso statu, qualitate: in compositarum affectibus, si ad magnitudinem morbi immoderatio refertur, alteram ex aduerso magnitudinem oppones: si in figura, alteram quoq; figuram: ita habet, si in situ, & numero eueniat. Quare in omnibus contraria immoderatio, aliud immoderatum, ad mediocritatem reuocat. nam quod contra naturam est, dum ad eam reducitur, per eandem quidem viam, sed in aduersum tendentem redit. Quod si iam rursus ad priorem statum reuerti debet, certè per remedia præsentī affectioni contraria, eò perueniet. atq; id sanè, quò maximè communis, generalisq; omnium morborum curatio, dirigitur, contrarium existit, quemadmodum Hippocrates etiam memoriæ prodidit: Contraria, inquit, contrariorum sunt remedia. singula verò singulis aduersantur, vt calido quidem morbo, frigidum remedium, frigidum autem calidum adhibeatur, pari modo etiam sicco humidum, humido siccum. MATHETES, Succincta valde medendi ratio existit, quam ferè omnes

omnes homines mentis compotes, intelligunt. GERON, Vide-
tur ita omnibus, vt dicis, sed quibus, qua mensura, quomodo, &
quo tempore remedia ista adhiberi debeant, imperiti ignorant.

MATHESES, Atqui hanc medendi rationem simplicibus partibus

conuenire docuisti, quæ autem compositis accommodari potest?

GERON, Morbosæ vniuscuiusque eorum quatuor generum, de
quibus facta est mentio, immoderationi alia cōtraria opponi de-
bet, donec ad naturalem moderationem peruenerit. MATHET.

Exemplo hoc explices? GERON, Si caro amplior quàm natura e-

10 xigit, vlceri cuiquam supercreuerit, medicamentum adhibere con-
uenit, non quod carnem generet, atq; nutriat, sed quod detrahat,
demat, erodat, atq; cōsumat. contrà, si pars aliqua caua magis vl-
ceris vitio euaserit, huic medicamētum, quod carni faciundū est,
vt eam reficiat, applicari debet. vtroq; verò tandiu vtendum est,

25 quousque pars affecta, ad moderationem naturalem peruenerit:
tollere autem oportet, priusquam illa ad contrarium excedat, ni-
si enim supercrescenti carni demendo, in medio constiteris, ca-
uam partem efficies: ita nisi cauam reficiendo medium seruaue-
ris, ampliorem quàm par est, reddes. MATHESES, Si ergo in hoc

30 morborum genere, quo partes vel maiores, vel minores iusto fi-
unt, restitutio per contraria fieri debet, quid in altero genere a-
gam, quo naturalem figuram excedunt? GERON, Si pars aliqua
gibbosior quàm prius euadat, cū plures singulares cuiusq; ip-
sum distinctiones inueniantur, in contrarium statum premēdo,

35 & repellendo, deducere oportet: quæ verò introrsum compressa
est, ac veluti resima, vt in naso accidit, extrorsum reduci debet:
item læuia exasperari, aspera læuigari decet. cauitates quoque
vel meatus, vel omnino foramina, aut maiora, aut minora, aut ma-
gis vacua, aut pleniora, quàm conuenit, aut à crasis lentisq; hu-
moribus obstructa, etiam contrarij ratione, ad moderatum sta-
tum reduci necesse est. MATHESES, Quid in situ, & numero agen-

40 dum censes, si naturam excedant, vt emendari queant? GERON,
Quæ in priorem partem, retrorsum: quæ retrorsum vergunt,
prorsum agere oportet: item quæ sursum, deorsum: quæ deor-
sum, sursum: rursus quæ dextrorsum, sinistrorsum: quæ sinistror-
sum, dextrorsum mouere expedit. In numero autem partium na-
turali vitiato, considerandum est, aliud eius excessum, aliud de-
fectum existere. MATHESES, Quomodo curatio eius tentanda
erit? GERON, Non aliter quàm in magnitudine corrigenda, a-

40 blatione & adiectione perfici debet. hoc verò intercedit discrimi-
nis, quòd in isto morbi genere, nempe numero vitiato, partes to-
tæ, in magnitudine autem violata, particula illarum tolli, vel ad-

*Ex magnitudine
morbus quomodo
curandus.*

Ex figurā.

Ex situ.

Ex numero.

*Curatio morbi ex
numero.*

nci

*Curacionis indi-
catio vnde peten-
da.*

*Quæ pars affe-
cta, & quando
restitui, quæ non
poterit.*

*Naturæ & me-
dici mutua opera*

*Medicus in quo
naturæ inserui-
at & opituletur.*

*Scopus curatio-
nis.*

*Contraria contra-
rijs adhibenda.*

ripi poterint. **MATHETES**, Vnde in hisce morborum generibus vniuersis, indicatio restitutionis petenda est? **GERON**, Non à rerum agendarum notione, sed à morbi specie. verum hæc quidem curationis modum solummodo indicat: fieri verò ipsa ne possit, an minus, non item ostendit. **MATHETES**, Nihil profectò me iu-
5
go temere illi manus admoveam, explica præceptor, ex quibus li-
cebit cognoscere, quæ pars affecta, & quando restitui, quæ non
poterit. **GERON**, Ex opificis causæ robore, & infirmitate: item
ex materiæ copîa & inopîa. nam res eadem in his fieri, in illis mi-
10
nimè potest. **MATHETES**, Quæ sunt in morbis amouendis, vel
in sanitate tuenda causæ, quæ opificis rationem obtinent? **GE-
RON**, Natura, & medicus, omnium quæ corpori humano boni
causa fiunt, autores existunt: sed alia natura, alia medicus præsta-
15
re potest. nam os ita confractum, vt partes eius à sede natua ab-
errent, membrumq; distortum sit, natura corrigere, & conforma-
re, sicut & luxatum articulum reponere nequit: medicus autem
potest. Contrà vlcus cauum carne replere, sicut & semicoctum,
aut crudū quid concoquere natura potest: medicus non item: ve-
rū in hisce medicus naturæ inseruit, opitulaturq; dum vlcus
20
medicamentis, quæ id purgent, impositis purum efficit, & dum
ei quod concoquere nequit, auxilium modicè calidum applicat.
MATHETES, Hoc quod hætenus dixisti de opifice causâ intelli-
go: quid autem materiæ superiùs tribuere volebas? **GERON**, Alij
25
parti restituendæ materia perpetuò suppetit, nempe quæ ex san-
guine trahit originem, alij post primam editionem deficit, vt quæ
ex semine ortum habeat. hinc natura venam, arteriam, ligamen-
tum, neruum, & similia, vbi violata fuerit, iterum reficere ne-
quit. quare primū in omnibus eò consilium dirigi debet, vt
30
contraria contrarijs adhibeantur: deinde vt in vnoquoq; genere
contrario ordine collocentur: postremò considerādum, quan do
quidem naturæ, quando verò nobis licebit scopo inseruire, quem
indicatio suggerit: quando rursus ytriq; vel omnino denega-
tur, vel certo tempore, vel partim. Nam si materiæ inopîa vrgeat,
35
nihil eorum quæ ex semine in animali formando natura procrea-
uit, ex alio restitui poterit: quæ verò ex alimento semper gignun-
tur, instaurare licet. **MATHETES**, Illa ergo quæ recensuisti vitia-
ta, nullāme curationem recipiunt, sed quasi desperata relinquin-
tur? **GERON**, Recipiunt quidem aliquam, sed non absolutam:
quippe ossæ, aut cartilagine, aut simili parte deperdita, alia in eis
40
locum regni haud poterit, simile verò aliquid substitui licebit.
At neruolæ septi transuersi essentis, aut cordis, iecoris, similisq; id
genus

- genus vulneratæ, nullus medicinæ locus est. MATHETES, Huc ergo omnium vitiiorum, quæ hæcenus enumerasti, totam curandi rationem, deduxisse videris, vt alia refrigerentur, alia calefiant, alia humectentur, alia exiccantur: idq; consilium in similibus dedisti. at compositarum vitiata magnitudine, curationem *Curationis totius ratio, tum in partibus simplicibus, tum in compositis seruanda.*
- 5 in adimendo, vel instaurando consistere docuisti: numero autem deficiente, vel superante, aut totum adimendum, aut regenerandum esse: figuram, si peccet, ad naturalem statum reducendam: repleta vacuando: vacua replendo: obstructions aperiendo, ad
- 10 aperta contrahendo: conuiuentia & densata in contrarium du- cendo, partim adaperiendo, partim rarefaciendo: in compositionis autem morbo, vt partes diuortium continui expertæ, conglutinentur. sed quibus remediorum generibus, vitia superius dicta corrigi possint, nondum exposuisti, quare nunc ea seorsum
- 15 quæro. GERON, Certè medicamentis, cibo, potu, alijsq; auxilijs, quæ corpori adhibentur, quorum in numero sunt etiam nonnulla instrumenta, quæ luxatis articulis accommodantur. MATHETES, Itaq; totam medendi artem, ad duorum tantum capitum cognitionem redigis, nempe ad corporum, quibus succurrendum est,
- 20 & auxiliorum naturam? GERON, Pauca sanè videntur numero, sed doctrinæ vsus, & exercitij plena sunt. primum enim qui artem velit exercere medicam, omnium affectionum dignoscendarum facultatem sibi comparet, maximè illarum, quæ particulas in alto latentes infestare solent. Neq; enim cuiusuis est, singularum
- 25 partium vel simplicium, vel compositarum, cum in alto sitæ fuerint, insalubrem statum inuenire: deinde auxiliorum materiam singulis idoneam conquirere: item tum facultatem ipsorum, tum vsum habere cognitum, quæ haud minima artis pars existit. MATHETES, Cum iam pleraq; alia compendiosè hîc, & summatim
- 30 perstrinxeris, oro te, exponas etiam, qua via & ratione vnamquaq; partem affectam, eiusq; morbum deprehendere licebit? GERON, Principiò internoscendum est, quo ex genere illorum, quæ contra naturam sunt, morbus, qui tibi curandus affertur, censeatur. nam tria vniuersa repugnantium naturæ genera numerantur: vnum affectio, actionem lædens: alterum illius causa:
- 35 tertium casus, qui comitari solet, græcè *συμπάσις* dicitur, quod simul accadat, superueniatq;. MATHETES, Quæ causæ sunt eiusmodi affectionum? GERON, Principalissimæ quidem talem appellationem merentur cum agunt: dicuntur autem subinde tales, etiamsi nondum quicquam agant, ideo quod agere possint, vt cruditas morbi causa dicitur, licet hunc nondum intulerit. MATHETES, Quid vocas cruditatem? GERON, Voco hîc crudita-

Curationis totius ratio, tum in partibus simplicibus, tum in compositis seruanda.

Remediorum genera, quibus partium singularium vitia corrigenda.

Medendæ artis duo capita.

Affectionum totius corporis notitia.

Auxiliorum materia eorundem facultatis & vsus cognitio.

Partis affectæ & morbi notitia.

Tria naturæ aduersantur.

Affectio corporis actionem ledens. Causa. Casus.

Affectionis seu morbi causa.

Cruditas.

B tem,

tem, non modò frustratam in ventriculo cōcoctionem, sed in va-
sis quoq; iocinore, corporisq; mole vniuersa. apud grēcos autem
ἀμύψια proprie deprauata ventriculi concoctio: ἀμύψια, quacunq;

Casus, siue sym-
ptomata morbo-
rum quot.

in parte humores malè fuerint concocti, nominatur. MATHESES. 5

GERON, Hi tres: actionis offensa, casus qui corporibus eueniunt,
& excrementorum immoderatio, horum autem omnium est cor-
poris affectio, quam siue morbum, siue ægritudinem appellare li-
cet. MATHESES, Vnde autem hæc, eorum quæ modò retulisti,

Causa affectionis
vnde noscitur.

causa esse noscitur? GERON, Ex ijs quæ superueniunt. nonnulla 10
itaq; ipsorum necessariò affectiones comitantur: nonnulla non
necessariò, sed vel sæpè, vel rarò, vel incertò: sicut alia rursus affe-
ctionis differentiam necessariò sequuntur, Græci παθογνωμονία,

Indicia morborū.

quod affectus indicent, appellant, atq; hæc firma ac stabilia mor-
borum indicia censi debent: quæ autem non necessariò euenire 15
solent, vel morbi distinctionem, vel morem, vel magnitudinem
ostendunt. MATHESES, Non satis intelligo quæ dicis. exemplo

reddas vim vniuscuiusq; manifestam, vt ego quoq; eo adiutus,
similiter meipsum in alijs omnibus eadem ratione, & via exerci-

Exemplum in
membrana con-
stans inflamma-
tionem ex-
peria.

Inflammationis
nota.

Tumor.

Rubor.

Dolor.

tem. GERON, Finge membranam costas succingentem, quam 20
Græci πνοζωνόνη vocant, inflammatione laborare. affectus hic,
nimirum inflammatio est, cui necessariò superueniunt tumor con-
tra naturam, rubor & dolor: quorum duo sanè in conspectum nō
veniunt, solus autem dolor reliquus est, qui costas irritat, & pun-
ctorius efficitur. Dolet igitur homo, quia affectus inflammatio 25
est, doloris autem species pungens est, eò quòd affectæ partis na-
tura membranosa sit: costis autem negocium facessit, quia has af-
fectus obsidet. quinetiam dolor longissimè pertingit, quia mem-
brana costas succingens, quàm plurimùm extensa est. MATHESES.

Febris cur in-
flammationem
membranae costa-
rum sequatur.

Febris non om-
nem inflamma-
tionem comita-
tur.

Difficultas spi-
randi ex ijs est,
quæ locum affe-
ctum necessariò
sequuntur.

Spiritus paruus
& frequens cur
in inflammatio-
ne membranae.

Cur febris tanquam necessaria, semper adest comes? GERON, 30
Tum affectus, tum partis ægræ causa: quorum alterum si desit,
febris necessariò non sequetur. neq; enim si digitus inflammatio-
ne laborat, febris statim inuadit: quoniam procul à corde situs
est. neq; cū membrana succingens laborauerit, morbus autem
ipsius, aut scirrhus, aut œdema fuerit, febrim sequi necesse est. 35
difficultas verò spirandi necessariò partem affectam comitatur, quia
hæc respiratoriæ cuiusdam partis portio est. MATHESES, Cur
spiritus redditur paruus & frequens? GERON, Non sanè ob par-
tem affectam, sed propter ipsius morbum. nam dolor respiratio-
nis officinas plurimùm distendi prohibet, eò quòd illam vsu ipsi- 40
us nondum absoluto, interrumpit, cogitq; ad secundam actio-
nem celeriter properare, non tantum adhuc quietis intermitten-
do.

- do, quantum in naturali statu habebat. **MATHETES**, Sûntne aliî casus, qui hanc inflammationem necessariò comitentur? **GERON**, Est etiam pulsuum commutatio, tum quæ à febribus, tum quæ ab affectâ partis specie separari nequit. nam arteriæ febris quidem ratione, maiorem, velociorem, & frequentiores pulsus habent: quia verò pars quæ inflammatur, nervosa existit, tensionem, duritiemq; experiuntur. **MATHETES**, Quid de decubitu censendum? estne ille quoq; ex eorum numero, quæ necessariò huiusmodi morbum sequuntur? nam audiui plerunq; ægros in nullum se latus commouere, aut in alterum duntaxat decumbere potuisse: & cum se paululum à sano in affectum, aut ab hoc in sanum dimouerent, atq; in id decumberent, maximo cruciatu angisotos. **GERON**, Ita habet. interdum enim decubitus, in latus affectum, interdum in alterum facilius est, minusq; doloris adfert ægrotanti: est, cum in utroq; latere eodem modo habeat. Nam cum membrana succingens duplex existat, si quidem exterior eius circa ossa pars, validiore inflammatione laborat, ægri facilius in opposito latere decumbunt, quia in affecto, premuntur. quòd si altera, nempe interior affecta sit, ut plerunq; accidit, in opposito decumbentes, maiore dolore cruciantur: quia pars inflammata ipsis dependet. sin autem in affectam partem decumbant, minus dolent, eò quòd illa neq; ab ossibus prematur, neq; pendeat, sed ab ambobus hisce liberata sit, & super altera non affectam nititur. At utrisq; membranę partibus affectis, ægri in utrumq; latus æqualiter decumbunt. **MATHETES**, Quare dolor nonnullis ad præcordia, nonnullis ad iugulum pertingit? **GERON**, Id primum partis natura efficit: deinde quòd inflammationis casus superueniens dolorem longius protendat, quoniam enim membrana succingens, ad iugulum vsq; & per totum septum transversum pervenit, ubi superiores eius partes inflammatione affliguntur, iugulum deorsum reuelli videtur: ubi inferiores, dolor ad præcordia pertingit. **MATHETES**, Quid si in media costarum regione, inflammatio oriatur, quòd pervenire solet? **GERON**, Exigua, ne in alterutram quidem partem, nempe aut sursum, aut iugulum, aut inferius ad præcordia dolorem perducit: magna ad utrasque. **MATHETES**, Audio quare dolor vel ad iugulum, vel ad præcordia vsq; pertingat, materia verò inflammationis manetne semper eodem in loco, an discutitur, vel aliò transmittitur? **GERON**, Non in eodem persistit loco, sed accidit, ut ex parte inflammata (sicut etiam in omni oris, & oculorum inflammatione videre licet) sanies quædam tenuis, tum loci, tum morbi ipsius ratione refudet, & effundatur. nam inflammatio ex humorum influxu contrahitur,

Pulsus qui inflammationem comitari solet.

Decubitus ægri.

Membrana succingens duplex.

Dolor lateris pro inflammationis regione variat.

Dolor ad iugulum vel ad præcordia veniens.

Inflammatio in media costarum regione.

Inflammationis materia, an semper in eodem loco permaneat.

Inflammatio ex humorum influxu fit.

*Materia inflamm-
mationis quomo-
do educatur.*

tur, ipsaq; pars affecta rara existit, non cutis modo constricta, & densa. MATHETES, Quo pacto hæc materia educitur? GERON, Tussi profectò, quæ ab hoc affectu separari nequit, sed perpetuò eum comitatur, verùm si copiosus simul, & tenuis in parte inflam-
mata humor subsistit, & pars rarior est, plurimùm foris per tuf-
sim effunditur. contrà, si paucus & crassus, isq; per densa fluat,
paululùm quidem ad tussim incitabit, sed nihil expuetur: sicut et-
tiam cùm fuerit copiosissimus, egri & plurimùm tussunt, & non

*Excreatio an tuf-
sim semper comi-
tetur in pleuritide.*

pauca expuunt. MATHETES, Quemadmodùm tussis semper huic morbo adest, itane etiam excreatio? GERON, Excreant sanè ægri
non semper, sed plerunq;. MATHETES, Quo colore sputum cer-
nitur, quod ex tali affectu prodit? GERON, Non eodem semper;

*Sputi color in in-
flammatione lac-
teum.*

quia nec in parte inflammata excrementum, eiusdem semper natu-
ræ est, vt quod aliàs sanguinolentum, aliàs biliosum existat,
qualis etiam humor plerunq; defluit, qui inflammationem in pleu-
ritide efficit. MATHETES, Sputum igitur ipsius coloraturne sero
humoris, qui in parte inflammata continetur? GERON, Quid ni?
nam hinc rubrum quidẽ apparet, cùm id quod in membranam
influit, sanguineum est: flauum, cùm biliosum: spumofum verò,
quando pituitosus humor primùm impactus putridusq;, fluxio-
nis quæ inflammationem pepererit, autor existit: integrum autem
interdum apparet, cùm fluxio siue sanguinea, siue biliosa nimium
adusta fuerit. MATHETES, Quid huiusmodi omnia significare
poterunt? GERON, Præter partis affectæ, morbiq; ipsius distin-
ctionem, etiam fluxionis differentiam, nosci enim oportet cuiusq;
partis offensæ naturam, & communionem, quam cum vicinis
habet, vt, quis sit morbus, eiusq; locus deprehendatur. MATHET.
Quæ alia perspecta habere oportet? GERON, Quæ singularum
partium actio, & vsus sit: item quomodo morbi, eorumq; casus
generentur: quæ effectrices eorum sint causæ. hæc enim ad
quamvis partem læsam, eiusq; affectiones, & morbi ipsius distin-
ctiones cognoscendas requiruntur, sicut etiam morbi cuiusque
magnitudo & mores. MATHETES, Vnde hæc deprehendi po-
terunt? GERON, Magnitudo quidem ex affectionis ipsorum,
& casuum illam comitantium distinctione: mores autem ex mor-
bi differentia, & casibus, qui ipsum subsequuntur. MATHETES, In-
terpretare hoc apertiùs. GERON, In exemplo proposito, humor
melancholicus præpollens, longè perniciosissimus est, tum quòd
maximè malignus, ad erodendum acerrimus, & ad concoquen-
dum, purgandumq; contumacissimus existat, tum quòd maxi-
mum calorem indicet, à quo adustionem est expertus. sanguineus
autem omnium mitissimus est, vt pote dulcissimus, & conco-

*Sputa quid indie-
cent.*

*Morbus, & eius
sedes quomodo
cognosci queat.*

*Actio & vsus
singularum par-
tium observari
debent.*

*Magnitudo mor-
bi, & mores.*

*Humor melan-
cholicus pernicio-
sissimus.*

*Sanguineus hu-
mor qualis.*

ctu

- Et tu facillimus. reliqui duo humores, medium inter hos locum
 obtinent, quantum ad benignitatem & maliciam attinet. *MAT-*
THETES, Credo sanè sanguinem citissimè concoqui, & ad ex- *Pituita & bilis*
 cretionem inclinari: melancholicum autem humorem egerimè, *natura.*
 5 tum concoqui, tum egeri posse: pituitam & bilem, mediam quan-
 dam inter hos, & ad concoquendum, & ad excernendum natu-
 ram obtinere. Sed quid protendit, si nihil expuatur? *GERON*, Le- *Si nihil expua-*
 thale est, tum quòd fluxio ipsa ab inflammatione detineatur, tum *tur.*
 quòd, si intus maneat, tota corrumpatur, quemadmodum, si & fa-
 10 cile, & sine molestia materia expuatur, securissimum est: si coctum
 sputum fuerit, multò securius. *MATHESES*, Quæ alia morbi *Sputum facile*
 conditionem & naturam indicant? *GERON*, Pulsus arteriarum, *Morbi naturam*
 qui huiusmodi morbos comitari solent, sicut alia omnia, quæ ex *& conditionem*
 confortij lege obueniunt, vt deliria, sopores, fastidium, vrinæ, & *quæ indicent.*
 15 deiectiones aliæ atq; aliæ, conditionem morbi significant, vnde
 prælagire licet, quòd morbus, & dexter auxiliorum vsus tendat.
 nam prælagatio medicum excusat, si mors secuta sit, ægrosq; red- *Prælagatio.*
 dit obtemperantes, & longè antea tempus auxiliorum docet.
 quòd autem dexter illorum vsus, pars artis sit principalis, nemini
 20 est obscurum. *MATHESES*, Vno hæcenus exemplo, partem af-
 fectam, morbumq; ipsum indicasti, quin in altero adhuc clarius
 mihi exponas. *GERON*, Faciam id ex ijs, quæ excerni solent. nam
 excrementorum species multa docet: huic autem coniuncta est
 25 pars, vnde excretionem fieri cernimus, vt ex ambobus consocia-
 tis, firma quædam indicatio oriatur. Si enim (verbi gratia) mem-
 branosum quippiam excretum sit, id ipsum si apparuerit, eiusmo-
 di partem exulceratam esse indicat, quæ in superficie membrano-
 sam quandam naturam habeat: separata verò id ostendere nequit.
 Attamen regio per quam sit excretio, ad affectam partem veluti *Regio per quam*
 30 manu nos deducit. etenim in frà per aluum deiectum, intestini *fit excretio.*
 vlcus testatur: suprà vomitu reiectum, ventris: per tussim reddi-
 tum, membranarum, quæ asperas arterias integunt: per vrinas
 vesicæ, vel naturalium meatus, has itaq; ipsas partes, nec non illas
 quæ tum confortij lege, tum primariò laborant, inuicem discer- *Per aluum.*
 35 nere conuenit, ac distinguere principatu, consequentia, magnitu- *Per vomitum.*
 dine, paruitate, & acclensione causarum vtrasq; deprauantium.
 Complures igitur ob stomachi affectus, vel cerebro consentiète,
 melancholiæ casibus infestantur, vel oculis confortij lege dolen-
 tibus, suffusionum casus experiuntur. at si quis hæc diligenter a- *Partes distingui*
 40 nimaduertat, deprehendet affectus iam commemoratos, ex cru- *debent.*
 ditatibus, & recrementorum in ore ventriculi collectionibus
 prouenire: nec nò illas augeri ex ijs, quæ os ventriculi offendunt,
 3 remi-



*Remediorum com-
modo vsui quid
necessarium.*

*Morbi ex intem-
perie, essentiam
partis in se stare
solent.*

Morbi ex figura.

*Cavitates &
meatus propria
curationis ratio-
nem suggerere.*

*Curationis indi-
catio ex figura et
sit.*

*Obstructionis
curatio.*

*Euacuatio quib-
us in locis fieri
conueniat, figura
viscerum & situs
indicat.*

remittere ex his, quæ ipsum iuuare dicuntur. **MATHESES**, Co-
gnitis iam partibus affectis, quid ad commodum remediorum
vsum requiritur? **GERON**, Partium essentia, figura, & situs co-
gnitio. nam essentia primos morbos, qui ex intemperie gignun-
tur, edocet, quantum à naturali statu recesserint, quantumq; cale-
facere, refrigerare, humectare, & siccare oporteat. figura morbos,
de quibus antea dictum est, indicat, quantum à naturali modo
declinarint: eiusq; excessus docet, quatenus per contraria illi im-
mutari debeant, vt ad naturalem statum reuertantur. atq; hæc
morbis ex intemperie ortis, proportionem respondent. Porro ca-
uitates et meatus, propriam curationis rationem suggerunt, nam
partes quædam spaciosas laxitates intra se habent, vt arteria, &
vena artuum: nerui autem horum, neutro in loco: qui verò intra
peritonæum existunt, in altero tantum: quædam foris & intrò am-
plas capacitates habent, vt viscera ferè omnia. adhæc caro ipsa in
pulmone spongiosa, in renibus densissima: post hanc iecoris: lie-
nis autem, quanto densior est ea, quæ in pulmone habetur, tanto
iecoraria rarior. hæc autem communem habent cum his, quæ
à situ indicationem sumunt. In omnibus igitur his, quæ neutra
ex parte cavitates, & receptacula habent, defluxiones superfluita-
tem recipientes, fortiter exiccare, & si non fuerint natura siccio-
res, sicut nerui, & præcipuè in artubus, quæ intus & extrà aliquid
inflammationis, remittere possunt, non adeò validè siccantibus
indigent, præsertim si laxam partem, vt pulmo, habuerint. **MA-
THESES**, Exemplo rem nobis redde clariorem, quod ex figura,
& situ, indicationem curationis ostendat. **GERON**, Obstructio
vnus ex compositis affectus est, potissimum verò iocinoris, tum
propter eius constructionem, tum ob actionem accidit. etenim
vena, quæ à portis in totam iecoris cauam partem distribuuntur,
osculis earum, quæ in gibba sunt, sensum latentibus cohærent, a-
limentum autem totum ex ventre ad portas defertur: hinc, in ca-
uam iecoris regionem: inde, per terminos venarum iam dictos,
in gibbam transumitur: vnde fit, vt viscus hoc crebris obstru-
ctionibus, ob viarum angustiam, & materie permeantis copiam,
corripiatur. **MATHESES**, Quæ ergo curatio fuerit? **GERON**, Vt
cibi & medicamenta extenuantia exhibeantur, antequàm obstru-
ctio augeatur, latiusq; pertingat, & homo febricitet. quod si verò
adaucta fuerit, non modò his auxilijs, sed etiam euacuatione v-
tendum, quam quibus in locis fieri conueniat, tum figura visce-
ris, tum situs indicat. **MATHESES**, Dic, quomodo hoc intelli-
gam? **GERON**, Quæ in cauis partibus continentur, quia ex ven-
tre illius prouenerunt, ad intestina dirigemus: quæ verò in gib-
bis,

his, per vrinas educemus: simili modo, quę in thorace & pulmone continentur, per tussim expurgabimus: quę in cerebro harent, ad nares trahere oportet. *MATHESES*, Partium inflammatione laborantium curatio, etiāne ex situ & figura sumetur?

*Inflammatiō
partium quomodo
tentanda sit.*

5 *GERON*, Maximē: quomodo autem tentanda sit, compositarum partium natura docebit. *MATHESES*, Quaratione? *GERON*, Si humores in coxam decubuerint, per venas poplitis & tali, os educemus: per easdem etiā, si qui in vtero continentur: in thorace, & pulmone collecta, per interiorem cubiti venam detrahe-

*Euacuatiō quę
optima, & facilis
sit.*

10 mus: quę in capite, & ceruice infestant, per humerariam. nam optima, facillimaq; est ductio, quę per proximās, & affectę parti communes venas, confieri solet. *MATHESES*, De principio ne morbi dicis, an de fine?

*Reuulsio quibus
medeatur.*

15 *GERON*, De principio. nam fluentibus adhuc humoribus, reuulsio quam Hippocrates ἀνίστασθαι vocat, medetur: ijs autem, qui iam parti affectę infixi sunt, deriuatio, quę

Deriuatio quibus

15 *παροξισμός* appellatur: utrūq; verō euacuationis genus, per communes venas fieri debet. *MATHESES*, Non satis assequor, quasnam sic appelles?

*Venę communes
quę appellantur
in reuellendis, de-
ruiandisq; humo-
ribus.*

20 *GERON*, Quę in brachijs extant, communes ijs, quę in auribus habentur: & quę in his apparent, cum illis, quę in brachijs visuntur, cōmunionem obtinent. si itaq; humores in vtero contentos, reuellere sursum, hoc est, in contrarium trahere

*Venę quęnam in
superioribus parti-
bus inflammatio-
ne laboranti-
bus incidendę.*

20 velis, eam quę in cubito est, venam incidas, aut cucurbitulas mamillis defigas, vel manus calefacias, vel eas deliges: rursus, si inuicem illos deriuare cogites, venam poplitis, aut tali serias, cucurbitulas inguinibus accommodes, crura calefacias, perfrices, &

25 deliges: si verō sinistra laboret, ex artubus, qui in illa directō habentur, sanguinem detrahas. Venas autem incidere oportet, quę viciniores, magisq; locis affectis directę existant. nam licet inflammato, si libet emittere sanguinem, interiores sinistri bra-

*Venę viciniores,
& locis affectis
directę incidendę.*

30 chij venas: in iecore, dextri incides. *MATHESES*, Quas autem incidam, si superiores inflammationem experiantur? *GERON*, In angina, lippitudine, alijsq; capitis affectibus, exteriores, & è directō sitas: in artubus autem offensis, coniuges, siue reuellendi, siue

*Venę incidendę
coniuges in superio-
rioribus partibus
inflammatis.*

35 deriuandi gratia, sanguinem detrahare oporteat. Hoc tamen obseruare debes, vt cum morbus inueterauerit, ex ipsa parte læsa, aut ex vicina, humorem educas. Ita quoq; in angina, venas lingue subiectas incidemus, vbi totum quidem corpus recementis vacuum fuerit, morbus autem in vetustatem inciderit. Eodem eti-

*Morbo inueterato,
ex qua parte
humorem ducere
conueniat.*

35 am modo lieni & iecori cucurbitulas applicamus, aliamq; partem

40 quamlibet sic affectam, scarificamus, vbi humores non amplius influunt. nam si adhuc fluunt, parti ipsi nullum adhibendum est remedium: quia tunc illos magis irritares, malumq; duplo maius

*Humoribus ad-
huc fluentibus,
nullum adhiben-
dum est remediū.*

Humores, quatenus educere tentum pestilium sit.

redderes. MATHETES, Quando igitur tempestivum erit? GERON, Vbi totum iam corpus recrementis liberum fuerit, neque amplius quippiam influit, in parte autem læsa, id quod pridem influxerat, adhuc continetur, tunc ex ipsamet humores educes: si id fieri nequeat, saltem ex vicina, aut per venas ductas ab ijs, quæ in partibus ipsis sitæ sunt: superius, eas communes appellavi. MATHETES, Humoresne per solam venæ incisionem, educi debent?

Humores, an per solam venæ incisionem educi debeant.

GERON, Non per hanc solam, sed etiam per medicamenta: ut si gibba iecoris regio laboret, id quod in ea continetur, per urinam

Humores, pro sitis ratione educendi.

ducere convenit: si caua, per aluum. ita pectus & pulmonem per tussim expurgare licet: ventriculum & stomachum, per vomitum: intestina, per deflectionem, sicut etiam lienem: renes autem per urinas: vterum per menstrua: cerebrum per palatum, gurgulionem, aures & nares. MATHETES, Hactenus de humoribus

Qualia remedia pro partium affectuum situ, adhiberi debeant.

tum per initia, tum morbis iam inueteratis, pro partium affectuum situs ratione educendis, diligenter me docuisti, nunc de remedijs agas obsecro, quæ ipsis applicari debeant. GERON, Ex

ternis ac superficarijs sanè partibus, talis medicamentorum speciei adhibenda est, qualem affectus requirit: penitioribus ac in alto sitis ea, cuius facultatem, non qualis nunc, sed qualis futura est,

Partibus in alto sitis, validiora requirunt remedia.

accommodandam ex situ etiam, discimus. nam antea per medias aliquot partes transire cogitur, quàm ad læsam perveniat. quare mendicamenti, siue ex ijs sit, quæ imponuntur, siue ex illis, quæ in cibo aut potu sumuntur, non præsens vis, sed ea, quam habebit,

cùm parti affectæ appropinquat, inspicere oportet. Hac ratione, quæ ad pulmonis inflammationes extrinsecus, ac thoraci admoventur, multò validioris, acriorisq; naturæ esse debent, quàm

Remedia acrimia inflammatis partibus altius sitis idonea.

quæ ipsi visceri applicentur, si fieri possit. quod enim per multas partes interpositas ad locum affectum pervenire debet: si per initia imbecillæ fuerit, in transitu prorsus exoluitur, & elanguescit.

MATHETES, Quæ ergo sunt acriora remedia? GERON, Si pars multò fuerit remotior, altiusq; sita, cucurbitulis utimur: quod auxilium inflammationibus per extima subortis, valde aduersatur. Ita cùm sanguis ex pulmone reijcitur, astringens quoddam

Astringentia in sanguinis reiectione thoraci admoveere periculosum est.

medicamentum, parti quidem affectæ conveniret: quia verò ad eam penetrare nequit, alia quædam medicina commiscenda erit, quæ illud quasi manu eò deducat, aut ipso nō utendum erit. nam

qui thoraci astringentia in tali affectu, admovent, maximum ægro discrimen vitæ, adferunt, eò quòd eiusmodi medicamēta etiam sanguinem, qui in thorace continetur, ad partē affectam, quòd ipsa pervenire nō possunt, propellunt. Eadem quoq; ratio est in liene, iecore, & omnibus, quæ intra peritonēū continentur, obser-

uanda.

- uanda. sæpius enim cutis, tametsi durior, minusq; affectibus oportuna, quam viscera existat, tamen eiusmodi impositis exulceratur. Quod si ipsis visceribus medicamenta applicare possemus, quibus frequenter indigent, hoc leniora esse oporteret, quod etiam
- 5 ipsorum natura facilius afficitur. Et quidem omnia medicamenta quæ esse, & bibere medici præcipiunt, viscerum affectibus idonea, longè acriora, validioraq; facultatibus esse conuenit, quam illa, quibus partes affectæ indigent, si excipias ea, quæ ventriculo & stomacho conducunt. hic namq; sola talia exhibentur, quæ
- 10 lia affectus requirunt: cæteris vero omnia acriora, valentioraq; præsertim quæ renum vel pulmonis caussa exhibentur, eoq; statim ex apertione corporum, quam anatomen vocent, disquirendum est, quot numero partes medicamentum, quod ad pulmonem affectum, sit peruenturum, antea transire cogatur. In singulis enim partibus, aliquid ex humoribus admiscetur, ac mutationem quandam, commutationemq; pro visceris natura experitur. quare id quod ex facultate ipsius reliquum est, adeo exiguum, & languidum existit, vt partem affectam adiuuare satis nequeat. Eodem modo in remedijs habet, quæ extrinsecus admouentur.
- 20 nam in externa inflammatione, tale esse medicamentum oportet, quale species inflammationis indicat: in ea verò, quæ altè latet, tantò acrius requiritur, quanto illa ab exterioribus partibus magis recessit. MATHETES, Cum iam omnes ferè curandi rationes, breuiter sis persecutus, vnum adhuc, quod ad illas conducere mihi videtur, reliquum, scire ex te cupio: num scilicet fieri possit, vt quis ante morborum finè, prænoscat sanitasne, an mors sit expectanda? GERON, Fieri utiq; potest, si omnia dextrè in curatione administrentur, nec peccatum ab ægro in victu committatur. MATHETES, Ars ne quædam de his tradita est? GERON, Græci
- 30 copiosè, præsertim Hippocrates & Galenus eam tractarunt, vocaruntq; *πρόγνωσιν*. hæc siquidem omnia, quæ in morbis euentura sunt, ante illorum solutionem prænunciat. MATHETES, Si ergo ars quædam præfagiendi existit, quomodo illam consequar obsecro? GERON, Vnum sanè, & primum te hoc scire oportet, nonnulla necessariò euenire: nonnulla verò casu, & fortuitò. MATHETES, Quænam igitur necessariò eueniunt? GERON, Quæ morbi & naturæ ratione fiunt: vt si ille validus, hæc autem imbecilla sit, mors certò præfagiri potest: contrà si natura valentior morbo resistat leuiori, sanitas speratur. MATHETES, Vnde natura valentior, aut imbecillior cognosci potest? GERON, Summatim quidem ex actionum integritate & vitio, membratim autem ex singularibus actionibus. quarum primum quidem genus
- ad prin-

*Medicamenta
quæ edimus, &
bibimus, viscerum
affectibus idonea*

*Ventriculi medicamenta.
Renum.
Pulmonis.*

*Medicamentum
partes in alto sitas
transiens, quale
le fiat.*

*Medicamentum
in externa inflammatione
quale esse oportet.*

*Præfagiri ne sanitas
an mors possit, ante morborum
finem.*

Prognostice.

*Necessariò quæ
eueniunt.*

*Naturæ robur
vel imbecillitas
vnde cognoscatur.*

*Præfagia futu-
rorum, ex recre-
mentis sumuntur.*

*Natura ægri,
& medentis vi-
tio sepe impedi-
tur.*

*Præfagia quan-
to eueniant, re-
spondeantq; me-
denti.*

*Ἐξ ὧν ὁ ἰατρὴς
ridicula.*

*De morbis quo
pacto augurari li-
ceat.*

*Morbi solutio
quando rectè præ-
dicatur.*

*Quid præfagire
liceat, si & mor-
bus & natura va-
lens existat.*

*Natura vis ex
proprijs faculta-
tibus, maximè
verò ex pulsa de-
prehenditur.*

*Magnitudo mor-
bi vnde cognos-
citur.*

*Recrementa or-
gana concocta
aut cruda, natu-
re vires indicant*

ad principia refertur: alterum ad ea, quæ ab illis propagantur: iter-
tium ad illa, quæ peculiarem quidem habent administrationem,
sed processus quosdam ab illis recipiunt. quartum enim genus sui
quidem ratione, ad prænotiones inutile existit: fortuitum autem
ex his quoq; præfagire licet. quemadmodum etiam ex recremen-
tis, præfagia de futuris nunquam non sumi possunt: ex illis qui-
dem consortij, ac consensus lege: ex his autem, quoniam singula
pro sua quæq; natura, statum concoctionis tempus habent, aut
naturam materia illorum, aut materiam natura superiorem fore
deprehendimus. Hoc interim admonere te volo, naturam sæpe
vel ægri, vel medentis vitio impediri: vt hic illud quo tendebat,
non assequatur, & sine, qui prædici poterat, frustretur. præfagia
enim tunc solum eueniunt, cum & is qui curat, medicus optimus
est, & æger nihil delinquit. quippe errores commissi, aut morbi
solutionem remorantur, aut mortem accelerant. **MATHEUS, Ri-**
diculam igitur esse video artem prognosticam, quã diuinatores
profidentur, qui morbos hoc, vel illo modo finiendos prædicunt,
non apponentes, omnibus ritè administratis. **GERON, Rectè sen-**
tis. falluntur enim, qui de morbis hoc pacto augurantur: multò au-
tem rectius medici sapiunt, qui morbum (si omnia, vt par est, agan-
tur) septimo die solutum iri prædicunt: si autem error commit-
tatur parvus, morbi solutio ex septimo in nonum diem transibit:
magnus, in vndecimum: si adhuc maior, in decimum quartum:
si maximus, periculum vitæ pro certa salute sequetur. **MATHEUS.**
Quod si vterq; tum morbus, tum natura valens fuerit, tumne et-
tiam præfagire possunus? **GERON, Maximè.** quemadmodum
si luctatores duos fortes, singulari certamine congressos videamus,
ex primis ipsorum insultibus deprehendere possumus, non
solum vter alterum superaturus sit, sed etiam vter præter victo-
riam, sæpe aduersarium etiam celerrimè sit prostraturus. **MATHE-**
TES. Hec igitur ex accurata virium, morbi, & naturæ cognitione
prænoscimus? **GERON, Imò,** ex his ipsis etiam præfinitum tem-
pus victoriæ, aut offensionis deprehendimus: at robur naturæ ex
proprijs functionibus, vt supra annotatum est, maximè verò ex
pulsu: quoniam huius opifex facultas, est vitalis. **MATHEUS, Sed**
morbi magnitudo vnde cognoscitur? **GERON, Ex ipsis,** quæ illi
superueniunt, *συμπτώματα* græcè vocauimus. quantum enim natu-
ra morbum, vel morbus naturam vincat, ex concoctione, & cru-
ditate propriorum recrementorum deprehendimus: ventris fa-
nè, quæ per aluum deiciuntur: vasorum autem, quæ per vrinas
excernuntur: totius rursus corporis, quæ per sudores. Ita etiam
alia omnia recrementa, quæ in vna, vel pluribus partibus consi-
stunt,

- stunt, concocta, aut cruda, naturæ vires indicant. in thorace quidem & pulmone, ea quæ tussis rejiciuntur: quæ in vesica & renibus, illa quæ in vrinis feruntur: in iecoris autem caua regione, & mesenterio, ea etiam quæ inferius descendunt: in superiore ventre & stomacho, ea quæ vomitu rejiciuntur. At cerebri robur, quantum sit, ea quæ per palatum, aut nares, auresque excernuntur, indicant. in omnibus autem commune est, ut morbus non prius solvatur, quam concoctionis nota, in recrementis exeuntibus appareat, siue aures, siue oculi, siue guttur malè habuerit. In summa, omnes excrementorum maturaciones, celeritatem crisis, & securam sanitatem portendunt: cruda verò, concoctionis expertia, & in prauos abscessus conuersa, crisis frustrationem, vel labores, vel moram morbi, vel mortem, vel recidivas morborum nunciant. **MATHESES**, Cum ista quæ recensuisti, necessariò eueniant, quænam illa sunt, quæ casu accidere ægro pronuncias? **GERON**, Illa nimirum, quæ extra morbum sunt, ut si nocturnus vicinorum tumultus, aut canum latratus, aut triste nuncium, egros reddiderit insomnes. **MATHESES**, Ergo quæ morbi ratione accidunt, certa ne portendere possunt? **GERON**, Non omnia, ut in acutis morbis potissimum euenit. potest enim humor superfluius intra corpus ad partem aliquam vitæ necessariam confluere: quemadmodum contrà alius ex nobili parte in obscuram transinigrare. Is sanè, qui in nobilem partem inuectus est, summum periculum esse futurum: qui verò in ignobilem labitur, repentinam ac inopinatam ægro salutem aduenturam, significat. Ac in huiusmodi corporis statibus, hoc solum certò, & indubiè prædicere possumus, quem verò in finem tendat, accuratè scire nemo potest: sicut etiam de furentibus acutorum morborum humoribus, inconstans ac incertum est iudicium. de illis verò, qui iam partem aliquam obsiderunt, licet nobis quid futurum sit, prænoscere certius, ubi varias naturæ facultates, & quænam ipsorum sit differentia, nouerimus. **MATHESES**, Videris duo tantum hîc humorum excrementa adducere: vnum, quod per totum corpus vagatur moueturque: alterum quod in partem aliquam refedit: quid de illis iudicas, quæ adhuc cum sanguine in vniuerso corpore sunt commista? **GERON**, Si iustò copiosiora non sint, singula sunt concoquendi tempus habitura diximus, modò cuiusque naturam cognouerimus. ita namque etiam de concoctione ipsius nonnihil artificiosè coniectare licebit, ubi omnia, nimirum circa ægrum rectè administrantur. Nemo igitur vel mediocriter in prognostica arte versatus, morbum illum, cuius concoctio ut absoluitur, duos requirit menses, quatuor tantum, aut septem diebus solum

*Cerebri robur
quænam indicet.*

*Excrementorum
maturaciones, &
cruditates quid
ostendant.*

*Casu, quænam
accidere in mor-
bis soleant.*

*Non omnia cer-
ta ex morbi ra-
tione portendun-
tur.*

*De furentibus a-
cutorum morbo-
rum humoribus
incertum est iu-
dicium.*

*Duo humorum
excrementa.*

*Excrementa su-
um concoctionis
tempus habent.*

*Morbus suum
quisq. terminum
habet.*

iri presagiet. sicut enim vnumquodq; animans proprium viuendi tempus, ita morbi suum quisq; terminum obtinet. **MATHE.**

*Præcauendi mor-
bos ratio.*

*Conualescentium
recreatio.*

*Sanitatis con-
seruatio.*

*Humores eorum
quæ naturæ ad-
uersentur, causæ
sunt.*

*Causæ morbi dif-
ficulter cognosci
possunt.*

*Humores copio-
sos, aut prauos,
vel visceris ob-
structio unde co-
gnoscere liceat.*

*Sanis omnia se-
cundū naturam
insunt: ægrotan-
tibus contrā.*

*Venientis morbi
signa.*

Hec ne omnia sunt, quæ ad morbos curandos pertinent, an quedā etiamnum dicenda supersunt? **GERON**, Super sunt vtiq; sed pau-

ca: primum nempe, quomodo ij tractari debeant, qui morbis quidem nondum sunt impliciti, sed paulò post ægrotaturi, nisi ipsi prospiciatur. secundum, qua ratione à morbis conualescentes re-

creari possint: tertium, quo pacto integra sanitate præditi, in ea queant conseruari. veteres has artis partes *προφυλακτικὴν, ἀναληπτικὴν, ὑγιαίνουσαν* appellant. **MATHE.** **TES**, Quin illas eodem compendio

& ordine, quo superiora docuisti, & ex quibus singulæ consenti, persequaris. **GERON**, Vniuersum ipsarum genus in humoribus

consistit, ex quibus, quæ naturæ aduersantur, originem trahunt: cuiusmodi sunt causæ, affectiones, & symptomata, quæ semper

in primis retineri in memoria debent. Cum enim, vel quædam humorum copia, vel prauitas, vel obstructio, vel corruptum vis

in corpore contrahitur, periculum est, ne homo propemodum ægrotet. difficulter autem huiusmodi causæ cognosci possunt:

quemadmodum etiam canis rabiosi virus, nullum peculiare signum in corpore effert, priusquàm ille, qui commorsus est, pro-

pè rabiatur. **MATHE.** **TES**, Quid autem agendum censes, vbi nullis ex signis affectionem medicus animaduertere poterit? **GERON**,

Ægros diligenter interrogare debet, quæ illis acciderint. Cùm autem copiosi, vel mali humores in corporis mole suboriuntur,

vel viscus aliquod obstruitur, ea licet per casus quosdam cognoscere, quæ media quodammodo existunt, tum eorum quæ sanis

insunt, tum illorum, quæ ægris accidunt. nam quæ sanis insunt, ea omnia secundum naturam sunt, & inculcata: quæ verò ægro-

tantibus eueniunt, contra naturam, & vitiosa: quæ medio horum loco consistunt, ex genere quidem illorum habentur, quæ mor-

bis contingunt, sed ad eò exigua, & infirma viribus, vt nondum solitæ cuiusq; actiones ab eis impediuntur. Exempli gratia: dolor

capitis, aut alterius cuiusdam partis ad eò paruus, vt hominem lecto decumbere nondum cogat. quinetiam grauitas, aut præcordiorum, aut capitis, aut alterius cuiusdam partis, aut visceris, quæ

nec ipsa consuetas actiones impedire queat. Adhuc magis corporis tumor, aut gracilitas, aut malus color, & ad motiones

pigritia, aut somnolenta affectio, aut vigiliæ nondum satis magnæ, vt hominem à vitæ transigendæ actionibus, abducant:

multò magis fastidium aliquod, aut vehemens ciborum appetitus. Ambo namq; sunt, corpore etiam non admodum sano:

quæadmodum, si quis minus, aut magis sitiatur, quàm par sit, aut in

stoma-

- stomacho seu ventriculo roſionem percipiat, aut corporis laſitu-
dinem experiatur. Huiusmodi enim formula quedam eſt eorum,
quæ in morbum prolapſuris eueniunt. MATHETES, Cùm iam
hæc ab illis, qui me conſulent, audiëro, quomodo venienti mor-
5 bo ſuccurram? GERON, Duplex eſt cauendi morbi ratio: nempe *Morbi cauendi duplex ratio.*
pe immutatio, quam vulgus alterationem vocat, & euacuatio. *Immutatio quomodo fiat.*
MATHETES, Quomodo autem fit immutatio? GERON, Contra-
rijs, vel tota eſſentia, vel vna qualitate, vel duabus. MATHETES,
Quænam immutatio fit contrarijs tota eſſentia? GERON, Eo-
10 rum quæ toto genere contra naturam ſunt, vt venena, & virus
peſtiferorum animalium, peſtisq; ipſa, quæ & immutari, & eua-
cuari debent. quæ verò ad naturalem ſtatum redire poſſunt, im-
mutari tantum crassa & viſcoſa extenuando, incidendoq; tenuia
15 efficiendo crassa: communiter autem vtraq; concoquendo, ob-
ſtructiones aperiundo. MATHETES, A quibus autem hæc immu-
tationes ſiunt? GERON, Immutantur ſanè humores, vel ab ipſa
parte, cui inſunt, dum concoquuntur: vel à medicatis quibusdam
facultatibus, quæ etiam virus & venena tranſmutant. MATHET.
Quomodo autem fiet euacuatio? GERON, Attractorijs remedijs.
20 MATHETES, Quibus? GERON, Ipſi affectus docebunt. ſi namq;
omnes ſimiliter humores adaucti fuerint, principaliffima qui-
dem, & maxima euacuatio, per ſanguinis detractionem adhibe-
tur: reliquæ verò, functionibus totius corporis, exercitijs, balne-
is, inedia. Ita euacuare etiam corpus oportet, ſi in eo ſolus redun-
det ſanguis. MATHETES, Quid agendum cenſes, vbi ſlauæ, aut
25 atræ bilis humor, vel aquoſum quoddam humoris ſerum exupe-
ret? GERON, Euacuari quidem debet, ſed non ſimiliter, nam pri-
marum venarum recrementa, alui ſubductionibus purganda
ſunt: aliarum autem, ſiquidem aquoſa & tenuia, per vrinas: ſi au-
30 tem biliſa fuerint, per aluum educere conuenit. quanquam eti-
am tenuia per deiectiones euacuare liceat. MATHET. Quo pacto
ea tollentur, quæ per totum corporis habitum diſperſa ſunt? GE-
RON, Tenuia certè per ſudorem, & per medicamenta cuti admo-
ta exiccari ſolent: biliſa verò primùm purgare, deinde per cutem
35 euacuare oportet. MATHETES, Quòd ſi pituitæ humor exun-
det, qua ratione auferetur? GERON, Si quidem ſalfa fuerit, medi-
camento expurgabitur: ſi acida, immutationem requirit. MA-
THETES, Quamnam immutationem hic intelligis? GERON, Que
fit per concoctionem, in qua obeunda, natura adiuuari debet.
40 MATHETES, Quibus? GERON, Quiete, calore moderato, cibis bo-
ni ſucci ac modicis, vini paulum calefacientis potu. calorem au-
tem moderatum præſtant puelli, aut catuli ventri incumbentes,

C frictio

Pituita dulcis. frictio mediocris, moderatus calidarum aquarum usus, cibi & medicamenta modicè calefacientia. At dulcis pituita multò facilius concoquitur. MATHETES, Quibus obstructions viscerum aperiuntur. GERON, Cibo, potuq; idoneo, & medicamentis extenuandi facultate præditis. MATHETES, Vbi iam ægri à morbis conualuerint, imbecilles autem inde, ac senio confecti fuerint, quomodo recreari, ac refici poterunt. GERON, Cum nulla eos causa contra naturam, nec affectio infestat, sed sola corporis gracilitas, imbecillitasq; virium adsit, quam bonus quidem sanguis, & cum eo spiritus animalis, & vitalis, sed exiguus licet, effecerit: unde etiam solidæ illorum partes sicciores, eoque inualidiores, & totum deniq; corpus frigidius euaserit, magis præsentanea auxilia, ad huiusmodi habitum corrigendum esse puto, quæ celeriter & securè nutriunt: præcipuè verò mediocrem motum, cibum, potum, & somnum. MATHETES, Cum motus varij sint, quinam hisce conueniunt. GERON, Gestatio, ambulatio, frictio, & balneum: atq; si ex his meliusculè habuerint, paulatim ad consueta vitæ munera se conferant. MATHETES, Quos ipsis cibos præscribis. GERON, Principiò quidem humidos, concoctu faciles, & non frigidos: processu autè temporis eos, qui liberalius præstant alimentum. MATHETES, Quem potum commendas. GERON, Vinum, ætate quidem medium, sed leuius, & pellucidum: quod scilicet subflauum, vel album existat, odore gratum, gustu nec omnino aquosum, nec insigniter aut dulce, aut acre, aut amarum, aut aliam qualitatem eximiam respiciens. In illis autem regionibus, quæ vinis carent, cereuisiam claram, quæ ex hordeo, & lupulo confecta sit. quare etiam aqua læuissima ex cinamomo, nucemulcata, & alijs id genus cocta, qua Turcæ uti solent. MATHETES, Postquam valetudinarius ad pristinam sanitatem redierit, quibus præsidijs hanc tueri poterit. GERON, Ferè ijs, quæ iam commemorauit: quanquam in hoc à curatoria artis parte differat, quòd hæc paulatim viciata corrigat. Itaq; si corpus priorem habitum conseruaret, arte, quæ illi præesset, neutiquam indigeret: verum quia corrumpitur, nec idem perpetuò perseuerat, factum est, ut artem, quæ ipsi prospiciat, desideret. MATHETES, Hoc nondum assequor, explica luculentiùs. GERON, Cum quotidie corporis essentia aliquid decedat, necessarium est, ut, ne tota euaporet & dissipetur, cibo moderato, concoctu facili, non nimis viscoso, crasso, aut tenui: potu autem vini generosi, odorati, puri, modico & familiari naturæ, illud resarciamus. quia verò omnia que eduntur, bibunturq;, ad amulsim effluxæ essentia similia reddi nequeant ac confici, necesse est recrementa praua inde excitari, humo-

- humorumq; copiam: quæ cum corpori noceant, auferri protinus debent. **MATHESES**, Quibus remedijs? **GERON**, Exercitijs, quæ huc dirigantur, vt recrementa quidem efficiantur, expurgenturq; humores autem concoquantur. **MATHESES**, Quid aliud ad con-
- 5 seruandam sanitatem agendum censes? **GERON**, Omnes causæ, quæ illam offendere possunt, vitari debent: nempe somnus immoderatus, intempestiua venus, calor, frigus: item lassitudo, cruditas, temulentia, vigilia, tristitia, furor, ira, & aliæ id genus animi perturbationes. atq; hæc tibi nuper medicinæ initiato iam sufficere iudico. **MATHESES**, Nihil præterea desidero, quàm vt argumentum, quod in hac institutione es persecutus, in summam redigas, quò facilius etiam aliorum meminisse possim. **GERON**,
- 10 Medicina est ex earum artium numero, quæ in actione consistunt, non autem simpliciter, vt ex ædificatoria, fabrilis, & textoria, sed qualis ea, quæ collapsas ædes instaurat, & laceras vestes refarcit. quoniam verò & hæc bifariam constituuntur, nempe aut ab artifice exempla ex se fingente, aut extrinsecus inspiciente: medicina secundi generis existit. Non enim ex se ipsa fingit exempla, sed ex corporis humani consuetudine, totum id accuratè
- 20 meditata, ipsum quod corrumpitur, emendare conatur. Differt autem hæc ab alijs artibus, quòd magnam partem eorum, quæ in illa fiunt, natura operante suppeditat: vniuersa verò ipsius cognitio, qua nitens medicus tum corrector, tum minister est, omnibus alijs factorijs artibus proportionè respondet. Etenim simplicium partium essentiam, & compositarum generationis modum:
- 25 item quomodo affectus inueniantur, & quò singulorum curationis consilia dirigantur, edocet. **MATHESES**, Maximas tibi gratias habeo, optime præceptor, quòd omnia tam candidè, & luculenter, quæ artem medicam constituunt, edocere non sis gra-
- 30 uatus, oro te obnixè, vt quando opportunum erit, eadem copiosius ordine contrario, quem compositorium appellasti, interpreteris. **GERON**, Faciam libenter quandocunq; voles. gaudeo enim te medicam hanc artem obiter nunc, & veluti ex transcurso perceptam, accuratius deinde, & fusiùs omnes eius partes inuestigare, ac cognoscere velle: alio nimirum instituto, & consilio, quàm
- 35 hodie pleriq; faciunt, qui vix elementis illius rectè intellectis, solo nominis titulo, & experimentis, nescio quibus, aliunde mendicatis freti, ægrotis se posse mederi profitentur.

Recrementa præsua quibus remedijs auferenda.

Ad sanitatem conseruandam quæ vitari debeant.

Medicina ex quarum artium genere existat.

Medicina in quo ab alijs artibus differat.

Cognitio medicine alijs artibus factorijs respondet.

29

Ioannis Guintherij Ander-
naci Medici

DE MEDICINA VETERI ET NOVA

TVM COGNOSCENDA, TVM FACIVNDA,

Ad iuuentutem Commentarij primi

DIALOGVS SECVNDVS.



- 10 **M**ATHETES, Heri medicinam, veluti in tabula depi-
ctam, lineisq; suis adumbratam, ordine illo quem
ἀναλυτικὸν Græci appellant, perspicuè ostendisti: vel-
lem te nunc eandem ita summis ac principalibus
suis partibus detectam, resolutamq;, iterum quasi à
primis vsq; elementis restituere, ac componere, donec ipsam rur-
15 sus ad pristinam dignitatem, ac perfectionem reduxeris. GERON,
Recepi quidem me id in gratiam tuam facturum, quandocunq;
velles: sed metuo, ne dum omnia, quæ ad rei medicæ cognitio-
nem pertinent, longius persequor, ab incepto studio desistas.
20 **M**ATHETES, Non est quòd metuas, perchare Geron: nam eo sem-
per ingenio & animo fui, vt quamcunq; rem consilio prudētium,
& propria voluntate, semel discendam susceperim, nunquam, vel
laboris, vel temporis longi tædio postea deferam: nisi me oleum
& operam perdere intellexero, vt sub primis meis doctoribus
mihi accidisse confessus sum. GERON, Faxit itaq; **C**HRIſTVS OPT.
25 **M**AX. vt hoc nostrum institutum ad illius gloriam, & misero-
rum hominum salutem auspiciatò procedat. Quicquid enim sine
illius gratia et fauore, in omni vita perficiendum suscipitur, id to-
tum vanum est, & in perniciem interitumq; tendit. Priusquàm
autem disciplinam hanc, à primis ipsius particulis componere in-
30 cipiam, communi professorum consuetudine præfabor, quid ipsa
sit, & quibus ab alijs differat.

- H**erophilo igitur medicina est earum rerum
scientia, quæ corpora salubria, insalubria, & neutra, hoc est, media
35 inter illa efficiunt. atq; hæc Galeno definitio absolutissima cen-
setur, eò quòd non solum perfectiorem medicinæ partem, sed et-
iam materiam, formam, & finem complectatur. **M**ATHETES,
Quomodo? GERON, Sanitas medicinæ finis est: forma autem,
valetudo bona, vel aduersa, vel media; materia verò princeps, cor-
40 pus: secunda, causæ. **M**ATHE T. Cur auctores quidam Græci illam
nunc scientiam, nunc artem esse dicunt? GERON, Quatenus ha-
bitus est, qui recta ratione dirigitur, & primas theses exphilo-

Medicina quidē

*Medicinæ finis
sanitas.
Forma.
Materia.*

*Medicina cur
nunc scientia,
nunc ars appella-
tur.*

Scientia quomodo ars dicatur.

Theses medicinae firmæ, & certæ.

Exercitatio incerta, & coniecturalis.

Medicinæ autor DEVS.

Medicina apud Hebræos diu permansit.

A Græcis exculta est.

phia sumit, artificioq; ad docendum vititur, scientiam esse: quatenus autem ad actionem singulorum, & exercitationem procedit, artem esse pronunciant. potest enim aliquis ex communi illo precepto, Contraria contrarijs remedia adhibenda, cognoscere, febris, frigida conuenire: sin autem ignoret, quænam ex illis eligi debeant, artis est imperitus. MATHETES, Ergo scientiam quæ sublata demonstratione ad opus tendit, verè artem esse dicis? GERON, Dico hac ratione medicinam, & musicam, esse artes, alias autem, vt arithmeticam, artibus similes. MATHETES, Audiui nuper ex non obscuri nominis viris, medicam artem incertam, & coniecturalem esse. quid tu sentis? GERON, Proposita quidem medicinæ, si nominum vsus ambiguitatem deponas, firma sunt, vt mathematica: exercitatio autem illius coniecturalis est, vt cui sæpe non solum coniectura, sed etiam experientia minus respondeat. Quamquam autem hodie extent, qui medendi artem semper certam, firmam, & constantem, quæ nunquam fallat, esse velint, aliàs non esse medicinam: tamen Hippocrates in libro de prisca medicina, tantum illi non tribuit, sed tamen non ideo ipsam, quod interdum fallat, contemnendam, sed magis amplexandam laudèq; dignam esse, quod proximè ad veritatem accedat, memoria prodidit. Inter recentiores huius ætatis medicos, exorti sunt, qui illam adeò certam, & potentem esse prædicant, vt eius periti omne morborum genus, etiam veteribus insanabile, & pro desperato habitum, sanare possint. Sed de his postea seorsum agemus. MATHETES, Sûntne aliæ omnes artes etiam coniecturales? GERON, Non omnes: sed quædam & sua natura, & exercitatione, certæ existunt, vt arithmetica: quædam certæ quidem per se, sed in exercitatione coniecturales, vt medicina, & agricultura: quædam tum per se, tum in exercitatione coniectura nituntur, vt diuinatoria. quare etiam verè artes non sunt, sed nomine tantum. Quatenus igitur medicina & agricultura circa diuinationem versantur, coniecturales, & medio quodam modo artes existunt. qua de causa etiam Galenus medicum vati in prognosticis comparauit. MATHET. Satis pro humana conditione esse puto, si medicina, licet non semper fortasse, sapius tamen respondeat. Cui tandem salutaris ista professio fertur accepta? GERON, DEO OPT. MAX, qui Adamo primo nostro parenti, vbi post miserabilem casum, rerum optimarum ferè omnium noticiam amisisset, eam si non totam, certè, aliqua ex parte pro misericordia sua ipsi restituit: hanc mox ille liberis suis, & nepotibus: hi deinde cognatis, & familiaribus, veluti per manus tradiderunt. atq; sic medicina diu apud Hebræas gentes permansit. Ab his ad Græcos peruenit, ac diu

diu illic rudem, vulgaremq; ad Æsculapij tempora vsq; perseue-
 rasse legimus. hic illam postea subtilius excoluit, docuitq; poste-
 ros suos, qui ab ipso Æsculapiedg vocati sunt. **MATHESES**, Qui-
 bus adiutus principijs? **GERON**, Philosophiæ, vt non malè quis
 5 ipsam & rerum naturæ contemplationem, sub iisdem esse natam
 auctoribus, existimet. ideoq; multos ex sapientiæ professoribus,
 peritos medicinæ fuisse accepimus, clarissimos verò Pythagoram,
 Empedoclem, & Democritum, cuius ipse Hippocrates fuit disci-
 pulus. **MATHESES**, Cur nonnulli experientiam medicinæ prin-
 10 cipium esse affirmant? **GERON**, Quia fidem ipsa ab operibus ac-
 cepit, vnde rectius dixerim, experientiam quidem arti constitu-
 endæ accommodam, sed ita, vt naturalis ratio ei accedat, vt etiam
 Hippocrates censuit. Duo siquidem certissima omnium artium
 constituendarum principia existunt, nempe ratio, & experientia.
 15 **MATHESES**, Quinam primi auctores medicinam memorie, &
 literis prodiderunt? **GERON**, Ex omnibus memoria dignis
 Hippocrates, Coæ insule princeps, doctrina & facundia insignis,
 medicinam primus in artem redegit, eamq; multò absolutiorem,
 20 quam ipse à maioribus acceperat, Græcis post se reliquit. hunc
 pleriq; alij deinde imitati sunt: sed nullus eum vel ingenio, vel
 eruditione, vel iudicio assequi potuit. Longo intervallo successit
 Galenus Pergamenus, qui Hippocrati propemodum par, reli-
 quos omnes, tum qui ante illum, tum qui post fuerunt, doctrina,
 eloquentia, & iudicio longè superauit. is quod ab Hippocrate fu-
 25 erat omissum, addere & supplere conatus est. Postremis tem-
 poribus etiam inter Arabes, exorti sunt viri in medicina iudicio
 magis, quam facundia clari: quorum alij se Galeni interpretes, alij
 censores profiterentur: nec omnino inutilem operam in arte hac
 promouenda collocarunt. quòd autem instituto suo, non per o-
 30 mnia facere satis potuerint, temporum potius infelicitati, quam
 eorum voluntati ascribendum esse iudico. **MATHESES**, At qui
 Hippocratem ætate secuti sunt medici, omnes eadême via &
 ratione, qua ille, artem tractarunt? **GERON**, Minimè: tanta inter
 eos fuit dissentio, vt in diuersas curandi vias processerint, & plu-
 35 res illorum sectæ, præcipuè verò tres sint exortæ: nempe Ratio-
 nalis, Empirica, & Methodica. **MATHESES**, Quid singule profi-
 tebantur? **GERON**, Rationalis rerum naturæ sibi cognitionem
 vendicabat, hoc est, noticiam causarum, primùm abditarum, &
 morbos continentium: deinde euidentium: posthæc etiam natu-
 40 raliū actionum: nouissimè partium interiorum, necessariam
 medicinæ esse proponebat. professores ipsius Græcis λογικοί, ἀναλο-
 γιστικοί, & δογματικοί appellabantur. Quæ ab experientia empirica di-

*Philosophia, &
 medicina sub iis
 idem natura aus-
 toribus.*

*Artium consti-
 tuendarum duo
 principia.*

*Hippocrates me-
 dicinam memo-
 riæ prodidit, &
 in artem redegit.*

*Galenus Hippo-
 cratis interpres.*

*Arabes excusan-
 di.*

*Medici post Hip-
 pocratem in se-
 ctas tres diuisi.*

Rationales. cta fuit, nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam professi, in usu & experimentis eam ponebat: euidentes quidem causas, ut necessarias amplexa: obscurarum verò, & naturalium actionum questionem, ideo superuacaneam arbitrata, quòd natura esset incomprehensibilis, huius assertores *ἐμπειρικοὶ* ex ipsa *5*
Empirici. professione vocabantur. Tertia communia quedam complectebatur, ijsq; & similibus apparentibus, non abditis, insistebat: eius cultores *μεθοδικοὶ* appellabantur, à via quadam compendiaria, quæ græcè *μέθοδος* vocatur. MATHETES, Exponas mihi copiosius, oro, in quibus sectæ istæ dissentiebant: & num in quibusdam etiam conueniebant, non possum enim ea quæ iam breuiter es complexus, satis assequi. GERON, Etsi non multum referat, nosse reliquas dissentionis rationes: tamen morem tibi geram. Rationales, inquam, non credebant eum posse scire, quomodo morbi curandi essent, qui ignoraret, ex quibus principijs corpora nostra constent: quid secundam, quid aduersam valetudinem faciat. eum verò rectè curaturum, quem prima origo causæ non falleret. Quinetiam in nouis morborum generibus, in quibus usus nihil adhuc ostendisset, animaduertendum esse contendebant, vnde ea *10*
Causæ abditæ. cœpissent: aliàs neminem mortalium posse intelligere, cur hoc, vel illo potius uti debeat. atq; hæ sunt causæ in obscuro positæ, siue abditæ, de quibus suprà mentionem feci. MATHETES, Quas *15*
Causæ euidentes. euidentes appellabant, cognituq; necessarias esse dicebant: GERON, Calorem, frigus, famem, satietatem, & similia, à quibus morbi initium capere solent. qui enim originem ipsorum ignorat, is minimè illis occurrere poterit. MATHETES, Quas naturales corporis actiones vocabant: GERON, Per quas spiritum trahimus, & emitimus, cibum potionemq; & assumimus, & cōcoquimus: atq; hæc eadem in omnes membrorum partes digeruntur. Præterea sciendum etiam esse docebant, cur arteriæ modò summittant se, modò attollant: item quæ somni, quæq; vigiliæ sit ratio. nam cum ista minus rectè in corpore succedunt, eum solum mederi posse arbitrabatur, qui prius illa ipsa, qualiter euenerint, percepisset: sicut etiam cum dolores, & varia morborum genera interiores partes infestant. ideo etiam mortuorum corpora incidenda, eorumq; viscera scrutanda esse dictitabant, ut cum dolor intus incidit, scire liceret quid doleat, quæq; parte singula viscera intestinaue sita sint. nam aptius extrinsecus imponi remedia, ubi interiorum sedes, figura, & magnitudo comperta esset. Porro experimenta quidem necessaria esse fatebantur, modò rationi non *20*
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995
1000
1005
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1070
1075
1080
1085
1090
1095
1100
1105
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1140
1145
1150
1155
1160
1165
1170
1175
1180
1185
1190
1195
1200
1205
1210
1215
1220
1225
1230
1235
1240
1245
1250
1255
1260
1265
1270
1275
1280
1285
1290
1295
1300
1305
1310
1315
1320
1325
1330
1335
1340
1345
1350
1355
1360
1365
1370
1375
1380
1385
1390
1395
1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1435
1440
1445
1450
1455
1460
1465
1470
1475
1480
1485
1490
1495
1500
1505
1510
1515
1520
1525
1530
1535
1540
1545
1550
1555
1560
1565
1570
1575
1580
1585
1590
1595
1600
1605
1610
1615
1620
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
1690
1695
1700
1705
1710
1715
1720
1725
1730
1735
1740
1745
1750
1755
1760
1765
1770
1775
1780
1785
1790
1795
1800
1805
1810
1815
1820
1825
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2070
2075
2080
2085
2090
2095
2100
2105
2110
2115
2120
2125
2130
2135
2140
2145
2150
2155
2160
2165
2170
2175
2180
2185
2190
2195
2200
2205
2210
2215
2220
2225
2230
2235
2240
2245
2250
2255
2260
2265
2270
2275
2280
2285
2290
2295
2300
2305
2310
2315
2320
2325
2330
2335
2340
2345
2350
2355
2360
2365
2370
2375
2380
2385
2390
2395
2400
2405
2410
2415
2420
2425
2430
2435
2440
2445
2450
2455
2460
2465
2470
2475
2480
2485
2490
2495
2500
2505
2510
2515
2520
2525
2530
2535
2540
2545
2550
2555
2560
2565
2570
2575
2580
2585
2590
2595
2600
2605
2610
2615
2620
2625
2630
2635
2640
2645
2650
2655
2660
2665
2670
2675
2680
2685
2690
2695
2700
2705
2710
2715
2720
2725
2730
2735
2740
2745
2750
2755
2760
2765
2770
2775
2780
2785
2790
2795
2800
2805
2810
2815
2820
2825
2830
2835
2840
2845
2850
2855
2860
2865
2870
2875
2880
2885
2890
2895
2900
2905
2910
2915
2920
2925
2930
2935
2940
2945
2950
2955
2960
2965
2970
2975
2980
2985
2990
2995
3000
3005
3010
3015
3020
3025
3030
3035
3040
3045
3050
3055
3060
3065
3070
3075
3080
3085
3090
3095
3100
3105
3110
3115
3120
3125
3130
3135
3140
3145
3150
3155
3160
3165
3170
3175
3180
3185
3190
3195
3200
3205
3210
3215
3220
3225
3230
3235
3240
3245
3250
3255
3260
3265
3270
3275
3280
3285
3290
3295
3300
3305
3310
3315
3320
3325
3330
3335
3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3380
3385
3390
3395
3400
3405
3410
3415
3420
3425
3430
3435
3440
3445
3450
3455
3460
3465
3470
3475
3480
3485
3490
3495
3500
3505
3510
3515
3520
3525
3530
3535
3540
3545
3550
3555
3560
3565
3570
3575
3580
3585
3590
3595
3600
3605
3610
3615
3620
3625
3630
3635
3640
3645
3650
3655
3660
3665
3670
3675
3680
3685
3690
3695
3700
3705
3710
3715
3720
3725
3730
3735
3740
3745
3750
3755
3760
3765
3770
3775
3780
3785
3790
3795
3800
3805
3810
3815
3820
3825
3830
3835
3840
3845
3850
3855
3860
3865
3870
3875
3880
3885
3890
3895
3900
3905
3910
3915
3920
3925
3930
3935
3940
3945
3950
3955
3960
3965
3970
3975
3980
3985
3990
3995
4000
4005
4010
4015
4020
4025
4030
4035
4040
4045
4050
4055
4060
4065
4070
4075
4080
4085
4090
4095
4100
4105
4110
4115
4120
4125
4130
4135
4140
4145
4150
4155
4160
4165
4170
4175
4180
4185
4190
4195
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4230
4235
4240
4245
4250
4255
4260
4265
4270
4275
4280
4285
4290
4295
4300
4305
4310
4315
4320
4325
4330
4335
4340
4345
4350
4355
4360
4365
4370
4375
4380
4385
4390
4395
4400
4405
4410
4415
4420
4425
4430
4435
4440
4445
4450
4455
4460
4465
4470
4475
4480
4485
4490
4495
4500
4505
4510
4515
4520
4525
4530
4535
4540
4545
4550
4555
4560
4565
4570
4575
4580
4585
4590
4595
4600
4605
4610
4615
4620
4625
4630
4635
4640
4645
4650
4655
4660
4665
4670
4675
4680
4685
4690
4695
4700
4705
4710
4715
4720
4725
4730
4735
4740
4745
4750
4755
4760
4765
4770
4775
4780
4785
4790
4795
4800
4805
4810
4815
4820
4825
4830
4835
4840
4845
4850
4855
4860

sectæ transibant, sed alio atq; alio modo. atq; hæc tibi de illis sufficere arbitror. **MATHESES**, Cur Empirici naturalium rerum in medicina quæstionem comprehendere non posse dicebant? **GER.**

Empiricorum opiniones.

Quia neq; inter sapientie professores, neq; inter medicos de ipsis conueniebant. nam si rationes sequi vellent, omnium, probabiles videri potuisse aiebant: si curationes, ab omnibus hisce ægros ad sanitatem esse perductos. Igitur à certis potius, & exploratis petendum esse præsidium, id est, ab his, quæ experientia in ipsis curationibus docuisset. nam etsi diuersa de illis sensissent, se eadem tamen sanitati homines restituisse: idq; non obscurarum causarum, neq; naturalium noticia, sed experimentorum vsu, prout cuiq; responderunt, adiutos. Adhæc repertis iam olim medicinæ remedijs, homines de rationibus eorum disserere cœpisse: nec post rationem, medicinam esse inuentam, sed post inuentam medicinam, rationem esse quæsitam affirmabant. primò tamen remedia exploranda summa cura fuisse: nunc verò iam explorata, & si quod mali genus ignotum incideret, protinus videndum esse medico, cui morbo id proximum sit, tentandumq; remedia similia illis, quæ vicino malo sæpe succurrissent, & per eius similitu-

dinem opem repertum iri, pronuntiabant. **MATHESES**, Quid dicebantne medicum consilio non egere? **GERON**, Nequaquam. sic enim animal irrationabile hanc artem præstare posset: sed has abditarum rerum coniecturas superuacuas esse, quia non intersit quid morbum faciat, sed quid tollat: neq; quomodo, sed quid oportet primè digeratur: nec ad rem pertinere, quomodo spiremus, sed quid grauem tardumq; spiritum expediat: neq; quid arterias moueat, sed quid quæq; motus genera significant. deniq; mortuorum corporum incisionem apertionemq; necessariam non esse dictitabant, cum aliter plerq; se in illis habere, quàm in viuís soleant. **MATHESES**, Quid singulare docebant Methodici? **GERON**,

Methodicorum sententia.

Communium quorundam, & vulgarium contemplationem. hi namq; medicinam non longam, non difficilem, sicuti Hippocrates & alij: sed breuem facilemque esse dicebant, & contendebant nullius morborum causæ noticiam, vel partis affectu, vel temporis: vel regionis, in qua æger decumbit: vel eiusdem ætatis, viri, naturæ, habitus, consuetudinis: vel interiorum partium corporis humani rationem, ad curationes pertinere: sed communia quædam morborum intuenda esse, ideo etiam omnes affectus speciales, ad generales & communes redigebant, remediaq; illorum communia statuebant, quæ græcè *κοινὰ τῶν πάντων* vocabant, quasi dicas communiter, hoc est, quæ ubiq; & in pluribus morbis conuenirent. **MATHESES**, Quot morborum genera proponebant?

Sicut olim Ibesi salus.

*Methodicorum
morborum gene-
ra tria.*

*Astrictum
Fluidum.
Mixture.*

*In quibus Me-
thodici ab alijs
duabus sectis dis-
sentiant.*

*Medij inter se-
ctatores prae-
dic-
tos.*

GERON, Tria: vnum astrictum, alterum fluidum, tertium mix-
tum. nam modò ægros parum excernere, modò nimium: modò
alia parte parum, alia nimium. MATHETES, Qualia eiusmodi
morborum genera esse dicebant? GERON, Nunc acuta, nunc lon-
ga: quæ nunc increfcere, nunc consistere, nunc minui consueue-
rant. MATHETES, Quomodo autem agendum esse ijs cognitis
censebant? GERON, Si corpus astringeretur, digerendum esse: si
profluuiio laboraret, continendum: si mixtum (vt si inflammatio
simul cum defluxione oculum infestaret) occurrendum subinde
vehementiori malo: & aliter acutis morbis medendum, aliter ve-
tustis, aliter increfcentibus, aliter subsistentibus, aliter iam ad sa-
nitatem inclinantibus. Dissentiebant autem Methodici ab alijs
sectis, singulis iam commemoratis, à Rationalibus sanè eo nomi-
ne, quòd medicinam in rerum abditarum coniectura ponerent:
ab Empiricis autem eo, quòd obseruationi experimentorum ni-
miùm tribuerent, multaq; circumspicerent: ipsi tantùm facillima,
& plusquàm vulgaria persequerentur. ab vtriusq; simul, quòd ex
communibus curationem peterent, causis omnium reiectis, au-
xiliaq; vsu comperta in symptomatum concursu obseruarent.
MATHETES, Nulline olim professores extabant, qui sententiam
suam interponerent, quidq; in vnaquaq; secta vero proximum,
quid rursus ab eo alienum esset, ostenderent: & num vnus pro-
fessio per se satis præstare posset, an alterius quoq; auxilium re-
quireret? GERON, Indubiè extabant excellentes viri, qui trium
istarum sectarum opinioni non prorsus addicti essent, neq; ab illis
nimium abhorrerent, sed quodammodo medijs inter illos existe-
rent, sic vt modò his, modò illis, vel suffragarètur, vel aduersaren-
tur. Rationalibus quidem in hoc repugnabant, quòd cum eius
rei, cuius non est certa noticia, opinio certum reperire remedium
non posset, superuacaneum esse dicerent, causas inquirere, quæ
vel secundam valetudinem præstent, vel morbos excitent, quo-
modoq; spiritus trahatur, vel cibus digeratur. nam has vel sapi-
entia professores non scientia comprehendere, sed coniectura,
quæ incerta & dubia est, persequi solere. deinde quòd etiamsi ip-
sas certò cognoscere liceret: tamen ad ipsam curandi rationem ni-
hil plus conferre, quàm experientiam. In illo rursus aliquantum
assentiebantur, quòd faterentur, illos non frustra omnino natu-
rales causas istas introduxisse. nam multa esse, quæ licet ad ipsas
artes propriè non pertineant, tamen adiuuent excitando artificis
ingenium. adhuc naturæ rerum contemplationem, etsi medicum
non faciat aptiorem, tamen medicinæ reddere profectum: eaq; de
causa etiam Hippocratem, aliosq; antiquiores viros non conten-

eos febres & vlcera agitare, sed rerum quoq; naturam ex aliqua
 parte scrutatos fuisse: vnde quidem non medici, sed maiores me-
 dici extiterunt. Sic ratione, etsi non inter obscuras causas, neq; in-
 ter naturales actiones referetur, tamen sepius opus esse ipsi medi-
 5 cinæ fatebantur, quia hæc ars esset coniecturalis, cui sæpe non so-
 lum coniectura, sed etiam experientia minus respondeat: illamq;
 requiri, si nouum morbi genus inciderit, vt intelligatur, quo me-
 dicamento inter multa similia & morborum, & remediorum ge-
 nera, vt edum sit. **MATHESES**, In qua alia opinione Rationalibus
 10 accedere quodammodo videbantur? **GERON**, Qua putabant, etsi
 non referret, quæ egri esset natura: humidum magis, an magis sic-
 cum corpus eius existeret: validi nerui, an infirmi: frequens ad-
 uersa valetudo, an rara: manifestis, an abditis causis morbos æsti-
 marent: peterentq; fatigatio, an sitis, an frigus, an calor, an vigi-
 15 lia, an fames, an cibi viniq; abundantia, an intemperantia libidi-
 nis, illos fecerit: non tamen ignorari debere, quod æger vitæ ge-
 nus sit secutus: ex his enim similibus sæpe nouam curandi ratio-
 nem ducendam esse. **MATHESES**, In quibus veteres illi sectarum
 censores cum Methodicis, aut cōtra illos sentiebant? **GERON**, In
 20 nullis, aut certè admodum paucis. Nam dum Methodici in om-
 nibus & morbis & remedijs, communia spectanda esse docerent,
 hi sola illa non posse sufficere, nec ipsos intra professionem suam
 consistere posse, sed alia quoq; opus habere aiebant: debereq; ve-
 tutissimum Hippocratem imitari, qui tum communia, tum pro-
 25 pria intuenta esse præceperit. siquidem & compresorum, & flu-
 entium morborum genera diuersa esse, faciliusq; id in his quæ
 fluunt, inspicere posse. aliud enim esse sanguinem, aliud bilem, aliud
 cibum vomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare:
 aliud sudore digerere: aliud tæbe consumi. atq; in partes quoq; hu-
 30 morem erumpere, vt in oculos, auresq;: quo periculo nullum hu-
 manum membrum vacat. nihil autem horum sic, vt aliud curari.
 Ita protinus in his à communi fluentis mali contemplatione, ad
 propriam veteres medicos descendisse: atq; in hac quoq; rursus,
 aliam proprietatis noticiam sæpe necessariam esse. quia non ea-
 35 dem omnibus etiam in similibus casibus opitulantur. Etsi verò
 certæ quædam res sint, quæ in pluribus aut astringant, aut resolu-
 unt: inueniri tamen, in quibus aliter atq; in cæteris idem eueni-
 at. In his ergo communium inspectionem contrariam esse, pro-
 priorum autem salutarem: & causæ quoq; æstimationem sæpe
 40 morbum soluere. necnon etiam proprium aliquid & loci, & tem-
 poris istis quoq; auctoribus existere, quod hoc, aut illud, vel ad-
 mittendum, vel vitandum esse suadeat. præterea morborum in
 nisdem

*In quibus Me-
thodici cum Ra-
tionalibus con-
sentiant.*

*In quibus se-
ctarum censores
cum methodicis,
aut contra illos
sentiant.*

*Hippocratis sen-
tentia.*

Famem qui facilius ferant.

Que optima sit scita.

Medicina partes quot.

Nature contemplatio.

Causarum, & morborum consideratio.

Sanitas ex quibus constet.

Notarum & signorum, quibus morbi dignoscuntur, explicatio.

Curandi ratio.

Medicine partitio secundum Galenum.

hisdem hominibus alias atq; alias proprietates esse, & eum qui secundis aliquando frustra curatus fuerit, contrarijs sæpe restitui. Haud pauca quoque in dando cibo discrimina reperiri, nam famem facilius ferre adolescentem, quàm puerum: facilius in denso cibo, quàm in tenui: facilius in hyeme, quàm æstate: facilius vno cibo, quàm prandio affluctum: facilius in exercitatu, quàm exercitatu hominem sustinere. MATHETES, Satis superq; de sectis istis disputasti, quam tu optimam esse iudicas? GERON, Eam, in qua tum abditarum, tum euidentium causarum cognitioni, morborumq; & remedium non modò communium, sed etiam priorum obseruationi iuncta est experientia. hæc enim sine illis, & illæ sine hac nihil magni præstare possunt, eò quòd vnaquæq; aliarum poscat opem, & citra mutuuum auxilium, trunca sit atq; debilis. MATHE T. Audiui iam quidnam sit medicina, quæ ipsius origo, qui auctores, & quot proferentium eam sectæ extiterint, nunc illis omisissis, reliqua ordine, quem nuper promissisti, aggrediari. GERON, Id faciam, vbi ostendero quotnam medicine partes existant. MATHETES, Libenter audiero. GERON, Prima comprehendit hominis naturam, hoc est elementa, eorumq; temperationes, ex quibus ille in vtero gignitur, & formatur, nec non interiores exterioresq; partes, & ipsarum situs, figuram & vsum. Atq; ideo recentiores Græci, commune ei nomen φυσιογνωσίας indiderunt. Secunda causas morbos continentes, morbosq; ipsos, & accidentia continet: vnde etiam græcè αιτιολογία, vel παθολογία appellata est. Tertia sanitatis tuendæ, & ne corpora in morbos incidant, vbi autem inciderint, quomodo ad meliorem statum reducantur, rationem indicat, vnde græcè υγιής vocatur. Quarta notas & signa, quibus morbi dignoscuntur, prælagiaq; capiuntur, exponit: hinc σημεῖα λέγειται dicitur. Postrema medendi rationem præscribit, vocaturq; ab omnibus, tum antiquis, tum recentioribus Græcis θεραπευτική. Melius Galenus in libello de constituenda medicina partes has enumerat. Nam primo loco, de natura hominis, eiusq; partibus & harum functionibus agit: deinde morborum genera, causas & symptomata recenset. hinc notas illorum, & prælagia enumerat, ac loco σημεῖα ponit ποσὶ γνωσκέν: postea medendi rationem: nouissimè, quomodo corpus à morbis asserendum, aut cum à morbo conualescit, recreandum, aut in sanitate, qua iam fruitur, conseruandum sit. Atq; ex his tribus valetudinibus bonæ tuendæ partibus, vnam ποσὶ λαμβάνει, alteram ἀναλαμβάνει, postremam υγιένει appellat. MATHETES, Ista sanè ordinem illum compositorium, quo omnes artes tradi indicasti, compendio quodam representare videntur, nec parum me iuuabunt, in

- ffis retinendis, quæ mihi deinceps es declaraturus: tu si placet nunc institutum persequere. GERON, Auspicabimur itaq; ab hominis naturæ cognitione, paulò altius: quoniam nec in sanis bonam tueri valetudinem, nec in ægris morbi originem ac causam cognoscere, nec signis quippiam deprehendere, nec curationem rectè moliri possis, ignorans ex quibus homo principijs ac elementis constet, & quomodo his à naturali statu, quem prius obtinebant, mutatis, morbi nascantur. MATHETES, Quid vocas principia? GERON, Quæ nuper elementa: nam horum appellationibus etiam in illis veteres vsi sunt, nullamq; ferè distinctionem amborum esse putarunt. quanquam si vtraq; propriè & accuratè consideremus, res sunt paulùm inter se differentes. Principia enim totius rerum vniuersitatis, nec ex se vicissim, nec ex alijs sunt, nec rebus quæ ex illis suam trahunt originem, genere conueniunt: vt materia primaria, ac sempiterna, quam Græci *ὕλη* nuncuparunt, & principes qualitates, calor, frigus, humor, & siccitas, illi coniunctæ, naturaq; insitæ. Elementa autem sunt verè & naturaliter minime, atq; simplicissimæ, cuiusq; rei partes, quæ non sensu, sed ratione, & intellectu percipi possunt, ex simplicioribus quàm ipsæ sunt, generatæ, eoq; in diuersas species diuidi nequeunt: sed genere prorsus illis respondens, vt terra, aqua, aër, ignis: vel vt Hippocrates ait, humidum, siccum, calidum, frigidum. MATHETES, Quibus, qualibus, & quot humana natura constet? GERON, His ipsis, non tamen puris, ac sinceris, sed inuicem mixtis, concretis, & ad temperaturam quandam reductis. MATHETES, Cur dicis hominem ex elemētis posse constari, quorum naturæ non sint sincere? GERON, Quia omnia elementa, quæ apud nos extant, etsi impura sint, tamen sinceris, ex quibus ipsa prouenerunt, proximè accedunt. Nam illa ex puris, veluti imperfecta ex perfectis oriuntur. MATHETES, Eodem ne loco pura & impura consistunt? GERON, Minimè gentium. sed illa ab his seorsum remota sunt: ac terra quidem simplicissima, grauissima, siccissimaq; & omnis humoris expers, ad mediam vniuersitatis sedem: ignis aliàs leuissimus, & ardentissimus, ad concauum cœli, interioremq; regionem situs est, licet is non adeò pellucidus, neq; perspicuus, vt noster appareat. MATHETES, Qua de causa? GERON, Eò quòd nihil solidi ei sit admixtum. MATHET. Seruant ne elementa formas suas, quando in rerum generatione commiscantur? GERON, Nimirum. non enim idem in ipsorum commixtione, quod in simplici rerum transmutatione accidit, quippe in hac, cum recens aliqua forma subiectæ materiæ imprimatur, vetus aboletur: cum autem res noua ex elementorum tem-

Principijs & elementa rerum omnium.

Hominis elementa.

Cur homo ex impuris elementis.

Pura & impura elementa an eodem in loco sita.

Formæ elementorum an in rerum generatione seruentur.

Commixtio & transmutatio differunt.

peratione efficitur, tunc formæ illorum perseverant. MATHEŦ. Id exemplo clarius reddas. GERON, Cum herba ex elementis concretis gignitur, essentiæ horum retinentur: cum verò illa per concoctionem in sanguinem, & tandem in carnem degenerat, quamvis prior herbæ forma, noua nascente intercidat, tamen elementorum formæ non abolentur, sed stabiles & firmæ permanent, quousq; vlla compositi ratio constabit, licet non vna & perpetua commixtionis proportionem. Idem princeps Hippocrates

sentire videtur, dum scribit: καὶ πάλιν γε ἀνάγκη διαχωρέειν ἕκαστον εἰς τὴν

ἑαυτῆ φύσιν πλεονέχει τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ πλεονέχον πρὸς τὸ ὑγρὸν, καὶ τὸ

ξηρὸν πρὸς τὸ ξηρὸν, καὶ τὸ θερμὸν πρὸς τὸ θερμὸν, καὶ τὸ ψυχρὸν πρὸς τὸ ψυχρὸν.

Similia ad similia reuertuntur.

quæ verba ita latinè sonant: Et singula corporis humani, cum vita defungitur, ad suam rursus naturam recedere oportet, humidum ad humidum, siccum ad siccum, calidum ad calidum, & frigidum ad frigidum. MATHEŦES, Explica hæc apertius. GERON, Singula quæ gignendi gratia coierunt, talem in corpore vim retinent, qualem contulerunt. atq; omnia per interitum eò, vnde prodierunt, reuertuntur, quod fieri non posset, nisi pristinas illa naturas retinerent. MATHEŦES, Quæ amābo rectè inuicem permisceri possunt. GERON, Quæ sibi mutuò aduersantur, & contrarias in communi materia qualitates obtinent. MATHEŦES,

Permissio recta.

Quomodo fieri debeat.

Quomodo autem miscentur. GERON, Si paribus ferè portionibus commixta, temperataq; coeant. Tunc enim totæ illorum essentiæ mutua aduersariarū qualitatum vi & effectiōne franguntur, comminuunturq;. Sic etiam qualitates temperatione confusæ, omnino se retundunt, vt corpora illa tandem neq; essentias, neq; qualitates puras ac integras retineant. MATHEŦES, Quid hæc ne dissipatæ abolentur. GERON, Nequaq;, sed represso duntaxat excessu ad moderationem, mediocritatemq; reducuntur.

MATHEŦES, Hoc igitur pacto mixtio perfectè fieri potest, quam tu contrariorum in vnum idemq; concretionem dixisti. GERON, Potest. non tamen aquam aquæ, aut vinum vino simili infusum permisceri dico: quia licet essentiæ in totum quodammodo perfundantur, manent tamen illa integra. MATHEŦES, Ergo ex contrarijs tantum commixtio fieri solet. GERON, Proculdubio, praesertim si paribus illa viribus quodammodo concurrant. Nam si reliqua inter se coeant, hoc autem postremum desit, non vtiq; mixtio, sed procreatio dicenda erit. MATHEŦES, Quamobrem. GERON, Quia ibi contrariorum vires valde sunt impares, id quod inferius, & imbecillius est, à maiore & valentiore superatum, eò adigitur, vt in illius naturam transeat. Ideo etiam aliud est miscere, aliud gignere: hoc cōmixtio, illud generatio existit. MATHEŦ.

Intelli-

- Intelligo, quæ hæcenus elementa enumerasti, omnibus quæ in hoc mundi orbe continentur, esse communia: dic nunc etiam, quæ magis ei sunt propinqua? GERON, Illa indubiè, ex quibus reliquæ etiam animantes sanguine prædite generantur: præsci vo-
- 5 cant humores: quorum princeps sanguis est: cuius nomine etiam comprehenditur, reliqui, pituita, bilis flaua, & bilis nigra, de quibus postea copiosius tractabimus. MATHET. Quæ propria homi-
- 10 nis sunt elementa? GERON, Minimæ sanè partes simplices, quas nonnulli appellant similes, eò quòd si diuidantur, per omnia si-
- 15 bi sint similes: deinde etiam compositæ, vt mox audies. MATHET. Cur plura quàm vnum hominis elementum statuisti? GERON, Quia homo si ex vno constaret elemento, nunquam doleret, neq; enim esset, vnde dolorem perciperet, ut Hippocratis verbis utar. nam vnum in aliud mutari nequit, cum non habeat in quod trans-
- 20 mutetur. At quod nequit mutari, id neq; commutari, neq; affici poterit: quod autem affici non potest, id vacat dolore. MATHET. Vnde igitur dolor fit? GERON, Ex commutatione & sensu. MATHETES, Ex quibus commutatio & sensus? GERON, Ex primarijs qualitativibus. MATHETES, Declares oro apertius, cur id quod
- 25 non afficitur, doloris expers censeatur? GERON, Qui vnum elementum homini tribuunt, siue atomos, siue corpus incompartum, minimum, & quod partitionem non admittat, appellare malint, nullas id qualitates cum alijs, tum quæ per totam essentiam transfunduntur, naturà obtinere affirmant, eoq; nec com-
- 30 mutationibus subijci, quas omnes homines in se fieri assentiuntur. Dicunt, inquam, elementum ipsorum neq; calefieri, neq; refrigerari, neq; exiccari, neq; humectari: multo autem minus, vel nigritiem, vel albedinem, vel aliam quandam omnino qualita-
- 35 tem, secundum vllam mutationem suscipere. MATHETES, Quid audio, itane elementis suis omnem adimunt qualitatem? GERON, Existimant sanè aliquid in homine frigidum, calidum, humidum siccum, flauum, rubrum, nigrum, amarum, similiaq; videri, re ipsa autem & natura tale non esse. MATHETES, Mirum quòd non animaduertunt, hominem, si tali natura præditus esset, dolere non
- 40 posse. GERON, Rectè sentis. nam quod dolore affici debet, hæc duo requirit, nempe vt commutari & sentire possit. Nam si nullam omnino commutationem admiserit, eum quem ab initio obtinebat habitum, perpetuò seruaret. sin autem doleat, commutationem experitur, eoq; priorem statum retinere non potest. At si
- instar lapidum, aut lignorum, quæ calefiunt, aut refrigerantur, secanturq; transmutentur, nullo autem sensu polleant, affectionem quæ ipsis inest, non magis quàm lapides sentient. Indiuidua enim

Elementa hominis propria.

Ἀλλόωσις; Commutatio, & immutatio, vultus alteratio.

Quod non afficitur, doloris expers est.

Opinio eorum, qui vnum elementum statuunt.

Commutatio, & sensus dolorem pariunt.

Consultatio eorum, qui vnum elementum statuunt.

corpuscula, quæ illi, pro elementis affirmant, neq; commutari, neq; sentire natura possunt. Quia igitur homo ex commutatione & sensu dolorem sustinet, non potest ex eiusmodi simplici, atq; vniformi elemento constare. *MATHETES*, Id exemplis quæso clariùs ostendas. *GERON*, Si cutem acu subtilissima pupugeri, animal omnino dolebit: continget autem acus atomum, vel vnam, vel duas, vel plures. fingamus autem vnam contingere: at nulla atomus, aut vulnerari, aut sentire poterit: nihil itaq; ab acu afficietur: & si maximè afficiatur, non sentiet affectum. Eodem modo habet, si acus duas atomos contingat. si enim neutra ab acu vulneretur, vel si vulneretur, id neq; sentiat, certè sensus & doloris expers erit, qui vulnerabitur. Eadem ratio est, si tres atomos acu tetigeris, quæ in vna fuit: quippe non maior in pluribus, quàm in paucis occasio affectus & sensus excitandi apparet, sicut in lapidibus, ossibus, pilis, & id genus alijs constat. Etenim nihil quod sub sensum affectumq; cadit, ex his quæ sentire, & pati nequeunt, in vnum coëuntibus, potest componi. *MATHET*. Quomodo eiusmodi inueniuntur? *GERON*, Experientia, & ratione. hinc enimprehendes, corpus quod sentit, afficiturq; ex sensus expertibus, & impatilibus nunquam componi. Nam siue adamantes plures, siue alia corpora, quæ pati nequeunt, congregaueris, eaq; vulnerare tentaueris, id quod ex illis generatur, neq; vulnus accipiet, neq; sentiet. Ego namq; ita iudico, quòd si natiuum omnes atomi sensum haberent, vulnerari autem, atq; affici non possent, inde quòd complicitur inter se, carnem efficientes: neq; sic dolituras, si acus in illas demittatur. Quæadmodum enim, si duos digitos, licet sensiles, inuicem complicemus, nullus dolor comitatur, cum rursus separantur dissoluunturq; ita, ubi acus separat atomos inuicem, ac seiungit, nullam autem vulnerat, animal nequaquam dolebit, id quod tum euidencia, tum ratio ipsa testatur. *MATHETES*, Quid si dicant atomorum patroni, ipsas sentire? *GERON*, Et si etiam concedamus illis sensus, separatio tamen earum nullum dolorem parit, siue experientiam, siue rationem inspiciamus. quantò autem minus dolebunt, si ipsis sensum adimamus? Cum enim dolor commutationem & sensum, vt nuper dixi, necessariò postulet, atomi verò neutrum habeant, rationi consentaneum est, etiamsi alterum ipsis adesse concedamus, doloris tamen expertes adhuc manebunt. adhuc si pati quidem eas non posse, vim autem sentiendi obtinere admittamus, nulla etiam sic ratione dolebunt. *MATHETES*, Quamobrem? *GERON*, Quia neq; afficientur: & si affici quidem eas, verum sensu carere dixeris, non dolebunt, eò quòd neq; sentiant. quicquid enim

Exemplum.

Experientia & ratio rebus demonstrandis necessaria.

Dolor ex quibus fiat.

- enim dolet, tum affici, tum sentire affectum oportet. *MATHESES*, *Dolor ex affectu & sensu.*
 Quid hinc tandem colligis? *GERON*, Nullum corpus, quod ex affectus sensusq; expertibus elementis constet, sentire. item nullum, quod ex impatibilibus quidem, sensu autem præditis conflatum est, dolere vnquam: eò quod minimè afficiatur. Nam sentiendi quidem facultatem habet, reuera autem nunquam sentiet: quemadmodum & corpus humanum vim quidem sentiendi obtinet, non autem prius sentit, quàm ab aliquo afficiatur. *MATHESES*, Ex qualibus igitur elementis corpus sensorium componi
 10 debet? *GERON*, Ex eiusmodi sanè, quæ sentire & affici possunt, vel quæ afficiuntur quidem, non autem sentiunt. *MATHESES*, *Corpus sensibile ex qualibus elementis.*
 Primam sanè opinionem, vt rationi consentaneam accipio, alteram verò non assequor. Mirum enim videtur, quod corpus dolori obnoxium ex elementis sensu vacuis, etsi affici possint, generetur: cùm antea dixeris, dolorem ex commutatione & sensu euenire. *GERON*, Omnes particule corporum sensilium, si inquirere naturam ipsarum, & ratione scrutari velis, sentiunt & afficiuntur, quemadmodum suprà ostendi. Si verò prima elementa inspicias, statuasq; sensu quidem carere, variè autem in priuatis
 15 multis commutationibus inuicem agere, atq; affici posse, corpus sensorium producere non est alienum. Omnis enim quæ ex pluribus fit compositio, si ea quæ componuntur, talia semper, qualia sunt ab initio, seruauerit, nullam extrinsecus nouam speciem assumet, quæ non antea ijs, quæ componuntur, affuerit. Sin autem
 20 hæc variè transmutentur, ac multifariàm commutentur, aliud quoddam secundum genus, quod prima eius elementa non habuerint, exoriri poterit. *MATHESES*, Hoc precor exemplo clariùs mihi ostendas. *GERON*, Domus quæ ex lapidibus, lateribus, lignis, & tegulis exædificatur, nihil genere diuersum, quod non
 25 particulis insit, quæ illam constituunt, acquirit. Quæ enim durities, color, grauitas, figura, & magnitudo in singulis illis cernebatur, in toto quoq; ædificio apparet. Id autem intercedit discriminis, quòd non ad amulsim eadem tum figura, tum magnitudo in domo conspiciatur, quæ in singulis eius partibus primò fuit.
 30 *MATHESES*, Quid ita? *GERON*, Quia hoc non quærimus, vtrum domus maior sit, an lateres, vel illa quidem oblonga, lateres autem quadrati existant. verùm an propterea & magnitudinem, & figuram participet, quòd hæc particulis eius, quæ illam constituunt, insint. Quis enim non nouit, quòd linea, quæ ab vno angulo
 35 ad alium pertingit, figuram quadratam diuidat, & quòd ex illis duobus triangulis coeuntibus, vna figura quadrata perficiatur. adhæc quòd tum triangulus, tum quadratum, etsi non omnino

Nova forma quando assumatur.

Exemplum à domo.

eandem, non tamen diuersi generis figuræ existant. quinetiam duo semicirculi simul iuncti, totum absoluunt circulum. quare aliud ex alio fieri potest, non autem diuersi generis. nam figuræ figuræ efficiunt, & minores magnitudines maiores: non autem figuræ pariunt magnitudines, neq; hæc figuras. **MATHETES,** 5
 Quorsum hæc omnia attulisti? **GERON,** Vt intelligas ex elementis, quæ secundum qualitatem non transmutantur, nihil diuersi generis fieri posse: ex his autem quæ transmutantur, posse. Quippe quod nuper nigrum fuit, nunc album: quod antea album, postea nigrum: quod olim sensus expers, iam sensile euadat. **MATHETES,** 10
 Ergo putas corpus aliquod compositum ex igne, aëre, terra, & aqua, sensu carentibus sensorium fieri posse? **GERON,** Maxime: sed commutatis prius illis, nec non inuicem transmutatis, per totaq; commixtis & temperatis. nam si remanent, qualia fuere, & solummodo, vt frumenta in aceruo, miscentur, nequaquam sensile, & dolori obnoxium progenerant. **MATHETES,** 15
 Quare mihi consentaneum ijs, quæ hæcenus dixisti, videtur, corpus sensus compos non posse ex alijs elementis fieri, quàm quæ sentiant, & afficiantur, aut ex sensu quidem vacuis, sed quæ commutari transmutariq; adeo possint, vt quod ex ipsis generatur, fiat sensile. **GE-** 20
RON, Rectè quidem colligis, verùm hoc etiam ex ista complexione sequetur, necessariò plura vno esse elementa, eaq; posse affici & sentire, vel si ipsa non sentiant, certè id quod componunt, varia sua commutatione, mutationeq; sensorium efficere. quòd si verò corpus inde conditum, tum sentiat, tum afficiatur, profectò dolori 25
 erit obnoxium: sin autem dolori, etiam voluptati subijcietur. Adhæc memoriam, recordationem, imaginationem, obtinebit, vt quorum omnium velut radix ac fons quidam sensus existat. Si nihil horum habuerit, neq; vllam aliam actionem animalem, neq; animam ipsam habere poterit. Quinetiam ex euidenti licet 30
 intelligere, plura specie esse elementa, si consideres quàm varij morbi hominem soleant inuadere, quàmq; diuersa illis adhibeantur remedia. Quippe alius calidis, alius frigidis: quidam siccantibus, quidam humectantibus: hic dulcibus, ille acerbis: nonnulli astringentibus aluum, nonnulli relaxantibus: non pauci cutem 35
 densantibus, plurimi adaperientibus consanuerunt. Sin autem ex vno factus elemento homo doleat, certè vna quoq; sanandi ratio apparet: sed multæ, & differentes curandi viæ existunt: non igitur vnum specie duntaxat elementum hominis esse potest. multò minus numero, vt illi putabant, qui hominem in totum, 40
 aut aërem, aut ignem, aut aquam, aut terram esse statuerunt, ignorantes se transmutationem elementorum potius, quàm vnum elementum

Sensile corpus ex non sensili quomodo fiat.

Corpus sensile ex qualibus elementis fieri oporteat.

Demonstratio, elementa plura esse specie ex euidenti, nempe ex varijs morbis, eorum remedijs.

- elementum asseuerare. Eodem errore tenentur, qui hominem
solum sanguinem esse, aut bilem, aut pituitam, existimant. nam
nemo vnquam in purgationibus immoderatis, ex sola bile, aut
pituita purgata mortuus est: nec vllum anni tempus est, in quo
5 vel sola pituita, vel bilis, vel sanguis in corpore humano appare-
at. MATHE TES, Abundè satis, plura vno, aut specie, aut numero
esse elementa, demonstrasti, siue indiuidua, siue incompactibilia
corpuscula, siue ignem, uel aërem, vel aquam, vel terram priua-
tim, siue singulos humores, aut bilem, aut pituitam, aut sangui-
nem, corpus humanum illi constituent. sed quomodo homo ex
10 primis illis mundi elementis generetur, nondū intelligo. GERON,
Non ex solidis tantum corporibus elementorum, sed etiam qua-
litatibus eorum coniunctis generatur. nec his quidem puris &
integris, vt dixi, verum inuicem commixtis & temperatis, qualia
15 in omni rerum humanarum materia habentur. Commiscentur
autem ipsa non æqualiter inter se, sed hæc maiore, illa minore por-
tione: atq; exuperantis elementi species in ista mixtione, ab inge-
niosi & industrijs deprehenditur. Cum enim aliquid frigidum,
siccum, & densum apparet, plus terræ quàm aliorum elemento-
20 rum accepisse colligimus: vbi humidum, rarum, & fusile, plus a-
quæ: sicut plurimus calor in corpore animalis, ignem copiosum
adesse significat: & spiritus natura, sine qua animus constare ne-
quit, aërem quidem potissimum, ignem verò simul cum eo inesse
ostendit. neq; terram ipsam per se, ac meram in corpore animan-
25 tis inuenias, neq; aliquid impermixtum. imò neq; in mundo sin-
ceram terram videre licet, quæ non aliorum elementorum etiam
sit particeps. idem quoq; de aqua, aëre, & igne sentiendum. MA-
THE TES, Audio ex illis inuicem temperatis hominem constare:
sed cum nihil illis etiam sinceris simile in corpore videam, vix vt
30 credam, possum persuaderi. GERON, Considerato triticum, hor-
deum, glandes, ficus, legumina, & arborum fructus, ex aqua &
terra quidem procreari, sed quibus aëris & ignis essentia miscea-
tur. Nam si terram aquæ adiungas, nihil aliud præter lutum effi-
cies. singula autem legumina, & arborum fructus, nequaquam
35 lutum existunt. quare etiam ignem & aërem participant, quæ
per se inuicem temperentur. MATHE TES, Glandes sanè, ficus, ar-
borumq; fructus, & imprimis stirpes, ex mundi huius elementis
ita oriri non dubito, cum paruum cuiusq; semen terræ mandari
videam, quod ne millesimam quidem partem totius plantæ repre-
40 sentat: sed qua ratione homo inde gignatur, nondum assequor.
GERON, Perpendito animalia ex illis nutriri. quippe boues, o-
uesq; herbis, sues tum his, tum glandibus etiam, capræ verò præ-

*Contra eos, qui
solum sanguinem
aut alium humo-
rem hominis ele-
mentum esse pu-
tant.*

*Homo ex solidis
elementis & eo-
rum qualitati-
bus constat, sed
non æquali inter
se portione.*

*Elementi exupe-
rantis species, ab
ingeniosis depre-
hendi potest.*

*Animus sine spi-
ritus natura con-
stare nequit.*

*Nullum elemen-
tum purum in
mundo apparet.*

*Elementa omnia
inuicem miscean-
tur.*

*Homo qua ratio-
ne ex elementis
gignatur.*

terea teneris arborum furculis pascuntur. atq; ex his sanguis illorum generatur, corpus nutritur, conceptus formantur, augenturq;. Cum itaq; homo ex huiusmodi & similibus bestiis sumat alimentum, non certe alia ex re quapiam, quàm ex elementis etiam modò commemoratis, originis suæ principium, incrementum, vel præsens nutrimentum habere potest. Siquidem primum legumina ac fructus, deinde animalia ex his generantur, pascuntur, augenturq;. nec ex solis corporibus, igne, aëre, aqua, & terra, sed etiam ex illorum qualitatibus ipsis coniunctis creantur: quarum ratione inuicem agunt, patiunturq;. **MATHESES, Qua** 10

Ortus & interitus commutationis, & fluori essentiae subiiciuntur.

de causa? **GERON, Quia** omnia, quæ oriuntur & intereunt, duabus potissimum mutationibus subiiciuntur. **MATHESES, Quibusnam?** **GERON, Commutationi** simul, & fluori essentiae. Commutantur quidem dum refrigerantur, calefiunt, exiccantur, & humectantur. nam hæc solæ qualitates totam prorsus mutant essentiam: fluunt autem tum per sensibiles excretiones, tum per latentem perspirationem. Quare ut corporis essentia conferuetur, duplici quoq; instauratione eget: altera quæ exuperantes reprimat qualitates: altera quæ locum inanitum repleat. At quæ excessum coercet qualitas, excedenti est contraria: quæ verò defectum supplet, non contraria, sed potius essentiae quæ defluxit, simillima esse debet, ut cuius vicem in animali obtinere cogatur. hæc autem nutritio fit ex materia quadam simili ei, quæ prius fuerat, euacuata, unde ipsa alimentum nominatur. At quæ essentiam pro qualitatibus ratione commutant, non alimenta, sed medicinae vocantur. 25

Qualitates essentiam mutant quæ.

Alimentū quid.

Medicinae quæ vocantur.

MATHESES, Sūntne aliquæ essentiae qualitatū expertes? **GERON, Nullæ** prorsus, idcirco ubi necessitas vrget, illas cum essentis adhibere cogimur: & quando summa qualitas requiritur, ipsum elementum, nempe ignem, aut aërem, aut aquam, aut terram offerimus: quando autem mediocris desideratur, mistum aliquod ex elementis applicamus: verbi gratia, ubi calefacere cogitamus, talem deligimus medicinam, in qua maior sit ignis, quàm contrarij elementi portio: ubi verò refrigerare, contrà: ubi vtrunq; tum commutare, tum nutrire studemus, eiusmodi materiam quærimus, quæ & medicinae, & alimenti vsum præbeat. 35

Ordo generationis à primis elementis, vsque ad integram hominis structuram.

MATHESES, Intelligo nunc quatuor hæc elementa, ignem, aërem, aquam, & terram ex materia & qualitatibus, veluti omnium rerum primordijs, provenire. ex elementis herbas, stirpes, ac fructus omnes generari: ex his rursus animalium cibos: ex his ipsis deinde humores: ex his postea singulas partes similes: ex his tandem inuicem iunctis, primum ac simplex instrumentum, quod ob vnam operationem à natura est conditum: ex his rursus simpli-

- simplicibus in vnum compositis, alterum maius instrumentum. atq; ex his nouissimè inter se connexis, vniuersi corporis structuram constari ac constitui. Porro qualitates elementorum efficientes, etiam toridem existunt, quot ipsa quoq; sunt elementa, nempe calida, frigida, humida & sicca. sed cur Hippocrates elementa calidum, frigidum, siccum & humidum, qualitatum harum nomine appellarit, nondum intelligo. GERON, Quia per has facta sunt elementa. nam si materiæ summus calor, aut frigus, aut humor, aut siccitas adiuncta fuerit, iam totum corpus est elementum. neq; enim quia flauum, vel nigrum, vel album sit, vel leue, vel graue: nec quia densum, aut laxum, aut rarum: nec quia premat, vel incidat, vel frangat: neq; vt summatim dicam, quia per aliam quampiam qualitatem agat, elementum esse iudicatur. solæ namq; effectrices qualitates elementa testantur, præsertim primæ inter se contrariæ. Atq; in his magis calor, qui omnium longè est efficacissimus: post hunc frigus: deinde humor: postremo siccitas. atq; ideo totam, cui adhærent, essentiam commutant: calor quidem & frigus subito: humor autem & siccitas, temporis spacio, ac paulatim. In summa causæ sunt, cur elementa inuicem transmutentur, & plantas, animaliaq; procreent. MATHETES, Nullane alia qualitas patientem essentiam, in totum immutare potest? GERON, Nulla prorsus. neq; enim si graue leui, neq; si leue graui, neq; si asperum leui, vel si rarum denso, vel si tenue crasso coniunctum sit, vnam essentia speciem in alteram transferre consuevit. MATHETES, Quid de molli, viscoso, duro, & friabili sentis? GERON, Priora duo, ad humidorum naturam pertinent: reliqua ad sicca referuntur. MATHETES, Quæ aliæ præter has tactiles qualitates existunt? GERON, Nullæ: quod autem visoria, auditoria, gustatoria, vel odoratoria qualitates, materiæ commutationes non sequantur, cuius est manifestum. Sunt enim hæ quoq; ex tactilium genere: differunt autem ab illis, quæ propriè tactiles nominantur: quoniam neq; in omnibus animalium generibus inueniuntur, neq; totas subiectas materias commutant. MATHETES, Quæ sunt autem visoria? GERON, Versantur in coloribus, albedine, nigredine, rubore & similibus. MATHETES, Quæ sunt auditoria? GERON, Soni graues, acuti, mediij. MATHETES, Quæ saporum? GERON, Astringens, austera, acerba, amara, falsa, acris, acida, dulcis, & pinguis. MATHETES, Quænam sunt odoratrices? GERON, Saporibus respondent, sed non habent speciei nomina. odorum verò differentia, fragrantia, & foetore potissimum comprehenditur. MATHETES, Consentaneum igitur illis videtur, quæ hætenus docuisti, vt tactiles quidem qualitates, non-

Qualitates primæ quatuor.

Qualitates effectrices solæ elementa testantur.

Qualitates summæ efficacia inter se differunt.

Qualitates secundæ quid possint.

Tactiles qualitates duplices.

Visoria.

Auditoria.

Gustatoria.

Odoratrices.

nonnullorum duntaxat animalium propriæ: quæ verò totam commutant essentiam, atq; transmutant, primæ naturæ, & omnium rerum communes, elementorumq; effectrices existunt. GERON, Ita habet. calor enim, frigus, humor, & siccitas, non modò quamlibet materiam, cui subiectæ sunt, procreant: sed etiam mutuo in se agunt. MATHETES, Cur autem propria elementa animalium sanguine præditorum, non solum hominis, humores illos quatuor esse: similes autem partes hominis tantum statui-
sti, cum & ille in alijs quibusdam animalibus inueniatur? GERON, Humores sanè isti in omnibus sanguineis animantibus cernuntur, eorumq; sunt proxima & propria elementa. similes autem partes, propriæ hominis dicuntur. quia etsi in alijs quoq; animalibus habeantur, non tamen omnes humanis similes existunt, quædam etiam alterius generis sunt, vti vngulæ, cornua, aculei, rostra, squamæ. MATHETES, Qua ratione humores hominis elementa dicuntur, cum illos ex sanguine tantum menstruo, originem habere audiam? GERON, Is quatuor in se humores continet, vnde omnes deinde particulae gignuntur. caro quidem & nervus similes sunt, sed illa sanguinea, calida, & mollis: hic autem exanguis, durus, & frigidus: neutra tamen integrè, & absolute talis est. quid opus est verbis? duræ partes ex crassiore sanguinis portione, molles ex humidiorè, sic calidiores ex calidiorè, frigidiores ex frigidiorè procreantur. atq; sic foetus statim ab initio formatur, singulaeq; partes, sequenti tempore ex propria, & familiari materia aluntur, augenturq;. MATHETES, Non putavi in sanguine ipso alios contineri humores. GERON, Lac quoq; vnum videtur, sed reuera contrarijs & differentibus inter se partibus constat. vna siquidem est tenuis, & serosa, quam Græci ὀππὸν appellant: altera maximè caseosa & crassa, quæ illis τῆρος dicitur: ipsum verò lac, medium inter illas existit. sic etiam in sanguine, vna pars veluti sanies illius, quæ græcè ἰχθυὸς vocatur, sero lactis responderet: altera ceu sedimentum, & fex, caseo similis habetur. Quinta etiam fibræ quædam sanguini inesse cernuntur, quibus ablati, ille non concrevit, coloreq; & essentia differt. Quidam enim ad amulsi ruber apparet: quidam hoc magis flauescit: alius plus nigricat: alius album quiddam in summo representat: interdum totus sanguis liuidus apparet: sæpe nigro proximus est, purpuræ saturatè modo. quare etiam vnum non est: alioqui similis semper appareret. MATHETES, Quomodo varietas ipsius cognoscitur? GERON, Ex colore totius corporis, vomitu, aluo, & venæ incisione. MATHETES, Id explices amabò. GERON, Cum totum corpus nigrius, cicatricesq; in eo tales visuntur, & venæ in cruribus varicosæ

Elementa sanguineorum elementa humores.

Hominis propriae similes.

Cur humores hominis elementa dicantur.

Foetus quomodo per initia formatur.

In sanguine variae partes.

Lactis partes.

Sanguinis color, quomodo variet.

- ricosæ simul & liuidæ apparent, crassus & niger humor abundat. Quando sanguis niger & crassus appareat.
- cùm verò flauus color in corpore, pilis, vomitu, & aluo cernitur, Flauus.
- nimirum bilis flaua superat: sicut etiam sanguis vel pituita excellere cognoscitur, si in illis rubeus, aut albus color appareat: id ex Ruber, & albus.
- 5 venarum incisione etiam per sanitatem facta confirmatur. siquidem ex alio flauus, ex alio ruber, ex hoc nigrior, ex illo albioreffluit. Medicamenta idem testantur, si vniciq; humori purgandopropria & idonea exhibeantur. quippe idem medicamentum non omni naturæ corporum, tum sanorum, tum ægrotantium
- 10 conuenit. verbi causa: si quis regio morbo laborantibus, medicamentum bili ducendæ idoneum offerat, copiosam illam, tum flauam, tum pallidam expurgabit. contrà, si in eo aquæ subter cutem genere, quod græcè *λεωφλεγμοσίας* dicitur, medicamentum istud exhibere volueris, parum bilis educes: vt, si aliud pituitæ purgandæ efficax, arquato laborantibus præbeas, non modò nihil mentione dignum, sed etiam magno cum naturæ detrimento euacuabis: multum autem in hydropicis commemoratis, & sine noxa educes. Eadem ratione medicina atræ bili expurgandæ idonea, in elephantico morbo, & plurimum vitiosæ materiæ, & magna cum vtilitate extrahes. quæ omnia quatuor humores in homine contineri clarè demonstrant. idem in purgationibus immoderatis euidenter apparet. Nam si quis violentius medicamentum ad bilem purgandam efficax assumpserit, primum sanè illam excernet: deinde pituitam: postea atram bilem: postremò purum sanguinem. Non aliter euenit, si fortius medicamentum pituitæ euacuandæ idoneum datum fuerit: principiò ipsam pituitam expurgabit, mox bilem flauam, deinde atram, tandem sincerum sanguinem: atq; in hoc ægrotus emoritur. Vnde constat, medicamenta purgantia suum singula humorem proprium trahere. Cùm enim animans ob medicamenti violentiam ad eò imbecillum euaserit, vt morti sit vicinum, tunc proprii humoris euacuatio cessat, & altera ipsam sequitur. MATHESES, Quare non amplius humor priori similis euacuatur? GERON, Quia prior ille propemodum totus è corpore est eductus, vnde neq; viuere diutius animal poterit, aliquo ex elementis ipsius intereunte. sed quicunq; deinceps ex reliquis humoribus ad euacuationem paratior fuerit, dissoluitur, corrumpitur, & diffluit. Quapropter siue atram bilem, siue pituitam trahens medicamentum, supra naturæ modum illam purgauerit, flauæ bilis humor, vtpote calidissimus, ac tenuissimus statim subsequetur. Rursus, si bili ducendæ idoneum medicamentum impendiò magis illam purgauerit, secundo loco pituita, deinde atra bilis euacuatur. MATHESES, Quare

Suum quisq; humor medicamentum postulat.

Ordo humorum expurgandorum per medicamina valentia.

Catalogum primum bilem, mox pituitam, deinde atram bilem, postremò sanguinem ducit.

φλεγματίας id est, primum pituita, deinde bilem flauam, postea atram, nouissimè sanguinem.

Melancholicus humor post alios humores purgatur.

Sanguis cur omnium humorum postremus educatur.

Homo ex quatuor humoribus gignitur, augetur, & nutritur.

Singula semina sibi familiaria alimenta attrahunt.

Medicamentorum facultas naturalis, familiaria etiam attrahunt.

Interdum etiam attrahitur quod minus conuenit.

Medicine plus insidit purgantes, primum superflua, deinde humidum particulis solidis insidit, & proprium rapiunt.

Hippocratis explicatio.

melancholicus humor posteriore loco GERON, Quia grauissimus, crassus, & moueri contumax est. MATHETES, Si grauitatis, crassitiei, difficilisq; motus ratione hic post flauam bilem, & pituitam purgari solet: cur sanguis eo leuior, tenuiorq; & agilior, omnium postremus educitur? GERON, Quia natura hunc, ut sibi familiarem maximè amplexatur. MATHETES, Non igitur sine causa olim nonnulli, tum naturæ interpretes, tum medici, hominem ex solo sanguine generari, atq; nutriri pronunciarunt. GERON, Fateor: sed Hippocrates illū ex quatuor humoribus magis naturaliter gigni, augeri, & nutriri docuit: qui etiam cum varias hominum formas in sanis corporibus videret, non vnum, sed quatuor humores elementa ipsorum esse asseueravit: nec non diuersas admodū naturas partes, ex differenti quoq; essentia primam statim originem trahere, & postea vario uti alimento, prodidit. MATHETES Verba eius recites obsecro. GERON, Quemadmodum semina, inquit, & stirpes, cum terram subeunt, singula id, quod in illa naturæ ipsorum respondet, attrahunt: utpote acida, dulcia, amara, salia, & omnis generis alia: primum sanè & maiore ex parte ad se trahunt, quod naturæ ipsorum conuenit, deinde quoq; alia, sicut etiam medicamenta in corpore nostro agunt. quippe naturalis quædam facultas, singulis ipsis inest, qua familiaria sibi, & idonea attrahunt: sicuti Herculeo lapidi vis est indita ferri attractrix. Hac nutritiones, purgationesq; perficiuntur. ipsa quidem cum alimenti copia suppetit, id quod conuenit attrahente: nonnunquam verò etiam id quod minus congruit. Idem in medicinis purgantibus accidit. nam cum id bilis, aut pituitæ totum ex venis traxerint, quod in illis redundat, mox humidum particulis solidis insitum & proprium violenter rapiunt, animal velut resoluentes, ac in elementa redigentes, corrumpentesq;. At vehementem hanc medicinarum tractationem alius quidam humor illi natura proximus consequitur, qui primum fuerat violenter attractus. MATHETES, Videor mihi iam totam elementorum rationem satis perspectam habere, si hoc vnum mihi adhuc explicueris: cur Hippocrates illorum moderatum inter se temperamentum tum facultate, tum copia ad hominis sanitatem requirat, alij verò non parem omnium in temperatura portionem esse doceant? GERON, Ille vniuersam totius corporis moderationem intelligit: hi de singularum partium temperamenti, quarum aliæ calidiores, aliæ frigidiores, aliæ siccæ, aliæ humidæ natura existunt. Atq; hæc de Elementis ex veterum, præcipuè Hippocratis & Galeni sententia, habui, quæ tibi cognitu necessaria putarim, cras si placet reuertere: nunc enim ad uesperas cit.

Ioan-

DE MEDICINA VETERI ET NOVA

TVM COGNOSCENDA, TVM FACIENDA,

COMMENTARII PRIMI

DIALOGVS TERTIVS.

- 10 **M**ATHETES, Faustum ac foelicem hunc tibi diem, ho-
norate præceptor, exopto. GERON, Talis quoq; tibi
contingat, quid sibi vult, quod tam manè huc te con-
tuleris? MATHETES, Vt te horis istis antelucanis de elemento-
rum & principum qualitatum temperationibus differentem au-
15 diam. Quare si gratificari mihi voles, differentias illorum, quot-
nam & quales existant, siue generales, siue speciales, eo ordine,
quo hactenus vsus es, persequaris. totam enim hanc noctem pro-
pmodum insomnem duxi: adeò inquietum me elementorum
istorum meditatio reddidit: dum nunc pura & impura, nunc pari
20 inter se portione mista, nunc impari quidem, sed pro sua singula
natura temperata, animo succurrerent. GERON, Quandoquidem
nudiustertius tibi promisi, me de illis quoq; disserturum, labo-
rem istum iam DEO duce suscipiam: ille faxit, vt tibi fiet fructuo-
sus, mihi non nimium grauis, & molestus. *Temperamen-*
tum quid.
25 tur, siue temperatura, ac temperatio, quæ Græcis *μεσότης*, Latino-
barbaris complexio dicitur, misturæ elementorum ratio est, siue
qualitatum principum, quæ elementis insunt, harmonia, hoc est,
congrua elementorum, & summarum illorum qualitatum com-
missio. Qui autem elementorum omnium misturam, sine primis
30 qualitibus factam, temperamentum nominant, maximè errant.
nam elementa à qualitibus separari nequeunt. MATHETES, In-
telligite vocare temperamentum, in quo nō sola elementa, citra
effectrices qualitates, nec hæ solæ absq; illorum omnium essentij
commiscentur. GERON, Rectè intelligis. nam mutuam tum ele-
35 menta, tum qualitates ille opem requirunt. MATHET. Quorū sunt *Temperamento-*
vniuersæ temperamentorum species? GERON, Nouem. vna qui-
dem temperata, quæ Græcis *εὐμεγέτης* dicitur: octo verò intempera-
te. *rum species.*
MATHET. Quænam obsecro? GERON, Quatuor quidem sim-
plices, vt calida, frigida, humida, & sicca: quatuor rursus aliæ ex *Temperata.*
40 simplicibus illis compositæ, vt calida & humida, calida & sicca, *Simplices.*
frigida & humida, frigida & sicca. MATHETES, Quænam tempe-
rata illa est? GERON, Rectè de hac primum interrogas, sine cuius
E

Temperata quid. cognitione de intemperatis nihil dici potest. Est enim ipsa omnium temperamentorum veluti norma & regula, quam respicientes, & sanitatis tuendæ victum inuestigamus, & intemperatos status corrigimus. Verum hoc notari debet, in rerum vniuersitate aliud absolutè temperatum, aliud in singulis generibus, vt stirpem, aut animal aliquod temperatum dici. **MATHESES**, Quod igitur absolutè sic vocatur? **GERON**, Quod ex contrarijs æqua portione coëuntibus constat. atq; hoc recentiores barbari pondere ac mensura, id est, verè & omnino medium vocant. **MATHESES**, Quando aut stirps, aut animal non absolutè temperatum dicitur? **GERON**, Quando non contrariorum paritate, sed medio critate suæ cuiusq; naturæ conueniente aestimatur, & non solum bonitate, sed etiam viribus reliquis præstat. Tunc enim ficum temperatam dicimus, cum talis fuerit, qualis maximè natura esse debet. Eodem modo hominem, aut equum temperatum vocamus, quando pro sua quisq; natura optimè habuerit. **MATHESES**, Quando autem modò commemorata optimè habere dicuntur? **GERON**, Cum operationem suam optimè obeunt. ficus enim laudatur, quæ optimas, plurimasq; ficus profert: homo autem, cum omnibus naturæ actionibus integris fruitur: equus, si velocissimè currat. **MATHESES**, At eiusmodi stirpes & animalia, cur non absolutè temperata, vt essentia quædam dicuntur? **GERON**, Quia accurata contrariorum paritas in illis non sit, vt dixi, sed mediocritas, quæ ad paritatem refertur. Hæc in scholis hodie quasi ad iustitiam temperata vocatur, quæ congruam, decoramq; generis sui æquabilitatem obtinet. in summa, quæ veluti omnibus numeris & partibus absoluta, integrè, & pro naturæ ipsius ratione, munere suo fungitur. In nullis enim temperatis animalibus & plantis, ea temperaturæ æqualitas existit, quæ ex pari elementorum commistorum mole spectatur, sed quæ animalis & stirpis naturæ conuenit. Debet autem aliàs humidum sicco, & frigidum calido esse copiosius. quippe homo, leo, equus, similem inter se temperaturam habere non solent. **MATHESES**, Percipio nunc quæ temperata voces: dic iam quæ sint temperatorum differentia. **GERON**, Quæ à temperata in suo genere naturam deficiunt, & aliquo superant. vnde alia calida, vel frigida, humida uel sicca, aut coniunctim calida & humida, calida & sicca, frigida & humida, frigida & sicca dicuntur: si cum illa conferantur, & ab eo quod in mistura præpollet, appellationem sortiantur. **MATHESES**, Hoc explica manifestius. **GERON**, Calida sanè in quibus calor, frigus mediocre excedit: frigida, in quibus frigus calorem superat; humida, in quibus maior humidi portio: sicca, in qui-

*Calida, frigida,
humida, sicca,
quæ singula existant.*

- in quibus siccitas excellit. MATHETES, At duæne istæ contrariorum oppositiones in omni natura inveniuntur, vt scilicet ea calidior, vel frigidior, & humidior, vel siccior existat. GERON, Nequaquam, sit enim vt aliqua in calore & frigore temperata sit, in humido autē & siccitate intemperata sit: rursus vt alia in humore & siccitate temperata sit, in calore autem & frigore intemperata. MATHETES, At superius dixisti, vnam tantum temperatæ naturæ differentiam esse: hîc alias duas præter illam adducere videris. GERON, Fateor: sed illam summè temperatam intelligo: has autem medio inter temperatos, & intemperatos status ordine colloco. Qui namq; in summo est temperatus, is neutram oppositionem habet superantem, qui verò è contrario intemperatus est, vtrinq; habet vitiosam. medium autem locum sortitur, qui in altera quidem temperatus, in altera verò intemperatus est. Qui itaq; ex dimidio temperatus, & ex dimidio item intemperatus est, non immeritò medius inter eum qui ex toto est temperatus, & eum qui ex toto est intemperatus, dici potest. MATHETES, Quid in omnibus rebus medium propriè appellatur. GERON, Quod aequali spacio ab extremis omnium contrariorum distat, Summè temperata natura. Mediocriter temperata.
- 20 vnde Græcis *σύνμετρος* dicitur, atq; in illo genere sub quo continetur, vel in specie temperatum existit. quod autem in vna tantum illorum oppositione moderatum est: verbi gratia, vel in calido & humido, vel humido & sicco, in illa medium voco, MATHETES, At cùm multa sint genera, sicut etiam indiuidua, necesse est etiam erit in singulis quoq; illis medium aliquod inueniri. GERON, Rectè iudicas. quoniam inter animantia, medium locum obtinet homo: cum quo si reliqua conferantur, alia humida, alia sicca appellantur, iam inter ipsos homines alius calidus, alius frigidus, censetur, si ei qui medius inter illos existit, comparetur. MATHETES, Videntur itaq; corpora qualitate affecta, non vno inter se modo nominari. GERON, Non vno sanè, vt ais, sed triplici: aliàs nempe vt simplicia, & mixture expertia, cuiusmodi sunt elemēta (verum hoc significatu in mixtis essentij non vtimur) aliàs veluti ad eiusdem generis, vel speciei medium collata: aliàs quasi ad rem quamlibet. MATHETES, Hoc exemplis luculentius exponas. GERON, Cùm os absoluto sermone siccum dicimus, non adijcientes leonis, canis, aut hominis, certè cum vniuersæ omnium, quæ in mundo sunt corporum naturæ medio conferimus. atq; hac ratione idem corpus calidum simul & frigidum, humidum & siccum esse poterit, sed varijs modis. Verum vbi vni cuiuslibet comparatur, contraria de eodem dicere licebit: verbi causa, Hippocrates Democrito siccior est, Asclepiade autem humidior. Cùm

Medium quid propriè.

Medium.

Homo medius inter animantia.

Corpora qualitate affecta trifariè nominantur.

Os quomodo siccum dicatur, si cum varijs conferatur.

Diverse comparationes.

autem ad medium eiusdem generis, vel speciei refertur, tunc idem homo humidus simul & calidus, nihilque minus frigidus & siccus esse potest. At si ad mediocris temperamenti hominem referatur, siccus sanè, & frigidus dicitur: sin autem ad aliud quoduis animal, ut apem, vel formicam: aut ad stirpem, puta oleam, ficum, laurum, aut ad materiam, quæ nec planta, nec animal sit, ut lapidem, æs, ferrum, humidus & calidus censetur. Ea ratione fit, ut idem corpus animalis, aut stirpis cuiuspiam, omnium quæ in eodem sunt genere, medium, hoc est, temperatum, & mediocre: alteri verò cuiuspiam comparatum, vel stirpium, vel animalium, vel inanimatorum, intemperatum dicatur. Quippe viventis corpus cum demortuo collatum, humidius calidiusque existit. verbi gratia, leo viuis cum leone mortuo comparatus, tum ipse seipso, tum alter altero calidior humidiorque est. Atque ideo animal calidum & humidum esse dicitur, non absoluto sermone, sed quòd humor, calorue in eo superet. Nam inueniuntur complura animalia sicca & frigida, ut culices, muliones, muscæ, apes, formicæ, si cum mortuis conferantur. viua enim apis calidior humidiorque est quam mortua: sin autem cum homine, equo, boue, aliisque sanguine præditis animalibus conferantur, calida & sicca dicuntur. si verò ad vniuersam naturam expendantur, omnia ipsa frigida siccaque temperie sunt prædita. Sicut enim in vnoquoque genere, ubi quod à mediocritate recessit, ab eo quod vincit, nomen accipit: ita in vniuersitatis materia, cum aliquod medium transferit, non amplius temperatum, sed vel calidum, vel frigidum, vel siccum, vel humidum nominabitur. **MATHESES**, Quomodo igitur variæ istæ comparationes inter se differunt? **GERON**, Quæ ad hominem fit, ad aliquid eiusdem speciei fieri dicitur, quod Græci πρὸς ὁμοῦδες appellant. quæ verò ad apem, aut formicam, ad quippiam eiusdem generis, quod illi πρὸς ὁμογενὲς vocant. Simili modo quæ ad quamlibet stirpem fieri solet. Quamuis enim stirpium genus superius sit quam animalis: & id quo lapis, ferrum, æs, & similia continentur superius illo, cui stirpes insunt: tamen omnia ad idem genus conferri, licet improprie, dicuntur. **MATHESES**, Redige illa quæso in summam, ut facilius memoria queam retinere. **GERON**, Corpora quæ quatuor illas numero qualitates, calorem, frigus, humorem, & siccitatem, sinceræ & immixtas suscipiunt, prorsus & absolute calida, frigida, humida, & sicca dicuntur. reliqua verò aut animalium, aut stirpium, vel inanimatorum omnium, ut eris, ferri, lapidum, lignorum, in medio illorum primorum consistunt. Nullum enim præter elementa, summè aut calidum, aut frigidum aut humidum, aut siccum existit, sed medium prorsus contrarium,

Quæ absolute, aut non absolute calida, aut frigida: humida aut sicca dicantur.

- rum: ita vt nihilò magis sit calidum quàm frigidum, aut humidum quàm siccum: vel ad alterum contrariorum est propensum, ita vt magis sit calidum quàm frigidum, vel magis humidum quàm siccum: & si medium planè fuerit, in vtroq; contrariorum genere,
- 5 non magis calidum quàm frigidum, aut humidum quàm siccum, id temperatum nuncupatur. Sin autem in vna tantùm oppositione contrarium superet, medium locum obtinet, & partim temperatum, partim intemperatum existit. sin in vtraq; præcellat, omnino intemperatum est, & si calidum magis quàm frigidum sit,
- 10 quod magis est, id appellabitur, idem statuendum de sicco & humido. Pari modo, si frigidum magis sit quàm calidum, nominabitur frigidum. ita si in vtraq; oppositione alterum superet, siue calidum vnà cum humido, siue calidum cum sicco, siue frigidum pariter cum humido, siue frigidum cum sicco, certè ab eo quod præpollet, corpus appellationem sortietur. Ac varius in quolibet iam dictorum temperamentorum excessus, defectusq; modus, non in ijs tantùm, quæ simplicia sunt, sed etiam in compositis, idq; tum in tota essentia, tum verò in vnoquoq; genere inuenitur. MATHE-
- 15 TES, Vnde singula temperamenta cognoscuntur? GERON, Ex temperatis, medijsq; in quolibet genere naturis, cum quibus si alias compares, facilè quod in quauis superet deficiatue, inuenies. Disquiri autem debent, quæ absolutè temperata, intemperataq;, non in solis animalibus, & stirpibus, sed etiam in omni generata essentia existunt. Præterea obseruari conuenit, eorum quæ calida, frigida, humida, & sicca dicuntur, alia re ipsa esse talia, alia esse,
- 25 siue fieri posse: quoniam naturalem, vt id fiant, aptitudinem obtinent. MATHETES, Ex quibus verò media dignosci poterunt? GERON, Ex mistione extremorum. MATHETES, Qua ratione, obsecrò? GERON, Si aquæ feruenti parem modum glaciæ misc-
- 30 amus, medium quod pari intervallo ab vtroq; extremorum aberit, tum eo quod vrit, tum illo quod stupefacit, efficiemus: ad quod ceu normam, alia omnia adaptata iudicabimus. Ita si terram quæ sicca est, vel cinerem, vel tale aliquid quod sit aridum, pari aquæ modo imbueris, medium in sicci humidique oppositione euadet, quod ad humidorum & siccorum, quæ deficient, aut superent, notitiā comparandam, veluti norma & exemplar erit. corpus autem de quo iudicandum est, mediocriter calens esto. nam hoc ipsum humidi sicciq; medium corpus, si ad summum calorem frigisue fuerit perductum, falsam interim imaginationem exci-
- 40 tabit, & videbitur quàm sit mediocri aliquando humidius, aliquando siccus. Nam si calidius fiat, liquatum iam & fluxile, humidioris materiæ imaginationem de se præbebit: contrà, refrige-

*Temperatum.**Intemperatum.**Temperamentorum notie.**Reuera siue actiue, & potestate esse, quæ ducitur**Mediorum digno-**rio. Medium quomo-**do fiat.*

ratur, plus iusto coagmentatur ac concrefcit, immobileq; redditur, & durum tangenti apparet: unde etiam falſam ſiccitatis imaginem exhibet. Quòd ſi, vt humidi & ſicci parem modum habet, ſic etiam caloris & frigoris fit in medio, nec durum, nec molle tangenti apparebit. **MATHESES**, Homòne igitur tota hæc calidum, frigidum, humidum, & ſiccum, per tota miſcere poteſt. **GERON**, Nequaquam. **MATHESES**, Quæ de cauſa? **GERON**, Quia terra aque indita, miſcetur quidem, quatenus alicui videri queat, totaq; toti ita contemperatur: verùm appoſitio talis in exiguis partibus eſt, non autem tororum per tota miſtio: eò quòd amborum iſtorum per tota temperatio, **DEI** tantum munus eſt, magisq; etiam ſi calidum ac frigidum tota per tota temperentur: at ambo per tota contemperare, vt ſingula corpora ſimplicia ſenſum effugiant, non id naturæ ſolius, ac **DEI** opus eſt, ſed etiam noſtrum, ſilutium, quod ſicci humidiq; medium eſt, efficiamus: ſimili modo, quod calidi & frigidi ſit medium. **MATHESES**, Eſtne talis particula quædam in corpore humano? **GERON**, Eſt, hominis cutis omnium extremorum calidi, humidi, & ſicci, verè media, præſertim ea quæ eſt in manu. hæc enim omnium ſenſibilium norma futura erat, vt quam natura homini domeſticorum animantium prudentiſſimo, pro tactus instrumento condiderit, quò magis eam ab omnibus extremis pari abeſſe interuallo oportuit. Quæcunq; igitur partes cute ſunt duriores, veluti oſſa, cartilagineſ, cornua, vngues, ligamenta, vngulæ, caluaria, pili, in his omnibus ſiccum præualet. quæcunq; verò molliores ſunt, vt ſanguis, pituita, ſeuum, adeps, cerebrum, medulla tum ſpinæ, tum altera, in his humidi eſt plus quàm ſicci. quinetiam quantò pars ſiccifſima omnium quæ ſunt in homine, cutem ſiccitate ſuperat: tantò rurfus à cute ſuperatur id, quod eſt humidifſimum. **MATHESES**, Cùm igitur in homine cutis manus interior omnis exceſſus ſit expers, quodnam tum animalium, tum verò omnium corporum temperatiſſimum exiſtit? **GERON**, Homo, qui totius eſſentiæ, vel potius tum hominum, tum reliquorum animalium veluti regula, & norma habetur, ac reliqui omnes huic collati, calidi, frigidi, humidi & ſicci dicuntur. **MATHESES**, Multas ergo notas in hoc homine concurrere oportet? **GERON**, Multas proſectò. nam & cum vniuerſa eſſentia comparatus, & magis cum hominibus beſtijsq; medius apparere debet. **MATHESES**, Sed quæ ſunt medij in vniuerſa eſſentia communes notæ? **GERON**, Superius ſunt expoſitæ. Quæ autem in animalium ſpeciebus habentur, ex actionis cuiq; accommodatæ perfectione apparent. **MATHESES**, Quæ cuiq; actio conuenit? **GERON**, Homini, vt ſit ſapientiſſimus: cani, vt maximè

Torum per tota miſtio.

Cutis humana in manu temperatiſſima.

Homo temperatiſſimus.

Medij hominis notæ.

Actionis perfectionis.

- maximè sit adulatorius, vigil pariter & sagax: leoni, vt tantum sit fortis: sicut oui, vt solum placida existat. *MATHESES*, At hi sunt animi potius mores, quàm actiones corporis, quare huius statum prius, deinde illius persequaris. *GERON*, Medius horum
- 5 extremorum apparet, gracilitatis, & crassitiei, duritiæ & mollitiei, caloris & frigoris: ac tangendi corpus ipsius, calor occurrit mediocris, non autem mitis, aut halituosus, nec igneus & acris: sicut neq; frigus percipitur, quale in corpore sanguineo & humido esse queat: ac tali sanè corpore præditus, homo est temperatissimus. idem animo quoq; medium omnino statum audaciæ, & timoris, cunctationis, & præcipationis, misericordiæ & inuidiæ
- 10 obtinet. is ipse quoq; est alacer, amicorum studiosus, humanus, & prudens. atq; ex his primum & præcipuè temperatus homo cognoscitur: non pauca autem eorum accedunt, quæ necessariò
- 15 hæc sequuntur. Quippe edit ille, bibitq; moderatè, & alimenta non solum in ventre, sed etiam in venis, & tota corporis mole probè concoquit. Quid multis moror? omnes tum naturales,
- 20 tum animales vires integras obtinet, vt qui & sensuum facultatibus, & artuum motibus optimis, coloreq; viuido semper sit ornatus: nec non ad perspiratum excrementorum bene comparatus: inter somnolentum & peruigilem, inter glabrum & hirtum, inter nigrum colorem & album medius, pilosq; habeat cum puer est magis flauos quàm nigros: cum ætate floret, contrà, vnde non immeritò talis diuinam quandam originem representare vi-
- 25 detur. *MATHESES*, Ad hocne veluti exemplar, alios referre homines, & pro illius ratione æstimare oportet? *GERON*, Maximè. nam hæc via & ratio est, qua medium non in singulis modò animalium generibus, sed etiam in vniuersis cognoscis: etsi id non cuiuslibet sit hominis deprehendere, sed diligentis admodum, &
- 30 qui ex longo vsu magnam omnium partium notitiam habuerit. Ad eum modum plasta, pictores, statuarij, deniq; omnes alij sistentes, pulcherrima quæq; vnius speciei, tum pingunt, tum fingunt: veluti hominem, equum, bouem, leonem optimè formatum, ad id, quod in illa specie medium est, respicientes. Iam statua quædam Polycleti commendatur, quæ à Græcis *κλεινὴ*, hoc
- 35 est, regula ideo nominatur, quòd accuratam omnium inter se cōuenientiam obtineat. At longè præcellit is, qui ex mediocritate elementi procreatus, quadratum habitum, egregiamq; partium figuram est adeptus. Ideo etiam cutis manus interna, tactui maxime est idonea, quòd non solum omnium hominis partium, verum etiam vniuersæ essentia, quæ ortum & interitum experitur, media existat, non autem callosa, neq; dura, lapideæue, sed natu-

Hominis temperatissimi descriptio, & nota.

Status in corpore medius.

Animi.

Necessariò eodemmitantia signa.

Naturales & animales vires integre.

Temperatissimus homo diuinam naturam representat.

Temperatus exemplar, pro cuius ratione alij æstimari debent.

Polycleti regula.

*Cutis tempera-
mentum vnde co-
gnoscat.*

*Nervus & caro
quali temperamē-
to præditus.*

*Reliquæ partes
corporis quales.*

*Humorum disse-
rentia.*

*Sanguis.
Atra bilis,
Flava.
Pituita.*

*Instrumenta bu-
morū cognoscen-
dorum.*

*Tactus.
Visus.
Ratio.*

*Durities siccita-
tis solius propria
non est.*

*Molle.
Durum.*

raliter habita. MATHET. Quis naturalis eius status est? GERON.
Non modò in duritia, & mollitie, sed etiam in calore & frigore
medius. MATHETES, Vnde hoc cognoscam? GERON, Ex ipsius
essentia potissimum. est enim ipsa veluti nervus sanguinis parti-
ceps, inter nervum & carnem media, ac si ex vtriusq; mixtis con-
flata sit. MATHETES, Qualis autem est tum nervus, tum caro?
GERON, Ille quidem exanguis & frigidus: caro autem multi san-
guinis, & calida: medium locum tenet cutis, neq; planè exanguis
vt nervus, neq; multi sanguinis, vt caro. MATHETES, Quali verò
reliquæ partes temperamento præditæ sunt: si cutem omnium
veluti normam & indicem proponis, cui illas conferri, & iuxta
quam ipsas examinari præcipis? GERON, Humorum siue succo-
rum corporis humani optimus, & maxime familiaris, sanguis est,
natura mediocriter calidus. Huius veluti sedimentum, ac sæx est
atra bilis, quæ idcirco tum frigidior, tum crassior sanguine est: si-
cut flava bilis longè calidior: pituita verò omnium quæ in ani-
mali habentur, frigidissima est, & humidissima. MATHETES,
Quo instrumento id cognoscis? GERON, Quòd frigida quidem
sit, tactu deprehenditur: quòd autem humida, tactu pariter, & vi-
su, ratione q; iudicamus: ac tactu quidem & visu, quoniam talis
vtròq; apparet: ratione autem, quia non caloris copia, sed natu-
rali humore talis euasit. MATHETES, Ergo calidi, frigidiq; cor-
poris solus tactus, humidi autem & sicci, vnà cum tactu ratio iu-
dex erit? GERON, Ita habet. nam siccum durum prorsus est, id
quod tactu omnino dignoscitur: non tamen si quid durum est,
idem statim & siccum erit. MATHETES, Quamobrem? GERON,
Quia durities à sicco corpore inseparabilis est, non tamen eius
soliis propria. MATHETES, Cur non est propria? GERON, Quo-
niam id etiam quod à frigore concretum est, durum existit, vti
glacies. vnde neq; statim siccum & humidum internoscere ten-
tandum est, antequam considerauerimus, quomodo in calore &
frigore habeat. Neq; enim si quid cum summo frigore durum ap-
paret, id etiam siccum est: nec si quid cum vehementi calore est
molle, idem statim est humidum. verum cum mediocriter est ca-
lidum, tum æstimare, durumne, an molle sit, oportet. si nanque
molle sit, humidum est: si durum, siccum. quare etiam partium,
quæ in humano corpore sunt duræ, nulla est humida. MATHET.
Id non assequor, nisi rationem addideris. GERON, Quia tantum
in illo frigus esse nequit, vt aliquid in duritiem concrefcere in eo
possit: sed quod prius fuit fluxile, aliquando concrefcere, vti a-
deps, potest: & quod oleosum in sanguine fluidum & pingue est,
vbi in frigidum venit locum, cogelatur, durum tamen ne sic qui-
dem ef-

- dem efficitur, hinc etiam veteres rectè adipem dixerunt esse humidissimam. **MATHESES**, Vnde illa gignitur? **GERON**, Ex pinguiore parte sanguinis, per tenues venas effusa, crasso oleo similis, concrefcit autem propterea, quòd membranis adhærescat, eoq; congelatur, vbi cum frigidis & exanguibus particulis coniungitur, circa alias autem præcalidas, vt iecur, cor, venas, arterias, & id genus similes concrefcere nequit. Quoniàm verò per id quod valdè est frigidum, cogitur, idcirco etiam calefacta liquescit reliquorum congelatorum modo. **MATHESES**, Quæ pars corporis, humoris ratione adipem sequitur? **GERON**, Carnosum genus. **MATHESES**, Quare carnosum genus dicis: suntne plures carnis species, an vna tantum? **GERON**, Plures vtiq; prima sanè, quæ propriè caro appellatur, quam scilicet nusquam in corpore per se inuenias: sed est perpetuò musculi portio: deinde succedit propria cuiusvis visceris essentia, quam Erasistratus græcè *σπινθη* vocat: atq; huic visceris ipsius actio fertur accepta. **MATHESES**, Quid de cerebri proprio corpore censes? **GERON**, Id cute quidem & carne tum frigidius, tum humidius existit: adipem verò tum minus humidum, tum frigidum. **MATHESES**, Vnde hoc conijciam? **GERON**, Ex eo quod molle quidem tactu appareat, non autem à frigore congelatum sit, nec calore fundatur. Hoc autem obseruari debet, cerebrum innato calore & genuino, extrema quidem sui parte, non parum ad calidum inclinare, quod tactu deprehenditur, eoq; vehementi æstatis calore offenditur: interna autem esse adeò frigidum, vt congelare possit, id quod restantur excrementa, quæ ex palato & naribus hyeme descendunt, at priores ipsius partes tantò humidiores reliquis, quantò etiam molliores existunt. Nerui quoq; molles inde procedentes, cuti natura proximi sunt: duriores quidem humido & sicco ipsi cuti respondent: calore verò ab eius natura absunt tantum, quantum exangue corpus, à sanguine prædito abesse solet. Porro ne te perturbet, quòd Galenus cerebrum nunc temperatum, nunc calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum: nunc calidum simul & humidum, aut calidum & siccum, aut frigidum & humidum, aut frigidum & siccum esse dixerit. nam id facit quando illud cum supra dictis corporis partibus, præcipuè autem natiuæ essentiæ ipsius temperamento comparat, quod frigidum & humidum esse solet. **MATHESES**, Quæ sunt reliquarum partium temperamenta? **GERON**, Spine medulla cerebro propemodum respondet, vt ex quo originem suam habeat, paulò autem frigidior illo natura existit, eò quòd nullis societur arterijs, nec ipsius modo pulset, quamuis situs ratione in viuo animali calidior cerebro di-

Adeps humidissimus cum sit, vnde de gignatur.

Carnis plures species.

Cerebri temperamentum.

Cerebri extrema pars ad calorem inclinat.

Interna cerebri pars frigida.

Nerui.

Galenus sententia de cerebro.

Spine medulle temperamentum.

catur. **MATHESES**, Qua de causa? **GERON**, Quia in sui medio cor-
 di propinquior ipsa est, quàm cerebrum: superiore autem & in-
 ferioe parte, cauæ venæ magnæq; arteriæ incumbit, nec vllibi
 frigidior, quàm in ceruice percipitur. præterea quòd, cùm cere-
 brum frigidam suam naturam, aduersus cordis calorem in viuo
 animali tuetur, hæc ipsam seruare nequeat: idq; tres ob rationes.
 primùm quòd longè illo sit minor: deinde quòd cordi vicina: po-
 stremò, quòd vasa ei substrata sint, vt dixi, quæ in cerebrum nu-
 merosa licet, exigua tamen penetrant. Cæterùm medulla ista eti-
 am in hoc à cerebro differt, quòd siccior eo sit, durior & grauior, 10
 quamuis non tanto discrimine, vt grandem in cibus differentiam
 exhibeat. **MATHESES**, Qualis ea est medulla, quæ in reliquis of-
 sibus continetur? **GERON**, Alterius est naturæ quàm cerebrum &
 spinæ medulla. **MATHESES**, Quomodo inter se differunt? **GER-
 ON**, Cæterorum ossium medulla, nullum neruum producit, sed 15
 pinguior est, & humidior, nutrireq; potest, si probè concoqua-
 tur. Spinæ autem lentum & crassum humorem, sicut & cerebrum
 progignit. **MATHESES**, Qualis verò pulmonis caro existit? **GER-
 ON**, Minus humida, quàm adeps, vt quæ nec ipsa calefacta lique-
 scat. Sunt autem qui pulmonem & calidi ipsius, biliosi q; alimen- 20
 ti, & cordis vicinitatis gratia tum calidiorem, tum sicciorẽ ie-
 core ipso esse dicunt. Lienis, renum, & iecoris caro, adipe qui-
 dem longè minus humida, cuti tantò est humidior, quantò molli-
 or: calidior autem, quantò magis abundat sanguine. At cordis ca-
 ro, tantò est prædictis illis siccior, quantò durior, & non modò 25
 his, sed etiam omnibus corporis partibus calidior: id quod si in
 sinistrum eius sinum ad apertum scalpello, digitum inferas, de-
 prehendere licebit. **MATHESES**, Caro viscerum, quorum iam
 mentionem fecisti, vbiq; eadem apparet, an diuersa? **GERON**, Ie-
 coris, lienis, renum, & pulmonis caro natura simplex est, venis, 30
 arterijs, & neruis cuiusq; visceris vnde quaq; obnascens. Cor non
 simplicis naturæ carnis speciem obtinet, sed in eo sunt fibræ, qua-
 les in musculis cernimus, quibus caro circumcreuit. verùm non
 tamen in illo & musculis idem fibrarum genus inuenitur: quia in
 his neruorum & musculorum sunt particulae: in illo propria est 35
 fibrarum species, æquæ vt tunica venarum, arteriarum, intesti-
 norum, ventriculi, vteri, & vesicæ vtriusq; nam in his instrum-
 tis propriam quoq; carnem quandam suis ipsorum fibris circum-
 datam videmus. **MATHESES**, Huiusmodi carnes quo sunt tem-
 peramentò præditæ? **GERON**, Ipsæ quidem sunt cute calidiores, 40
 fibræ autem partim paulò minus, partim paulò magis, tum frigi-
 da, tum sicca quàm cutis, partim omnino similes cutis essentia
 existunt.

Medulla reli-
quorum ossium.

Spinæ medulla
qualem succum
gignat.

Pulmonis caro.

Lienis, iecoris, et
renum caro.

Cordis caro.

Viscerum caro.

Fibræ cordis pro-
pria.

- existunt. MATHETES, Quid de membranis sentiendum? GERON, *Membrarum*
 Omnes cutesunt sicciore, veluti etiā cerebri, & spinæ medullæ *temperatura.*
 inuolucra, quæ Græcis μένυχες dicuntur. sunt enim hæ quoq; mem-
 5 branæ. Tales natura sunt etiam venarum arteriarumq; tunicæ:
 nec non frigida, utpote exangues: contactu autem sanguinis ca-
 lesunt, atq; ad medium temperamenti statum veniunt. MATHETES,
 Cuius sanguis calorem suum accipit? GERON, A corde. MAT-
 10 HETES, Cuius temperamenti sunt nerui? GERON, Omnes ca-
 lore & frigore membranis respondent: molles autem, humore &
 siccitate cuti conueniunt: duri nequaquam, ut antea diximus.
 MATHETES, Quæ deinde has partes sequuntur? GERON, Ten-
 15 dines, quos Græci τένοις vocant, cute & neruis duriores: nec non
 ligamenta quibus ossa inuicem connectuntur, tantò cute durio-
 ra, quantò etiam sicciore. Adhæc cartilago, & medium quoddam
 20 inter hanc & illud corpus, quod Græci νεύροιο νδρωδὴ συνδυσμον, qua-
 si ex neruo cartilagineum ligamentum appellant. At os omnium
 quæ cutis operit, durissimum est, eorum verò quæ extra cutem
 extant, pilus est sicciissimus, mox cornu, deinde ungues, postea
 25 ungulæ, calcaria, rostra, similiaq;. MATHETES, Hactenus tempe-
 ramenta partium cum cute, veluti norma, contulisti: nunc etiam
 pro ætatis ratione, hominum temperaturas, earumq; differentias
 exponi mihi velim. GERON, Rectè mones. nam hoc ordine om-
 30 nia facilius assequeris, quæ ad temperamentorum cognitionem
 pertinent. quia verò homines cum alia, cum ætatum ratione in-
 uicem variant, primùm illæ cognosci debent, ut quæ non mini-
 mum facultatis, nobis ad causarum inuentionem deinceps sugge-
 rant. MATHETES, Quot igitur sunt hominis ætates? GERON, *Ætatum nume-*
 Hippocrati sanè quatuor: nempe pueritia, adolescentia, consi-
 35 stens ætas, prima pars senij, & altera quæ decrepita est. Sub ado-
 leſcentia etiam iuuentus continetur, ut non dubitem septem æ-
 tates numerare. MATHETES, Quibus nominibus apud Græcos
 recensentur? GERON, Prima vocatur ηλικία ἢ τῶν νεογενῶν παιδῶν, ἢ *Prima ætas,*
 βρεφῶν, quasi dicas, ætas puellorum recens natorum, vel infantii-
 40 um. secunda ἢ τῶν παιδῶν, quæ est puerorum. tertia ἢ τῶν μετῆραίων, vel τῶν *Secunda.*
 ἐφῆων, hoc est, ætas adolescentum, & puberum. quarta ἢ τῶν νεανίσκων, *Tertia.*
 quæ est iuuenum. quinta ἢ καθῆκηκα, quæ iam consistit, nec pergit *Quarta.*
 ulterius. sexta ἢ ἀρχὴ τῆς γερωνικῆς ηλικίας, quasi dicas principium se- *Quinta.*
 nilis ætatis. septima τὸ ἔσχατον γέρας, id est, extrema senectus. Qui *Sexta.*
 quatuor tantum ætates statuunt, græcè primam vocant πῶν τῶν αἰδῶν, *Septima.*
 45 quasi dicas puerilem: alterā πῶν τῶν ἀκμαζόντων, hoc est, vigentium: ter-
 tiam πῶν τῶν πρεσβυμοζόντων, hoc est, declinantium: quartam πῶν τῶν γε-
 ρόντων, hoc est, senum constituunt. MATHETES, Quomodo hæ

Quatuor ætates
quomodo cū sepe-
tem illis conueni-
ant.

Pueritia &
Infantia.
Adolescentia &
Iuuentus.

Ætas vigens.
Senectū.

Singularium æta-
tum anni.

quatuor tum apud Hippocratem, tum apud alios positæ, cum sex
illis, aut septem potius iam commemoratis, conuenire poterunt.
GERON, Apud Hippocratem sanè sub pueritiæ vocabulo etiam
infantia comprehenditur, & sub adolescentiæ voce iuuentus,
quæ etiam aliqua ex parte vigens, aut summus ætatis vigor, vt
Græcis ἡ ἀκμαστικὴ, uel ἀκμή dicitur: deinde senectū bifariam intelli-
gitur: altera validior, quæ iam à vigore declinauit, verum citra
manifestum sensum senectæ: altera decrepita. MATHESES, Quo-
to singulæ ætates anno incipiunt, finiuntq̃. GERON, Non pos-
sunt annorum numero circumscribi, nisi forsan generaliùs, nam
alij citiùs, alij tardiùs post infantiam, succedentes ætates ingredi-
untur. Communiter autem infantia à primo ortu ad septimum
vsq̃ annum perseuerat. Pueritia ad quartum decimum pertin-
git. Adolescentia ad vigesimum quintum prorogatur. Iuuentus
ad trigesium, vel trigesium quintum peruenit, quo homines
summè florent. Consistens ætas, media inter iuuentutem & sene-
ctam habetur: eam ingressi, iam à vigore nonnihil declinare inci-
piunt, sed ita vt vix percipi queat. tales non amplius iam crescunt,
sed in eo statu quo sunt, permanent, quantum sensu iudicare licet.
Primum senium à quadragesimo quinto, ad sexagesimum, vel
sexagesimum tertium protenditur: atq̃ huius ætatis senes Græcis
ἀποροσώτες, hoc est, crudi senes, sicut alij παροσώτες, quasi decli-
nantes appellantur. Decrepita ætas, vel extrema senectus ad vi-
tæ vsq̃ finem perdurat. Marcus Varro vetustissimus scriptor, etsi
non medicus, naturalium tamen rerum valde peritus, quinque æta-
tis gradus æquabiliter singulos, præter extremum, in annos quin-
decim diuisos esse pronunciat: sic vt in primo gradu, vsq̃ ad an-
num quartum decimum pueros collocet, quos ita etiam vocan-
dos esse putat, quod sint puri, hoc est, impubes. in secundo, vsq̃
ad annum trigesium adolescentes, eosq̃ ab adolescendo hoc no-
mine appellari. in tertio, vsq̃ ad quadraginta annos, iuuenes, atq̃
sic dici, quod rempublicam in re militari possent iuuare. in quar-
to, vsq̃ ad sexagesimum annum, seniores ponat, nuncupetq̃ ita,
quod nunc primùm corpus senescere incipiat. inde vsq̃ in finem
vitæ vnicuiusq̃ quintum gradum fieri, in quo qui esset, senem di-
ci ait, quod ea ætate corpus senio laboret. Alij aliter hominis æ-
tates distinxerunt: sed hæc tibi breuitatem doctrinæ desideranti,
sufficiant. MATHESES, Quoniam temperamento singulæ æta-
tes donatæ sunt, & quæ inter ipsas temperatissima censeri debet,
ad quam cæteræ omnes referri possint. GERON, Infantes & pu-
eri humidi sunt, & calidi, id quod intelliges, si primam eorum for-
mationem in vtero, antequam in lucem ædantur, consideraueris,
quæ ni-

Senes crudi.
Senes decrepiti.

Marcus Varro de
ætatibus.
Ætatum gradus
quing.

Pueri, quasi pu-
ri, & impubes.

Adolescentes.
Iuuenes.

Seniores.

Senes.

Ætatum tempe-
ramentum.

- quæ nimirum ex semine fit, & sanguine, rebus scilicet natura humidis, & calidis. cum autem hæc semper magisq; siccescant, initio quidem membranæ, tunicæ, viscera, & vasa figurantur. postremo autem ossa, vngues, cartilagine, conrescente materia absol-
 5 uuntur. priusquam enim hæc vel tendi, vel conrescere possit, nihil ex commemoratis perficitur. MATHETES, Quæ itaq; ex ipsius tensione fiunt? GERON, Tunica, membranæ, arteriæ, venæ, & nerui. MATHETES, Quæ ex congelatione? GERON, Os-
 10 sa, cartilagine, vngues, vngula, & viscera. atq; his in vtero absolutis, infans tandem in lucem prodit: summè licet algæ maris instar, humidus adhuc, non vasis tantum, visceribus, ac carne, sed etiam ipsis ossibus, quæ omnium partium corporis humani siccissima existunt: ita tamen, ut obstetrices tum hæc, tum vniuersos artus ceræ modo fingere formareq; possint. Florens autem ætas
 15 omnium naturalium in medio extremorum est, vt quæ neq; ad summam siccitatem, vt senium prouenerit, neq; in humido, & madore copioso, vt infantes versetur. MATHETES, Videris hîc trium tantum ætatum temperamenta referre, cum tamen quatuor & plurium antea adduxeris. GERON, Feci id quidem veterum exemplo: nunc autem tum harum, tum reliquarum omnium temperaturas, apertius explicabo. Ac puerorum sanè humida est, & calida: iuuenum, siue ætate vigentium, calida & sicca: declinanti-
 20 um à vigore, siue senescentium, frigida & sicca: senum frigida, & in solidis quidem particulis, vt membranis, venis, arterijs, nervis similibusq; sicca est: in spaciosis autem partium regionibus interpositis, superuacuo humore ob frigus orta scatur: hinc duplici ratione senes, tum sicci, tum humidi, dicuntur. MATHETES, Qualis est constans ætas? GERON, Inter iuuenes & declinantes, vel si mauis dicere seniores, sicut etiam inter pueros, & senes, flo-
 25 rens ætas media contrarijs, hoc est, temperata existit, vt illis conuenit. MATHETES, Quæ verò temperatissima est omnium ætatum, & optima? GERON, Adolescentium, reliquæ omnes sunt deteriores. MATHETES, Quare hæc alijs ita præcellit? GERON, Quia humor naturæ nostræ familiaris, nempe sanguis, ex temperamenti mediocritate in ea præcipuè dominatur. pueri sanè hunc quoq; obtinent, sed ob inordinatam ciborum copiam, non nihil
 35 crudi succi contrahunt. iuuenes flaua bile redundant, præsertim si praua victus ratione vtantur. Consistentes, ac declinantes, melancholicum humorem, vel in ætatis vigore adustum excipiunt: vel per se ex proprio temperamento colligunt. MATHETES, Cum itaq; calidissimus bilis humor, in iuuenibus magis quam pueris nascatur, illine etiam calidiores hisce dicentur? GERON,

Ordo generationis partium hominis, dum adhuc est in vtero.

Quæ ex tensione materiae fiunt.

Quæ ex congelatione.

Florens ætas.

Temperatura puerorum. Iuuenum. Declinantium. Senum. Senes nunc sicci, nunc humidi quomodo dicantur.

Constans ætas qualis. Florens ætas temperata.

Ætas temperatissima adolescentium cur sit.

Bilis in iuuenibus.

Melancholicus humor in consistentibus, ac declinantibus.

Si reliquis omnibus, quæ extrinsecus adueniunt, commutationibus circuncisis, eas quæ ex sola ætate veniunt, differentias estimaueris, neuter absolutè calidior videbitur: nam calores eorum qualitate dissident, quæ ex inæquali meatuum cutis perspiratu, vt sic dicam, creantur. **MATHETES**, Quis est inæqualis illorum perspiratus? **GERON**, Cum puerorum essentia humida, vigentium autem sicca sit, multum quidem ex illa, parum autem ex hac per latentes cutis meatus foras effluit: vnde etiam calor puerorum magis halituosus, copiosus, & blandus: in florentibus autem fuliginosus, siccus, paucus, & subacris tactu percipitur: atq; sic æqualitas caloris in pueris, iuuenibusq; inuenietur: illic in humida, hic in sicca essentia. **MATHETES**, Hoc exemplo declares. **GERON**, Lapis aliquando æquè calidus, vt aqua esse potest, nec impedit quicquam, quod ille natura siccus, hæc sit humida. **MATHETES**, Quomodo autem calidum in ætatibus iudicandum? **GERON**, Bisariam: vel in vno eodemq; infantis corpore, vel in pluribus puellis, & iuuenibus inuicem collatis. **MATHETES**, Non assequor: oro te, clariùs exponas. **GERON**, Propone tibi puerum, quem ante tempus aliquod noueris, & calorem eius qui tum fuerat, in memoriam reuoces, eiq; qui nunc est, cum illo conferas. nam si quæ mutatio omnino in calidum frigidumq; in puero facta videtur, facile excessum, qui vsq; ad florentem ætatem futurus sit, colligere poteris. ita nimirum, si idem puellus cum ipsomet conferratur, omnes eius externos accuratè similes casus obseruabis, ne quod propter horum aliquem calore & frigore differt, ætatis mutationi attribuitur. **MATHETES**, Quomodo si plures pueros, cum pluribus iuuenibus conferre oporteat, agendum censes? **GERON**, Graciles gracilibus, quadratos quadratis, & crassos crassius conferes: similiter etiam illos, qui calore & reliquis omnibus inuicem respondent. Nam si distinctionem in ætatibus inuenire studeas, eam in similibus quatenus licet naturis, tutiùs disquires: in contrarijs autem non item: quod differentia interdum, non tam corporum quæ inquiruntur, ætatis, quàm naturalis temperamenti gratia existat. Sic etiam corpora quæ tum victu vniuerso, tum temporum in quibus inuestigantur, statu inter se conueniunt, eliges. non autem exercitatum cum ocioso conferes: non lotum illoto: non ieiunum pranso: non sobrium ebrio: non sole vstum cum eo qui perfrigit: non vigilem cum eo qui somno indulserit: non deniq; cum ijs, quibus contraria est vel natura, vel victus ratio, vel quicquid rerum euentus: sed reliqua omnia sunt, quàm fieri licet, paria, vna ætate excepta. **MATHETES**, Cum iam anni tempora, ætatibus hominum respondere propemodum videantur,

*Caloris puerorum
& iuuenum com
paratio.*

*Calor in ætati-
bus quot modis
diuidendus.*

*Comparandorum
corporum inter
se ratio.*

- deantur, velim mihi definias, in quibus illa ab his discordent. GERON, Si ipsa per se spectentur singula, hyems sanè temperamento humida est, & frigida: non autem ea de causa, quòd reliquis temporibus humidior sit, & frigidior, cum id alia quoque ratione accidat: sed quòd humidum siccitatem, & frigus calorem superet. Eadem etiam ratione aestas calida dicitur, & sicca, quod calor & siccitas in ea propollean. Ver autem in omnis excessus medio, & temperatum existit: quia neque frigidum in eo plus quam calidum, sicut in hyeme, neque minus, ut in aestate valet. Ita siccitatis humidique æqualitatem in eo spectare licet, in quo scilicet, neque siccum, ut in aestate præualet, neque humidum, sicut in hyeme exuperat. Quare etiam meritò saluberrimum esse, & morbis periculosis minus obnoxium dicitur. At autumnus neque calidus est absolute, ut aestas, neque frigidus, ut hyems, neque equaliter temperatus, ut ver: imò in hoc maximè ab illo dissidet, quòd mediam temperiem, & æqualitatem perpetuò parem non seruet. Quippe meridie multò est calidior, quam manè & vesperi: nec in humido & sicco medium omnino statum obinet, quemadmodum ver, sed ad siccus declinat: ab aestate verò etiam in hoc vincitur, non tamen tanto interuallo, quanto in calore. MATHETES, Qualis itaque autumnus vocari debet? GERON, Siccus nimirum, ut in quo humidum siccitas vincat: in calore autem & frigido mistum quoddam ex utroque & inæquale dicitur: unde morbi Hippocratis sententia expectari solent, at facile est colligere, quamuis adolescentia veri, iuuentus æstati respondeat, reliquas tamen ætates autumnò & hyemi per omnia accuratè non consentire. MATHETES, Intellego nunc quantum hominum temperamenta, etatum ratione mutari soleant: quibus autem notis singula possim agnoscere, nondum ex te audiui, quare id quoque mihi paucis, ut soles, exponas. GERON, De temperato homine, quem tibi veluti regulam omnium proposui, non opus est, ut plura tibi recenseam: nouisti enim adhuc omnia illius signa, tum que ab animo, tum que à corpore, ueleius partibus sumuntur. MATHETES, Quòd facilius in temperatorum indicia assequar, obiter illa rursus in memoriam reuoces. GERON, Prima sanè & præcipua hæc esse dico, que ex ipsius essentia sumuntur, nempe quod non audax, aut timidus, sed alacris, fortisque existat: non iracundus, aut ignauus, sed mansuetus: non præceps, aut cunctator, sed prudens: non misericors, aut inuidus, sed amicorum studiosus, & candidus: non callidus, aut hebes, sed intelligens: non qui nimium concubitum appetat, aut formidet, sed in eo moderatè se gerat: adhæc non prodigus, aut avarus, sed liberalis existat: qui mores, probam cerebri, cordis, &

*Temperamentum
quatuor anni tē-
porum.*

*Ver saluberrimum
quare.*

*Autumnus quae-
lis.*

*Temperati homi-
nis præcipua in-
dicia.*

Animi mores.

Simplicium partium temperatio.

Compositarum harmonia.

Indicia temperati minus excellentia.

Accessoria quantitas & qualitas.

Signa ex qualitate.

Temperamentorum differentia. Naturalia.

Acquisita.

iecoris temperiem sequuntur. Præterea quòd simplicium quidem partium, eiusmodi hominis temperatura, medium in calido, frigido, humido, & sicco: nec non in mollitie, duritie, obesitate, & gracilitate statum obtineat. In compositis autem, quòd in magnitudine, figura, numero, situ, & simplicium, vnde illa fiunt, connexum, decentiam, ac moderationem representet: in ambobus autem quòd vnionem singulis convenientem, cum per se, tum cum alijs possideat. **MATHESES**, Quæ sunt minus præcipua & absoluta. **GERON**, Actiones naturales, vitales, animales, atq; hæc licet minus principales notæ existant, necessariò tamen accuratam simplicium particularum temperiem, & multæ ex ipsis instrumentariarum convenientiam, ambarumq; vnionem comitantur. **MATHESES**, Sûntne alia adhuc signa? **GERON**, Sumuntur etiam quædam ex accessorijs, nempe quantitate, & qualitate. vt si ille de quo agitur, sit corpore mediocris, & quadratus: quanquam etiam magnus, & paruus esse possit, si partes eius omnes sint temperatæ, & commoderatæ: item si capite, oculis, thorace, venis, alijsq; partibus moderatis præditus sit. **MATHESES**, Quæ ex qualitate indicia habes? **GERON**, Quòd toto corporis habitu in calido, frigido, molli, duro, hirsuto, & glabro mediocritatem obtineat: colorem autem ex albo & rubro mistum: capillos in pueritia rufos magis quàm nigros: in adolescentia flauos, & crispis modicè: in iuuentute nigros. adhæc quòd à causis morborum non facile offendatur. Cæterum hæc signa vniuersa, in aëre & victu temperato obseruari debent, ita vt is de quo iudicium feres, neq; in sole perpetuò versetur, neq; in umbra deliteat. nam regio temperata & intemperata, aër æstiuus aut hybernus, colorem cutis, mollitiem, & duritiem mutare ac corrumpere solet. **MATHESES**, Ista mihi ad temperati hominis agnitionem sufficiunt. Eodem modo intemperatorum indicia persequaris: quandoquidem superius alios absolutè temperatos, nempe in vtraq; contrariorum oppositione medios, alios in vna quidem temperatos, in altera autem intemperatos esse dixisti, priorum notis iam expositis, posteriorum deinceps similiter expedias. **GERON**, Antequam de his agam, hoc te admonere volo, temperamenta alia esse naturalia, nempe quæ à prima origine talia extiterint, alia verò ex longa consuetudine acquisita, quæ quasi altera natura dicuntur. siccitas enim plerumq; in humidum, & hoc in siccum mutatur: vnde etiam gracilitas in crassitiem, et crassities in gracilitatem transire solet. **MATHESES**, Vnde hoc accidit? **GERON**, Ex ociosa & delicata vita, qui natura graciles fuerant, pingues redduntur: hi rursus ex laboriosa vita, curis & tenui victu persiccati, gracilescunt. **MATHESES**, Quæ

Quæ signa ergo corporis calore quidem excellentis, humido autem & siccitate temperati existunt? GERON, Animus audax, ad iram proclivius, præceps, iniuriæ vindex, callidus: corpus autem rubidum, quod tangenti calidum percipitur, citoq; incalcescit magis: tardè refrigeratur: minus adipis quàm carnis habet, venasq; amplas: mediocriter hirtum: ad venerem proclivius, capillis nigris.

Corporis Valde calidi, humidum autem & sicco temperati nota.

5 MATHETES, Quæ autem notæ in ijs apparent, qui frigidus quidem excellunt, humido autem & sicco temperati sunt? GERON, Superioribus prorsus contrariæ, vt animus ignavus, timidus, cunctator, obliuiosus, minus sapiens, corpus ipsorum albidum, quod tactu frigidum percipitur, & facilè refrigeratur, ægrè autem incalcescit: venerem non appetit: cutem habet rufam, & si frigus nimis excedat, liuidam & plumbeam: adipem moderatam, venas exiguas: caput pilis caret, glabrumq; est, capillos autem rufos obtinet.

Mores contrarij prædictis.

15 MATHETES, Quales sunt sicciores natura, calido autem & frigido temperati? GERON, Prudentes, iniuriæ memores, vigiles & iracundi: corpore sicco, duro, gracili, ad motus difficili, veneris vsu modico saturantur, multo læduntur, sicut etiam à causis alijs siccantibus.

Sicciores natura, calido autem & frigido temperati.

20 MATHETES, Quibus signis humidiores, & altera oppositione temperati agnoscuntur? GERON, Simplices sunt, animo mobiles, somno dediti, ad venerem satis idonei, & proclivius: corpus habent carnosius, & mollius temperato: ab humectantibus facilè offendentur: atq; in altera tantum oppositione temperati sunt, in altera intemperati: in reliquis verè temperato conueniunt, his notis quas recensui exceptis.

Humidiores, & altera oppositione temperati.

25 MATHETES, Perge nunc intemperatos vtraq; contrariorum oppositione describere. GERON, Calidiores & sicciores acuto sunt ingenio, & prudentes, facilè mouentur ad iram, acres in agendo, vigilēs, bellicosi: sin autem calor valde superet, stulti sunt, & insani, nulla in re constantes: corpus ipsorum tactu calidum percipitur, sicumq; impenfè, & durum, gracile & hirsutum apparet: si calor multum exuperet, cutis & capilli nigri sunt.

Calidiores, & sicciores.

30 MATHETES, Quibus indicij calidiores & humidiores agnoscuntur? GERON, Simplices magis quàm prudentes, hilares & faceti sunt: corpore ad tantum calidiore, magisq; carnosio, & molliore quàm temperatum est: nec non venis amplis præditi, vbi vtraq; excedit qualitas. Sin autem calor plus quàm humidum mediocritatem superet, corpus ipsorum multo adhuc calidius, magisq; hirsutum apparet: paulò autem carnosius, molliusq; adipis expers, pilis nigris. Quod si humor copiosus, calor autem modicè excellat, corpus paulò quidem calidius hirsutiusq; multo verò carnosius & mollius existit, putridis morbis obnoxium, colore ex albo & rubro mixto.

Calidiores, & humidiores.

*Frigidiores, &
humidiores.*

Quales autem frigidiores, humidioresq̃: GERON, Ingenio sunt
stupidi, tardi, negotijs peragendis inepti: si paulum sanè exupe-
rantem vtranc̃ qualitatem habeant, corpus ipsorum album,
molle, obæsum, & glabrum, venæq̃ exiles apparent; si verò mul-
tùm, pro qualitatum incremento etiam hæc augentur: si pluri- 5
mùm, color quoq̃ rufus, aut liuidus, capillusq̃ rufus cernitur.

*Frigidiores, &
sicciores.*

MATHESES, Quæ frigidorum simul & siccorum notæ existunt?
GERON, Obseruare hic debes alios natura, alios ex ætate decli-
nante tales esse. MATHESES, Qui naturales dicuntur GERON,
In quibus vel vtrac̃ qualitas ex æquo, vel altera plurimùm, alte- 10
ra parum à medio recedit. MATHESES, Quibus indicijs vtrac̃
qualitas cognoscitur? GERON, Animo sunt ingeniosi, graues, in-
tegri, interdum maligni, inuidi, fraudulent, auari, parci, timidi,
tristes, taciturni, cogitabundi, solitarij, pertinaces, ad iram & ve-
nerem minimè procliues, sed irati non facilè pacantur: corpus ta- 15
ctum frigidum, durum, rectum, tenue, glabrum, & adipem per car-
nes sparsam, & si illud sit gracile, venas obscuras. MATHESES,
Quibus n̄, qui alteram tantùm habent vincentem qualitatem?
GERON, Huius sanè qualitatis exilia, illius ampliora erunt indi-
cia. MATHESES, Quibus notis distinguuntur, qui ex ætatis incli- 20
natione sicciores & frigidiores euaserunt? GERON, Corpus ha-
bent durum, gracile, in quo atra bilis abundat, eoq̃ nigrum &
hirsutum apparet, si iuuentus calida & sicca præcesserit: si non, co-
lor cutis, capillusq̃ & pilus frigoris modum, & proportionem
sequitur. At in omnibus commune est temperaturæ frigida, 25
vel raræ indicium, si corpus facilè refrigeretur: calidæ vel densæ
si non facilè. rursus sicca, si à siccantibus offendatur, aridumq̃, &
ad motum difficile fiat: sicut humidæ communis nota est, si ab hu-
meſtantibus lædatur. In coniugijs harum quatuor qualitatum,
eius quæ magis excellit, indicia semper eminebunt. MATHESES, 30

*Sicci & frigidi
ex ætate.*

*Totius corporis
temperatura.*

Cùm totius corporis temperaturam inquiras, ex quibus potissi-
mùm partibus illius indicia sumenda censes? GERON, Ex cute, &
musculis omnia ossa ambientibus, idq̃ in regione temperata, &
in victu moderato. si verò hæ temperaturæ totius naturæ non
sunt, sed cordis, aut iecoris, aut vtriusq̃ naturam præcipuè cali- 35
dam & frigidam sequuntur, & sunt ascititiæ, aliæ notæ apparent,
quæ in harum partium temperamento frigidus & calidus referen-
tur. hæ ipsæ etiam spectari debent in ijs, qui victu temperato v-
tuntur, & temperatam regionem incolunt. Nam aer æstiuus, nu-
dis, & hybernus, vitæq̃ vmbratilis, etiam vestitis, signa, quæ ex co- 40
lore, mollicie, & duritia sumuntur, alioqui certissima corrumpunt.
Insuper obseruare conuenit eandem omnes musculi tem-
peratu-

- peraturam, an diuersam obtineant. item num partium crassities, vel gracilitas à carne sit musculosa, an ex ossium subiectorum amplitudine, vel ex vtracq; vel potius ex humore in spacijs inter partes simplices collecto, vnde illæ aluntur. **MATHETES** Quare autem ista inspectanda obseruandaq; adeo censet? **GERON**, Quia artus crassiores fiunt, & apparent, si ossa sint ampla duraq; ad tactum: item si caro copiosior molliorq;, illa etiam tenuia integat: vel si vtracq; tum ossa, tum caro sublimius circumdata, & duritie satis ima appareant: adhæc si copiosus humor inter partes simplices contineatur: sicut rursus tenuiores artus efficit ossium subiectorum gracilitas, vel carniū penuria, vel vtracq; nec non pauca materia humida nutritoria. humidiores autem efficit caro copiosa & mollis, humorq; ille spacijs similarium receptus amplior, subtiliorq; vti sicciore, pauca, duraq; caro. **MATHETES**, Particulæ ergo corporis humani non semper eodem omnes sunt temperamento præditæ? **GERON**, Non: sed in quibusdam sanè omnes æquabili, in quibusdam verò, nec his paucis, inæquabili sunt donatæ. Nam aliæ iusto sunt humidiores, aliæ frigidiæ, aliæ sicciore, aliæ calidiores, aliæ prorsus temperatæ, ac mediocres.
- MATHETES**, Quod corpus ex toto similiter temperatum esse dicis? **GERON**, Quod in totum æqualiter concinnum est, omniumq; partium inter se conuenientiam in latitudine, longitudine, & altitudine seruat. sin autē thorax, collum, humeri fuerint maximi, lumbi verò parui, angusti, crura gracilia & sicca, certè corpus in quo hæc sunt, æquabiliter affectum esse non potest: sicut nec illud, in quo crura crassa sunt, lumbi lati, & thorax angustus, vel caput maximum, aut paruum, vel crura blæsa, aut vara, vel artuum extrema gracilia, aut crassa, vel exectæ scapulæ sine carne ac nudæ, alarumq; modo prominentes, vel aliæ particulæ statim in vtero matris à naturali proportionē, ad intemperiem mutatæ. **MATHETES**, Ergo cū de toto corpore iudicium facere oportet, omnesne partes prius examinare conuenit? **GERON**, Maximè. nam si cui thorax hirsutus est, non ideo illum etiam totum corpus calidius, siccusq; necessariò, sed caloris plurimum in corde habere, eoq; audacem esse censemus. posse verò aliquando propter hoc ipsum cor accidere, quò minus totum corpus similiter calidū siccumq; sit. Nam si totius corporis temperies est equalis, thorax natura his erit latissimus, venæ amplæ, arteriæ magnæ, eadem maximè, vehementissimèq; pulsatiles, tum plurimi per totum corpus pili: atq; ij quidem in capite valde aucti, nigri & crispi, vtiq; in prima ætate, processu autem temporis caluities subsequitur. In tali temperatura totum corpus erit etiam vegetum,

*Partes omnes nō
eodem tempera-
mento præditæ.*

*Corpus ex toto
temperatum.*

*Partes ante cor-
pus examinari
debent.*

*Thorax hirsutus
magnum cordis
calorem indicat.*

*Temperies cor-
poris equalis.*

Caluities,

probè articulatū, & musculosū: cutis ipsius nigrior, durior, & hirsutior. Ad eundem modum, si contraria omnia in thorace sint, ac æqualis in toto corpore temperies vigeat, hoc est, si vniuersæ corporis partes humidiores & frigidiores sint, thorax quidem angustus & glaber erit: sicut etiam totum corpus pilis nudum, 5
cutis mollis & alba, capilli subfului, potissimū in iuuentute. hi in senectute nō caluescunt, timidiq; statim sunt, ignaui & segnes, vt antea est indicatum. præterea paruis venis, & minimè conspiciuis: multa adipe grauantur, neruis, musculisq; imbecillis, artubus parum articulatè coniunctis. MATHETES, Optimè descri- 10
plisti quales casus comitentur, si temperamentum totius corporis æquale fuerit: qualia autem signa apparent, cū illud inæquale

Temperies partium inæqualis, non de toto corpore æstimanda est.

Partium temperamenta vnde cognoscantur.

Cutis non vbiq; internarum partium naturam prodit.

Cutis Germanorum, Gallorum, Thracum, & Scytharum.

Meridionales.

Proprius & ascititus calor diiudicandus.

Meridionalium & septentrionalium calor proprius & alienus.

extiterit? GERON, Cū inæqualis partium temperies est, non potest ex vna earum de toto fieri iudicium, eoq; singulæ æstimari debent, quo sint temperamento præditæ. MATHETES, Vnde 15
partium temperamenta cognoscantur? GERON, Ex functionibus potius, quàm tactu, aut inspectione. Non solum autem illæ, sed etiam affectiones, quæ partibus eueniunt, quarum extrema cutis est, examinari debent. MATHETES, Vbiq; ne cutis internarum partium naturam prodit? GERON, Non, sed in tempera- 20
ta tantum regione: nec omnium quoq; sed earum duntaxat, quæ similem ipsi habent temperiem. MATHETES, Cur non sub septentrione & meridie? GERON, Quia sub illo calor corporum ab ambiente frigore, & vincente, in altum propellitur: sub hac autem ab externo calore attractus, in cutem prodit. ideo etiam corporis temperies in regionibus ijs, quæ à temperie recesserunt, in- 25
æqualis visitur, dum externæ scilicet, internæq; partes ad eundem se modum non habent. Galli igitur & Germani, omnisq; Thrax & Scyta, frigidam humidamq; cutem habent. ideo etiam mollem, albam, & pilis nudam. His naturis omnibus calor in viscera vnâ cum sanguine confugit: vbi dum agitur, perurit, & 30
feruet. Sunt porro illi audaces etiam, & præcipitis consilij: Æthiopes contra & Arabes, alijq; vniuersi, qui ad meridiem habitant, cutem ex ambientis æstu, & naturali calore foras acto, adustam, duram, siccam, & nigram acquirunt, ita vt toto corpore natium quidem calorem exiguum, alienum verò, ascititiumq; tum copio- 35
sorem, tum feruescentem magis obtineant. Quare attendendum, & in singulis corporibus æstimandum est, suo & proprio, an ascititio calore incalcant. quæ enim putrescunt, omnia ascititio calore sunt calida, proprio frigent. Adhæc qui meridianam plagam incolunt, ascititio calidi, proprio frigidi sunt. E conuerso, qui in septentrione degunt, natiuo pollent calore copioso, alieno 40
& ascit-

- & ascititio exiguo. **MATHESES**, At in alijs regionibus minus in-
 temperatis, qualis calor præpollet? **GERON**, Hyeme naturalis v-
 berior, ascititius minor: æstate contrà ascititius maior, naturalis
 minor existit, atq; hæc eum definire oportet, qui temperamen-
 5 tum rectè est cogniturus. neq; enim omnino, si cutis nigrior ap-
 paret, iam totus homo calidior est, sed si reliqua omnia responde-
 ant. **MATHESES**, Quænam sunt talia reliqua indicia? **GERON**,
 Thorax, venæ, arteriæ, pili cuti respondentes. nam si alter in sole
 versatus diutius est, alter in vmbra, illi nigrior, huic albidior cu-
 10 tis erit. verùm hoc ad totius temperamenti commutationem ni-
 hil facit: ipsa namq; cutis sub sole diutius versata, sicciore, in vmbra
 humidior euadet: non tamen naturalis temperies, vel iocino-
 ris, vel cordis, vel alterius cuiusq; visceris, statim mutabitur. **MATHESES**,
 Aërem itaq; cutem mutare docuisti, quænam aliorum
 15 casuum sunt causæ? **GERON**, Calor naturalis in corpore excel-
 lens, spiritus vniuersos subtiliores, magisq; concitato efficit: nec
 non facultates pro sua natura gubernat, easq; absolutiores, & ex-
 peditiones reddit. in cerebro quidem ratiocinationem, quæ λογική
 Græcis dicitur, in corde vitalem, quam θυμική vocant, nos irasci-
 20 bilem ac animosam, in iecore verò naturalem, quæ Græcis πικρο-
 μοειδής, hoc est, appetitoria nuncupatur. Præterea spaciosas omni-
 um partium capacitates, vt thoracem, venas, & arterias, dilatat,
 flatuq; distendit, & si humor non desideretur, sanguine ipsas re-
 25 plet. Huius autem pinguior, tenuior, et leuior portio, in calidiori-
 bus partibus alimentum quoddam caloris efficitur, quemadmo-
 dum in frigidioribus seruat: cumq; venæ eam extra se in partes
 frigidiores, quod genus sunt membranæ, transmiserint, concre-
 scit: in calidioribus autem, vt carnosiss, absumitur, ac dissipatur:
 nisi fortè frigidæ temperaturæ, etiam victus ratio liberalior acce-
 30 dens, adipis aliquid carnosiss partibus adiungat: quomodo etiam
 animalia in latibulis delitescunt, non raro adipe obesa inueni-
 untur: nec aliò scemina viris pinguiore existunt, quàm quòd il-
 læ his sint frigidiores, & plurimum domi in vmbra versentur.
MATHESES, Si graciles ex calore, pingues autem ex frigido po-
 35 tissimùm nascuntur, vnde habitus quadrati, Græcis τεταμέναι, seu car-
 nosi fiunt? **GERON**, Ex sola temperata natura, & mediocri exer-
 citatione. **MATHESES**, Vnde corpulentia, quæ Græcis πλοσυρία
 dicitur? **GERON**, Ex humido quidem copioso, calore autem non
 multum à mediocritate summa recedente: adhæc ex temperata
 40 quidem natura, sed vita ociosa & deside. Verùm hæc corpulentia
 naturalis non est, sed acquisititia: sicut nec illi, tum qui pingues
 crassiq; sunt, & venas amplas obtrinent, tum qui angustas venas

Regiones minus
intemperatas iu-
colentes.

Calor naturalis
spiritus & facul-
tates gubernat.

Facultas ratio-
nalis.

Animosa.
Appetitoria.

Sanguinis pin-
guior & leuior
portio alimentū
caloris fit.

Animalia obesa
quæ.

Femina viris
pinguiore cur.

Habitus quadra-
ti seu carnosiss
vnde.

Corpulentia vnde
de.

habent, & graciles existunt, natura tales necessariò euaserunt, sed consuetudinis alicuius occasione, eiusmodi habitum consecuti sunt. MATHET. Quamobrem? GERON, Quia habitus gracilis, cum spaciola venarum laxitate, & harum angustia habituq; pingui, & crassiore, rationabiliter in alium propemodum recidit. 5
 MATHETES, Vnde quæso pili in singulis temperaturis progignuntur, & cur in his multi, in illis pauci, aut nulli erumpunt; deinde quare in alijs nigri, in alijs albi, in alijs rufi, fului, aut flauiproueniunt? GERON, Naturalis calor semper per omnem cutem aliquid diffat, simulq; interim humoris, aut vaporis fuliginosi, crassiq; & terrestris nonnihil, educit: verùm halitus celeriter, citraq; impedimentum transluit, humor in exilioribus spiramentis nonnunquam heret, aliquid etiam intrò recurrere ad profundum cogitur. fuliginosus autem, crassusq; vapor in angustis spiraculis impactus, nec faciliè rursus intrò redit, nec vacuari potest. Hunc igitur alius atq; alius iterum è profundo subiens ferit, prorsumq; impellit. 10
 Ac ex multis huiusmodi vaporibus fuliginosis alijs super alios impacti, tempore coniunguntur, vnamq; talem materiam efficiunt, qualis fuligo est, quæ foris cernitur, nisi quod spissatum est, id etiam per arctum transitum stipatum, in angustam prorsus figuram redactum est. Vbi autem talis materia totum obstruxerit meatum, deinceps iam violenter icta, similibus suis, quibus exitus non est, recrementis, tota ipsa interim propellitur: adeò, vt cute exire cogatur, iam lori formam adepta. quæ verò in meatu est impacta, quasi herbæ, aut stirpis radici respondet: quæ autem extra cutem prodit, veluti ipsi stirpi assimilatur. atq; hac ratione & modo, pili generantur. MATHETES, Cur calida & sicca intemperies efficit hirsutos, frigida autem & humida, prorsus glabros? GERON, Quia calor fuliginosa recrementa copiosè foras propellit, frigus intrò relinquit, adhæc dura cutis non ab similibus caseo recens coacto, perforatur quidem eorum quæ exeunt, imperu: cùm autem ob siccitatem rursus vniri nequeat, meatus ipsos immutatos seruat, qui etiam perpetuò transluentium ictu, assidue magis fistulantur. E contrario humida & mollis planè cutis, quasi caseus modò concrefcens, vias illorum quæ exciderunt, apertas non retinet, partibus eius scilicet, quæ prius dissidebant, rursus vnitis. Eadem ratione cutis calida quidem, sed humido & sicco moderatitatem sicca quidem, in calido autem & frigido temperata, mediocriter est hirsuta: at frigida omnia temperamenta siue mediocri, siue immodico polleant humore, nuda pilis existit. Quod 15
 autem frigore quodam exuperat, in humido autem & sicco est mediocre, minus glabrum existit, quàm frigidum simul & humidum, 40
 dum,

*Pili in singulis temperaturis va-
rijgignuntur.*

Excrementa quæ per cutem exeunt, calor naturalis expellit, vt pilos.

Vapor fuliginosus.

Pili quomodo generentur.

Hirsutos & glabros quid efficiat.

Cutis mediocriter hirsuta vnde nuda pilis.

- dum, hoc adhuc minus frigidum & siccum. MATHETES, Nondum accuratè satis rationem eius rei intelligo. GERON, Cutis hominis, ex qua pili oriuntur, inter omnes eius partes, est temperatissima: pro totius autem corporis temperamento, nunc siccior, 5 nunc humidior est: non autem adeò sicca, vt animalium, quæ testis, aut crustis, aut squamis, siue tenuibus, siue crassis intacta sunt, nec vt terra: nam eius siccitas maximè sine humore est: quæ verò in hominis, eiusq; similitum animalium corpore habetur, humoris compos est, & maximè omnium ad pilorum generationem 10 idonea. Cæterum humana, terræ potissimum qualis in vere esse solet, præsertim eius medio respondet. in hoc enim illa quoq; medio, quodam humidi siccitatisq; statu, vt cutis, est prædita. quæ verò pars veris, æstati est proxima, ea iam sicciolem iusto terram reddit: hac etiam magis æstas iam inchoata. Calida igitur & sicca 15 cutis, ei terræ statui similis est, quæ abeunte sit vere, vel ineunte æstate. nam media æstate summè est sicca, vt testaceorum animalium tegmenta, non vt hominum. Sicut igitur herbæ nec in sicca & squalente, nec in humida & lacustri terra nasci possunt, verum cum humoris abundantia absumi cœperit, tum è terra emergunt: 20 largiùs autem augentur, vbi hæc quoq; siccescit: modicè quidem in vere, celerrimè autem & plurimum ineunte æstate. ita pili quoque multi & magni, in calida & sicca cute proueniunt: in humida & frigida nulli: in sicca & frigida nonnulli: in frigida autem, & in humido siccoq; temperata, paucissimi. MATHETES, Iam satis as- 25 sequor, quo in temperamento pili, aut copiosi, aut pauci gignantur: cur autem colore variantur? GERON, Niger pilus fit, cum vapor excrementorum vi caloris adustus, in accuratam fuliginem mutatur: flauus autem vapor minus torretur: quippe quod tunc inhæret, flauæ bilis, non nigræ, scæculentum excrementum 30 est: albus verò ex pituita nascitur: rufus, sicuti coloris flauī albīq; est medius, sic ipse ex pituitosæ biliosæq; facis media quadam natura prouenit. MATHETES, Vnde crispī potius quàm rectī fiunt? GERON, Vel ob siccitatem temperamenti, vel ob meatus in quibus radican- 35 tur. ob siccitatem quidem ad eum modum, quo corrigie, quæ igne plus iusto siccantur: imò ipsi pili, vbi igni propius fuerint admoti, protinus intorquentur: atq; hac quidem ratione omnes Æthiopes sunt crispī. At verò propter meatuum, in quibus radican- 40 tur naturam, ideo crispantur, quòd exhalatio sæpe imbecillior sit, quàm vt rectam viam sibi moliri possit: adhæc quia, cum inflectuntur, etiam meatus suos figurent. Interim verò exhalatio satis valida est, sed à duriore cutis natura recta ferri regione prohibita, in latus flectitur, vt extrinsecus non halitum

Cutis idonea ad pilorum generationem quæ.

Terra in medio vere.

In parte veris æstati proxima.

In æstate iam inchoata.

Herbæ quæ in terra, & quo tempore gignantur potissimum.

Pilus niger, flauus, albus, rufus vnde.

Cur pili crispī.

Æthiopes crispī.

modò, aut sumum, sed etiam flammam ipsam, cùm sursum agi inhibetur, diuisam, utroq; versus in obliquum agi videre liceat. Sic igitur & corporis exhalatio, vbi forâs ferri impeditur, obliquum sibi transitum sub cute molitur, donec longiore spacio temporis collecta, per vim erumpat, forasq; transpiret. Est quando ambabus coeuntibus, & primæ exhalationis, quæ meatum finxit, imbecillitate, & cutis siccitate, obliquitas pilorum radicibus contingat. Quales autem in radice finguntur, tales fore perpetuò, rationi est consentaneum. adhæc nullum durum siccumq; corpus, nisi prius molliatur, fingi in rectum potest. **MATHESES**, Quales

Pili quales pro regione, ætate, & corporis natura esse soleant.

In regione calida & sicca.

In frigida, & humidâ.

In ætate.

Pili infantium, & adolescentiû, in temperata regione.

Iuuenum.

Pro natura corporum pili quales.

Pueri pilis nudi quare.

Cùm pubescere incipiunt, quales.

Adolescentes quales habeant.

Iuuenum pili.

Pili capitis, supercilij, & cilij.

pro regione, ætate, & corporis natura pili esse solent. **GERON**, In temperata sanè regione modicè nigri, & mediocriter, non prorsus crispi, nec omnino recti: plurimi autem incrementi, & robustissimi. In calida & sicca regione, qualem Ægypti, Arabes, Indi, alijsq; complures inhabitant, nigri, sicci, crispi, exigui incrementi, & fragiles. Contrà, qui humidam frigidamq; plagam incolunt, vt Illyrij, Germani, Dalmatæ, Sarmatæ, omnisq; Scytica regio, fuluos, tenues, rectos, & modicè auctiles obtinent: in ætatibus ad eundem modum habent. **MATHESES**, Antequàm pergas, distinguas mihi accuratiùs, ex qua nam ætate variarum istarum regionum pilos enumerasti? **GERON**, Florentium tales esse existimo. nam infantium pili rufi, ac fului, in temperata regione esse solent, quales Germani plerumq; obtinent. Puerorum & adolescentium flauui, vel modicè nigri, acijs qui temperatum locum incolunt, colore, magnitudine, crassitie, & robore conueniunt. Iuuenum autem nigri, cuiusmodi in Æthiopibus cernuntur. **MATHESES**, Hic quoq; hæsito, quamam in regione, ætatum iam dictarum pilos intelligere debeam. nam in Germanis ætate florentibus, non quidem nigros pilos, vt tu retulisti, sed flauos plerumq; video. **GERON**, Nimirum in temperata regione, temperatoq; homine. **MATHESES**, Quomodo autem pro varijs corporum naturis pili se habent? **GERON**, Ad ætatum & regionum rationem. pueri enim admodum parui, pilis nudi sunt, eò quòd utiq; nec meatus vllus in cute illorum, nec fuliginosum recrementum extet. incipientes autem pubescere, paruos, imbecilles, nunc albos, nunc rufos aut fuluos, pro temperamenti natura habent. adolescentes incrementum, magnitudine, crassitie, & robore mediocres, colore flauos, aut fuluos, aut modicè nigros: iuuenes qui ætate florent, valentiores, multos, magnos, & nigros habent, quòd & frequentes iam meatus sint facti, & fuliginosis excrementis, præ siccitate & calore abundent. **MATHESES**, Quid de pilis capitis, supercilij, & cilij, qui etiam pueris nobis nascuntur, sentiendum putas? **GERON**, Hi

non

- non vt herbæ sponte prouenientes, generantur, sed vt stirpes, quæ primaratione à natura conditæ sunt, non temperamentum corporis necessariò sequuntur. **MATHE T.** Obscurius est, quàm vt possim intellectu comprehendere. **GERON,** Herbæ ex innato
- 5 cuiuscunq; loci vapore proueniunt: stirpes, vt triticum, hordeū, & similia etiam, agricolæ industria, atq; ambæ sic inter se dignosci possunt, quòd hæ quidem certis quibusdam limitibus sint distinctæ, & æquabiliter, & nullis lineis circumscriptæ. Itapili qui in maxillis, & alijs membris habentur, à loci humore nascuntur,
- 10 si is calidus fuerit, plurimi: si frigidus, nulli omnino, aut paucissimi. Qui autem opificis animalium prouidentia, vt in palpebris, supercilijs, & capite gignuntur, hi omnibus naturis, calidis, frigidis, siccis, humidis insunt, nisi vltra modum fuerint intemperatæ, qualis est terra petricosa, aut arenosa. Itaq; generatio quidem
- 15 horum pilorum, naturæ artificis, color autem ætatis temperamento attribui debet. **MATHE TES,** Cuiusnam sunt coloris? **GERON,** Subfului propemodum. **MATHE TES,** Quamobrem? **GERON,** Quia, quod meatibus ob copiosum eius humorem, transitum facilem & deuotionem imbecillem inhæret, nondum in totum est
- 20 nigrum. **MATHE TES,** Cur autem facilè crescunt, & crassi sunt mediocriter? **GERON,** Propter excrementorum quibus aluntur, abundantiam. nam tota corporis pars, in qua fiunt, sicca est: cum tota quoq; caluaria ossa sit, cutis autem, quæ illi est circumdata, tantò reliqua corporis cute siccior, quantò etiam est durior.
- 25 Attamen non parua fuliginosi excrementi copia, tum ab ijs quæ circa cerebrum sunt, tum verò ex toto corpore ascendit: vnde fit, vt quale corpus totum est in ætate florentibus, talis sit cutis capitis infantium. **MATHE TES,** Quibus igitur ab initio cutis siccior fuerit, ij procedente tempore meritò calui reddentur, si verum
- 30 est quod dixisti, senescentium partes omnes siccescere. **GERON,** Benè colligis: imò non paucis cutis veluti testacea redditur, vbi supra iustum modum fuerit exiccata, in qua sicut iam didicisti, nihil nasci potest. Ea ratione interna manuum & pedum cutis, semper glabra est, & pilorum expers, eò quòd is tendo qui illi subest,
- 35 siccissimus sit, & densissimus. **MATHE T.** At quibus cutis capitis ad summam siccitatem non peruenit, quales in eis pili habentur? **GERON,** Imbecilli omnino albiq; fiunt, quos vulgò canos appellant: imbecilli quidem conuenientis alimenti penuria: albi verò, quòd alimentum, quo aluntur, veluti situs sit pituitæ, quæ tem-
- 40 poris spacio computruit. vbi enim meatus etiamnum manet, excrementum verò exiguum est, & lentum, ac languidè à calore propellitur, simile quiddam putredini in hoc experitur. **MATHE.**

Pilimalarum & maxille.

Pili palpebrarū, superciliorum, et capitis naturæ opificis prouidentia nasci dicuntur.

Pilorum color ætatis temperamento attribui solet.

Cur pili illi facilè crescant.

Qui calui fiant.

Cutis manuum & pedum cur glabra.

Pili cani in quibus, & vnde.

*Calities in syn-
cipite magis, &
cani in tempori-
bus potissimum
cur prodeant.*

*In temperato qua-
lis cutis, tales et-
iam reliquæ par-
tes vniuersæ.*

*Partes corporis
prius definiedæ,
quàm de illius
temperie iudi-
candum.*

*Principia alia-
rum partium.*

*Quæ proprijs fa-
cultatibus regan-
tur.*

*Quæ proprias, et
à principijs vires
habeant.*

Quare homines cùm senescunt, à syn-
cipite magis caluescunt, & à temporibus canescunt. GERON, Quoniam syn-
ciput omnium capitis partium est siccissimum. adhæret enim illis cutis olsi nu-
do: tempora verò humidiora sunt, quòd in his muscoli magni sub
cute habeantur: omnis autem musculus carnosus sit, caro verò
tum osse, tum cute humidior. MATHETES, Qui ergo calui sunt,
ij totiusne etiam corporis temperamento sicco omnes sunt præ-
diti? GERON, Nequaquam. nam fieri potest, vt cutis capitis dum-
taxat ita sit affecta, reliquæ autem corporis partes sint humidæ:
neq; etiam si nigra cutis hirsutaq; est, ideo totum quoq; animans
necessariò est siccum. Simili modo, neq; si mollis depilisq; hæc
existat, humidum ex toto animal esse oportet, verùm si per totum
æquabiliter est attemperatum, ratio est, vt qualis sit cutis, tales
sint & reliquæ partes vniuersæ: sin inæquabiliter, non item. MATHETES, Hoc exemplo clariùs efficias. GERON, Ostreorum to-
tum corpus humidissimum est, cutis siccissima. est enim illis testa
qua teguntur, qualis nobis est cutis, vnde etiam nomen græcum
ὀστράκωδες illis est inditum, quòd cutis eorum teste sit similis. Item
locustæ marinæ, gammari, cancri, similiaq; animalia, quæ molli
testa integuntur, vnde μαλακόβραχα vocantur: cutem quidem ha-
bent siccam, reliquam autem totam temperiem humidam. imò
verò illud ipsum, in eiusmodi animalibus nonnunquam humidi
causa fit, quòd natura siccam, terrenam portionem his vniuersam
circa cutem reponat. Non igitur existimandum est, nec quia cutis
ostreis sicca circumdata sit, ilicò carnem quoq; esse siccam: nec
quòd caro humida, mucosaq; sit, iam cutem quoq; esse eiusmodi.
quippe vnamquamq; particulam ex seipsa dignosci, æquum est.
Quare cùm de corporis temperie iudicare volumus, illas prius
definimus, examinabimusq;. MATHETES, Quibus notis tem-
peramenta illarum cognoscentur? GERON, Dicam, vbi quatuor
principum maximè partium differentias exposuero. Nonnullæ
enim principia quædam sunt, & alias gubernant, vt cerebrum,
cor, iecur, & testes: nonnullæ ab his & processerunt, & gubernan-
tur, vt nerui, spinalis medulla, arteriæ totius corporis, venæ om-
nes, & vasa seminaria: quædam nec alijs præfunt, nec ab alijs, sed
institis sibi natura facultatibus reguntur, vt os, cartilago, ligamen-
tum, membranæ, adeps, glandulæ, & caro simplex: quædam con-
natas simul, & à principijs per neruos, arterias, & venas, deriuantes
vires habent, vt lingua, pulmo, ventriculus, iecur, lien, renes,
& reliqua corporis instrumenta. MATHETES, Quibus pilos &
ungues attribuis? GERON, Nullis, vt quæ sint excrementorum
soboles, nec vllis præfunt, sed tantùm generentur. MATHETES,
Recen-

- Recenseas igitur singularum partium temperamentorum indicia. GERON, Cerebri naturam, vt ab hoc exordiar, quinque congenita ipsi genera ostendunt. MATHESES, Quænam obsecrô? GERON, Totius capitis habitus, sensus, motus, actiones principales, & naturales. MATHESES, Ex quibus capitis habitus indicatur? GERON, Ex quantitate, figura, & capillis. MATHESES, Quænam paruitas, aut magnitudo capitis portendit? GERON, Illa sanè, vitiosæ cerebri structuræ proprium est signum: hæc autem non necessariò bonam indicat. verùm si quidem ob insitæ facultatis robur eueniat, quo multam atq; optimam materiam efformauerit, laudatum est indicium: sin autem ob solius materiæ copiam, haud bonum existit. MATHESES, Quibus autem integritas, & vitium illorum distinguuntur? GERON, Figura, & ijs quæ ex ipsa processerunt, nam illa si concinna, & ceruix valida sit, alia
- ossa optimè affecta, & tota neruosa essentia benè habita, & robusta, semper bonum est indicium: sin contrà, malum. MATHESES, Quæ est propriè concinna capitis figura? GERON, Qualis est globi accurati ex cera, vtrinque sensim depressi, vt anteriores posterioresq; eius partes magis gibbæ quàm globi natura postulet, laterales autem rectiores fiant. Sicut autem apta syncipitis forma, cerebri, & neruorum ab eo procedentium, quorum complures quidem sensibus distribuendis dicati sunt, pauci verò motibus destinati, probam structuram ostendit: ita occipitij, & futuræ, quæ à græca litera Λ, quam imitatur, nomen habet, concinnitas,
- cerebelli cerebro annexi, & ab illo prodeuntium, nempe spinæ medullæ, & neruorum plurium sanè ad motus, paucorum verò ad sensus factorum, optimum statum & robur testatur. MATHESES, Quid partes in occipitio depressæ, quæ magis gibbæ esse deberent, indicant? GERON, Si figura non illiberalis & absurda fuerit, item si nerui, ceruix, & reliqua ossa naturaliter habeant, quod rarum est, penuriam materiæ, non facultatis formatricis imbecillitatem significant: si deterius affecta sint, quod frequens est, principium imbecillum signant. MATHESES, Quid partes acuminatæ? GERON, Hic quoq; si figura non inconcinna fuerit, & processus naturaliter habeant, cerebelli bonum est indicium, sicut in magnitudine capitis est distinctum: sin contrà, malum. MATHESES, Quid synciput depressum, aut fastigiatum nimis indicat? GERON, Idem quod occiput ita formatum: si figura vel maior, vel minor non indecora fuerit, & procedentes à cerebro nerui sensu
- rij, qui visum, & odoratum distribuunt, benè affecti, laudatur: sin aliter, improbatur. MATHESES, Vnde capitis habitus bonus vel malus innotescit? GERON, Ex capillorum crassitie, aut tenui

*Temperamento
rum partium no-
tæ.*

*Cerebri quinque
congenita genera*

*Capitis habitus
indicium.*

*Figura capitis
concinna.*

*Cerebri, & neru-
orum proba stru-
ctura quibus in-
dicatur.*

*Cerebelli, spine
medullæ, neruo-
rumq; inde pro-
deuntium habi-
tus boni indicia.*

*Occipitij partes
depressæ.*

*Occipitij partes
acuminatæ.*

Figura concinna.

*Syncipitis depres-
si, aut fastigiatij
figura quid notet.*

*Capitis habitus
boni vel malino-
tæ.*

*Reliquæ cerebri
notæ.*

Sensus.

Motus.

*Functiones ani-
mæ principes.
Naturales in ce-
rebro actiones.*

*Cerebri optimi
habitus.*

*Cerebri calidio-
ris humido & sic-
co temperati.*

*Quæ secundum
naturam habent,
similibus conser-
uantur, quæ ab
illa longius rece-
dunt, contraria
postulant.*

*Cerebri frigidi in-
dicia.*

tate: mollitie, aut duritia: figura recta & plana, aut crispa, & flexa: colore aut albo, aut pallido, aut rufo, aut flauo, aut nigro: incremento celeri aut tardo: caluitio, aut præmaturò, aut tardiore. MATHESES, Quæ præter iam dicta, cerebri naturam indicant: GERON, Sensus, visus, olfactus, gustatus, auditus, & tactus. nec non motus voluntarius, qui per nervos & musculos perficitur: adhæc principes animæ functiones, vt apprehensio, cogitatio, & memoria: postremò naturales in cerebro actiones. MATHESES, Quinq; ergo sunt numero, quæ cerebrum produunt. GERON, Maxime, sed his quinq; generibus accedit etiam, si facile, aut difficulter à causis externis commutentur. MATHESES, Quæ optimi cerebri habitum notant: GERON, Integerrimæ actiones primariæ, sensoriæ, motoriæ, & naturales: somnus mediocris: excrementa quæ per aures, oculos, nares, palatum, futuras, & meatus alios emanant, modica: mediocritas capitis in magnitudine, & figura concinna: capilli per infantiam subrussi, in pueritia subflauii, in adolescentia flauii, & inter simplices ac exquisitè crispas medijs, vix caluitium sequitur, si regio, & humores in cerebro fuerint temperati. postremò quòd illud non facile ab externis causis calidis, frigidis, humidis, & siccis offenditur. MATHESES, Quæ calidioris cerebri, humido autem & siccò temperati, signa apparent: GERON, Inconstantia opinionum, sensuum, motuumq;, & ingenij celeritas, somni breues, leues, & parum pleni: vniuersum caput calidius rubicundiusq;: oculorum venæ manifestiores: excrementa per aures, oculos, nares, & palatum pauca & concocta excernuntur, si tali cerebro præditi moderato victu vtantur, plura autem, & non concocta guntur, si cibo, potu, odoramentis, aëre, & alijs omnibus foris accidentibus natura calidis, præcipuè etiam humidis caput repletur, grauaturq;, quod illis perpetuò accidit: præsertim cum nullam victus rationem obseruant. Capilli his statim oborti in capite celeriter succrescunt. si cerebrum multò calidius temperato fuerit, nigri, validi, & crispi fiunt: si non multò, subflauii per initia, deinde nigrescunt: processu ætatis caluitium sequitur, præcipuè si longè calidius extiterit. adhæc tandem à causis calidis internis, & exterioribus facile offenditur, iuuatur frigidis. MATHESES, Hoc mirum mihi videtur, cum antea similibus conseruari similia, contraria curari contrarijs docueris. GERON, Quæ secundum naturam habent, similia postulant: quæ verò à naturali modo longius recedunt, contraria: eòq; omnis pars à similibus suæ intemperaturæ causis læditur, modico autem contrariorum vsu adiuuatur. MATHESES, Quæ frigidi cerebri indicia existunt: GERON, Constantia opinionum, sensuum,

- suum, motuumq; & intellectus tarditas, somni longi, graues, & pleni: caput neq; tactu calidum, neq; visu rubrum, sed pallidum apparet: venæ omnino obscuræ sunt: capilli multo post natales orti, tenues initio, exigui incrementi, recti, rufi, & stabiles. qui tale cerebrū habent, canitiem, non caluitium experiuntur, à frigidis causis promptè offenduntur, & ipso læsionis tempore destillationibus, & grauedine corripuntur: à modicè calidis adiuumentum sentiunt. nam valdè calida destillationem, grauedinemq; in eis augent, vt quæ excrementa cerebri colligunt. *MATHESES,*
- 10 Qualis siccior cerebri essentia existit? *GERON,* Firma & stabilis, *Cerebri siccioris essentia signa.* eorū formas non facilè suscipit: vnde difficultas discendi, memoria fidelis, sensuum perspicacitas, motuū promptitudo quædam, & plurimæ vigiliæ oriuntur: caput ex ea siccum & gracile apparet: excrementa per meatūs superius dictos exeunt: capilli à prima
- 15 origine celerrimè proueniunt robusti, crispī potius quàm recti: caluitium citò succedit: à siccantibus facilè læditur, ab humectantibus iuuatur. *MATHESES,* Humida cerebri essentia nimirum, *Cerebri humidioris indicia.* superiori ne contrarijs signis innotescit? *GERON,* Sic habet, fluida est, & facilè ideo formas suscipit: hinc discendi facultas, obliuio
- 20 celeris, sensus turbulenti, graues, obtusi, motus tardi: somnus paruus & grauis: caput ipsum humidum tangenti, tumidum, & obæsum apparet: excrementa copiosa prodeunt: capilli plani, & simplices apparent: canities, non caluitium sequitur. eiusmodi cerebrum ab humectantibus offensionem, à siccantibus adiuumentum
- 25 percipit. Atq; hæcenus simplicium temperaturarum cerebri notitas commemoravi: si placet, nunc etiam compositarum, expeditam. *MATHESES,* Amabò referas. *GERON,* Calidioris, & siccioris cerebri indicia sunt, sensus exquisiti, vigiliæ plurimæ, calor capitis, facies vsq; ad ætatis vigorem rubicundior: excrementa nulla: capilli prima origine quàm celerrimè enascuntur, & plurimi
- 30 alimenti sunt, colore nigri, & crispī. *MATHESES,* Quod si paulò calidiùs & humidius extiterit? *GERON,* Tum color capitis bonus, & calor adest: oculi sunt calidiores, & venæ in eis amplæ: excrementa copiosa, mediocriter concocta: capilli recti subflauī: caluitium ægrè admittunt: caput à calidis repletur, & grauatur: ab humectantibus autem multò maior excrementorum copia mox accedit. *MATHESES,* Quæ multò calidiùs, humidiusq; cerebrum
- 35 demonstrant? *GERON,* Visus turbulentus, cæteri q; sensus parum accurati: vigiliæ non longæ: somnus grauis, interruptus, vigilijs
- 40 & somnijs imaginationum plenus: excrementorum copia, calefactione, & humectantia, vt Auster, sunt ei aduersa: frigida autem & sicca, vt Aquilo, amica. caput tali cerebro prædictum, morbis est

Cerebri frigidioris & siccioris nota.

obnoxium. At si multò humidius, paulò calidius, contrà. quæ ratio communis est omnibus temperaturis compositis. MATHETES, Expecto nunc frigidioris & siccioris cerebri notas. GERON, Sensus omnes in iuuentute accurati sunt, nullo prorsus scaten vitio: processu ætatis qui tale cerebrum habent, subitò emarcescunt: in summa, omnes circa caput celeriter senescunt: caput ipsum tactu frigidum percipitur, & sine ratione decolor apparet: oculorum venæ delitescunt: excrementa inconstanter euacuantur: capilli in lucem editis vix emergunt, pauci nutrimenti, rufi, citò canescentes: procedente autem tempore, si humor superet siccitatem, caluitium sequitur. contrà si humorem siccitas, frigus calorem longè excedat, leue caluitium oboriur. Eiusmodi temperaturam causæ frigida faciliè infestant. MATHETES, Quæ tandem frigidum & humidum cerebrum signant? GERON, Sensus obtusi, & tardi: somnus plenus, isq; grauis, & altus: excrementorum copia: capillorum canities, non caluitium. hac intemperatura cerebri donati, frigore, repletione, grauitate, & destillatione affliguntur. MATHETES, Quia iam omnes cerebri intemperaturas, earumq; notas absoluisse videris, optime præceptor, oro te, vt priusquam alias principis partes aggrediaris, oculorū, qui neruos ex cerebro ortos habent, temperamentorum inditia per censere ne graueris.

Cerebri frigidi & humidii signa.

Oculorum temperamentorum nota.

GERON, Temperatos oculos notant, concinna, vel magnitudo, vel paruitas: sed vtraq; cum visione perfecta, illa enim multam materiam, hæc paucam: vtraq; verò à facultate formatrice benè temperatam significant. quemadmodum inconcinna siue magnitudo, siue paruitas cum visione hebeti, multam materiam, vel paucam, à vi formatrice malè temperatam testatur. At calidiores natura oculos, calor qui tactu manifestè percipitur: item motus facilis, & creber, venæq; latae monstrant: frigidiores, contraria indicant. humidiores autem notant mollities cum multo humore, & tenuis humor copiosus, qui magis ad aquæ naturam accedit. sic etiam cristallinus humor mollior, nec ita copiosus tales ostendit. Sicciores verò, durities & siccitas, tenuisq; humoris crassities, & paucitas: cristallinus autem durior, & paulò copiosior aquoso testatur. MATHETES, Quidnam oculos cæcios, quos Græci γλαυκός appellant, efficit? GERON, Humoris cristallini amplitudo, splendor exquisitus, & situs eminentior. adhæc paucitas, puritasq; humoris tenuis, & aquosi ad pupillam. MATHETES, Quid vicissim nigros reddit? GERON, Contraria: nempe humoris cristallini paucitas, splendor non exquisitè fulgens, & situs profundus, copiaq; vel impuritas humoris aquosi. At si omnes hæc priores causæ ad sint, maximè cæsius: si posteriores, nigerrimus erit oculus:

Calidiores oculos quæ indicent.

Frigidiores.

Humidiores.

Oculi sicciores.

Oculos cæcios quid efficiat.

Oculi cæsi in quibus est fulgor quidam horrendus, & à cæde dicuntur, quid hanc mihi nari videntur.

Oculos nigros quid reddat.

30
35
40

- oculus: si aliæ adsint, aliæ desint, maior & minor fiet glaucedo, & nigredo, pro illarum numero, & viribus. Iam qui mediam harum naturam habent, medijs quoq; causis accepti feruntur. **MATHE T.** Satis de his pro re præsentī egisti: nunc viscerum temperamenta
- 5 exponas. **GERON.** Anteq̃ id aggrediar, admonendus mihi eris, vbi partem quamcunq; vel calidiorē, vel frigidiorē, vel humidiorē, vel sicciorē, quā anteā factam dixero, me illam non alteri cuiquam rei, sed cum ipsamet conferre. quamuis alicui cor frigidius natura procreatum fuerit, multò tamen calidiorē
- 10 cerebro calidissimo temperaturam obtinere. **MATHE TES.** Enumeres igitur primū simplices ipsius temperaturas. **GERON.** Calidioris cordis signa alia sunt propria, & quæ separari ab eo nequeunt: alia quæ non semper, sed magna ex parte eueniunt. prima quidem sunt pulsus velox, frequens, respiratio magna, audacia: & si calor multū excesserit, furibunda quædam iracundia,
- 15 & temeritas: natura ad actiones prompta: thorax hispidus, præsertim pectus: nec non partes præcordijs vicinæ: adhæc thorax latus, simul cum paruo capite. **MATHE TES.** Quæ indicia minus propria, magna ex parte solum contingunt? **GERON.** Vniuersum corpus calidum, nisi iecur vehementi frigore obstiterit, præsertim si caput paruum fuerit: vt rursus caput magnum cum thorace paruo, cor frigidius significat. At si thorax capiti respondet, temperaturæ cordis propria signa sunt obseruanda, his quæ à thoracis amplitudine sumuntur, neglectis. **MATHE TES.** Contrariāne indicia, cor frigidum ostendunt? **GERON.** Vtiq; sed ex
- 25 his quoq; alia maximè propria, alia minus existunt, vt quæ etiam non perpetuò, sed plerunq; soleant contingere, ac prima sunt pulsus minores, quā pro naturæ modo, non tamen necessariò tardiores, vel rariores. Respiratio pulsui respondet, si thorax tantò minor est, quantò cor frigidius: sin autem maior est, quā frigoris portio requirat, respiratio non solum minor, sed etiam tardior, & rariore efficitur. Adhæc timiditas, natura ad actiones segnis, pectus glabrum, thorax exiguus simul cum magno capite, frigidum cor representant. **MATHE TES.** Quænam alia sunt indicia, quæ non semper adesse solent? **GERON.** Vniuersum corpus frigidum, nisi iecur vehementi suo calore obstiterit: thorax paruus, nisi cerebrum calore multo aduersetur. Siccioris cordis propria sunt, pulsus duri, ira non facilis, sed fera, quæ egre pacari queat. vniuersum autem corpus siccius, nisi iecur humidius obstiterit, plerunq;
- 40 etiam cor frigidius significat. contraria, humidius, vt pulsus mollis, mores ad iram procliuēs, sed quæ faciliè sedetur: corpus totum humidius, nisi iecur siccius renitatur. Porro calidioris & siccio-

*Cordis temperamenti signa.**Pulsus.**Animi mores.**Indicia minus propria.**Corpus totum calidum.**Caput paruum. Caput magnum.**Cordis frigidi notie.**Pulsus.**Respiratio.**Animi mores.**Impropria signa.**Cordis siccioris propria.**Impropria.**Cordis humidioris propria. Impropria.*

Cordis calidioris & siccioris propria. ris cordis notæ sunt (vt composita quoq; temperamenta referam) pulsus magnus, velox, frequens: respiratio magna, velox frequens: multò autem velocior & frequentior, si thorax non sit portione caloris cordis auctior. item iracundia, animus præceps, mores feri, ad furorem procliuus, qui difficulter placari possunt, alacritas ad actiones, pectus omnium maximè hirsutum, & præcordia. At calidioris & humidioris notæ sunt, pulsus quoq; magnus, velox, frequens, mollis: verùm arteriæ summissio, quæ Græcis *συσπλην*, vocatur, celerior quàm eleuatio, quæ *διασπλην* dicitur. Respiratio pulsui assimilis est, si thorax pro cordis caloris portione est adauctus. Contra, frigidioris & humidioris indicia sunt, pulsus mollis, animus timidus, non audax, ad iram propensus, nec iræ tenax, pigritia obeundis actionibus, pectus glabrum, quemadmodum frigidius sicciorq; temperamentum testatur, pulsus paruus, durus, inspiratio moderata, si thoracis paruitas, cordis frigori respondet. si verò minor est thorax, tarda & rara sit respiratio, animus minimè omnium ad iram propensus, irasci autem coactus, iram diu retinet. Atq; hæc de cordis temperamentorum simplicium, tum compositorum notis sufficere videntur, si in memoriam reuoces, quæ de proprijs animi moribus, temperaturisq; & naturalibus, siue infitis, & acquisitis dicta sunt. MATHEI. Vtinam reliquarum partium notiones similiter pertractasses, quia autem sine illis, de toto corpore rectè iudicare non possum, obsecrò perge reliquas absoluerè. GERON, Iecoris calidioris signa sunt, calidior sanguis, eoq; corpus vniuersum calidius, nisi cordis frigus obstiterit: bilis flaua in ætatis vigore copiosior, deinde etiam atra: venæ totius corporis natura amplæ: venter & præcordia hirsuta. contraria indicant frigidius iecur, nempe sanguis, totusq; corporis habitus frigidior, nisi à corde calefiat. nam huius calor, illius frigus potest obtundere. At cordis humor, iecoris siccitatem ad contrarium habitum traducere nequit. siccitas autem illius, huius humorem magis vincit, quàm ab eo vincatur: sicut etiam cordis frigus, multò facilius iecoris calorem superat. Adhæc pituitæ copia, venæ natura graciliores, venter & præcordia glabra, frigidum iecur indicant. Porro siccus, sanguis parior, crassiorq; & totius corporis habitus siccior, venæ duriores: contrà humidus, sanguis copiosior, humidiorq; & corpus totum humidius, nisi fortè cor renitatur, & venæ molliores ostendunt. Compositi temperamenti iecoris, signa sunt eadem ferè, quæ in simplici temperatura retuli, nempe sanguis crassior, & siccior, totumq; corpus siccus, bilis flaua copiosa, in vigore ætatis atra, venæ latæ, & duræ, venter & præcordia plurimum hispida.

Calidio-

- Calidioris autem & humidioris, sanguis abundantior, eoq̃ vni- *Calidioris, & hu-*
 uersum corpus calidius humidiusq̃, nisi cor obstiterit: venæ am- *midioris.*
 plæ, præcordia hirsuta: sed minus prædictis corpus morbis & pu-
 tredine, humoribusq̃ vitiosis, si vtræq̃ qualitas sit aucta, præci-
 5 puè humida, non calida, obnoxium existit. Sin autem calor non
 humidum auctum fuerit, vitiosis humoribus non laborat. Con- *Frigidioris, et hu-*
 trariæ frigidioris & humidioris notæ sunt, vt sanguis pituito- *midioris.*
 fus, totumq̃ corpus similiter habitum, nisi cor impediat: venæ *Frigidioris & sic-*
 exiles, præcordia glabra. Frigidioris porro & siccioris, sanguis *cioris iecoris no-*
 10 paucus, vniuersum corpus frigidius & siccius, nisi contraria cor- *ta.*
 dis natura fuerit: venæ angustæ, præcordia glabra. MATHETES, *Cordis & iecoris*
 Quid si cordis, & iecoris eadem natura fuerit? GERON, Totum *vna natura que*
 quoq̃ corpus illam sequetur, vt si ambo hæc sint calida, illud eti- *notas habeat.*
 am calidum: si frigida, frigidum erit. sic etiam in cæteris habet.
 15 MATHET. Quomodo partium minus principalium temperaturas
 cognoscam? GERON, Ex suis singulas actionibus. etsi autem ex
 cordis & iecoris natura totum corpus magna ex parte condisca- *Partium minus*
 mus, tamen testiculorum, ventriculi, & pulmonis temperamen- *principalium tem-*
 20 ta probè cognita, non parum etiam ad hanc rem faciunt. MATHETES, *peratura.*
 Quin illas breuiter exponas? GERON, Testiculorum natu- *Testiculorum ca-*
 ræ calidioris nota est, ad venerem propensio, sæcunditas in ma- *lidiorum nota.*
 fculis præcipuè procreandis, genitales partes celerrimè pilis ob- *Frigidiorum.*
 sitæ: frigidiorum contraria indicant. Humidiorum verò semen *Humidiorum.*
 largum, & humidum: sicciorum, paucum & modicè crassum. atq̃ *Sicciorum.*
 25 hæc sunt simplicium. Si composita est temperatio, calidior & sic- *Composita tem-*
 ciorum testium natura prædicti, statim ab initio ad venerem procli- *peraturæ testium*
 ues sunt, protinus autem ea satiantur, & si ad concubitum cogan- *indicia.*
 tur, offenduntur: semen habent crassum, & sæcundissimum: na- *Calida & sicca.*
 30 turales ipsoꝝ partes, eisq̃ proximæ, ad vmbilicum vsq̃ & sæ- *Calida & humi-*
 mora media, citissimè fiunt hispida. Calidiorum autem, & humi- *da.*
 diorum donati, non magis quàm alij concubitum appetunt, sed ex
 immoderatore eius vsu minus læduntur. si calor & humor ha- *Frigida, & hu-*
 35 rum partium sint aucti, veneris abstinencia offenduntur: semine *midia.*
 abundante naturalia, eisq̃ vicinalia loca minus hirsuta prædictis ap- *Frigida & sicca.*
 parent. At frigidiorum, humidiorumq̃ testium naturam sortiti,
 ad concubitum non sunt proni, sed tardè illum appetunt, exer- *Ventriculi tem-*
 centesq̃: semen tenue habent, aquosum, infæcundum, vel certè sæ- *perati signa.*
 40 cellas generant: partes genitales ac vicinas glabras habent. Fri- *Calidioris.*
 gidiorum & sicciorum nacti temperationem, semen crassum pau-
 cumq̃ obtinent, cætera prædictis similia. MATHETES, Ventri-
 culi nunc temperaturarum notas enumeres? GERON, Si is tem-
 peratus est, benè concoquit: si intemperatus, malè, at calidior de-

terius appetit, quàm concoquat: melius autem concoquit bubu-
 lam carnem, & quæ difficilia sunt: facilia verò in ipso corrumpun-
 tur: ructus edit nidorosos, aut fumosos: cibo potuq; calido oble-
 ctatur: modico frigidiorum usu non grauatur, calidorum extrin-
 secus adhibitorum statim leditur, & sustinere ea nequit. *Contra*, 5
 frigidior ventriculus vehementius appetit, imbecillius conco-
 quit, præsertim cibum frigidum, & difficilem: ructus acidos plu-
 rimos ædit, præsertim à frigido cibo, facile accescente. aliàs tum
 cibo, tum potu frigido oblectatur: immodico autem horum usu,
 & rebus externis frigidis protinus leditur. Siccio-rem ventricu- 10
 lum indicat sitis citata, quæ modico potu sedatur, plurimo gra-
 uatur: fluctuationibus affligitur, & quod in eo abundat, in super-
 ficie fluitat: siccioribus cibis delectatur. Humidiorem verò nulla,
 aut minima sitis vrget, humorem largiorem facilius tolerat: om-
 nibus quæ humectant, oblectatur. Compositæ temperaturæ, ex 15
 simplicium natura cognoscuntur: vt calidior & siccior ex siti ma-
 xima. verùm hæc distinguenda est, à thoracisne visceribus, an
 à ventriculo oriatur. Nam quæ ab huius, vel iecoris calore sitis
 orta est, illam præcordiorum calor prodit, eamq; potus præser-
 tim frigidus sedat: inspiratus autem aer frigidus non iuuat. Quæ 20
 verò à cordis & pulmonis intemperie profecta est, hanc æstuans
 thoracis calor, multa inspiratio, longaq; expiratio indicant: nec
 non ipsam aer frigidus inspiratus, euidenter finit. potus quidem
 modicè frigidus eam iuuat, non autem statim ipsam restinguit.
 At quòd ventriculus interdum difficilius cibos præ imbecillitate 25
 non possit concoquere, id non solum ex intemperie, sed etiam ex
 succi cuiusdam aliunde influentis vitio, solet contingere. Alijs e-
 nim ex capite pituita defluit, vt Romæ, & similibus locis perinde
 humidis: alijs flaua bilis ex iecore in ventriculum confluat, et si na-
 tura sint pituitosi, pingues, calidi, glabri, venis & musculis parum 30
 conspicuis. MATHETES, Atqui ego id temperamento calidis,
 gracilibus, hirsutis, musculosis, nigris, venosisq;, & biliosis solis
 euenire putabam. quare tu mihi eius causam explices. GERON, In
 biliosis naturis nonnunquam bilis ipsa, ex intestinis ad ventricu-
 lum, plurimis autem non, conscendit. Cur autem in pituitosis &
 obælis hoc eueniat, hæc est ratio: Meatus, per quem iecur bilem 35
 in ventrem euomit, alijs geminus est, alijs vnicus: ac plurimum
 vnicus is intestino inseritur, quod Græcis *ἐκφυσις* dicitur, exitusq;
 fundi ventris, & ieiuni medium est. Vel si geminus meatus est, in
 exitum fundi ventris maior, in fundum ventriculi paulò suprà 40
 portas, minor ingreditur: in quibusdam tamen, licet paucissimis,
 superior pars maior, inferior minor inuenitur. In quibus autem
 maior

- maior est, his in ventriculum quotidie non parum bilis effunditur, quam vt euomant, ante cibos necesse est, & nisi id faciant, offenduntur. quibus verò vnicus est meatus, ijs tota bilis in ieiunum intestinum confluit. *MATHESES*, Qua ratione hos discernere inter se licebit? *GERON*, Totius corporis temperamento: deinde ijs quæ infrà excernuntur, nam in quibus multa colligitur bilis, nihilq; ex ea in ventriculum peruenit, mera biliosa perpetuò deijciuntur. in alijs, qui scilicet & pituitoso corporis habitu sunt præditi, & bilem vomunt, haudquaquam alius biliosa egerit: quippe in illis & minor bilis portio gignitur, & maxima in ventriculum peruenit. *MATHESES*, Mirum mihi videtur, quomodo homines natura frigidi, venis, arterijsq; exilibus, & minus numerosis præditi, meatus bilis plures, quàm calidi & venosi habere possint: & si duos habent, cur ex inferiore nihil ferè bilis semper excernatur, plurimùm autem ad stomachum emergat? & si parum bilis in talibus gigni dicas, cur quotidie ventriculus ab eo infestetur? *GERON*, Rationi consentanea adfers, nec possum tibi refragari. etsi verò Galenus quibusdam geminum bilis meatum, ex iocinore inferi affirmet, & nonnulli hodie anatomici complures se tales vidisse pronunciant: ego tamen rarissimè binos deprehendi, idq; potius in biliosis natura, quàm pituitosis. nam calidis, & siccis temperamento familiare est, vt vomitiones spontaneas, subuersiones stomachi, & animi defectiones experiantur, quoties venter diutius ieiunus à bile torquetur. Nam cùm hoc excernunt, nihil habet quo reficiatur, ab inferioribus biliosum hunc excrementum attrahit. *MATHESES*, Quando aliàs vomitus biliosus contingit? *GERON*, Primùm cùm bilis in ventriculo ex igneo ipsius calore, similiq; materia & succo nata, porracei coloris abundat: deinde cùm illa planè flaua, vel calida ex iecore descendit: tertio cùm pituita in intestinis copiosissima congregatur, quæ meatum summo intestino insertum replet, vt bilis per inferiora descendere nequeat, sed ascendere ad stomachum, ibiq; nauseam, & alios affectus excitare cogatur. *MATHESES*, Ex quo porracea illa bilis in ventriculo gignitur? *GERON*, Non ex pane, suilla carne, aut simili quopiam, sed calidiore, maliq; succi necessariò. *MATHESES*, Ex qua materia flaua, pallidaq; bilis generatur, quæ ex iecore in ventrem defluere, euomisq; solet? *GERON*, Ex quocunq; cibo, tum mali, tum boni succi: etiamsi probè concoctus fuerit. imò magis in his qui accuratè assumpta concoxerunt, flaua euomuntur: atq; magis adhuc in illis, qui diutius cibo abstinuerunt. Porracea verò in ijs solis gignuntur, qui vtiq; cibos malè in ventriculo concoxerunt. At curæ, tristitia, ira, dolor, exercitia, vigilia, ie-

*Discretio illorū,
qui bilem aut vo-
munt, aut deijci-
unt.*

*Cur frigidi plu-
res bilis meatus,
quàm calidi ha-
beant.*

*Bini meatus bi-
lis in biliosis ma-
gis quàm in pi-
tuitosis inuenti.*

*Calidis & siccis
familiare.*

*Vomitus biliosus
quando aliàs con-
tingat.*

*Bilis porracea
vnde gignatur.*

*Bilis flaua ex ie-
core prodeuntis
materia quæ.*

Bilis in ventriculo orta quomodo ab illa quæ in iecore gignitur dignosci queat.

ium, & inedia, flauæ bilis generationem promouent, quoniam etiam in iecore adaugent. **MATHETES**, Quibus notis ergo bilis, quæ temperamenti ratione in ventriculo gignitur, ab illa discerni poterit, quæ ex iecore ad ipsum confluit? **GERON**, Quod à sicco & igneo ventriculi calore, panis, caro suilla, & bubula melius, quàm pisces saxatiles concoquantur, leuior cibus deterius in bilem conuertatur. Bilem verò, quæ ex iecore in ventriculum confluit, nulla concoctionis diuersitas, præter ciborum commutationem comitatur. Ad eundem modum cum acidi ructus infestant, considerandum est, propriione ventriculi affectu oriantur, 10

Dolores capitis ab intemperie, et qui ex ventriculi recrementis sunt discernendi.

an pituita ex capite in illum confluens, ipsos excitet. Simili ratione capitis dolores discerni debent, num ex propria eius temperie, an propter quædam ventriculi excrementa incidant. Iam cerebrum ipsum cuius sit temperamenti, per se æstimare est fatius, quàm ex corporis totius affectione. Nam vnaquæque pars, vt antea monui, seorsum æstimari, non autem ex vna, de omnibus iudicium ferri debet. **MATHETES**, Quare hoc iam sæpius admones? **GERON**, Quia celsij oculi, verbi gratia, siue humoris vincen- 15

Non ex partibus de toto corpore iudicandum.

tis, siue caloris, siue amborum iudicium statuere oportet: vtique ipsorum proprii sic, non omnium totius corporis partium temperamenti, documentum erunt. Neque crura, si macra & sicca fuerint, ideo quoque totius corporis temperamentum siccum erit. Alij enim affatim carnosi, pingues, crassi, prominente ventre, molles, & candidi, etiam eiusmodi cruribus donati, cernuntur. verum si totius corporis temperies æqualis fuerit, sicci omnino 25

Crura. Nasus.

erunt, qui macra crura habent; humidi, qui crassa, adhæc quibus acutus & aduncus est nasus, hi sicci: quibus resimus, humidi. Si verò inæquale temperamentum, nec omnium particularum idem fuerit, non ex vna de vniuersis iudicare oportet, sicut antea quoque de cute diximus. **MATHETES**, At cum temperamenta pro ætate 30

Ex toto corpore de partibus iudicium ferre oportet.

tum ratione mutantur, notæ quæ illa indicant, etiamne variare solent? **GERON**, Non semper. fit enim sæpe, vt præsens nota prioris temperamenti sit, non eius quod in corpore nunc habeatur: veluti si quis annos natus sexaginta, denso sit pilo, non quod calidus & siccus nunc sit, sed quod antea talis fuerit. Consistunt autem 35

Notæ temperamentorum variæ.

pili antea geniti, eo scilicet modo, quo herbar, quæ vere sunt enatae, nonnunquam æstate perseverant. Alij enim temporis spatium, & paulatim hispidi plurimum esse desinunt, latentibus scilicet præ nimia siccitate pilis. Alij diutissimè pili permanent, nimirum qui nec in progressu temporis admodum siccantur, & à primo ortu valentem habent originem, amborum ritu, quæ radices in terra valentes egerunt. Quare Hippocrates rectissimè dixit, 40

spectan-

spectandum esse, ex quibus, & in quæ mutationes fiant. nec ideo quemlibet pilosum, statim melancholicum existimandum esse: verum si floret adhuc ætas, nondum talem esse: sin iam declinat, melancholicum iudicabis: si verò senex est, non item. Quippe me

Mutationes ex quibus, & in quæ fiant, spectandæ.

5 melancholica temperamenta ex sanguinis adustione sunt. Cæterum cum id pati incipit, non statim est adustus: verum hirtus, qui calidus & siccus est, celeriter erit, non autem ilicò melancholicus. Quippe cutis densitas, crassiorum recrementorum transitum remorans, in temperamentis, quæ ad summum calida sunt, ea com-

Temperamenta melancholica ex sanguinis adustione sunt.

10 buri cogit. Ita fit, vt tale his non sit præsens excrementum, quod pilos creat, quale olim procedente tempore in vasis est futurum. MATHETES, Partium temperies similisne est excrementorum naturæ? GERON, Non vsquequaque, fieri enim potest, vt excre-

Temperamenta partium, non respondent excrementorum naturæ.

15 menta quidem pituitosa colligantur, non tamen particula sit humida: quia frigida necessario, humida non necessario existit, eò quod sicca quoq; esse possit. MATHETES, Quomodo pituita sicca esse poterit, cum tu nuper eam frigidam humidamq; esse dixeris? GERON, Quia illa non ex ipso corpore nostro, sed ex cibis

Pituita interdum sicca.

20 generatur. Quando autem corpus ingestos cibos non vicit, qui humidi fortasse natura sint, non mirum est, si tunc ipsum quoq; excrementum his simile procreant. Ne igitur putes, si corpus siccum fuerit, excrementum similiter esse siccum. Nam si quis statim ab initio siccior, frigidiorq; temperamento fuerit, is non est melancholicus, sed excrementis pituitosus. sin autem ex habitus mu-

25 tuatione, frigidus, siccusq; est redditus, necessario talis iam etiam melancholicus est. MATHETES, Declara hoc luculentius. GERON, Si quis superiore ætate calidus & siccus, ex sanguinis adustione, copiosam bilem atram generarit, is utiq; præterquam quod siccus est, & frigidus, protinus etiam melancholicus existit:

30 sin autem à principio frigidus & siccus fuerit, habitu corporis albus, mollis, glaber: venis, articulisq; parùm expressis: gracilis, tangenti frigidus, animo minimè audaci, timido, & tristi: non tamen excrementa huic melancholica insunt. Propriæ igitur notæ, non illæ quæ frequenter tantum accidunt, obseruari debent, si-

Note propriæ obseruandæ.

35 cut nec omnia, quæ calefaciunt, ea quoq; siccare censendum est: quamuis nonnulli ita sentiant. MATHETES, Qua de causa? GERON, Quia cum inflammatas partes, aqua profundentes calida,

Calida non semper sicca.

humorem ab his euacuari cernunt, siccitatem calori succedere arbitrantur. neq; id solum, vbi calor cum siccitate, verum etiam vbi cum humore est coniunctus. Verum non est idem, vel humorem qui locis quibusdam sit dispersus, ab aliquo euacuasse: vel propriam particulæ alicuius temperiem, sicciorē reddidisse. Siqui-

dem partes inflāmatæ inæquali in temperie laborant, dum simi-
 lares quidem nondum proprium temperamentum amiserint, sed
 assidue adhuc in mutatione, atq; commutatione versentur, om-
 nibus nimirum quæ intercedunt spaciolis, materia fluida refer-
 tis. Quæcunq; igitur calida humidaq; natura sunt, cum sic affectis
 admouentur, non modò superfluitates, quæ media similarium
 spatia occuparunt, euocant, sed etiam partes ipsas humectant. **MA-**
THETES, Enumeratis iam tum communibus omnium rerum,
 tum proprijs humani corporis principijs & elementis, varijsq;
 eorum temperationibus, obseruande præceptor, suscipe adhuc
 etiam hoc laboris, vt me doceas, quænam optima ex illis structu-
 ra, ac habitudo, imò omnium aliarum veluti regula, censeri
 debeat. **GERON,** Nimirum ea, quæ apud omnes sanissima di-
 citur. **MATHESES,** In quo corpore hæc, & quibus notis depre-
 hendi poterit? **GERON,** In quo omnes partes benè habent, ita vt
 simplices quidem idonea constent temperatura, compositæ au-
 tem ex his, vt summam in magnitudine, numero, figura, & situ,
 mediocritatem inter se obtineant: singulæ verò actiones suas re-
 ctè & constanter obeant. **MATHESES,** Ergo eiusmodi corpus
 difficilius quàm cætera, morbis corripitur? **GERON,** Non modò
 difficillimè in morbos incidet, sed etiam, actionibus suis præstan-
 tius, quàm alia fungetur. **MATHESES,** Qua de causâ? **GERON,**
 Quia corporis offensiones, partim à causis externis, partim ab ali-
 menti recrementis profisciscuntur. ab externis sanè, vt si quis su-
 præ naturæ modum sit excalfactus, aut refrigeratus, aut humecta-
 tus, aut siccatus: quibus annumerantur etiam curg, tristitia, labor,
 vigilia, aliæq; id genus similia. A recrementis autem nimium aut
 copiosis, aut vitiatis. **MATHESES,** Cur autem corpus moderatè habi-
 tum minus afficitur? **GERON,** Quia moderata ac bona eius tempe-
 ries, non facilè ad immoderatā peruenit, eò quòd ab externis vn-
 diquaq; plurimùm distet. adhæc, quia eiusmodi corpus actioni-
 bus suis probè fungitur, omniumq; præstantissimis succis scatet,
 facilius iram, tristitiam, vigilias, curas, imbrem, squalorem, & sum-
 matim vniuersas morborum causas sustinet. **MATHESES,** Hæc sanè
 ratione, excellentem istam corporis structuram, ab externis cau-
 sis difficulter infestari posse intelligo: quomodo autem ab alimen-
 ti excrementis eam minus offendi cognoscam? **GERON,** Ex ipsius
 præcipuè natura, in qua neq; copiosi, neq; vitiati succi facilè con-
 gregantur, neq; si congregati fuerint, ideo læsio aliqua animanti-
 bus inde affertur. Quippe naturalium inter se actionum commo-
 deratio, et vniuscuiusq; ipsarum integritas, recrementa tum gigni
 non sinit, tum generata facilè excernit: & si quando diutius inhe-
 serint,

*Habitudo sanis-
 sima.*

*Corporis offensio-
 nes, ab externis
 causis, & alimen-
 ti recrementis.*

*Corpus modera-
 tum cur non fa-
 cilè afficiatur.*

Causæ externæ.

Internæ.

- serint, minimè ab ipsis vincuntur. Etenim imbecilles, & intem-
 peratæ naturæ, à morboſis cauſis facilè ſuperantur: temperatæ
 verò & validæ, qualem eſſe optimam illam diximus, plurimùm
 reſiſtunt: notas eius antea tibi recenſui. *Naturæ intem-
 peratæ facilè à
 cauſis morboſis
 ſuperantur.* MATHETES, Eximia er-
 5 go illa corporis ſtructura ac fabricatio, ſolane adfert ſanitatē?
 GERON, Summam quidem, & abſolutam illa efficit, rariſſimāq;
 eſt, & omnis bonæ valetudinis, veluti Polycleti regula, quæ au-
 tem ab illa parum declinant, nihilominus ſanum etiam corpus, li-
 cet non abſolutè, efficiunt. *Status optimus
 rariſſimus.* MATHETES, Quare dicis optimum
 10 illum corporis ſtatum eſſe rariſſimum? GERON, Quia non fre-
 quenter, ſed per longos temporum circuitus gigni ſolet: minus
 autem perfectus aſſiduè. Porro qui omnes illius facultates probè
 memoria tenet, is reliquas inferiores facilè dignoſcere poterit.
 MATHETES, Ne mihi excidant, quæſo in memoriā reuoces,
 15 quæ nuper de corpore prorſus temperato dixiſti. GERON, Me-
 dium hoc dicitur, inter molle & durum, inter piloſum & glabrū.
 adhuc inter illud, quod magnum pulſum habet, & hoc quod par-
 uum obtinet: ſicut inter id quod magnas venas, & illud quod an-
 guſtas poſſidet. *Medium quid.* MATHETES, Qualenam dicitur, quod compo-
 20 ſitis partibus eſt ad amuſſim moderatum? GERON, Vt vno ver-
 bo expediam, veluti Polycleti regula. MATHETES, At quod iam
 paulò plus iuſtò calidius, frigidum autem, humidum & ſiccum
 moderatè fuerit, & partem vnā aliquā non rectè figuratam
 habeat, quale dicitur? GERON, Id etiam ſuperare interdum, mo-
 25 deratum videtur: verbi gratia, quod durius quidem illo eſt, ab
 externis cauſis minus afficitur: quod verò mollius, ab interiori-
 bus: ſic etiam denſius externis: rarius internis, minus eſt obnoxi-
 um. vnde in quo plus excrementi per cutem diffſatur, id valenti-
 us: in quo autem minus, infirmius id exiſtit. *Moderatum.* MATHETES, Quod
 30 nuper moderatum dixiſti? GERON, Quod iam neq; rarum, neq;
 denſum, ſed inter omnes exceſſus medium eſt, vtrunq; id quod
 excedit, in aliquo ſuperat. MATHETES, Hæc non aſſequor.
 GERON, Denſum à cauſis externis: rarum ab internis, minus of-
 fendit: medium ab vtriſq; prorſus tutum eſſe docui. Quod inter
 35 omnes exceſſus medium obtinet, mediocriter illis reſiſtit, idem
 omnium maximè ſanum cenſemus. Rurſus quod eo ſiccior eſt,
 humectantibus cauſis, quod humidius, ſiccantibus validiùs repu-
 gnat. MATHETES, Quid audio? oratio tua huc tendere videtur,
 vt medium illud corpus, non omni ex parte cæteris vniuerſis mi-
 40 nus iniurijs oportunum, ſed in aliqua ſingulis ſit inferius: quan-
 quam id nemo non deligere præ alijs debeat. ſed quam eximium
 illud corpus quod deſcribis, habet magnitudinem? GERON, Nec

Moderati corporis magnitudo.

Corporis humani incrementū quoque tendat.

Temperatissimum corpus.

Optima corporis structura.

Habitus bonus quis.

Habitus malus quis.

Habitudo bona ad aliquem relaxata.

magnum, nec paruum existit. MATHETES, Quamobrem? GERON, Quia magnitudo, humoris vel materię abundantiam, paruitas ipsius materię defectum, vel immodicam siccitatem, ut antea admonui, comitatur. MATHETES, Quousque corporis humani incrementum se extendit? GERON, Donec ossa firmum robur adepta sint. in paruo autem corpore, vel ob materię penuriam, vel ob ipsam siccitatem indurescunt, firmaque redduntur, ideo neque magnitudo, absolute humoris indicium est, neque paruitas siccitatis. Singula namque ob duplicem occasionem, ab incremento vel maturius, vel serius desistunt. Quod si in magno corpore molilitiem, in paruo duritiem protinus deprehendis, erit profecto illud humidum, hoc siccum. verum si separari inuicem nequeant, superuacuum est ad magnitudinem, aut paruitatem respicere, cum proprię temperamentorum notę sufficiant. MATHETES, Duo ergo hæc corpora, tum magna tum parua, particulas moderate constructas habere possunt? GERON, Maxime. nam corpus quod nec densum euidenter, nec rarum, nec durum, nec molle sit, nec item pilosum, nec glabrum, quantamcunque magnitudinem habeat, temperatissimum existit. quod si etiam compositę eius partes, moderationem quandam inter se consequantur, idem corpus erit etiam aspectu pulcherrimum, cum ipsius structura omnino sit integra. MATHETES, Si itaque optima corporis structura, ex bona similium partium temperie, & æquali compositarum moderatione constat, quemnam habitum illam obtinere dicis? GERON, Nimirum bonum, quem Græci *εὐεχία* appellant. MATHETES, Huncne alię quoque corporum naturę sortiuntur? GERON, Non in totum vnaquęque, sed qui malus, aut absolute, aut alijs comparatus dicitur, in quauis structura consistit. MATHETES, Ergo qui bonam absolute habitudinem accurate cognoscere velit, eum optimę structure notitiam habere oportebit? GERON, Indubie. nam cum amplam ipsa habeat latitudinem, incrementum, græco nomine *εὐεχία*, id est, bona habitudo, à priscis tum philosophis, tum medicis nuncupatur. defectus autem, & remissio, peculiare nomen non habent, sed pariter atque ipsum genus, sanitas appellatur: quod fit, ut bona habitudo, optima quedam valetudo existimetur, eoque in corporibus optime constructis gignitur. Quodcunque enim tale non fuerit, id optimam valetudinem non suscipit, nec bonam ipsam habitudinem adipisci potest. MATHETES, At quid sentiendum de illa, quę comparata alicui bona habitudo dicitur? GERON, Ad singulorum naturam accommodatur, nec bona absolute, sed cum appendice quadam, vel Hippocratis, vel Democritatis habitudo bona vocatur. Milonis autē Herculis & Achillis, bona

- bona simpliciter habitudo citra vllam additionem erit : sicut & formosus Absolon absolutè. Simia verò haudquaquam simpliciter, sed quatenus simia formosa. sic etiam athletarum admodum boni habitus, cum appendice boni dicuntur, vt quos Hippocrates minimè tutos esse scribat. *MATHESES*, Ergò boni habitus etiam sunt periculosi? *GERON*, Bona quidem habitudo absolutè, vbi ad summum peruenierit, minimè est periculosa. Imò ea cum ad summum euecta est, inter omnes corporis status tutissima habetur: sed athletarum bona habitudo, cum nec optima corporis affectio, nec habitudo absolutè bona existat, meritò cum ad summum peruenierit, periculosissima censetur, vt quæ à natura non proueniat: vnde fit, vt sanus habitus ea sit melior. *MATHESES*, Quid est sanus habitus? *GERON*, Summa ipsius perfectio, bona habitudo. athleticus autem habitus, non absolutè, sed cum additione vocatur, vt simia perpulchra, cubitus magnus, chœnix iniusta, drachma adulterata. *MATHESES*, Quo modo hæc intelligam? *GERON*, Non alio, quàm quo communis docendi ratio postulat. nam cubitus magnus, non absolutè cubitus, sed totum hoc, cubitus magnus appellatur. sic chœnix iniusta, non chœnix simpliciter, sed vniuersum hoc, chœnix iniusta dicitur. Eodem modo in alijs omnibus, id quod absolutè citra vllam adiectionem nuncupatur, non eandem habet naturam, quam ea quæ cum appendice nomen sortiuntur. sed illud quidem, cum ad summum peruenit, laudem: hoc autem reprehensionem forsitan meretur. quem-
- admodum etiam bona athletarum habitudo, non solum ab Hippocrate, alijsq; veteribus medicis, sed etiam à præstantissimis philosophis meritò vituperatur. *MATHESES*, Quamobrem tantoperè contemnitur? *GERON*, Quia Plato eam libro tertio de Repub. ad naturales actiones inutilem, nec non ad sanitatem minimè tutam esse ostendit, vt quæ non absolutè bona corporis temperies, sed grandis quædam ipsius moles existat, nec queat gigni, nisi immodicè quispiam se expleuerit. atq; hac de causa nec tuta est, nec vsum vllum ad ciuiles actiones adfert. *MATHESES*, Cum itaq; nullius sit momenti, cur hanc cum verè bona conferendam censet? *GERON*, Nimirum vt accuratius cognoscamus, & perscrutemur, quidnam vtraq; in se commune, quid contrarium habeat. nam proba omnium partium temperies, validæq; actiones, cum bonæ reuera habitudini, tum athleticæ communes existunt: & si hæc, bonus quoq; corporis humor: contraria verò sunt, sanguinis, & totius solidarum inter se partium molis mediocritas, quæ in accuratè bona habitudine, & immoderatio earundem ipsarum, præcipue autem carnosi generis, in athletarum ha-

Athletarum habitudo periculosa

Habitus sanus.

Athletarum habitudo cur reprehensione digna.

Athleticus habitus cur periculosus.

bitudine deprehenditur: quæ ubi ad summum peruenit, tuta esse non potest. **MATHESES**, Quamobrem obsecrô? **GERON**, Cum enim liberalius comedere, corporis augendi, & ad pugnas corroborandi gratia, cogantur, ventriculusq; eorum valdè, concoquat, ac alimentum facile post concoctionem distribuatur, mox sanguis generetur, apponatur, agglutinetur, siue adhæreat nutriatq; periculum est: ne supra modum expleantur, nullusq; naturæ ad appositionem alimenti locus relinquatur, eoq; venis immodico sanguine oppletis, nativus calor perspiratu impeditus, suffocetur, & restinguatur. sin autem calor adhuc obstiterit, quædam vel ex pulmonis, vel iecoris, vel pectoris præcipuis vasis rumpuntur, ut quæ molliori cōstant tunica, quàm quæ in ceteris membris habentur, & alimentum prius suscipiunt. Præterea sanguis bullientis cuiusdam instar efferuescens, tum ob naturalis caloris copiam, tum ob assiduas actiones, tunicas ipsarū, veluti mustum dolia dirumpit. **MATHESES**, Ista ergò ex immodica repletione proueniunt? **GERON**, Vtiq; nam calor innatus, à nimio in venis sanguine extinguitur, venæq; ipsæ rumpuntur. **MATHESES**, Quod omnes corporis nostri temperaturæ, tum optimæ, tum mediocres, tum prauæ, ita ut docuisti habeant, non possum non tibi assentiri. quia verò nondum in corpore ipso, singularum partium structuram ac fabricationem perspexi, valdè mihi difficilis earum notitia esse videtur. **GERON**, Rectè iudicas. ego enim nihil te vnquam egregij in medicina facturum puto, nisi prius harmoniam illam corporis humani, ex apertione, atq; confectione, quam Græci vocant ἀνασπυλν, perspectam habueris. **MATHESES**, Oro igitur te perchare magister, ut in hac quoq; me erudias, ne temerè tum in toto corpore, tum in eius partibus curandis quicquam tentem. **GERON**, Iam ex docendi labore non nihil sum defatigatus, cras, si gratum erit, maturius me accedito.

*Calor innatus in
athletis extingui
tur.*

Ioannis



Ioannis Guintherij Ander-
naci Medici Clarissimi

DE MEDICINA VETERI ET NOVA
COGNOSCENDA, COM-
MENTARII PRIMI

DIALOGVS QVARTVS.



MATHETES, Adsum rursus tuo iussu honorate præceptor, vt me totius corporis humani fabricationem, partitionemq; doceas. GERON, Rectè fecisti, quòd tam manè adueneris. antequam enim vnam anatomes partem ab
5 soluero, dies nos deficiet. MATHETES, Quot sunt igitur vniuersæ illius partes, & quæ? GERON, Quatuor potissimum. Prima namq; ossa contemplatur, ac Græcis ὀστέλογια dicitur: altera viscera, & interanea ventris, thoracis, & capitis: tertia musculos, & nervos: quarta venas, & arterias continet. MATHETES, Possunt
10 ne hæc omnia vno in corpore simul conspici? GERON, Non facillè. veteres enim ante Galeni tempora, præsertim in Alexandria, primum adolescentibus cadauera alsicata, quæ græci σκελετοὺς vocant, inspiciunda, examinandaq; proponebant, vocabantq; eam anatomes partem ὀστέλογια. Deinde integra corpora recens de-
15 functa aperire, incidere, & perscrutari docebant, indicabantq; initio, ventrem inferiorem, ab hoc thoracem, inde caput, & suas cuiusq; partes explicabant. Postea in alijs corporibus, musculos & nervos, in alijs venas, & arterias, tum interiores, tum exteriores exponebant. Hanc nos quoq; docendi rationem olim Lutetię
20 ante annos triginta in anatome celebranda obseruauimus. Deinde cum aliq; tùm Andreas Vesalius, qui antea mihi medicinam publice proficenti operam dabat, & post hunc Realdus Cremonensis, insignis medicince professor, in amplis suis de re anatomica voluminibus eandē imitati sunt. Ad quos sanè nunc te remitterem,
25 nisi prolixiores difficilioresq; tibi adhuc parum in confectionibus versato, esse putarem. Qua de causâ commodius fore existimo, si prius in hisce meis rudimentis, ad ingenium tuum accommodatis, erudiaris, omnibus contentionibus, & anatomicorum controuersijs omisis. Huius autem te antea admonitum esse velim, quàm institutum aggrediar, anatomen non solum ex auditione, librorumq; lectione, sed etiam ex inspectione corporum,
30 & fide oculata (vt ait ille) cognoscendam esse. MATHETES, Pro tuo arbitratu & iudicio agas: ego diligenter auscultabo, & intue-

bor. Cur autem ossium historiam, cæteris anatomæ partibus pre-
mittendam censes? GERON, Quatuor de causis. primum, quia
ossa inter partes simplices durissima, sicissima, & maxime terre-
stria, veluti fundamenta corpori subiiciantur, quibus hoc innita-
tur. Quod enim pali in tentorijs, & in ædibus parietes, id ossa in
animalium corporibus sustentandis præstant. Deinde quia cor-
poris nostri figura, partiumque eius effigies illis responderet. Nam
si animalis caluaria sit rotunda, cerebrum quoque tale necessariò
erit: quemadmodum, si illa oblonga sit, hoc quoque figuram talem
induit: ita si maxillæ parvæ, faciesque tota sit rotundior, musculi
quoque parvi erunt: si rursus illæ fuerint longæ, hi quoque tales ap-
parebunt, ut qui ossibus extrinsecus adhaerant, magnitudinemque
eorum, & figuram imitentur, sicut hos arteriæ, venæ, & nervi.
Tertiò, quia ex ossibus probè cognitis, etiam musculorum inser-
tiones, nervorumque processus, & vasorum quorundam ductus,
accuratius perdiscuntur. Postremò, quia medicus ossa, cum fran-
guntur, vel luxantur, minimè curare poterit, nisi naturalem eo-
rum structuram, & compositionem antea habeat cognitam. tunc
enim optimè vitiosa cognoscet, ubi ea prius, quæ naturalem mo-
dum conseruant, intellexerit. Quia verò ossa inter se variant, figu-
ra, magnitudine, numero, & situ, primum obiter singula recense-
bo: deinde mirabiles ipsorum commissuras ad stabilitatem, ad ar-
tus firmandos, ad motum, & ad omnes corporis actiones accom-
modatos, interpretabor. Quod si anatomici recentiores in ope-
rosis illis suis, & nimium prolixis commentarijs fecissent, minus
obscuri & difficiles essent.

*Ordo, qui in hoc
libro servabitur.*

Caput.

Caluaria.

*Caluaria quibus
ossibus constat.*

*Quot & quæ sint
caluariæ ossa.
Os frontis.*

Suprema igitur totius osseæ compagis & structuræ pars
CAPUT est, ex pluribus vtrinque ossibus affabrè connexum, quæ
veluti fornicem, & cameratum quiddam representant, unde Gre-
cis τὸ καμάριον καὶ ψαλλοῦδες dicitur. Os huius eminentius, nobis cal-
uaria, Græcis κράνιον vocatur: ab interiore parte concava, ab exte-
riore gibba, vtrinque lævis, & quæ cerebri membranam contegit,
& quæ cute capillorum gignente, contegitur. Hac summus ille
rerum opifex, principem animam, veluti munimento conseruare
voluit. MATHETES, Vnò ne ac simplici osse illa constaret? GERON,
Nequaquam: sed pluribus inter se connexis, figura inuicem diuer-
sis. MATHETES, Quot igitur illius sunt ossa, & quæ? GERON,
Octo: vnum sane in anteriore illius parte, quod frontis os nomi-
nant, rotundum quodammodo, & iuxta superiorem oculorum
regionem tenue. in hoc etiam foramen (de quo postea) cernitur,
vtrisque in latere ad supercilium medium pertingens. non semper
autem vtrobique perfectum ac globosum existit, sed plerumque si-
num

- num semicirculi modo exculptum duntaxat obtinet. Huic pro-
 pinqua sunt alia duo, in vtroq; capitis latere singula, quæ sinciput
 constituunt, quadrilatera, cauernosa, rara, & omnium capitis os-
 sium firmissima, præsertim quæ ad verticem tendunt: vnde est,
 5 quod non modò sinciput, sed etiam superior frontis regio, in in-
 fantibus recens natis, ad tres menses vsq; , inter mandendum re-
 spirandumq; moueantur, & palpitent. nam tenera, mollia, & qua-
 si membranea adhuc existunt: vnde cerebrum manifestè attolli,
 & summitti in illis conspicitur: paulò autem post sermonis ini-
 10 tium, obdurefcit. Quartum os est occipiti, quod Græcorum lite-
 ræ Λ figura simile, sincipiti ad superiorem capitis partem conne-
 ctitur. omnium id firmissimum, densissimumq;, et in media ipsius
 regione etiam crassissimum: in reliquis autem tenue quidem insi-
 gniter, sed nihilominus solidum, validumq; existit. vbi idem cras-
 15 sius est, cauernulis valida lamina obductis, scatet: vbi verò tenue,
 minimè cauernosum cernitur. Ne igitur propter tenuitatem iniu-
 rijs maximè pateat, tuberculum habet oblongum, in medio ipsius
 lineæ instar exporrectum: præterea tum intus, tum foris leue &
 æquale: ad inferiorem verò eius terminum, asperum, & inæqua-
 20 le deprehenditur: quò commodius nimirum ligamenta, & mu-
 sculorum tendines edat, excipiatq;. Cæterum foramen omnium
 quæ capiti insunt, maximum obtinet: cuius anteriore parte, sen-
 sim in angustum cogitur, tandemq; in amplam crassitudinem de-
 finit. vtroq; verò eiusdem latere, duo capitula exigit, quæ primæ
 25 ceruicis vertebræ insinuentur, capitis flectendi extendendiq; gra-
 tia. MATHE T. Quenam reliqua sunt ossa? GERON, Quæ tempo-
 ra à superiore parte capitis discernunt, & totis oris paulatim squa-
 marum ritu extenuantur. vnde etiam Græcis λεπτοειδῆ dicuntur,
 in vnguemq;, vt ait ille, committuntur: nempe vt inferiora ossa,
 30 superioribus leuiter insideant: in inferiore verò ipsorum sede,
 crassa, duraq; adeò existunt, vt saxea videri possint, vnde etiam
 Græcis λιθοειδῆ, quasi dicas petrosa, nominantur: ob quod nullus
 capillus, vt verisimile est, ea parte gignitur. In his ossibus singulis,
 amplum & anfractuosum foramen auris apparet, quod primò re-
 35 ctum & simplex, procedendo flexuosum, ad cerebri sedem pertin-
 git: deinde verò in multa alia foramina tenuia diducitur, per que
 facultas audiendi nobis datur. Ab hoc meatu, alia bina itinera du-
 cuntur: quorum hoc cæcum, anfractuosum, angustumq; est: alte-
 rum, etsi cæcum similiter existat, tamen minus flexuosum & ar-
 40 ctum apparet. MATHE TES, Auditus hoc instrumentum, solidò-
 ne temporum ossis processu, aliquo introrsum tendente constat:
 GERON, Non: sed ex tribus vtrinq; ossiculis, quorum veteres

*Ossa sincipitis duo.**Ossa in infantibus tenera.**Occipitij os.**Os occipitij quod lenam intus.**Foramen occipitij ossis.**Temporum ossa.**Foramen auris.*

*Osficula tria au-
rim.*

nullam mentionem fecerunt: recentiores duo tantum inue-
runt: hodie tria in vtraque aure conspiciuntur, coniuncta in-
uicem & colligata reperiuntur, membranæ suis adnata, auditorio
instrumento nimirum accommodata. Duo ex eis spongiosa sunt,
& medullæ nonnihil pro eorum portione continent. tertium ob
nimiam ipsius tenuitatem solidius existit. *MATHETES*, Quomo-
do inueniri per incisionem possunt? *GERON*, Partes quæ circa
meatum auditorium consistunt, leniter, & sensim derimes, me-
atumq; aperies, donec in conspectum veniat: vbi iam ad mediam
ferè ipsius sinus sedem, scalpello circa membranam illi obductam,
cauernososq; sinus replentem, penetraueris, essentia ipsa apparet.

*Osficulorum sit-
us.*

MATHETES, Quem singula habent situm, & figuram? *GERON*,
Primum propinquius est foramini interno, longiusculum, & in-
ferius mucronis instar in aciem tendit: altera parte caput habet
oblongum, & rotundum: nec non duos processus repræsentat.
quà tenuè & acutum est, membranulæ inferitur, quæ ipsi & se-
cundo osficulo intenditur: quà verò crassius est, & capite insigni-
tum, illam ipsam membranam tympani modo quatit, cuius gra-
tia malleus ab vsu magis quàm à figura dictus est. *MATHETES*,
Quale secundum osficulum existit? *GERON*, Crassiusculum su-
periore parte est, & planum, vt in eadem referre queat, vnde eti-
am ex re nomen accepit. nam primi osficuli, malleoli dicti, ferien-
tis ictus excipit. Cæterum in duos tenues, acutosq; processus, ve-
luti crura definit: quorum alter tertio osficulo inferitur, ac mem-
brana ibi annexa confirmatur. quidam hoc denti molari, qui ra-
dices duas, hanc longiorem ac tenuiorem: illam crassiore, ac bre-
uiorem habet, comparari aptius dicunt, sed nihil refert, incudi,
an denti conferas. hic vsus, illic figura potissimum spectatur.

MATHETES, Quare natura hæc duo osficula sic composuit? *GE-
RON*, Vt crassiore parte se respiciant, ac penè contingant. Quia
cùm auditio ex aëris motu fiat, huius ictus in meatum ad osficula
ipsa defertur, ibiq; fit percussio quædam sonitus, qui sentitur,
ciendi gratia. nam osficula ista membrana cedente moueri, atq;
in uicem confricari, est consentaneum. *MATHETES*, Vbi tertium
osficulum consistit? *GERON*, Intra meatum auditorium, in ca-
uernula quadam leuiter rotunda situm est, cauum, et perforatum,
ferreo instrumento, quo equis insidentes, pedes sustentant, non
absimile. Cæterum ossa temporum, de quibus nuper dixi, tres ha-
bent processus: primum sanè obliquum, tenuem, & perquam so-
lidum, sed ita tamen, vt interdum leui de causa abrumpatur.

*Tres ossium tem-
porum processus.*

Græci varijs eum nominibus, nunc à calami scriptorij, & styli si-
militudine *χαλκοειδῆς*, & *τυλοειδῆς*: nunc ab acu *βελονοειδῆς*: nunc à galli-
galli-

- gallinacei calcari *αλγικρον* appellant. Alter processus à manime papilla *μασθηδης* dicitur. Tertius longior, tenuiorq; ad os iugale pertinet, eiq; inseritur. ad huius autem processus radicem, sinus ante meatum auditorium imprimitur, maxillæq; cornu excipit. At reliqua temporum ossium portio, quæ sinciput spectat, ampla, tenuis admodum, solidaq; & læuis extrinsecus est; intus autem inæqualis, & minimè cauernosa. quæ verò imam capitis sedem respicit, aspera est, & inæqualis. *MATHESES*, Quod septimum os capitis esse dicis? *GERON*, Id quod imæ capitis regioni, iuxta palatum subiacet, contiguumq; habet occipitium. imò quod inter caput, & in alas cunei instar, medium infixum est, vnde Græcis *σφηνοειδες* dicitur, vnicum ac coniugis expers. quidam sanè capitis, quidam verò malarum ossibus annumerant, quòd in mediâ illorum regione consistat, & vtriusq; sit particeps. ego verò capiti attribuo, eò quòd non minimam caluariæ amplitudinis, quâ cerebrum conditur, regionem occupet. Galenus id, quâ à cauis temporum locis, ad dentes posteriores, & palatum procedit, eoq; finit, os palati nominat. quâ autem occipitio cohæret, basim cerebri, eoq; vulgares, os basilare nuncupant, quasi cerebro subster-
- Os septimum cuneatum.*
- Os palati Galeno*
- Os basilare.*
- natur, aut aliorum caluariæ ossium, ceu fundamentum existat. *MATHESES*, Quam hoc figuram obtinet? *GERON*, Non vnâ, sed multiplicem, vnde etiam veteres Græci id *πολυμορφον* iure appellarunt. quippe ad latera & cauam temporum regionem, tenue solidumq; admodum: in medio autem, & quâ occipitio cohæret, omnium caluariæ ossium multò crassissimum apparet. adhæc extrinsecus quidem continuum, & solidum vndiq; cernitur: intus autem rarum, & tenuissimè pumicis modo latebrosus, spongiosumq; & vacuum existit, vt recrementa à cerebro manantia excipiat emitatq;. ea verò parte, antra duo spaciola, tenui quodam
- Os cuneatum multiforme.*
- osso distincta septo, obtinet: sub ima verò huius sede, aliud etiam exiguum antrum delitescit. *MATHESES*, Qua parte huiusmodi spaciolæ cauernæ ac specus patent? *GERON*, Nusquam, nisi ad narium foramina. quippe per totam eorum superficiem osse obsepuntur. *MATHESES*, Quare ad nares sunt peruiæ? *GERON*, Vt aërem & reddant, & accipiant. *MATHESES*, Nihilne amplius os hoc interna caluariæ parte, quâ crassius est, obtinet? *GERON*, Sinum quendam vtrinq; in quo glandula, & singuli meatus pituitam à superioribus excipientes, cùm viuít homo, consistunt. *MATHESES*, At quid tandem extrinsecus os istud representat? *GERON*, Quatuor processus, vtrinq; binos ad caluariæ basim, alarum modo prominentes, vnde etiam Græcis *σφρυγιδεις* appellantur: quorum in medio cauitas conspicitur, vnde muscu-

Octauum os caluariae odoratui feruens.

Odoris & excrementorum cerebri foramina.

Colatorium.

Processus octauis ossis longus.

Ossa faciei.

Iugalia ossium essentia qualis.

Malarum ossa.

Malarum ossa duodecim.

lus enascitur, qui maxillam sursum trahat. **MATHESES**, Quodnam octauum caluariæ os numeras? **GERON**, Quod mediæ frontis ossis basi subiaceret, & in cuneatum os desinit, nariumq; septum producit, & ima huius parte à malis distinguitur: essentia tenuissimum, prædurum, Græcis ἡμισελὴς, & ἀσπλοδὴς vocatur, eò quòd cribri, vel spongiæ instar foraminibus, non quidem è directo sibi inuicem respondentibus, neq; omnino rectis, sed partim obliquis & flexuosis peruium sit: non modò vt sensus odoris per illa, sed etiam pituitosa cerebri excrementa, si quando copiosiora infestant, expurgentur. quare cùm foramina illa, pituita spiritus grauitate detenta, replentur, grauedine humorum & destillatione laborare solent, & interdum odorandi facultatem amittere. Barbari colatorium nominant. **MATHESES**, Nullòne processu constat? **GERON**, Oblongo, qui in spaciosam caluariæ capacitatem protenditur, & sedes odoratus instrumentis dicatas, septi instar interfecat: acin viuientibus crassiori cerebri membranæ firmissime adhærescit, quæ dextram cerebri partem à sinistra separat. **MATHESES**, Audiui iam caluariæ ossa: reliqua capitis nunc enumeres. **GERON**, In vtraq; sanè faciei parte, singula extant, quæ à genis tendentia, ab inferioribus sustinentur, & iugalia appellari possunt, ab eadem similitudine, qua Græcis ζυγάδιη, vel ζυγάματα dicuntur, non autem sunt hæc ossa propria, ac peculiaria, sed aliorum partes. nam ex duobus, nempe temporum, & malarum processibus constant, ex quibus hic extremæ superciliorum regioni inhæret, ille ex petrosi ossibus pendet, auriumq; foramina constituit. **MATHESES**, Qualem ossa hæc essentiam obtinent? **GERON**, Solidam duramq; adeò vt vix affici queant, medullæ expertem. quia verò extrinsecus gibba, intus caua existunt, operimenti modo musculos temporum, de quibus postea, tuentur. atq; hæc ex alijs ossibus prodeunt, reliqua faciei sunt, quæ per se ipsa consistunt, & proprijs terminis circumscribuntur. Malæ varia diuersaq; obtinent: duo maxima iuxta iugalia sita, vtrinq; singula, portionem quandam temporum, superciliorum, sedisq; oculorum, hoc est, totum anteriorem angulum comprehendunt: alia duo minora, squamæ instar extenuata, in vtroq; magno oculi angulo singula constituunt, in ijsq; foramina habentur, per quæ neruus in faciem porrigitur, & pituitosum excrementum in narium meatus desert. Rursus alia omnium minima, iuxta vtruncq; magnum oculi angulum, singula similiter tenuia, & squamæ instar pellucida, cernuntur. His iam sex in oculorum cauitate sitis, alia duo insigni magnitudine subiacent, quæ malas vtrinq; dentiumq; omniura alueolos insculptos sibi continent, & latera,

imamq;

5 imamq; narium sedem constituunt: iuxta quæ etiam insigniter
 caua, minimeq; solida, sed cereis imaginibus intus vacuis persi-
 milia existunt. Adhæc singula utroq; narium latere ossa consi-
 stunt, exigua, dura, solida, lata, tenuia, oblonga, & quadrangulo
 10 potius, quam triangulo similia, ut quæ superius sint obtusiora, in-
 ferius autem aspera, inæqualiaq; & in cartilaginem deorsum pro-
 gredientem, finiunt: eò autem molliorem, quò longius ipsa ad na-
 rium apicem defertur. atque ossa iam dicta validissimè commit-
 tuntur, quæ narium foramina ad palatum tendunt. Postremo alia
 15 duo ossa utrinq; singula ad palati extremum extant, bonamq; illi-
 us & narium cavitatis portionem occupant, tenuia quidem, ve-
 rum solida, & lata. posteriori verò sede partim ossi, quod cune-
 um figura refert, connectuntur: partim ab eo libera sunt. MATHE-
 TES, Duodecim, si benè memini, malarum ossa recensuisti, om-
 20 nēsne anatomici, & res ipsa in hoc numero consentiunt? GERON,
 Minimè, sed alij quindecim statuunt, nempe qui Galenum secuti,
 peculiaria duo ossa utrinq; singula incisorij dentibus, & os
 sphenoides siue cuneatū malis attribuunt. Alij octo duntaxat es-
 se affirmant, vnum scilicet, quod in extrema malarum parte ha-
 25 betur, alterum quod in narium foraminibus situm est. adhæc duo
 narium peculiaria: item duo maxima, in quibus malæ, dentesq; il-
 larum ferè omnes sedem habent. postremum est os sphenoides,
 coniugij expers. quidam addunt os quoddam, ad extremam fau-
 cium radicem, non admodum firma basi, ut reliqua, consistens,
 30 quod linguæ veluti fundamentum subiicitur, Græcorum literæ
 Y figuram representans, vnde etiam *υοειδης* ab illis dicitur, aliās
υιλοειδης, Theophilus *λαμβοειδης*, à litera Λ, quæ est Y inuersum.
 Cæterum os hoc non simplex est, sed ex varijs, & pluribus alijs,
 non pari semper numero, sed magna ex parte vndecim constru-
 35 ctum: interdum, præsertim in mulieribus, ex paucioribus con-
 stat: ac in homine longè aliam, quàm in quadrupedibus figuram
 obtinet. Maxilla verò vno osse constat: brevis in summoq; men-
 to lata & dura, ut varios in mandendo motus sustinere possit, in
 40 brutis plerisq; ex duobus inuicem ossibus connectitur, longaq;
 est, & in acutum desinit. Cæterum ut tutius moueatur, sinus & ca-
 uitates insignes, medullaq; infarctos, ad menti regionem & late-
 ra, ut in alijs animantibus, in postica ipsius sede obtinet. Extre-
 mæ ipsius maxillæ partes, quasi bicornes sunt: harum alter processus
 infra latior vertice ipso tenuatur, longiusq; procedens, sub osse
 iugali subit, & super id temporum musculus illigatur, totus ab il-
 lius tendine comprehensus. alter, nempe posterior, breuior & ro-
 tundior est, ut qui in tuberculum oblongum finiat, & in eo sinu,

*Anatomicorum
 dissentio in ma-
 larum ossibus.*

Maxilla.

*Tuberculum ma-
 xillæ.*

Maxilla tuberculum cur cartilagine munitum.

qui iuxta foramina auris est, cardinis modo fit inferiturq̃, vt facilius huc illuc inclinans, maxillę facultatem motus preſtet. MATHE. At caput hoc maxillę, ſiue tuberculum, continuóne motu, in ſinu illo mutuo affrictu interdum abrumpitur? GERON, Ne hoc fiat natura proſpexit, & vtriq̃ tum ſinui, tum capitulo cartilaginem, ſicut alijs omnibus articulis, cruſtę modo obduxit: nec non aliam quandam inter ſinum & tuberculum reſpouit cartilaginem læuem, tenuem, mollem, eſſentiaq̃ veluti cartilagineam. MATHE TES, Secunda hæc cartilago oſis búsne adnaſcitur? GERON, Nequaquam, ſed ligamentis tantum articulos in orbem continentibus. 10

Foramina maxille.

MATHE TES, Qua de cauſa? GERON, Vt ea durorum oſium impetus, validosq̃ motus obtundat exoluatq̃. MATHE TES, Quibus alijs hæc maxilla conſtat? GERON, Duobus vtrinq̃ foraminibus: vno quidem interiùs ſito, non procul à proceſſibus iam dictis: altero exteriùs ad latera. internum ſanè ampliùs eſt, inæquale ac aſperum, per maxillę longitudinem porrectum, quod viam neruo ex tertio pari, ad dentium radices, venæq̃, & carotidibus internis propagatis præbet. externum verò eiſdem nerui ſobolem, ad inferius labrum procurrentem tranſmittit. imò continuum iter ab vno foramine, in alterum, veluti canalis deprehenditur, ſi maxillam dirimas, confringasq̃, aut ſi in integra adhuc ſectam interno foramini indideris. MATHE TES, Habētne alia adhuc præter hæc foramina? GERON, Externa ſanè parte nulla, præter alueolos, quibus dentes inſiguntur. at ſinuoſa intus magis eſt, tuberculisq̃ exaſperatur, vt muſculi commodiùs inferantur, cohæreantq̃ validiùs. MATHE TES, Quid autem de natura dentium, diſcrimine, & numero adſers? GERON, Ex oſſea quidem 15

Dentium alueoli.

constant eſſentia, ſed non paulò alijs oſſibus duriore, vt cibo, ſicut molaris lapis frumento conterendo pares eſſe queant, gingiuis mollibus, & labijs conſecti, ſenſusq̃ facultatis præter aliorum oſſium naturam compotes. MATHE TES, Cur tales natura condidit? GERON, Vt ea quę illos ſecant, franguntq̃, aut rodunt, aut calefaciunt, aut refrigerant, aut quauis de cauſa immutant, ſtatim deprehendant, ne ex improuiſo vitientur. MATHE TES, Primarióne ſenſiles, an accēſſorię? GERON, Ex tertio neruorum coniugio, ramuli quidam ad radices, & alueolos eorum pertingentes, ſentiendi facultatem miniſtrant. At dentes non modò ſentiunt, 25

Dentes quot, & vnde.

verum etiam quouis propemodum vitę tempore, præſertim autem ad quadrageſimum quintum annum uſq̃, creſcunt & nutriuntur, mutariq̃ intra ſeptimum annum ſolent: ad loquendum etiam neceſſarij. Nam infantes nō antea fari incipiunt, quàm dentes habuerint, & ſenes his amiſſis adeò balbutiunt, vix vt intelligi poſſint. 30

Dentes creſcunt, & nutriuntur ad annum quadrageſimum.

35
40

- possint. MATHETES, Quotnam in vniuersum dentes homo obtinet? GERON, Vt plurimum triginta duos : in malis sedecim, & totidem in maxilla. ex his priores quatuor : quia cibum oblatum
- 5 ab incidendo : & quod inter ridendum conspectui pateant, *Incisores octo.* *γελᾶσθαι* quibusdam singuli tantum in malis & maxilla habentur, tam lati, vt quaternorum locum & vsum sustineant. quibusdam sex, vel octo, vel etiam plures, nullo saepe ordine collocantur, sed partim recti, partim foras exerti, partim intra os erumpunt, vt pronunciationem impedian. Nuper visus est, qui primores dentes,
- 10 non incisores, sed veluti molares haberet. Hi deinde quatuor, alijs dentibus omni ex parte cinguntur, in vtroq; maxillæ latere binis, quos Græci *κυνόδοις*, Latini caninos appellant, quod canes huiusmodi insignes habeant. sunt autem hi inferiore parte gingiuis proxima, lati, superiore acuti, vt si quid incisorij dentes ob duritiem dissecare nequeant, ipsi perfringant : quanquam munus eorum sit cibos diuidere, & inuicem dirimere & separare. MATHET.
- 15 Validiores ergo sunt incisorij? GERON, Simplicibus quidem, vt illi, radicibus infixi sunt : verum superiores, malarum ossi inserti, longioribus, vt ad oculorum orbem ferè pertingant, & nervis qui labri superioris motores ab oculorum regione, per foramen superius commemoratum emergunt, admodum vicini sunt : vnde fit, vt altero ex his dentibus auulso, periculum nonnunquam immineat, ne oculi parte aliqua offendantur. quare etiam vulgo
- 25 dentes hosce oculares nuncupant. Hi dum infantibus nascuntur, magnum accersunt dolorem : et si quando humorum, à cerebro in eam gingiuarum partem defluxio procumbat, in qua hærent, totis malis oculisq; cruciatum pulsatilem, nō sine febre etiam in natu grandioribus, conciliant. MATHETES, Quinam post hos sequuntur? GERON, Maxillares, vtrinq; ferè quini sunt, asperi, duri, ampli, & magni, vt veluti molæ, cibos iam incisos & præfractos, in læuorem redigant, vnde etiam molares dicuntur, Græcis autem *μύλαι*, & *μυλῖται*, vel *γομφιοί*. interdum tres tantum in adolescentibus, in adultis quatuor emergunt : interdum quatuor à sinistro latere, quinque à dextro : vel contrà, quinque à sinistro, quatuor à dextro. MATHETES, Quamobrem? GERON, Quia nonnulli ex his, omnium vltimi & nouissimi post pubertatem, & veneris vsum, ab anno decimo octauo, ad vigesimum sextum : nonnullis octuagesimo anno, nunc absq; dolore, nunc maximo cum cruciatu nasci solent : vnde etiam Latinis genuini, Græcis *ὀψόγονοι*, *κομήηρες*, & *σφρονηήρες*, quasi serotini, ætatis & sapientiæ indices appellantur, reconditissimi, & gingiuis propemodum operiti.
- 40

Canini dentes quatenus incisores validiores.

Dentes oculares cur dicti.

Maxillares dentes.

Genuini dentes.

*Dentes molares
quot radicibus
insiguntur.*

MATHETES, Quot molares hi dentes radicibus insiguntur? GERON, Variare solent. nam qui inferius maxillæ inhaerent, binis radicibus: qui superiori, ternis plerumque: verum hi quoque inter se differunt. qui namque superius sunt, quaternis, qui inferius, ternis aliquando radicibus nituntur, praesertim duo intimo denti proximi: duo autem superiores, qui caninis succedunt, duabus tantum radicibus, tres autem reliqui ternis insiguntur. duo inferiores caninis proximi, tres reliqui duabus radicibus constant. ac pars illorum extra gingivas conspicua, radici appendicis modo committitur. Quare si casu dens aliquis in his effractus fuerit, reliqua eius portio erui non debet, sed appendix: quia radice seruata, rursus sponte succrescunt. atque hæc sunt capitis totius ossa: nunc ad reliqua digrediendum est. MATHETES, Quibus modis caluariae ossa inuicem committuntur? GERON, Diuersis. quædam enim veluti per suturas, mutuò sibi connexa sunt, vocaturque ea compositionis ratio Græcis *ῥαφή*. hanc autem explicare volentes, nonnulli serratam compositionem esse: alij compagem in vnguem factam definiunt. illi quidem à figura ferrarum, contrario se occurso mutuò ingredientium, cum scilicet vnius partes, in alterius crenas inferuntur. hi verò ab ijs rebus, quarum gibbae partes ad vnguium figuram structæ, sinus sibi idoneos subeunt. Preterea quædam simplici linea, citra omnem tuberis asperitatisque, & sinus mutuuum ingressum coaptantur, concinnanturque, vnde connexus eorum Græcis *ἀρμυνία* appellatur. quædam clauis modo sinibus insiguntur, qui modus Græcis dicitur *γέμφωσις*. Postremo sunt quæ cardinis modo in sinu cohaerent, ac *γυγλισμός* ab illis nominatur. MATHETES, Quot igitur sunt in vniuersum caluariae suturae? GERON, Octo: sed inter has tres legitimæ ac veræ: quinque verò spuria ac falsæ. MATHETES, Quenam veræ dicuntur? GERON, Quæ scilicet dentatis pectinatum compagibus coeunt. primæ quidem duæ transuersæ, vna in sincipite, ossa ipsius à frontis osse dirimit, ossa sincipitis temporumque, ab occipitis osse seiungens, quæ à corona, quam ea parte homines gestare solent, *εὐφρανία* Græcis appellatur: altera in occipite, quæ à Græcorum litera *Λ* *λαμβδοειδής*, vel ab *Υ*, *υψιλοειδής* illis dicitur, in cuneum coiens. Tertia verò à medio posterioris suturæ, per capitis longitudinem, ad mediam usque priorem extenditur: interdum per mediam frontem, usque ad summas nares descendit, sed rarius, idque tam in viris, quam in mulieribus: Græci ipsam, quod sagittæ, aut virgæ modo recta sit, *ὀφελαιῖαν*, & *ῥαβδοειδῆ* nominant. Harum trium suturarum figura, Græcorum literæ *H* similis existit. MATHETES, Quæ spuria capitis suturæ habentur? GERON, Singulæ super au-

*Caluariae ossium
commisurae.*

*Caluariae suturae
quot et quæ sint.*

*Sutura vera
tri.*

Sutura spuria.

per au-

- per aures, quæ à tertia æquè distantes, & per capitis longitudinem exporreçtè, tempora à superiore capitis parte discernunt, ob quod etiam nonnullis Græcorum *ῥαφαὶ καὶ ἀφίαι*, quod est, futurę temporum dicuntur. **MATHESES**, Quare has non veras propriasçq; futuras vocas? **GERON**, Quia lineæ seu squamæ duæ mutuo sibi incumbentes potius, quàm futuræ videntur, vnde etiam Græcis *λεπιδωειδὴ πτεροκολλημαί*, quasi squamosa agglutinamenta dicuntur. nam os sincipitis descendens, vtrinçq; totis oris paulatim squamorum modo extenuatur: atq; id quod ab auribus ascendit, similiter tenue, subit. Itaq; inferiora temporum ossa, superioribus occipitiȝ leniter insidunt: ab infima autem occipitiȝ futuræ regione incipientes, rectà quodammodo sursum ascendunt, instarçq; semicirculi, ad coronariæ futuræ finem tendunt. **MATHESES**, Quæ tertia est illegitima futura? **GERON**, Quæ à secundæ legitimæ extremo prodiens, per mediâ ossa fertur, quę lapidosa dicuntur, ac ad capitis basim tendit, vbi caput cum prima vertebra iungitur. inde autem incipiens, ad fines coronalis futuræ reuertitur. hinc rursus deorsum ad extremos dentes, & palatum descendit: atq; hic capiti ac malis communis est, totumçq; os cuneatum in se continet. **MATHESES**, Quæ tandem quarta & quinta existunt? **GERON**, Quarta os capitis octauum, ab osse frontis distinguit. quinta à cauis temporum incipit, & per medias minoris anguli oculorum regiones fertur, ac ad nares summas transuersim tendens, malas à fronte separat: intra caluariam iuxta basim, os cunei instar formatum, ab osse frontis dirimit. **MATHESES**, Numerus hic futurarum & locus, idémne omnibus apparet? **GERON**, In ijs sanè qui bonam corporis structuram nacti sunt, idem ferè deprehenditur: in alijs variare solet. Hoc autem notandum, in quibusdam futuris ampliores, et laxiores, in quibusdã & exiles, & compactas magis existere. **MATHESES**, Quę igitur figurę capitis sunt à naturali alienæ? **GERON**, Prima est, in qua cùm prior capitis eminentia consideratur, futura quoçq; sincipitis aboletur: ea quę in occipitio est, seruata, vnà cum recta, quę ad medium vsq; supercilium porrigitur. Altera, in qua cùm posterior eminentia deest, occipitiȝ etiam futura perit, sic vt coronaria remaneat, & recta per medium occipitium, vsq; ad caluariæ basim pertingat. quare in vtracq; capitis figura vitiosa, siue fronti, siue occipitio innitatur, remanentium futurarum effigies, literam T representat. Tertia est, in qua cùm vtracq; eminentia perit, duæ futuræ solæ, reliquæ bifariam se mutuò interfecantes, literæ X imaginem referunt. Nam altera quidem transuersa, ab vtrolibet auditorio meatu, ad alterum per medium caput diducitur. Altera verò

Figurę capitis à naturali alienę quę sunt.

pitij spinalis medullæ causa facta, per capitis longitudinem, ad summum vsq; nasum pertingit, rectæ futuræ, quæ sagittaria dicitur, modo. hæc enim semper seruatur: reliquæ autem duæ, cum totius capitis figura variantes, intercidunt. Quarta, in qua future omnino contra naturam transuersæ, tum sincipitis, cum occipitij, per capitis longitudinem extenduntur: rectâ verò transuersim ducitur, vt in capitibus quibusdam quadratis, hodie non vno in loco cernere licet. in hac postrema figura, cerebrum quoq; vitiosum, & rationis expers esse, constat. reliquæ à naturali variantes, in nonnullis summo ingenio & prudentia præditis, cernuntur. At figurarum huiusmodi vitia, in nostris caluarijs non ita crebrò apparent. in caluarijs autem ad oblongi globi modum constructis, quæ solæ naturales sunt, futuræ variare solent. Nam quæ à coronis gestandis appellationem sortita est, extremis suis finibus nunc in illam, quæ cuneato & temporum ossi communis est, incidit: nunc versus priorem partem, aut posteriorem: & summa sua sede, modò fronti est, modò vertici propinquior. Rectâ verò quæ ad frontem procedere solet, nunc sub imo capillo desinit: nunc frontem ipsam secans, inter supercilia ad nares finitur. Iam occipitij futura duplex quoq; interdû apparet, trium digitorum interuallo disita, & vtræq; alijs duabus æquè distantibus, coniuncta. In eiusmodi caluaria pars posterior visa est Lutetiæ Parisiorum amplissima, & longius vltra spinalis medullæ foramen, exportrecta. MATHETES, Quem amabò vsu, futuræ hæctenus abs te enumeratæ, capiti exhibent: GERON, Multiplicem profectò primùm ne si vehemens aliquis ictus capiti inferatur, protinus os eius frangatur, & in longiores rimas dissiliat. deinde, vt vapores qui ad cerebrum continuè ascendere solent, & fuliginosa recrementa per eas expurgentur: vnde quò rariores sunt, minusq; arctè cohærent, hòc caput ab internis iniurijs, quas illorum copia excitat, tutius reddunt. quanquam externis, vt æstui frigoriq; & alijs casibus faciliùs exponant. quantò autem densius & firmius compactæ, vt sensum quandoq; effugiant, tantò securius ab externis: interioribus autem obnoxium magis reddunt. tertio, vt crassa cerebri membrana caluariæ per eas alligetur, vasq; alia intrò, alia extrà permeent. postremò vt durioris membranæ ligacula, simul cum vasorum quorundam finibus extrorsum emergentia, mutuò sibi occurrant, & coalescentia communem ex se membranam, quæ quòd caluariam extrinsecus ambiat, Græcis *μεμβράνη* dicitur, progenerent. MATHETES, Quomodo faciei ossa inter se coniunguntur? GERON, Partim futuris falsis, partim harmonica ratione, primam sanè maximam habet, quæ à temporibus

Suturarum capitibus vsus & vitia.

Faciei ossa quomodo inter se coniunguntur.

- poribus vtrinque incipiens, per medios oculos, naresque transuersa, ad alterum tempus penetrat. à qua breues duæ, ab interioribus angulis deorsum spectant: & malæ quoque in summa parte singulas transuersas futuras habent, à medijsque naribus, aut superiorum
- 5 dentium gingiuis, per medium palatum, aliisque transuersa idem palatum secat, quæ duæ, harmonica potius compage, quam futuris iunguntur. *MATHESES*, Quid de malarum iunctura dicis? *GERON*, Hæc cum osse quod ad aurem situm est, cardinis modo connectitur, vocantque Græci eam, vt supra admonui, *μαθισµον*. *Malarum ima etna qualis.*
- 10 atque hæc de capitis ossibus medicinæ candidato satis esse puto. *MATHESES*, Nihilne in his amplius mentione dignum, reliquum esse censes? *GERON*, Nihil nisi quædam foramina, quæ nervis vasisque transmittendis inseruiunt. *MATHESES*, Ea igitur ne pretermittas obsecro, vt tota capitis ossium narratio absoluat. *GERON*, Primum frontis peculiare ad medium supercilium pater: non
- 15 semper autem in vtroque latere perfectum, globosumque existit, sed crebro veluti sinus instar semicirculi exculptus apparet. Alterum in quarto malarum osse, veluti oblongus meatus habetur, eiusque ductus in priore illarum sede, penitus delitescit: per oculi vero regionem tenui & squamæ simillimo osse tegitur. Tertium amplius ex magno internoque oculi angulo, in narium sinus recta deorsum pertingit, secundo quartoque malarum ossi commune: per hoc præter nervi sobolem, etiam pituitæ nonnihil, ex cerebro ad nares transmittitur. Quartum, omnium quæ in oculi regione ha-
- 20 bentur, maximum obliquumque est, sphenoidi, & malarum ossi commune. per hoc & nervi portio, & temporum musculus exoritur, pituitæque nonnihil ad grandius foramen in narium sinus defluit. latitat autem altius, vt vix cerni queat. Quintum in sphenoidi osse duplex iuxta oculi vtriusque sinus radicem consistit, foris prorsus rotundum: nervum ab eo quod videndi facultatem illi
- 30 defert, græcè *ὀφθαλμικόν* dictum, ex primo coniugio excipit, cui magnitudine etiam respondet: interius exiguum est, & angulosum. Sextum & ipsum in sphenoidi osse cernitur, ima parte ferè rotundum, summa acutum, longumque & angustum, nervo visorio maius est, secundi coniugij nervis motus ciendi gratia, venæque & arteriæ alimenti oculis suppeditandi causa, nec non pituitæ ex cerebro in oculi regionem, & hinc in nares promananti, dicatum. Septimum etiam in sphenoidi osse rotundum apparet, nervulum excipiens. At foramina quædam exigua, iuxta octauum ca-
- 40 pitis os spectantur, odoribus & aëri ad cerebrum attrahendis accommoda, eaque cribri, & spongiarum foraminibus similia existunt. inter reliqua verò vnum vtrinque tum rectum, tum grande

Foramina odoribus & aëri attrahendo accommoda.

satis existit, quod primum quodammodo est, priori frontis ossi
 proximum, venamq; ex narium amplitudine exporrectam, ad
 duram cerebri membranam transfinit. MATHESES, Hæcne su-
 periorum ossium, quæ hætenus ordine recensuisti, numero as-
 cribenda putas? GERON, Nequaquam. MATHESES, Quamob- 5
 rem? GERON, Quia priora illa in vtroq; latere vnica ac singula: hæc
 autem exigua & multiplicia existunt. MATHESES, Ad quid autem
 hæc conducunt? GERON, Vt pituita, si cerebrum ea vehementer
 repletum sit, hisce excoletur, vnde sæpe fit, vt ipsa, vel modica il-
 lius copia etiam obturentur, & alia grauedinis accidentia super- 10
 ueniant. MATHESES, Omniāne quæ de foraminibus istis adfers, de
 penitiore capitis parte intelligenda, an de externa putas? GERON,
 De ea quæ ab osse sphenoidæ, ad palatum introrsum tendit. MA-
 THETES, Quem alia sunt foramina? GERON, Cauernosa inter du-
 as frontis laminas amplissima, quæ & corpus medullæ propemo- 15
 dum simile membranula obductum complectitur, & ad superci-
 liorum sedem, imò superiorem oculi regionem iuxta frontem:
 nec non reconditis quibusdam foraminibus in narium sinus per-
 tinet. MATHESES, Quem in vsum? GERON, Vt aer qui in ea con-
 clusus est, narium odoratus gratia hinc transmittatur, MATHESES, 20
 Quomodo aërem illic contineri credam, cum ossa ista in cadaue-
 re tantum mihi explices? GERON, In his quibus prior frontis os-
 sis squama perfringitur, aut morbi Neapolitani vitio eroditur,
 tanto sæpe impetu auram illinc expirare cernimus, vt lumen can-
 delæ exhibitum extingatur. In hac parte foramen rimæ instar 25
 patescit, per quod aer in cerebrum distribuitur, duraq; illius mem-
 brana caluarie alligatur, idq; fibris & vinculis. quanquam non so-
 lum his, sed alijs etiam locis adfirmetur. Porro in osse sphenoi-
 de, permulta quidem foramina sunt exigua, vnum verò in horum
 medio magnum. MATHESES, Ad quid tam multa natura con- 30
 didit? GERON, Vt cerebri pituita ex glandula, quæ ossi sphenoi-
 di ima parte adhæret, in sinus duos insignes subiectos, per ea ex-
 cernatur: hinc per meatus alios sensui partim occultos, partim ma-
 nifestos in palatum & nares manet. Quia verò pituita hæc in ri-
 mam illam ad oculos pertinentem prius decidit, non absurdum 35
 videtur, hinc viam lachrymis effundendis patere. nam fluidus ille
 humor in oculos emanans, hinc excernitur: deinde ab illis postea
 in genas delabitur. Sunt qui os hoc sphenoides, præsertim media
 ipsius regione, insigniter crassum, minusq; peruium esse affir-
 ment. quanquam reuera eo in loco cribri & spongiæ modo fora- 40
 minulentum existat: quæ autem cum occipitijs ossæ committitur,
 ad posteriorum sinuum partem solidum & percrassum. Ceterum
 duos

Osium in sphenoi-
 de foraminum
 vsum.

Lachrymarum
 via.

duos etiam canales habet, qui arteriam carotidem, præcipuè intra
 caluariam ad plexum reticularem, de quo postea agetur, indidem
 efformatam emittant: non autem pituitæ ex glandula effunden-
 de sunt destinati. Iam aliud occurrit foramen, temporum ossis &
 occipitiij commune, per quod pituita ori potissimum & palato in-
 fluit, & aer quoq; inter spirandum caluariam petit. atq; id si vo-
 les, octauum numerare licet. Ad latus autem in osse sphenoide,
 foramen apparet nonum, læue, non adeo rotundum, sed modicè
 in longitudinem vtrinq; compressum. Decimum huic in eodem
 osse sphenoide extrinsecus adiacet, sed multò minus, & ad amuf-
 sim rotundum, venæ iugularis soboli dicatum. *MATHETES,*
 Sûntne alia adhuc foramina? *GERON,* Multò plura quam ha-
 stenus audieris. *MATHETES,* Quæ obsecrò? *GERON,* Exiguum
 in osse sphenoide, intus nonnunquam videtur, neruo & venæ
 inferuiens. rarò hoc in vno latere, rariùs in vtroq; apparet: id vn-
 decimum numero esse potest. Duodecimum in caluariæ basi ex-
 trinsecus, temporum ossi insculptum est, obliquè foràs proce-
 dens, in auditorium instrumentum desinit, quod tum neruo,
 tum veng, tum etiam aëri in temporum ossis cauerna, auditus in-
 strumento peculiari subseruit. Decimum tertium in priore tem-
 porum regione foramen insigne habetur: non rectà autem calua-
 riam permeat, sed longi meatus ex posterioribus in priora obli-
 què vergentis instar, carotidis arteriæ ramum, caluariam subeun-
 tem excipiens. At os hoc foramine peruium, quò ad fauces spe-
 ctat, asperum, inæqualeq; pumicis modo cernitur. Ea verò de cau-
 sa carotis arteria, longius obliquiusq; ducitur, vt vitalis spiritus
 anfractuoso hoc itinere, accuratius cerebro præparetur. Deci-
 mum quartum è regione superioris, aliud sphenoïdi ossi peculia-
 re incipit, ac rectà prorsum in narium sinus, longi meatus instar
 protenditur, arteriæq; carotidis ramo exiliori. nam maior calua-
 riam ingreditur, qui in naribus vnà cum alijs illius furculis, eò di-
 rectis, pulsus edat sensibilem. Quintumdecimum meatus est au-
 ditorius, quinto neruorum pari addictus: intus quidem in calua-
 ria incipit, exterius autem ab aure excipitur. at quanquam verò
 intus admodum amplius, cauiusq; existat: flexuosus tamen, & va-
 rius adeò procedit, vt nihil ferè rectà ad caluariam impulsus ad-
 mitrat, idq; duplici de causa, tum quòd iter eius anfractuosum,
 tum quòd processu fiat angustius, quàm in medio fuerit. Sextum
 decimum foramen in medio auditus sinu exoritur, illumq; ad po-
 steriora flexuosum pertingit, ac inde quòd nihil etiam, sicut supe-
 rius, rectà introrsum recipiat, Græcis anatomicis *τὸ φλὸν*, hoc est,
 cæcum appellatur. Non longè ab hoc septimumdecimum occur-

rit foramen, temporum & occipitis ossibus commune, amplum, non ita rotundum, sed in duas partes exprorectum: quarum interior sexto neruorum pari, ex caluaria in anteriora elabenti, exterior maiori internè iugularis ramo, minori autem arteriæ carotidis soboli, caluariam versus, posteriora ingredientibus inseruit. 5
Decimum octauum in occipitio foramen rotundum, sed processu oblongum, obliquiusquæ apparet. nam ex posteriore, internaquæ caluariæ parte decliue fertur, quò citius septimi paris neruus sexto committatur, vnaquæ ambo simul hærentes, deorsum tutò descendunt. in eodem osse etiã aliud omnium longè maximum habetur, numero decimum nonum, per quod spinalis medulla ex cerebro descendit. Vigesium ex posteriore occipitis regione, quæ primæ ceruicis vertebræ committuntur, non insigniter amplum incipit, longo autem ductu, ad interiorem caluariam fertur, ac in 10
superiorem partem foraminis, sexti neruorum paris desinit. In nonnullis caluarijs foramen hoc, nunc in altero latere, nunc in utroquæ deficit: verum tunc eius vices aliud sustinet. Vigesium primum in temporum osse, iuxta futuræ literam Græcorum Λ referentis latus delitescit, quæ mamillares processus habentur, transuersim caluariam ingrediens. hoc quoquæ foramen aliàs in altero, aliàs in utroquæ desideratur. Vigesium secundum in naribus amplum, septo quodam distinctum, in faucium sinus tendit. Vigesium tertium iuxta dentes incisorios posteriores, utroquæ in latere ex palato in narium spacium desinit, quarto malarum ossi commune. Vigesium quartum ad palati finem, quo sextum 25
malarum os habetur, duplex cernitur. atquæ hæc de foraminibus sufficere videntur. *MATHETES*, Omniãne iam quæ in caluaria sunt, exposuisti? *GERON*, Potiora quidem, & quæ alicuius sunt momèti: minora venis tantum transmittendis, membranarumquæ nexibus dicata, prætermittere cogito, si vnum adhuc adiecero, 30
quod cartilaginis magis naturam, quàm ossis refert, Græci à litera Λ *λამβ-δοειδης* appellant. Os est latiusculum, foris gibbum extuberansquæ, intus autem cauum: non simplex et solidum, sed ex varijs compositum est. *MATHET.* Quem usum præstat? *GERON*, Linguae veluti fundamentum subiicitur: imò complures illius & laryngis musculi, de quibus aliàs, ex hoc enascuntur. *MATHETES*, In cadauere hoc viderine potest? *GERON*, Non, ut quod facillè sicut alia cartilaginea ossa rumpatur. *MATHETES*, Quæ capitis ossa sequuntur? *GERON*, Caput spina excipit, quæ varijs nominibus 40
apud Græcos appellatur, nunc *ράχis*, nunc *ναις*, nunc *ἀκάνθη*. est autem corpori humano veluti carina quædam, ex varijs ossibus compa-

*Os yoides, vel
lambdoides.*

Spina.

- compacta, & fundamentum. nam eius beneficio erecti consistimus, rectè ambulamus, prorsum & retrorsum inclinamur, & circumagimur. *MATHESES*, Ergò non vno osse solido perpetuoq; nimirum constare potest? *GERON*, Minimè, sed ex pluribus existit. *Cur spina ex pluribus ossibus constet.*
- 5 guis, atq; articulatim diuisis & duris, quæ omni corporis motui peragendo, & stabilitati conuenit. *MATHESES*, Quæ spine sunt partes? *GERON*, Ceruix, thorax, lumbi, os sacrum & coccyx. *MATHESES*, Quibus, & quot numero ossibus tota spina constat? *GERON*, Triginta quatuor: atq; ex his, viginti quatuor vertebræ nobis, Græcis *σπονδυλοι* vocantur, intus cauæ: extrinsecus varijs donatæ processibus. *MATHESES*, Cur hoc nominis sortitæ sunt? *GERON*, Quia corpus nostrum munere ipsarum in varias partes vertitur, omniacq; opera necessaria peraguntur. *MATHESES*, Quot sunt numero? *GERON*, Septem quidem in cer- *Vertebrae.*
- 15 uice vsq; ad scapulas: in thorace duodecim ad extremam vsq; costam numerantur: in quibus interdum natura ludit, vt nunc duæ tantum, nunc tres ita sibi continuæ, nullaq; futura, aut commissura iunctæ videantur, quasi arte diuidi possint: quanquam id rariùs accidat: lumborum autem, qui ab extrema costa incipiunt,
- 20 quinque habentur: sex in osse sacro, & quatuor in coccyge apparent. ac viginti quatuor ex his propriæ existunt, reliquæ improprie: quia non eodem funguntur officio. *MATHESES*, Cur sic constructæ sunt? *GERON*, Primum, quia medullam venamq; cauam & arteriam magnam tuentur. *MATHESES*, Omnesne inuicem
- 25 sibi respondent? *GERON*, Quædam habent inter se communia, quædam verò singularia. Nam omnes sanè in medio peruiæ sunt, processusq; habent, & sinus, nec non foramina, per quæ nerui prodeunt, sed non omnia æqualia: imò nec ipsæ similem inter se magnitudinem obtinent. Hunc namq; ordinem natura seruat, vt
- 30 quod gestatur, minus sit eo quod gestat. qua de causa omnium spinæ ossium infimum, quod Græci *σπονδυλον*, vel *ισχον*, hoc est, latum, vel sacrum vocant, maximum existit, viginti quatuor vertebris tanquam basis, & fundamentum subiectum. Si à sacro osse ascendas, vertebra, quæ illi committitur post primam, numero vigesima quarta, in lumbis quinta, alias mole superat. reliquæ ascendentes, quanto magis situ ab infima recedunt, tanto minores apparent: præterquam cum vertebra proximis partibus, grandi aliquo commodo interuenit. Nam prima reliquis ceruicis vertebris latior est, & secunda validior grandiorq; quam tertia. *MATHESES*,
- 40 Quare foramen superiorum vertebrarum latius est, quam inferiorum? *GERON*, Quia medulla spinæ, quæ per vertebrae medias fertur, non eandem ubiq; seruat crassitiem: sed in descensu ad

*Vertebrarum con-
nexio.*

*Spina stabilimen-
tum corporis,*

*Vertebrarum pro-
cessus.*

*Vertebrarum cer-
uicis structura.*

neruorum generationem paulatim constringitur, & extenuatur. MATHETES, Quomodo cohaerent inuicem vertebrae? GERON, Processuum, sinuumque praesidio. quia verò natura spinam corpori veluti stabilimentum motui accommodum esse voluit, vertebrae omnes, duabus prioribus exceptis, priore quidem parte amplius corporibus colligat, de quibus postea agemus: posteriore autem duobus articulis connectit: unde prorsum valde inclinari possumus, retrorsum nequaquam. quare etiam vertebrae posterius laxius committuntur. MATHETES, Quot sunt vertebrarum processus? GERON, Earum quae priores duas sequuntur, vnde-
cim numerantur: nempe duo in superiore parte, vtrinque singuli ad latus sinus, cui incumbens vertebrae caput obliquum insidet: item duo ascendentes, qui incumbentem subeunt vertebrae: duo rursus descendentes, quibus subditae vertebrae processus excipiuntur. deinde quatuor transversi, vtrinque singuli quidem, sed bifidi, vltimus est posterior, spinæ modo acutus, eoque Graeci priuatim illum, sicut etiam totam vertebrarum compagem *anavbleu* nominant. MATHETES, Quare hanc partem adeò acutam natura formauit? GERON, Vt medullae spinæ potissimum, veluti val-
lum quoddam, & propugnaculum esset, ne ab externis offenderetur. MATHET. Verum huiusmodi processuum magnitudo, in omnibusne vertebrae aequalis cernitur? GERON, Minimè. MATHETES, Quamobrem? GERON, Quia ubi pars quaedam princeps & nobilis sub ipsa medulla delitescit, longiore opus est spinæ munimento: ubi verò sola tantum medulla habetur, longis spinis opus non est. quare meritò in thorace, quo cor & magna arteria, & in lumbis, sub quibus eadem arteria, & vena caua continetur, longissimae vertebrarum spinæ, in alijs omnibus partibus, vt sacro osse, & ceruice, breuissimae habentur. Quò autem vertebrae hae spinatae tutius subiecta tueantur, natura plurimis earum cartilaginem circumdedit, quae rumpi nequeat. MATHETES, Vt ordine omnia intelligam, ab ijs quae ceruicem efficiunt, vertebrae incipias. GERON, Prima vertebra in lateribus quidem omnium solidissima, densissimaque, per longitudinem autem tenuissima existit, ab alijs non parum varians. Foramen enim omnium habet maximum, per quod spinæ medulla transit: eò quòd & illa hoc loco sit crassissima. deinde quòd duos superiore parte sinus vtrinque contineat, quibus duo occipitis capitula excipit, quibusque hae flectuntur extendunturque, siue prorsum, siue retrorsum caput agatur. adhuc quòd in posteriore horum sede, rursus vtrinque singulos habeat, qui iuxta occipitij tuberculum impressis respondent, primo medullae spinæ neruorum coniugio viam praebentes.

Tertium

- Tertium his insigniorem interna ipsius regione obtinet, qui cartilagine obductus, protuberans secundæ vertebræ caput, siue dentem excipit. ne autem tot sinubus extenuata, plus æquo imbecillis euaderet, processu quodam exiguo prius donata est, cuius adminiculo crassescit, inualescitq̃. **MATHETES, Habētne alios etiam processus?** **GERON,** Iuxta exteriores sinuum, quibus occipitis capitula insinuuntur, fines, transuersos exigit processus, vtrinq̃ singulos, proceriores quàm in alijs vertebris, & latiores. At posteriorem processum, quam spinam appellauimus, hæc sola
- 10 vertebra ex omnibus non habet, sed aspera tantum est, & veluti acuta linea extuberat. **MATHETES,** Secunda vertebra ceruicis qualis est? **GERON,** Angustior quidem prima, sed validior, vti omnes deinde reliquæ. **MATHETES,** Quomodo primæ connectitur? **GERON,** Singulis in vtroq̃ latere superiori processibus,
- 15 minimū euentibus, qui sinibus illis parum cauis respondent. deinde etiam alio quodam capite in horum medio sito, elatiori admodum duro & solido, quem Græci à dentis figura ὀδονοειδῆ vocant: aliās à nuce pinea καυοειδῆ; aliās à cuspidē αὐροειδῆ & πυροειδῆ. Huius prior pars, leui & lubrico tubere prominet: posterior magis
- 20 protuberat, crassiorq̃ est, quàm vbi origo ipsius incipit. **MATHETES,** Quamobrem? **GERON,** Quia sinus in vtroq̃ latere singulos, posteriore sede tertium obtinet: illos quidem inter ipsius radicem & tuberculum vertebræ neruis transmittendis idoneos, hunc ligamento excipiendo, quod medullam spinalem con-
- 25 stringit, accommodatum. **MATHETES,** Quare superior dentis pars in mucronem extenuatur? **GERON,** Vt elatius extra primam vertebram prominens, validum teresq̃ ligamentum ex se producat. **MATHETES,** Sūntne alia adhuc vertebræ huic peculiaris? **GERON,** Nulla propemodum. nam ipsa quoq̃ vt reli-
- 30 quæ ceruicis vertebræ, posteriores processus, duplici mucrone bipartitos obtinet, breues & simplices vtrinq̃, & inter processus ascendentes descendētesq̃, vtroq̃ latere sinus, suprà et infrà commune cum prima vertebra foramen efficit. **MATHETES,** Subsequentes hanc vertebræ, similēsne habent processus? **GERON,**
- 35 Tertia, quarta, & quinta, duplici processus posterioris mucrone, secundæ respondent. Sexta autem & septima, hunc ampliorem quidem, sed obrusiozem, non duplici quidem mucrone bifidum, sed appendice quadam auctum. Quantum autem ad transuersos processus ceruicis attinet, tertia, quarta, quinta & sexta,
- 40 amplios & bifidos, non spinæ ipsarum modo asperos, & inæquales representant. Septima latos quidem exerit, sed obscurè bipartitos. id autem notari debet, hos ipsos in omnibus esse, præter-

*Vertebra ad
costas.*

quam in septima peruios, & internam ipsorum partem semper lat-
torem esse, atq; elatius, quàm posteriorem efferrī. At posteriores
spinę processus, in omnibus quasi vertebriis variant: quemadmo-
dum transuersi inter se conueniunt. **MATHESES**, Quare poste-
riores, & transuersi processus bifidi existunt? **GERON**, Musculo-
rum ortus, insertionisq; gratia. **MATHESES**, Cur foramina in
transuersis esse dixisti? **GERON**, Vt venam arteriamq; sursum du-
cant, quæ spinæ medullæ, ipsiq; tandem cerebro sanguinem &
spiritum transmittant, in reliquis autem vertebriis a secunda, ea-
dem serie, ad sacrum os vsq; foramina consistunt. atq; hæc de cer-
uicis vertebriis dicta sunt. Infra ceruicem superius duodecim
esse docui. quanquam numerus earum quandoq; variet, vt nunc
vna redundet, nunc desideretur, licet rariùs. **MATHESES**, Qua-
les sunt? **GERON**, Hæc ne quæ in ceruice enumerasti, similes, an potius ab il-
lis differunt? **GERON**, Partim conueniunt, partim discrepant,
nec non inter se quædam habent communia, quædam diuersa.
MATHESES, Ea quæso explices. **GERON**, Primum grandio-
res sunt hæc, quàm ceruicis, eaq; potissimum, quæ longius ab illa
distant. quanto autem cuiusq; vertebræ corpus grandius, tantò
etiam minus solidum apparet: utpote fungosum, & multis inæ-
qualibus, varijsq; foraminibus incerta serie peruium, in quæ ve-
næ arteriæq; alimenti illis distribuendi gratia, subeunt, nisi enim
vasorum propaggines, ossibus crassis insinuentur, nõ utiq; nutri-
mentum illis per alta sitis, suppeditari potest. Sunt autem forami-
na illa, vt postea audies, in posteriore vertebrarum thoracis par-
te insigniora, quàm alibi. **MATHESES**, Quotnam hæc vertebræ pro-
cessus habent? **GERON**, Septem: nempe vnum posteriorem, duos
transuersos: duos ascendentes, duos item descendentes. **MATHE-**
SES, Qualem autem posteriorem? **GERON**, Nouem quidem superio-
res longissimum, simplicem, minimeq; bicornem, nec admodum
amplum. quanquam autem à proceriore incipiat radice: tamen
in mucronem sensim desinit. in decima non ita longus, vt in supe-
rioribus apparet, mucroq; eius amplius & obtusus est, non vt in
alijs acutus. in vndecima minus adhuc quàm in decima exporri-
gitur, eiusq; mucro obtusior est, & spissus. Præterea in nouem
prioribus, hic idẽ processus insigniter decliuus, vt in ceruicis sex-
ta & septima cernitur, spectatq; deorsum: in decima verò minus
deorsum, sed magis rectè retrorsum vergit. in duodecima rectif-
simè. Ita verò intelligas, nullam adeò rectè ferri, quin ipsius mu-
cro semper magis deorsum quàm sursum feratur. quanquam nul-
lius vertebræ processum sursum magis, quàm deorsum, nemo
verè asseuerare vt in quadrupedibus, queat. **MATHESES**, Quo-
modo

- modo habent transuersi thoracis vertebrarum processus? GERON, Perquam magni sunt, validi & crassi, ac in nouem superioribus nulla magnitudinis differentia cernitur. In decima autem minus quam in superioribus processus extuberant. In vndecima adhuc minores, breuiioresq; existunt. In duodecima, minimi omnium. MATHETES, Qua de causa? GERON, Quia in nouem superiorum vertebrarum processuum apicibus sinus cartilagine obducti habentur: quibus costæ primis partibus leuiter capitulatæ inhærent. In decimæ autem processu, aut obscurus, aut nullus sinus deprehenditur: in duabus infimis nulli prorsus occurrunt. Hoc autem notandum, omnes quidem istorum processuum sinus, priore parte haberi. verum alij superiorem, alij inferiorem, alij mediam regionem occupant. MATHETES, Quorsum autem transuersi hi processus spectant? GERON, Omnes, qui in superioribus quam decima existunt, prima excepta, deorsum respiciunt: qui inferius, sursum. MATHETES, Foramina, per quæ nervos ex spina medulla in superioribus vertebris prodire docuisti, respondentne ijs quæ in ceruice habentur? GERON, Quæ huic viciniores sunt vertebræ, similia habent foramina: quæ lumbis, horum similia. MATHETES, Qui sunt ascendentes illarum, & descendentes processus? GERON, Duo suprà infraq; adeo exigui, vt vix à plana superficie differant. MATHETES, Ad quid conferunt? GERON, Illi, vt incumbentis vertebræ sinus subeant: hi, vt subiectæ insinuentur. quæ autem inter hos processus asperitates & tubercula inæqualia conspiciuntur, valida producunt ligamenta, quæ thoracis vertebrae firmiter connectent. Sciendum autem est, duodecimam illius ab alijs euariare: quod vtraq; ex parte excipiat, nullam ipsa excipiat. Nam vndecimæ vertebræ processus descendentes aliquantum sinuosos, ipsa suis ascendentibus subit, sic ascendentes primæ lumborum vertebræ processus, suis ascendentibus ingreditur. MATHETES, Quales lumborum sunt vertebræ, quas superius quinq; numero esse dixisti? GERON, Omnium maximæ, & crassissimæ. MATHETES, Ergo etiam foramen illud, per quod spinæ medulla transit, amplius quam in alijs existit? GERON, Nequaquam: sed quantò hæc in nervis obiter generandis consumitur, graciliorq; euadit, tantò illud quoq; angustius redditur. alia verò complura foramina habent, minimè peruiâ, incerto ordine & numero. MATHETES, Qua in regione sita? GERON, Interna, qua ipsæ venam cauam & arteriam intus attingunt. hinc enim propagines vasorum recipiunt, quibus ipsa nutriuntur. MATHETES, Quid de illo foramine ais, per quod in superioribus vertebris, neruū vtroq; latere ex spina medulla ori-

*Foramina per
quæ nervi prode-
unt.*

Vertebrae lumborum.

ri indicasti: GERON, Contraria prorsus est ratio in lumbis, quàm in ceruice & thorace. MATHETES, Quid ita? GERON, Superior vertebra summam foraminis partem, latamq̃ efficit: inferior autem imam, & quasi tertiam duntaxat absoluit. quippe sinus inter corpus ipsum & descendentem processum extans, longè maior est eo, qui in superiore vertebræ parte, inter corpus ipsius, & descendentem processum delitescit. MATHETES, Quot hæ vertebræ processus obtinent? GERON, Septem. vnum posteriorem, duos transuersos, duos ascendentes, & totidem descendentes. MATHETES, Qualis est posterior in spina? GERON, Validus & crassus, non autem pro ipsorum mole procerus, aut longus: ad latera tenuis, suprâ infraq̃ latus. mucro eius appendice, veluti etiam thoracis vertebræ constat, obtusus est, & quodammodo triangularis. MATHETES, Transuersi vertebrarum in lumbis extantium processus, ipsi nē qui in thorace sunt, respondent? GERON, Multò sunt tenuiores: prima autem & quinta, breuiores quàm aliæ obtinent. MATHETES, Qua de causa? GERON, Primum ne illi obliquum thoracis motum, hoc loco maximè impediatur: deinde, ne ab ilium osse impediuntur. mediæ horum longiores existunt, & graciliores, quàm ad lumborum vertebrae pertineat. MATHETES, Viginti quatuor iam spinæ ossa absoluiſti, quænam reliqua decem existunt, de quibus suprâ meministi? GERON, Vertebrae, sequitur os quoddam magnum & latum, quod Græci ideo nunc *πλάτυ*, nunc *μεγαλόν*, siue *εργόν* appellant. eius pars posterior gibba est, & curua, vt tutius ea, quibus tutandis consecrata est, ab iniuria vindicet. prior autem leuis non aspera, sed ima ac sinuosa, quo vicina ossa aptius complectatur. MATHETES, Continuū mne est, an ex multis compositum? GERON, Ossibus quibusdam veluti vertebris constat: quanquam minus conspicuis, quàm in lumbis, nec solutu facilibus, vt in coctione maximè apparet. MATHETES, Quot ossibus, & qualibus compactum est? GERON, Quinq̃, aut vt plurimum sex, sepe tribus, sicut etiam in simijs & canibus. nonnunquam duobus tantum, vt Lutetiæ Parisiorū etiam olim in asficato quodam cadauere vidimus. adeò magna in hoc osse varietas deprehenditur. At præter has sacri ossis partitiones, aliud quoddam os cartilagineum, in mucronem acutum desinens, adhareret, de quo statim tractabimus. MATHETES, Si ergo tot partibus os illud constat, quomodo coagmentantur, coalescuntque? GERON, In prima quidem ætate cartilaginis interuentu: in adultis commissura adeò coalescunt, vt non nisi coctione multa, aut vetustate, præsertim in iunioribus separentur: idq̃ nunc in medio tantum, non in lateribus: nunc vbiq̃. imò vnum duntaxat os esse vide-

Ossis sacri constructio.

- videtur, nisi fortè, quà primum os cum secundo coalescit. MATHE.
 Separata ea ossicula, quę sacrũ os constituunt, quam compositio-
 nem ac figuram representant. GERON, Lumborum vertebra-
 rum ferè imaginem indicant. nam superior sacri ossis pars, supe-
 5 riori vertebrarum regioni: inferior, inferiori magna ex parte re-
 spondet. MATHE TES, Dic hoc quæso luculentius. GERON, Quia
 superna sacri ossis regio tam ampla est, auctaq; appendice, quàm
 ima vertebræ lumborum pars existit, quæ sacri ossi committitur,
 vt lumborum vertebræ in se coarctentur. MATHE TES, Habet
 10 ergò simile foramen medullæ spinæ dicatum. GERON, Non: sed
 multò angustius, sicut etiam medullam graciliorem. MATHE TES,
 Quot sunt in sacro osse processus, & quales. GERON, Spinas du-
 as, tres, quatuor, exiguas quidem, sed tantò latiores, quantò os
 ipsum vnde prodeunt, grandius, lumborum spinatis processibus
 15 ferè similes, quasiq; rectas: nonnunquam, vt in finijs sursum ver-
 gentes. MATHE TES, Apparentne in hoc osse processus transuer-
 si. GERON, Obscuri, qui in extrema magis parte, sinus leuiter ca-
 uos, inequales, asperos, continuosq; ilium ossibus, quæ foràs ver-
 gunt, excipiendis aptos habent. quanquam interdum os ilium,
 20 de quo postea agetur, sinu suo tubercula sacri ossis, cardinis mo-
 do excipiat. MATHE TES, Sinus hi & tubercula, aliorumne mo-
 do, quorum antea meministi, cartilagine obducuntur. GERON,
 Non. imò nihil præter cartilaginea producunt ligamenta, quę os
 sacrum, ilium ossi validissimè connectunt. MATHE T. Quos habet
 25 alios processus. GERON, Ascendentes, & descendentes, vt in lum-
 borum vertebris. nam horum postremæ tubercula illis excipi-
 untur. descendentes autem subitò ossi insinuantur, lumborum
 vertebrarum modo globosæ. MATHE TES, Si os sacrum eadem
 ferè quę lumbi, obtinet, quot foramina in illo habentur. GERON,
 30 Quatuor, aut quinq; in priore ossis parte qua ipsæ compingun-
 tur, vtrinq; latent, & totidem in posteriore. MATHE TES, Quem
 vsus hæc præstant. GERON, Quinq; aut sex neruorum pari-
 bus viam præbent. nam primum par, inter vltimam lumborum
 vertebram, & primum os, quemadmodum reliqui nerui, ex lum-
 35 borum & thoracis vertebrarum lateribus, egrediuntur. Alterum
 par inter primam & secundam particulam emergit, & alia dein-
 cept, eadem similiter serie, ut, quod par elabitur, subitò ossi perpe-
 tuò ascribatur. MATHE TES, Süntne alia adhuc foramina. GERON,
 In posteriore parte alia quædam inter spinas ossium apparent, ad
 40 viam spinæ medullæ peculiarem spectantia. MATHE TES, Quid
 per ea transit. GERON, Nihil, sed ipsa ligamentis, vt spacia & fo-
 ramina inter spinas reliquarum vertebrarum conspicua, opplen-

*Sacri ossis proces-
sus.*

*Sacri ossis fora-
mina.*

Coccyx.

tur: quanquam interdum continua, nullisq; foraminibus peruia, vt in canibus ferè existant. **MATHE TES**, Quid ex sacro osse restat? **GERON**, Vltima eius pars, quam Græci à cuculi auis rostro introrsum curuato κοκκυγα, barbari siue recentiores caudam, vel os caudæ appellant. nam os sacrum paulatim gracilescit, extenuaturq; donec in tres cartilagine acutissimas, aut si maius in osses cartilagines, vel in ossa cartilaginosa, fungosaq; & extremum os coccygis desinit, & in iunioribus rubescit. **MATHE T**. Quot in totū eius sunt particulæ? **GERON**, Quatuor plerunq; in homine, & obliquo introrsum ductu, in acumen cessant: in tenera adhuc ætate laxari separariq; possunt, neq; tunc multum à reliquis vertebra differunt. **MATHE TES**, Quale primum coccygis ossiculum existit? **GERON**, Cæteris latius est, ac maius, sinuosumq; superius. **MATHE TES**, In quem vsus? **GERON**, Vt inam posterioris ossis sacri partem, cartilaginis interuentu excipiat. atq; hac ratione vertebrarum inter se compagem imitatur, fortè motus alicuius gratia.

*Primum os coccygis.**Coccygis ossis latitudo in partu.*

MATHE T. Quando potissimum? **GERON**, Cū mulieres foetum edere conantur, in quo os istud à sacro laxari, ac versus posteriora flecti, rationi est consentaneum, idq; non sine magno cruciatu. Huic primo ossiculo etiam quatuor adsunt processus: duo laterales, & totidem posteriores, acuti & superiora spectantes. **MATHE TES**, Qualia sunt tria coccygis ossa reliqua? **GERON**, Rotunda quodammodo, & paulatim in acutum tendentia: ad eò verò arctè inter se compacta sunt, vt vnicum os esse videantur: aliàs fungosa, vt pectoris ossa existunt. **MATHE TES**, Ossicula ista coccygis, in asicatis cadaueribus humanis, semperne inueniuntur? **GERON**, Plerunq; quia verò cartilaginosa & mollia existunt, nisi colligentur coagmenturq; raro omnia, præsertim extrema eius particula apparent. in simijs & canibus tria tantum ossicula cernuntur. **MATHE TES**, Plus ergo cartilaginis habent coccygis particulæ, quàm os sacrum? **GERON**, Vtiq; nam hoc summa tantum parte, quā infimæ lumborum vertebræ committitur, cartilaginem obtinet. quā verò cum ilium osse vnitur, & plurimis ligamenti firmissime colligatur, nulla obducitur, nisi in quibusdam, & non vbiq; Coccyx autem cū alibi, tum in extremo cartilaginosa est: non minus autem cartilaginis, aut potius cartilaginei ligamenti hisce particulis, quàm inter lumborum vertebra intercedit: cū inter sacri ossis partes nihil cartilaginis cernatur, præsertim in ætate prouectioribus. **MATHE TES**, Quomodo hæc ossicula inuicem committuntur? **GERON**, Vt partes in osse sacro, quanquam tertium huius, vt ossis sacri primum, sæpe articulo connectatur. **MATHE TES**, Quomodo hoc illi inseritur? **GERON**,

Liga-

Ligamenti admodum cartilaginei interuentu, vertebrarum instar, nulla intercedente articuli specie: idq; cum os sacrum sex constet particulis. **MATHEſ**, Quid si quinq; tantum? **GERON**, Tunc primum hoc coccygis os, foraminis cuiusdam in posteriore parte constituendi, neruiq; sexti paris in sacrum os deducendi, ac defendendi gratia, acutos duos processus exiguos obtinet, qui sursum spectantes, quintę sacri ossis partis processibus, validę coalescit. Quando autem sex sunt sacri ossis partes, quod frequentissimę accidit, nullos eiusmodi processus inuenias. verum id ad latera sinus, qui sextę ossis sacri parti coaptatur, superiori quidem sede transuersim lateſcit: inferiore autem sensim extenuatur, ac rursus secundo ossi committitur. Huic deinde tertium quartumque succedunt, eodemq; modo inuicem committuntur, tantõ minor, quantõ singula humiliorem locum possident. **MATHEſ**, Habetne coccyx foramina? **GERON**, Nullum quidem, vt thoracis & lumborum vertebrę, per quod spinę medulla permeat, aut ex quo vlli nerui prodeant. quia in sexta ossis sacri parte, spinę medulla terminatur, extremumq; ipsius, nõ in coccygis os descendit. Nam priore, posterioreq; regione, foramina intus quidem ampliora, foris autem angustiora, quàm in sacro osse existunt: per quę tria neruorum paria, vt in illo deducuntur: quamuis in secundi ossis cum tertio commissione, scissura sæpe foraminis loco deprehendatur. In simijs & canibus coccyx ex lateribus ab ilium osse non occupatis neruos, sicut lumborum vertebrę emitunt. atq; hoc bruta cum hominibus habent commune, cum reliqua spinę medullę portio simplex sit, nulliq; coniungatur, nisi quod in homine frequenter, veluti in tres ramos diuidatur. **MATHEſ**, Quibus coccygis pars vltima committi solet? **GERON**, Membraneis corporibus cuti mistis illigatur, sedisq; finem gignit. quanquam extra strictorium ani musculum emineat, eidemq; musculo posteriore parte subiiciatur, vt priore alterius musculi interuentu, peni annectatur. **MATHEſ**, Satis superq; de coccyge & alijs spinę partibus, iam egisse videris, reliqua corporis ossa nunc persequaris. **GERON**, **THORAX** triplicibus constat ossibus, in posteriore quidem parte vertebris, quas nuper enumeravi: priore verò, pectore, quod Gręcis *στεινον*, interdum *σθθος* dicitur: in lateribus autem, costis: quibus quicquid præcipuę interceptum, circumscriptumq; est, veteres medici thoracem vocarunt, cordi nimirum & pulmoni tot & tam validis munimentis tuendo, consecratum. Quę verò regio ipso osse simul cum cartilaginibus costarum definita est, proprię pectus dicitur. **MATHEſ**, Quia costas vertebris, si benę memini, inhaerere dixisti, quot ipsarum numero

Coccygis foramina.

Thoracis structura.

Pectus.
Costæ.

Costæ.

sint, expeditas. GERON, Duodecim semper tum in viris, tum in mulieribus, vtræq; in parte, quot etiam vertebræ existunt: raro vndecim, rarius tredecim. puto autem numerum illarum vel maiorem, vel minorem aliquando esse, quòd materia vel nimis copiosa, vel iusto paucior existat. Atq; ex his septem superiores, quæ

Costarum figure

pectoris ossi & vertebris inseruntur, *καὶ ὁσπαι γνήσιαι*, hoc est, costæ germanæ & veræ: quinque autem inferiores, quæ quòd solis vertebris annectantur, non autem ad pectoris os, sed ad thoracis latera pertingant, *νοθαὶ* Græcis, nobis spurix, falsæ, mendaces, & illegitimæ vocantur. MATHESES, Quam figura præditæ, & quomodo hæ ab illis differunt? GERON, Primis partibus rotundæ, & quasi capitulatæ angustioresq; sunt, quâ vertebrarum transuersis processibus inherescunt. inde patescentes, sensim in exteriori partem recurvantur: ac vbi latissime euaserint, paulatim rursus angustiores, in priora leuiter flexæ, cum osse pectoris committuntur. quamquam inferiores latissima nonnunquam cartilagine donentur. MATHESES, Superiores nullamne habent cartilaginem? GERON, Imò omnes cartilaginosa, non solum quâ cum pectore connectuntur, sed etiam bona ipsarum parte existunt, & præcipuè quâ incuruari incipiunt: vbi etiam sunt molliores, sicut

*Costarum figure
vñus & ratio.*

ad radicem duriores. quia cartilagine etiam ibi duræ magis sunt, vbi cum duriori partis alicuius essentia, vt osse pectoris iunguntur: vbi verò cum molliore, ibi etiam ipsæ molliores existunt, at in senio confectis, in osseam naturam transeunt. MATHESES, Quare costæ talem habent figuram, & quo dixisti modo conformatæ sunt? GERON, Vt leui momento contrahi, ac rursus dilatari, commodeq; pulmonibus, cordiq; sedem dare possint. MATHESES, Læuesne sunt, an asperæ? GERON, Vbi ligamenta & musculos thoracis spinæq; vel excipiunt, vel emittunt, nonnihil exasperatæ sunt: ceteræ læues. MATHESES, Habentne etiam sinus? GERON,

Costarum sinus.

Octo mediæ costæ, inter secundam & decimam, interna regione ima insinuatæ sunt, vbi primum à vertebris ad thoracis latera abscedunt. MATHESES, Quid huiusmodi sinibus excipiunt? GERON, Venam coniugis expertem, quam Græci *ἀρτηρία* vocant, arteriam, & neruum è spinæ medulla prouenientem. Tres autem humiliores costæ, quamuis sinibus careant, vtpote tenues, & intus depresso, magna tamen vasa citra illos exprorecta, repræsentant. MATHESES, Quomodo costæ vertebris committuntur? GERON,

*Costarum cum
vertebris connec-
tus.*

Articulari connexu, quem Græci *συνarthρώσις* appellant: ita tamen, vt capitula eorum intrò magis, quàm extrà vergant, non autem omnes simplici, vt decima, vndecima, & duodecima, sed nouem superiores, nonnunquam & decima, sed rarissimè duplici articulo ver-

lo ver-

- to vertebriis inferuntur. MATHETES, Si ergò bifariàm ita iunguntur, duo nimirum etiam capitula habebunt? GERON, Maximè. vnum quidem quo vertebrarum sinibus inhærescunt: alterum, quò transuersorum processuum fastigijs internis firman-
 5 hæc tubercula sinibus vertebrarum respondent. MATHETES, Quid de primis tribus costis adfers? GERON, Prima sic circa humeros sita est, rotundoq; capitulo, primæ thoracis vertebræ insinuatur: deinde transuersum illius processum, tantisper ascendit, quousq; eiusdem summo apici, altero tuberculo coarctetur. Se-
 10 cunda autem, & reliquæ septem sequentes, non æquè rotundo, sed obtusiore tuberculo, communi, semper duarum vertebrarum sinui inhærescunt. At illa transuersis secundæ thoracis vertebræ processibus, perinde vt prima, articulari modo insinuatur. MA-
 THE T. Omnesne costæ eodem loco vertebriis insidunt? GERON, Nequaquam, quia hæc illas diuersis locis excipiunt: superiores quidem in ima transuersorum processuum parte interna: inferiores in superna: mediæ, in media ipsorum regione. at tres inferiores costæ, non admodum capitulatæ, sinibus quoq; vertebrarum parum cauis connectuntur. MATHE T. Quale tertium thoracis
 20 os est, & quomodo costæ huic committitur? GERON, Pectorale Os pectoris. os à faucibus incipit, ab utroq; latere lunatum, & à præcordijs iam ipsum quoq; cartilagine mollium, terminatur, vbi gladij figuram representat: natura fungosum & molle: priore parte magis, continua squama, quàm posteriore obducitur. nam hac parte
 25 multis inæqualibusq; foraminibus, sed non peruijs donatur, quæ vas nutritioni illius accommodis, viam ministrant. MATHETES, Simplexne hoc est? GERON, Non, sed ex pluribus constat: numerus autem eorum non idem in omnibus manifestò apparet. nunc enim duo tantum, nunc tria, aliàs quatuor, aliàs quinque, vel
 30 sex conspicua existunt. rariùs autem septem in homine: in brutis ferè semper cernuntur. interdum duo, aut tria illius ossa inferiora, per medium sunt omnino diuisa: interdum nonnulla ipsorum, medium habent foramen, calami scriptorij, aut parui digiti instar crassum, vas indubiè transmittendis accommodatum. Est cum
 35 quartum, quintum, & sextum os, in duo inæqualia diuidantur. MATHETES, Ossa illa inter se ne respondent? GERON, In adultis tria ferè tantum conspiciuntur, prorsus inter se varia. primum enim latum quidem & crassum, sed breue, quàm priores costæ illi committuntur. præterea interiùs cauum, exteriùs gibbum, in
 40 medio longè crassius quàm in lateribus. In his autem vtriusq; singulos sinus habet, qui posteriora versus tendunt, cartilagine incrustati, quibus clauiculæ caput insidit. In his squama, sinibus

Os ingale.

medijs iuxta interna ipsius latera prominula, os superius lunatum cernitur, foueamq; repræsentat, quam Græci *σφαγλυ*, Latini iugulum, barbari furculam superiorem appellant. **MATHESES**, Qualis inferior huius ossis pars est? **GERON**, Leuiter aspera, & secundo ossi cartilaginei ligamenti interuentu, adeò laxè committitur, 5
vt nonnunquam ossium horum connexus, imò etiam motus in magnis respirationibus percipiat. **MATHESES**, Quale os pectoris secundum existit? **GERON**, Latum etiam supra crassumq; est,

Pectoris os secundum.

sed paulatim quâ primo glutinatur, angustius, tenuius, & multò longius: in utroq; autem duorum istorum ossium connexus latere, sinus ambobus communis, & cartilagine obductus apparet, cui secundæ costæ cartilago, obtusioris trianguli, verticis instar protuberans insidet. **MATHESES**, Habétne etiam os hoc secundum, alios præter hunc sinus? **GERON**, Complures vtrinq; ob-

tusioris trianguli modo excauatos. non autem pari intervallo inuicem disitos. Nam primum in altero latere huic ossi peculiaris, tertiæq; costæ cartilagini excipiendæ addictus, ab illo qui secundam costam excipit, longius recedit, quàm alter sinus quartæ costæ accommodatus. Sic inter secundum & tertium sinum, plus interualli, quàm inter tertium & quartum existit: adeò vt sinus in 20
hoc osse sextæ & septimæ costæ peculiare, mutuò se propè contingant, non tam alti, vt superiores. Quippe secundum hoc os cartilagine costarum, tertiæ, quartæ, quintæ, sextæ, & septimæ, quemadmodum secundæ protuberantes excipit. **MATHESES**, Quid de tertio pectoris osse habes? **GERON**, Exiguum est, ac te-

nue, & secundum ima parte interna sic conglutinatur, vt primum secundæ. **MATHESES**, Vbi nam secundo committitur? **GERON**, Vbi septimæ costæ cartilagini, ima secundi ossis regione con-

Cartilago mucronata.

nectitur. **MATHESES**, Quomodo terminatur? **GERON**, In mucronatam cartilaginem. quidam os illud non habent, sed mucronatam tantum cartilaginem, quam Græci *ἐξοειδῆ*, barbari malum granatum vocant. **MATHESES**, Quare extremam huius ossis partem sic vocant? **GERON**, Quia totum pectoris os cum cartilagine gladium repræsentat. nam illud manubrio, cartilago ensi plerumq; similis est. **MATHESES**, Quare dicis plerumq;? **GERON**, Quia hæc non semper est simplex, & acuminata, verum sæpe lata, sæpe etiam bifida, vnde vulgo furcella dicitur, 30
quâs tota est latissima, & planè ossæ, præsertim priore parte. nam posterius diutius cartilaginosa est, & semper intima. **MATHESES**, Habétne os pectorale communionem aliquam cum

cartilagine? **GERON**, Indubiè. nam omnia pectoris ossa ex cartilagine proueniunt, vt quæ siccando paulatim durescat, quod in pueris 40

- pueris & adolescentibus est manifestum. Nam pectus infantis recens nati, vt magna pars ossium, omnesq; appendices, aliud nihil sunt, quàm cartilago. deinde anno iam secundo inter medios costarum articulos paulatim siccelsit, vt inter primas & secundas
- 5 costas ossiculum aurei floreni instar: inter secundas & tertias, interq; tertias & quartas, lupini modo: inter quartas & quintas lentis amplitudine concreuerit. vbiq; tamen vnumquodq; rotundissimum est. quicquid reliquum singula ossa hæc ambit, cartilago adhuc est, costarum cartilagini tam simile, vt idem videri possit.
- 10 Quantùm verò cartilaginis os illud summum & amplissimum iuxta primarum costarum & iuguli articulum tegit, postea in os duratur: ita tamen, vt inter illam & os commissuræ nota in pueris manifestissima, in adultis plerisq; non obscura appareat. MATHETES, Quem vsus præstat mucronata illa cartilago? GERON, *Cartilaginis mucronatus vsus,*
- 15 Vt subditas partes, præcipuè autem septum transversum instar munimentum tueatur. nam eo loco hoc maximè est nervosum, siue tendinis naturam sortitū, cuius offensio cordi ipsi penè subiecto communicari potest. membrana enim cor ambiens seprotransverso annexa est. MATHETES, Quæ post thoracem ossa habes? GERON,
- 20 A ceruice duo lata vtrinq; ad scapulas tendentia, Græci *ὠμοπλάταις*, *Scapulae.* nostri scoptula operta, barbari spatulas nominant: ad verbū autem sonat humerus latus. nam ea in summis verticibus sinuata, ab his triangula ex diuersis lateribus, paulatimq; lateſcētia ad spinam tendunt, & qualiora parte sunt, hac hebetiora, obtusioraq;. In
- 25 imo duæ illis adnascuntur appendices: vna inferius grandior, crassior, & longior, altera paulò superior habetur. MATHETES, Quot habent scapulæ processus? GERON, Tres. primum sanè in summo eius vertice, qui *ἀκρόμιον*, quasi summus humerus appellatur, quā cum iugulo connectitur: alter brevis eius ceruix est, cui
- 30 leuiter insinuatq; humerus insidit: tertius interiore parte exiguus, & acutus modicè intumescit, ac græcè *χρουνή κροσίδης*, vel *ἀκροκροσίδης* appellatur: à veterum autem Græcorum litera *z* similitudine, sigmoides nominati potest. MATHETES, Quid præterea in scapulis cernitur? GERON, A basi ipsarum spina quædam incipit humilis, paulatimq; plenior efficitur, donec ad summum verticem
- 35 ascenderit, ibiq; vt dixi, cum iuguli articulo iungatur. MATHETES, Quibus lata scapularum ossa posteriore parte connectuntur? GERON, Nulli ossi, nisi in summo occipitio, ceruici, thoracisq; vertebri, & ossi hyoïdi validis musculis inhærescunt. MATHETES,
- 40 Cū scapulas iugulo coarctari dixeris, exponas quæso, qualenam illud existat. GERON, IUGVLVM, quod summo pectoris ossi & *Iugulum.* superiori scapularum processui coarctatur, Celsi iugulum, alij

græca dictio ne *κλῆδα*, latini claviculam nominant, quod scapulas, & per has humeros cum pectore confirmet, stabilitq̃. **MATHESES**, Qualis huius ossis essentia est, & figura? **GERON**, Inæqualis. nam iuxta scapulas & pectus fistulosa intus, magisq̃ rara est, quàm reliqua eius portio, eò quod etiam latiuscula existat. **Mediæ** eius partes solidissimæ, tenuissimæ, & propemodum rotundæ. in imo autem veluti in lineam protuberant, quæ à capite eius incipiens, paulò vltra medium pertingit. adhæc extrinsecus gibba est, interiùs caua: quia hæc asperam arteriam, stomachum, sexti coniugij nervorum cerebri, medullæq̃ spinæ insignes ramos alam petentes, ferri oportet: adhæc quod alibi aspera sit ad musculos, ligamentaq̃ producenda, alibi levis, alibi sinuosa, & foramina duo, aut tria, præsertim in posteriore parte obtineat.

MATHESES, Quid de capite iuguli dicis? **GERON**, Multa cartilagine incrustatur, leue est: si illa detrahatur, tenuissima appendice asperum, & inæquale apparet. **MATHESES**, Quod os illud est, quod scapulis inferi dixisti? **GERON**, **HUMERVS**, ut Celsus vocat. ut autem alij, brachium, à græca dictione *βραχίον* derivatum. latino barbari adiutorium brachij vocant. quanquam Galenus id, partem mediam inter cubiti & humeri articulum esse definiat. **Hippocrates** manum id totum appellat, quod à scapulis ad extremos vsque digitos porrigitur. In summa, humerus illud os erit, quod parte superiore cum scapulis: inferiore, cum radio cubitoq̃ coniungitur. **MATHESES**, Quot humerus habet partes? **GERON**, Tres potissimùm. summa inter eas grandiuscula est, rotunda, parvæ cuidam ceruici coagmentata adnatæq̃. **MATHESES**, Simplexne hæc est, & integra? **GERON**, Non: sed in duo tubercula diuiditur, externum & internum, sinu fissuræ particulae simili, intersecante, qui viam nervis in humerum discurrentibus præbet: internum quidem verticulatis scapularum ossibus inseritur, leue, æquale, & cartilagine incrustatum, nervis ex transitu maiori parte deligatur: externum nulli articulo inherescit, sed collis modo prominet, asperum & inæquale, in quod multa validaq̃ ligamenta inferuntur, humerum scapulis connectentia. Verùm hoc idem externum tuberculum, rursus in duo capitula diuiditur, nempe prius & posterius, quod illo multò grandius existit.

MATHESES, Quoniam sinu ita distinguitur? **GERON**, Admodum alto, longo, & secundum cavitatem ad amussim rotundo, priore parte externalitante. **MATHESES**, Qualis media humeri pars est? **GERON**, Rotunda, non recta, nec ex toto sibi similis, sed ante quidem & foris gibba, securitatis gratia: posterius autem, & intus sima, quo corporum iniquatorum comprehensioni sit magis accommodata.

Duo capitula
externi.

Med' a humeri
pars.

- data, nec non vt vasis ad manum discurrentibus locum præbeat.
- MATHESES, Qualis autem pars ima humeri existit? GERON, Duos habet processus inæquales. horum superior radij, de quo postea, caput excipit: inferior nulli ossi prorsus connectitur.
- 5 MATHESES, Habentne etiam sinus? GERON, Inter commemoratos processus aliquid cauius trochlearum orbitis simile habetur, quo cubiti extremum inditum facile mouetur. Ad huius autem orbitæ extrema, duo etiam sinus apparent, qui cubiti processus acutos excipiant: prior quidem & minor priorem, cubito introrsum flexo: posterior autem & maior, posteriorem complectitur.
- 10 MATHESES, Qualenam summum ac superius humeri caput existit, quod extrâ prominet? GERON, Semicirculari sinu ad vtrâq; humeri latera protenso constat, in quem validissima ligamenta laxè, & liberè inferuntur, quæ ab extremis scapulis sibi vicinis, prodeunt.
- 15 MATHESES, Nullusne alius sinus extat? GERON, Indubiè, qui externum hoc caput, de quo agimus, in duo tubercula per longitudinem diuidit, vt tendini à musculis humeri prodeunti, viam præbeat recipiatq; ne facile dissiliat.
- 20 MATHESES, Inueniunturne etiam in hoc osse foramina, vt in alijs antea indicasti? GERON, In externis illis duobus tuberculis, non pauci meatus insunt, per quos venulæ complures, & arteriæ ossis ipsius nutriendi causa, ingrediuntur: nam circa mediam humeri partem interiorem ad costas, foramen extat apertissimum, deorsum vergens, & in os ipsum penetrans.
- 25 MATHESES, Quo nomine illam partem quæ ab humero incipiens ad manum pertingit, appellas? GERON, BRACHIUM Celso dicitur, quemadmodum alijs cubitum, sicut etiam Doribus *κῦβιτον*.
- 30 MATHESES, Quot ossibus brachium constat? GERON, Duobus. vno sanè quod à rotis paruis radios imitantibus, Græci *ραχιδα*, nos radium nuncupamus, barbari autem Focile minus: altero, quod græcè ab vlna *ῥαχὶς*, latinioribus cubitus vocatur. quanquam sic etiam pleriq; totum id, quod inter humerum & manum intercedit, appellitent.
- 35 MATHESES, Quomodo hæc ossa inter se differunt? GERON, Radius superior quidem est, sed minor breuiorq; & ceruice tenuiore oblongaq; constat, capite autem rotundo & leuiter cauo, externum humeri tuberculum recipit, & cum eo neruis & cartilagine colligatur: huiusq; articuli beneficio totū brachium, nunc in pronom, nunc in supinum adducitur. Cubitus interior longiorq; & primo plenior, in summo capite duobus quasi verticibus extantibus, quas
- 40 Græci *ροτόνας* vocant, in sinum humeri, quem inter duos processus eius esse docui, se inserit. MATHESES, Vertices illi suntne inter se pares? GERON, Prior, minor, posterior, grandior est, qui poste-

Summum humeri caput.

Cubitus, vel brachium.

Ossa duo brachij. Radius.

Cubitus, sive vlna.

riorem etiam humeri sinum, iuxta clatiorem orbitæ regionem ingreditur; hunc Attici ἀλκίεγον, Hippocrates ἀγκῶνα vocat. in eo etiam appendix quædam cernitur, intus quidem modicè caua, foris gibba, exiguum quoddam scutum representans: in quibusdam tamen paulò maior interdum deprehenditur, in quam tendines à superioribus musculis profecti, iuxta cubiti nodum inferuntur. **MATHESES**, Sinusne aliquis inter hos vertices siue processus delitescit? **GERON**, Literæ nostræ C, vel Græcorum ε consimilis, vnde etiam στροφοδὴς ab illis vocatur, leuis, & cartilagine obductus, cui orbita humeri trochleæ similis, inter duos eius nodos sita insidit, eiusq; articuli beneficio, totum brachium citra luxationis periculum flectitur, extenditurq;. **MATHESES**, Hic solusne sinus id præstat? **GERON**, Alius quoq; vtroq; latere exiguus, paulò inferius, quàm vbi ille, qui C figuram refert, apparet, cui superius radij caput rotundum ita insidit, vt liberè quidem circumagi, sed non facilè dissilire queat. **MATHESES**, Quare sinus isti commemorati hanc securitatem brachio præstare possunt? **GERON**, Quia validissima ligamenta articulum constringunt, quæ vt commodius orirentur, natura externam processuum regionem, sinusq; modò commemorati, ambitum asperum fecit, & inæqualem. **MATHESES**, Vtraq; hæc ossa, quorum hactenus mentionem facis, eandemne figuram per reliqua ipsorum longitudinem, obtinent? **GERON**, Cubitus à ceruice sua, ad trium digitorum spatium quadratus apparet: hinc pari interuallo ab imo, triangularis: ad inferiorem ceruicis partem rotundus. Radius autem quatuor veluti confusis angulis constat: media eius pars triangularis propemodū, sed obtusiore angulo magis, quàm acuto existit: latus eius sursum vergens, rotundius est, atq; gracilius, quàm ea quæ deorsum spectant. summum enim circiter duos digitos prorsus rotundum est. **MATHESES**, De radij cubitiq; cum humero connexu & figura, audiui: nunc, quomodo illa inter se suprâ & infra committuntur, edoceas. **GERON**, Suprà quidem cubitus radius, infrâ autem radius cubitum excipit. nam in externo cubiti prioris processu, sinus quidem transuersus, leuis & cartilagine obductus cernitur, interno radij capitulo, cui humerus inseritur, excipiendo appositus. Infrâ autem radius crassior est, habetq; appendicem, cui superior cubiti appendicis pars, tuberculi modo protuberans, insinuatur, eoq; radius vtriusq; articuli beneficio, in prouum supinumq; tantummodo agitur, reliqua ab humero parte non omnino rotundus & læuis existit, sed asper, & inæqualis: necnon aliquot in locis sinuosus, ligamentorum musculorumq; producendorum gratia. Hæc ipsa autem ossa

vtrinq;

- utrinque validissimis ligamentis iuxta humerum iuncta, paulatim dirimuntur, rursus ad manum coeunt, modo amplitudinis mutato. Siquidem ibi radius plenior, cubitus autem tenuis est: deinde radius in caput cartilaginofum confurgens, in verticem eius sinuatur. cubitus rotundus in extremo, parte altera veluti appendice paulum procedit. MATHETES, Qua regione magis hæc ossa inuicem distant? GERON, In media. nam radius ibi potissimum: deinde per reliquam longitudinem arcus modo ita obliquatur, ut à cubito admodum recedat. MATHETES, Quamobrem? GERON, Partim ut radius cubito suffultus, obliquo ductu in pronum supinumque promptè agatur: partim ut musculi inde ad externam internamque cubiti regionem enascantur, consistantque: partim ut res ampliores commodius apprehendi possint. MATHETES, Hocne intervallo ac spatio, ossa illa prorsus sunt libera & disiuncta? GERON, Minimè, sed membranoso ligamento connectuntur: quod angulis ipsorum internis adhæret, obliquis filamentis contextum. MATHETES, Quomodo cum manu inferius coherescunt? GERON, Duplici appendice primam manus partem, quæ καρπὸς græcè dicitur, excipiunt, flectunt, & extendunt: radius quidem maximum digitum, cubitus autem minimum respiciens. MATHETES, Cur, oro, id accidit? GERON, Quia etsi foris illa gibba, tamen intus in radio quidem insigniter, in cubitu autem leuiter caua existit. MATHETES, Aliudne quippiam ossa hæc brachij obtinent? GERON, Nihil, nisi quod cubitus adhuc processum quendam, quem Græci à styli figura *στυλοειδῆ* vocant, obtineat, qui aliquos primæ manus partis motus dirigit firmatque. MATHETES, Prima palmæ pars quam καρπὸν Græcè nominasti, quòtnam, & qualibus ossibus constat? GERON, In ætate grandioribus octo minutis duris, intusque modicè fungosis, ac medullosis, non prorsus solidis, figura, magnitudine & situ variantibus. Singula enim peculiare quippiam representant, quo inuicem discernuntur: externa quidem superficie leuiter gibba: interiore caua, partim recta, partim rotunda, partim oblonga, partim triangula cernuntur, duplici distincta ordine: quorum superior cubito, radio stylarique processui: inferior alteri palmæ parti, quæ μετὰ καρπὸν Græcè dicitur, & primo pollicis ossi articulari nexu, committitur. MATHETES, Summus ille ordo, quot ossibus constat? GERON, Tribus: primò quod internum illius latus constituit: secundò quod huic succedit, magisque ab interno recedit: tertio quòd per externum latus secundo proximum est. Præter hæc, aliud os paruulum externum omnino latus occupat, minimum digitum respiciens, quod etiam exiguo leuique sinu commemora-

Prima palmæ
pars, brachialis
vulgò.

Brachialis partes
octo.

Palmæ ossa tres
sunt.

Ossa tria summi
ordinis.

*Ossa interioris
ordinis.*

tum modò processum recipit, cum manus in latus decliuus ad inferna porrigitur, eaq̃ ratione quatuor in totum ossa, primus ordo complectitur. MATHETES, Quot habet inferior? GERON, Similiter quatuor, alteri palmæ parti contermina, nempe quintum, sextum, septimum, & octauum. MATHETES, Qualia sunt hæc ossicula, quæ cubito, & secundæ palmæ parti committuntur? GERON, Leuia, & cartilagine obducta. MATHETES, Qualia autem cernuntur, vbi se inuicem contingunt? GERON, Non vndiq̃, aspera & inæqualia, ligamentisq̃ obsita, sed leuiter sinuosa, & cartilagine quasi munita. MATHETES, Quomodo inuicem cohererent? GERON, Nervis, ligamentisq̃ nerueis articulari nexu adeò aptè constringuntur, vt nisi illa cum membranis, quibus obducuntur, detraxeris, vnum os latum, oblongumq̃ caput esse putes. Sic autem coagmentata in radij cubitiq̃ sinum inferuntur, manus extremæ flectendæ extendendæq̃, & obliquorum eius à stylari processu motuum promouendorum gratia. MATHETES, Singula quæso ordine percenseas, qualia sint, & quomodo inter se connectantur. GERON, Primum sanè tum radio, tum secundæ palmæ partis insigni vtrinq̃ tuberculo coarctatur. secundum primo osi, & septimo committitur. tertio leuiter cauo inferitur: hoc autem ipsum amplo tuberculo octauo osi insinuatur. quartum cubitum non attingit, sed ligamentum, quod à stylari eius processu enascitur, aliqua ex parte duntaxat recipit. id os huius ordinis omnium est minimum, nullo insigni capite, aut sinu donatum, & nisi longius quàm crassius esset, rotundum propemodum. Quintum superius sinuatum primi osis capitulum excipit: nec non externo latere os sextum, & primum pollicis admittit. sextum alterius palmæ partis, quæ *μετακάρπιον* dicta est, osi connectitur, quod indici digito præponitur: item ei, quanquam obscure, quod medio subijcitur: tribus autem primæ palmæ partis committitur. Nam primum quidem os sinu suo excipit, in quinti verò sinu tuberculum suum inserit: deinde non admodum extanti capitulo, sed plana potius superficie septimo coarctatur: in secundo ordine id minimum, vt septimum maximum, & quintum octauumq̃ mediæ existunt. MATHETES, Quid de septimo censes? GERON, Hoc in communem primi & secundi sinum rotundo capite, & prominulo ingreditur: interno latere sexto osi: externo autem octauo, amplo capitulo coarctatur, sed capite depresso, & sinu superficiali vniuersim os septimum quatuor primæ manus partis ossibus, nempe primo, secundo, sexto, & octauo, nec non ei quod in altera manus parte medium digitum sustinet, committitur. MATHETES, Restat adhuc octauum. GERON, Id cunei

- cunei modo septimum & tertium subit, illisq; committitur: nec non secundæ palmæ partis ofsibus duobus, quæ annulari, & paruo digito subiiciuntur. MATHETES, Præter hæc octo ofsicula, nullumne aliud adijcitur? GERON, Exiguum, quod à sesami fi-
 5 gura *σπαραμυδιος* dicitur: ad externum secundæ palmæ partis latus situm, articulum hunc confirmat, atq; id, quod paruum digitum sustinet, nonnihil suffulcit. MATHETES, Quid præterea de his ofsibus notatu dignum habes? GERON, Nihil, nisi quod quintum & octauum insignem processum obtineant: hoc sanè foris intrò
 10 vergentem: illud ab interno foràs tendentem. quò autem vtriusq; ofsis processus porrigitur, ibi quoq; sinus est, tendinum ligamentorumq; gratia. MATHETES, Quæ ossa his enumeratis in manu succedunt? GERON, Quæ secundam palmæ partem explent, quam vt suprà monui, Græci medici *μελαναχμοί*, alij *κίερα*, & *ἀνδράνα*
 15 appellant, ad digitos tendentia, à quibus ipsimet oriuntur. MATHETES, Quo nomine hæc vocantur? GERON, Eò quod parua admodum sint, & sesami leguminis semini figura respondeant, veteres Græci *σπαραμυδιος*, Latini sesamina ofsicula appellant. MATHETES, Quis eorum est numerus? GERON, Incertus: in quibusdam enim viginti, in quibusdam quindecim, in quibusdam
 20 decem, in alijs plura, aut pauciora. MATHETES, Vbi sunt sita? GERON, Sub infimis non solum manus, sed etiam pedis articulis, inter vtriusq; internodia. MATHETES, In quem usum? GERON, Non solum vt vacuum illam regionem, quæ ipsidem
 25 articulis reliqua est, impleant, sed etiam vt articulos, sicut in genu patellam tueantur, & muniant, rebusq; apprehendendis firmitatem non exiguam, & in pede humi æqualiter aptando, maximum adferant subsidium: adhæc ne articuli in ipsa flexione in acutum angulum dirigantur. MATHETES, Quomodo inuicem colligantur? GERON, Cartilagineis ligamentis: quanquam
 30 in medio, & iuxta secundæ palmæ partis longitudinem, insigni spatio inuicem dirimantur, quo musculi digitis mouendis idonei continentur. MATHETES, Eandemne figuram vbiq; retinent? GERON, Minimè: sed communiter quidem depressam & oblongam habent: quod autem indici digito subiicitur, longius, crassius, & validius apparet: reliqua sensim breuiora fiunt, extenuanturq;
 35 vt quod minimo digito annectitur, omnium sit breuissimum tenuissimūq;. Gemina verò illa, quæ sub interiore primæ plantæ ofsis parte reperiuntur, maiora sunt, & cartilagine quædam incrustata: quæ licet solidiora existant, tamen intus fungosa sunt, ac meatibus plena, in quibus succus quidam medullosus nutrimenti gratia conseruatur. MATHETES, Cùm digitorum men-

Digiti.

tionem feceris, quot numero naturaliter esse solent, & quo nomine singuli nuncupantur? GERON, Quinq; : quorum primus & maximus græcè *ἀνίσχης*, Hippocrati *μέγας*, nobis pollex dicitur: quod scilicet tantum polleat, quantum alij omnes quatuor, vel tota manus. secundus illis *λίγανος*, nostris index vocatur. tertius Græcis *μέσος*, quod medium locum inter omnes obtineat. quartus *παράμεσος*, quod medio vicinus sit, vel *ιατρικός*, hoc est, medicus appellatur, Latinis annularis, quod veteres in eo annulos gestarint. quintus à paruitate, Græcis quidem *μικρός*, nobis autem minimus, & auricularis vocatur. MATHETES, Quot ossibus sin-

Digitorum ossa.

guli digiti constant? GERON, Tribus, quæ Græci *φаланγας*, *κνυδύλους*, & *συνσπλινδας*, nos acies, internodia, & articulos nuncupamus. In vniuersum igitur omnia digitorum ossa quindecim numerantur, aut quatuordecim, si primum pollicis articulum à secunda manus parte, quam *μυοκαρπὸν* appellant, disungamus. MATHET. Qualia tandem sunt? GERON, Dura ac densa, non tamen prorsus solida, vt quæ singula sinum oblongum, ac insignem cavitatem medullæ conseruandę gratia comparatam, non minus quàm secundæ manus partis ossa, habeant. MATHETES, Cur DEVS non plures, aut pauciores digitos condidit? GERON, Vt omni figuræ comprehendendæ essent idonei: imò digitos ideo etiam extrinsecus omnino gibbos fecit, vt ab iniurijs essent tutiores: intus autem, et in lateribus depresso, sinuososq; vt facilius terere, subigere, & apprehendere possint. pollicis autem os hinc excipias, quod vt primæ manus partis ossa, intus gibbum acutumq; existit. MA-

Cur digitorum ossa crassiora, & spissiora, quàm longiora.

Digiti inter se inæquales.

THETES, Quare digitorum ossa suprâ infraq; crassiora & spissiora, quàm longiora existunt? GERON, Vt pondera molesq; firmius comprehendant. MATHET. Cur digiti magnitudine inter se non sunt æquales? GERON, Vt ipsorum extrema inflexione ad æqualitatem commodius perueniant, vel tum maximè, cùm magnam aliquam molem comprehendimus. ideo etiam articuli primi, secundis sunt minores, & hi tertijs, qui omnium sunt minimi. MATHETES, Simplicemne ossa hæc formam representant? GERON, Nequaquam, sed duplicem: quia in vna, articuli omnes conueniunt, in altera discrepant: vltimi verò communem habent. quæ verò parte illa secundæ palmæ parti annectuntur, cava sunt: quæ autem internodia existunt, articulari connexu mutuo coeunt. Superior duorum ordinum pars rotunda, interior nec planâ, nec incuruata, sed media existit. Externa ossa in quibus ungues incipiunt, rotunda cernuntur, præterquàm internodia: in nonnullis paulò depressiora, & leuiter plana. Interiora inaq; cuiusq; digiti ossa in verticem sinuantur, excipiuntq; exteriorum exigua tubercula,

Ordines digitorum.

- tula, & nervis ea continent, à quibus orti vngues indurefcunt.
- MATHESES, Quo in loco ossa illa minuta sesamina consistunt?
- GERON, Primum in secundo pollicis articulo interiore: duo, quàm
 5 primum os secundo committitur, vtcunq; rotunda & solida, pri-
 moq; illius ossi incumbunt: pars eorum depressa, leuiter sinuata,
 & cartilagine obducta est. Totidem in primis reliquorum digi-
 torum internodijs deprehendimus, tantò pollicis articulo mino-
 ra, quantò propius ad paruum digitum accesserint. Illius enim pri-
 10 mo articulo minima, & quodammodo cartilaginea connectun-
 tur. præter hæc vnicum quandoque in senibus, tertio pollicis ar-
 ticulo interiori adheret, nonnunquam adeò exiguum in singulis
 digitorum secundis & tertijs internodijs os delitescit, vt vix de-
 prehendi queat. atq; ita superiores cadaueris ossi partes ordina-
 15 tæ sunt. MATHESES, Quare te obsecro, vt inferiores quoq; ea-
 dem breuitate & ratione interpretari digneris. GERON, Ima spi-
 na, quæ os sacrum continet, in grande aliud, transuersum, longè
 valentissimum vtrinq; definit, cui toti nullum nomen inditum
 est, eoq; Oribasius *ἀνασφυρόν* appellat: à membrorum autem ad quæ
 20 pertinet, vicinia appellationem sortitur. Nam quàm latum est,
 nempe suprà, & posterius, vbi sacro ossi committitur, Græcis
λαγύραν ὀστέον, nobis ILIUM os dicitur: ab exteriori parte gibbum
 ad spinam resupinatum. quàm autem femora excipit, coxa, Græcis
ἰσχίον. priore parte, qua vtriusq; lateris os tenue, ampliterq; perfo-
 ratum cartilagine committitur, pecten vocatur: vbi super intesti-
 25 na transuersum ventrem format: rectius quidem in viris: recur-
 uatum magis versus priorem regionem in fœminis, ne partum
 prohibeat. MATHESES, Continuumne amplum hoc os esse so-
 let? GERON, Plerunq; sed in tenera adhuc ætate tres eius partes
 certis limitibus omnino sunt circumscriptæ. nam omnes simul in
 30 coxarum sinu cartilagine connectuntur. vbi verò hæc indurefcit,
 tria illa ossa difficilius discerni: imò nulla ratione præterquam
 putredine, coctura, aut vi dirimi possunt. MATHESES, Quàmnam
 figuram situs ratione obtinet, siue continua, siue tripartita exi-
 stat? GERON, Ilium os amplissimum est, intrinsecus peluis cu-
 35 iusdam modo cauum, quo commodius vulua, præsertim dum
 fœtum gestat, vesica & intestina recumbant: item asperum, inæ-
 quale, & insigniter crassum, sicut etiam alia ossa quibus connecti-
 tur: adhæc longius, quàm sacri ossis processus transuersi, latiusq;
 exporrigitur, vt varijs musculis sedem præbeat. MATHESES,
 40 Quomodo cum osse sacro cohæret? GERON, Tubera Ilium os-
 sis superficialijs duorum, aut nonnunquam trium transuersorum
 sacri ossis processuum sinibus excipiuntur: quemadmodum ho-

*Ossa sesamina
quo in loco con-
sistant.*

*Ilium os propriè
dictum quod sit,
& quale.*

Coxa.

Pecten.

*Ilium ossis figu-
ra & vñs.*

rum rursus tubercula illius sinibus respondent, sicut etiam oblongus transuersum sacri ossis processuum sinus, longum Ilium ossis tuber appositum excipit. Contrà, prior transuersorum processuum sinus, pars admodum protuberans, amplos quoque Ilium ossis sinus priore sede ingreditur. **MATHESES**, Ilium os eandemne semper crassitiem ubique retinet. **GERON**, In ima sinuum iam dictorum parte, gladii modo acutum apparet, ut transuerso ossis sacri vertebræ processui superficie respondeat: in posteriore autem regione versus dorsum, oblongam sacri ossis veluti spinam in processuum sinibus, non breui etiam sinu ad amussim recipit. at duobus processuum sinibus, ad posteriorem spinæ ipsius partem sitis, & tuberculo in medio illorum prominenti, non item. **MATHESES**, Quamobrem? **GERON**, Quia non adeo ampliter protuberat, ut processuum illorum sinus altè penetrant. **MATHESES**, Ilium os sacrone admodum arcè connectitur. **GERON**, Non adeo, sed copiosa cartilago ligamenti naturam referens intercedit, totum interuallum, quo ossa inuicem dehiscunt, adimplens. **MATHESES**, Quid præterea amplum hoc Ilium os eximium habet? **GERON**, In ambitu semicirculi modo rotundum est, & in media eius amplitudine quodammodo gibbum: necnon appendicem ibi asperam inæqualemque representat, quam veteres spinam illius appellant. hæc autem in utroque latere interno & externo comprimitur, partim ut præcipua obliqui abdominis musculi pars illinc oriatur. **MATHESES**, Quid de COXA ais, quam Ilium ossi continuam esse dixisti? **GERON**, Os hoc crassius validiusque est, ut vniuersum corpus vni innitens cruri, fortius sustineatur. **MATHESES**, Ergo etiam sinum habet? **GERON**, Adeo altum, ut nullum os aliud, quem Græci *οστόλλω*, nos acetabulum vocamus. verum is priore parte altior quam in reliquo eius ambitu, asperque & cæcis quibusdam foraminibus plenus existit: idque nulla alia de causa, quam ut ligamentum procreet, quod intus in femoris capitis cervicem inseritur. **MATHESES**, Supercilia eius sinus eadem ubique apparent? **GERON**, Tam antè, quam posterius extant, eò quod sedentibus femur magis angustum flecti, quam stantibus, aut aliud quid agentibus extendi, aut retrorsum agi oporteat: inferius autem non continuè rotunda, sed per interualla intermittunt, ut exili venæ in asperum hunc, nullaque cartilagine obductum sinum, via pateat, quæ articulo alimentum suppeditet, unde viscosus humor ibi copiosus colligitur, cuius beneficio ille facile mouetur, agilisque euadit. **MATHESES**, Cum acetabuli supercilia, non vndiquaque sibi respondeant, quomodo articulus ei insertus, à luxatione tutus esse poterit? **GERON**, Validum cartilagineumque liga-

*Coxarum ossis
figura.*

Acetabulum.

*Quid acetabuli
luxurari probi-
bet.*

ligamentum in orbem supercilijs circumdatum est, quod magis quàm illa sinum adhuc adaugēt. **MATHETES**, Aliusne etiam sinus in hoc osse cernitur? **GERON**, Vtq; inter priorem Ilium ossis, vbi hoc sacro committitur, & posteriorem coxæ regionem.

Sinus alterius acetabuli vsus.

5 **MATHETES**, In quem vsus? **GERON**, Vt neruo inter eos qui crus adeunt, quarto, ex pluribusq; composito, & maximo viam præbeat. **MATHETES**, Quid præterea in coxarum osse notatu dignum habetur?

Processus coxarum.

GERON, Processus acutus, qui ligamentum ad os sacrum pertinens, educit: item sinus in posteriore eius internaq;

Sinus coxarum.

10 regione subiectus: præterea appendix inferius, cui sedentes innitimur, ampla crassaq; tum roboris, tum musculorum ibi oriuntium gratia. **MATHETES**, Video hæc ita, vt dicis habere, restatne aliud quippiam?

Appendix.

GERON, Sinus in elatiore coxæ parte cernitur, ex quo ligamentum enascitur, quod os illud leue reddit & lubri-

Sinus in elatiore parte coxæ.

15 cum, femoris musculorum gratia. in vtroq; autem sinus huius latere tuberculum extat, externò quidem amplum, ne musculi hæc descendentes, ab illo declinent, prohibens: interno autem quod coxæ articulum confirmet. **MATHETES**, Quid de osse pectinis amplius habes?

GERON, In priore parte, dextra & sinistra cartilaginis interuentu commissum est: quanquam in prouectioribus ætate, cartilago in os degeneret. in fœminis singula hæc vtrinq;

20 ossa, non tam longa linea, vt in viris coniunguntur: sed inferius adeò distant, vt quæ regio inter extremum sacrum os, quod coccyx dicitur, & interiores coxas vacua existit, multò amplior in il-

25 lis, quàm in his occurrat: sicut etiam infernè vtriusq; coxæ partes, nempe dextra & sinistra longè magis dirimuntur: vnde constat, pectinis non vt coccygis ossa in partu disungi, dehisciq;.

MATHETES, Qualis essentia horum ossium existit? **GERON**, Suprà infraq; cæteris sunt tenuiora: quò autem magis ad medium accedunt, eò magis attenuantur, vsq; dum in amplissimum foramen

Ossa pectinis in partu non laxantur sicut coccygis.

30 desinant. superius committuntur sic, vt ad dextrum cum sinistro amplæ cartilaginis interuentu coalescat. Inferius autem foraminis latus teres est, tum roboris augendi, tum musculorum ei familiarium gratia. **MATHETES**, Qualis superior pectinis regio?

GERON, Aspera, vt recti abdominis muscoli inde oriantur, adhæc prior quoq; aspera est, vt secundi musculi tibiam mouentis, caput neruosum hinc enascatur. In hac etiam eminentia quædam

35 ab interiore coxa, ad pectinis commissuram vsq;, octauū femoris musculum producit. posterior pars acuta est, qua decimus femo-

40 ris musculus prodit. **MATHETES**, Quod os post istud sequitur? **GERON**, **FEMUR**, quod coxæ acetabulo insidit, ad crus vsq; pertinens, omnium corporis humani ossium, simul & longissimum,

Femur.

latissimum, & crassissimum, Græci *μηρόν* vocant. MATHETES, Putabam nullum os eo quod illa comprehendit, esse latius: cur femur dicis latissimum? GERON, Idem adhuc affirmo. etsi illium ossa, caluariæ & scapularum, femore sint latiora, & os sacrum multis illius partibus, tum latius, tum crassius, nullum tamen æquè longum vt femoris existit. MATHETES, Quæ alia eius figura est? GERON, Priore exterioreq; parte gibba, posteriore internaq; sima. quantum verò ad essentiam attinet, dura est, & medullosa. MATHETES, Quid in superiore parte habet peculiare? GERON, Caput rotundissimum, leue, & cartilagine obductum, quo in, sinum coxæ conficitur, eiusq; appendicem prælongæ ceruici ad interiora vergenti adnatam. idem hoc caput paulò inferiùs quàm vertex ipsius est, sinum arcum altumq; & inæqualem representat, cui ligamentum rotundum à coxæ acetabulo ortum validissimè inseritur. MATHET. Habétne processus? GERON, Duos exiguos. horum exteriorem qui maior est, Galenus à rotatione *προχωρητικόν*, alij à *μέγαλον*, alij à *γαστήρα* appellant: interiorem *προχωρητικόν* minorē. MATHE, Quid hi processus præstant? GERON, Musculos alios excipiunt, alios ipsi edunt. MATHET. Quale inferiùs apparet? GERON, Multò crassius validiusq; quàm supra, sicut columnæ etià bases ac spiræ crassiores quàm scapi, & capitula. Quare in maximos duos processus, quæ capita appellare possis, Græci vocant *κεφάλους*, distinguitur: prorsum magis, quàm posteriùs tendentes, quo faciliùs superiora membra sustineant. inter hos autem ingens altaq; cauitas vacua insidet. Adhæc inferiora ista femoris capita media sinuantur, quò faciliùs à cruribus excipi possint. At femoris & cruris commissura, osse paruo, rotundo, molli, cartilaginoso, intus cauernoso, & pumicis modo rarò tegitur, PATELLA mac molam Latini, *πτεροειδής* Græci vocant, quod etiam ad omnes crurum flexus iuncturam tuetur, & veluti tubercula subiectorum amplius sinibus comprehendit, paululùmq; intumescens, cauitatem, femur, & crus intercedentem complet: etsi nulli ossi inheareat, sed carne et nervis deligetur, paulò magis ad femoris os exporrectum. MATHETES, In posteriore femoris parte, quomodo capita hæc inter se habent? GERON, Plurimum inuicem distant, in eorùmq; spatio interposito sinus amplius, altusq; existit, modicè asper, nulla cartilagine obductus, qui asperum & inæquale cruris tuber excipit, maximòq; totius corporis nervo, simul & venæ arteriaq; in crus deducendis idoneus. MATHETES, Quid in lateribus capitum horum cruris, mentione dignum apparet? GERON, Multa foramina cæca, vnde validissima tria, & rotunda ligamenta articulum continentia pronascuntur:

- feuntur: vnum toti articulo exteriori: alterum interiori: tertium
 mediæ regioni exporrectum. MATHETES, Quémnam articu-
 lum colligant? GERON, Quo femur cum crure coarctatur, quem
 etiam genu iuncturam appellant. MATHETES, Quot ossibus
 5 crus constat? GERON, Duobus, nempe tibia, quæ Græcis *κνήμη*, *Crus.*
 barbaris focyle maius dicitur: & sura, quæ Græcis *ἰσχίον*, vulgò
 focyle minus, aut fibula vocatur. TIBIAMagnitudine humerum
 superat, qui aliàs Galeno omnium, excepto femore, maximus esse
 putatur. Cæterum duo hæc, suræ & tibiæ ossa inuicem colligan-
 10 tur: in medio autem dehiscunt, membranoso tantum ligamento
 connexa. Prior tibiæ pars Græcis *ἄνω κνήμη*, & *ἄνω κνήμη*, aliquan-
 do *κνήμη*: posterior *κάτω κνήμη* dicitur. quanquam hæc corpori car-
 tilaginoso potius quàm ossibus conueniat. ambo autem ybiq;
 15 propemodum triangula, præsertim per mediam ipsorum longi-
 tudinem apparent: atq; in tibia priore angulus valde est acutus,
 eoq; à nonnullis spina illius dicitur. In summa tres lineæ per hæc
 ossa exporrectæ, tres angulos constituunt. MATHETES, Quo-
 modo duo illa ossa inter se differunt? GERON, Tibia grandior
 20 crassiorq;: sura autem superius longè minor breuiorq;: inferius
 paulò tenuior, & mulò longior existit. MATHETES, Quid his
 ossibus adnascitur? GERON, Vtriusq; duæ appendices, nempe su-
 præ infraq; singulæ. MATHETES, Qualis superior tibiæ apparet?
 GERON, Crassa admodum lataq; ac in priore parte magis quàm
 posteriore deorsum portendit. MATHETES, Habéne appendix
 25 ista sinus? GERON, Duos oblongos cartilagine obductos, qui in-
 feriora femoris capita excipiunt, aspero inæqualiq; inuicem tu-
 berculo distincti, quod validissimum emittit ligamentum, genu
 iuncturæ constringendæ accommodatum. MATHETES, At su-
 ræ quam ad femur non ascendere dixisti, appendix superior, qua-
 30 lémnam sinum obtinet? GERON, Interno quidem latere non a-
 dedò cauum & amplum, cui externus tibiæ appendicis processus,
 leuissimè protuberans, committitur. MATHETES, Quales infe-
 riores tibiæ & suræ appendices existunt? GERON, Superioribus
 ferè similes. nam in tibiæ appendice amplissimus sinus, & quo-
 35 dammodo geminus conspicitur, vt qui medius tubere leuiter
 prominente, distinguatur, altiusq; ad latera illius penetret. MA-
 THETES, Quid inferioris tibiæ suræq; appendices, peculiare ha-
 bent? GERON, Singulæ processum extuberantem, foris gibbum
 excarnemq;, intus sinum, quem Græci *σφῆν*, nos malleolum vo-
 40 camus. Tibiæ verò appendix internum, suræ externum efficit,
 quem nonnulli perperam talum nominarunt, cùm hîc sub illo
 vtrinq; contineatur. atq; sic vndiquaq; contegatur, vix vt attingi

*Differentia tibiæ
& suræ.*

*Appendices quæ
tibiæ & suræ.*

Talus.

Pedis ossa.

possit. **MATHE TES**, Quæ ossa tibiam suramq; sequuntur. **GERON**,
 Pedis, vt **TALVS**, qui ἀσπάλῳ græcè dicitur; calx, quæ πῆλην vo-
 catur. scaphoïdes os, cubicum, & quæ primam illius partem; quæ
 ῥαπὸς vocatur, efficiunt, planta, & digiti. **MATHE TES**, Quale os
 talus est? **GERON**, Durum, medullæ expers, ad posteriora magis
 spectans, tessare lusoriae figura simile; in alijs autem animantibus
 teres propemodum, vnde etiam totus græcè πῆλος dicitur, quod
 lateribus quatuor, dextro, sinistro priore & posteriore constet.
 Nam pars eius superior, quam nonnulli solam sic appellant, in me-
 dio caua, vtrinq; superciliofa, trochileæ modo rotundiufcula: in-
 ferior admodum inæqualis est, vtpote ter extuberans, ac gibba,
 bis caua, cartilagine vbiq; obducta, posterior eius regio læuis &
 modicè rotunda, processum longum calci incumbentem sæpe
 exigit. adeò autem est accliuus, vt sursum potius quàm deorsum
 spectare videatur. **MATHE T**. Quibus ossibus potissimum com-
 mittitur? **GERON**, Priore quidem parte rotundo capite longa
 ceruice adnato, cum osse scaphoïde: vtroq; autem latere emi-
 nentijis exiguis, & subrotundis, in duos superficiarios tibie, su-
 raq; sinus recipitur, ligamentisq; connectitur, intus læuis. **MA-
 THETES**, Qualis CALX est, quam talo subijci dixisti? **GERON**, 20
 Omnium pedis ossium maximum, essentia talo simili præditum,
 quod partim processus duos ex talo recipit, partim tuber amplum
 illi immittit. inferius autem qua ingredimur, leuiter rotundum
 est, ac lariusculum, vt firmius incedamus: posterius quoq; simili-
 ter rotundum, & tibie rectitudinem excedit. è regione maximi 25
 digiti, Tali capitulo subiacet. quæ autem minimo digito respon-
 det, cum osse Cubico coarctatur, nulli alteri connexum. **MATHE T**.
 Habétne etiam calx sinum aliquem? **GERON**, Amplum, interiore
 parte sub pede fixum, per quem tendo transfuersus, tutò ad infi-
 mum digitum com meat. **MATHE TES**, Quodnam cubicum os 30
 appellas? **GERON**, Calci vicinum, gibbumq; foris, intus autem si-
 mum, iuxta id, os scaphoïdes situm: sed ita vt hæc duo mutuò se non
 attingant. Quippe inter talum, os scaphoïdes, cubicum & calcem,
 magnus intercedit sinus, quem musculorum extrema replent.
 Idem hoc cubicum os interna parte, qua paruum digitum respi- 35
 cit, gibbum habet processum, in eoq; sinum conspicuum, cui ten-
 do maximus iuxta sesamina pollicis ofsicula inseritur. **MATHE T**.
Os scaphoïdes. Quale est os SCAPHOÏDES? **GERON**, Quæ cum talo committi-
 tur, cimbæ modo sinuatum est: quæ verò cum tribus primæ pe-
 dis partis ossibus connectitur, gibbum. **MATHE TES**, Quot, & 40
 quæ illam constituunt? **GERON**, Tria ossa paruula, & cubicum
 hoc inferiori scaphoïdis parti, articulari modo connexa sunt. Ex
 his au-

- his autem primum alijs duplo maius apparet: secundum longē primo & tertio tenuius: tertium primō minus, secundo maius. cubicum primo adhuc grandius existit. **MATHESES**, Quenam alia pedis ossa restant? **GERON**, **PLANTAE**, quam Græci *πῆλον*, eō *Plantæ ossicula* quinq̃.
- 5 quod hac ingrediamur, appellant, quinq̃ cernuntur. nam primū pollicis os simul comprehendit, quod in manu non sit. **MATHESES**, Sūntne hæc quinq̃ ossa, vt in palma, ad digitos vsq̃ inuicem disita? **GERON**, Non modò figura, sed etiam structura, & articulari cum prima parte pedis & digitis connexu illis respondent.
- 10 quanquam capita superius magis gibba, crassiora, & longiora paulo habeant. **MATHESES**, At quomodo plantæ ossa, cū quinque sint numero, quatuor ijs connectuntur, quæ primam pedis partem, quam *πάρος* Græci vocant, efficiunt? **GERON**, Tria plantæ cum huius tribus coarctantur: reliqua duò cubico ossi connectuntur. Sicut autem palmæ & primæ manus parti articulo exteriori, ita quoq̃ plantæ, vbi quintum illud os cubico iungitur, aliud quoddam ossiculum apponitur. **MATHESES**, Quomodo hæc rursus digitis cohærent? **GERON**, Ad eorum quæ in manu sunt, similitudinem, nempe ex appendice in rotundum caput de-
- 20 sinunt, eòq̃ primi digitorum ossis sinum ingrediuntur. In summa plantæ palmis, digiti digitis respondent, excepto pollice, qui duplici tantum osse constare videtur: quanquam etiam ossa sesamina iuxta primum & secundum internodia, eundem vsū, vt in manu, obtineant. In reliquorum digitorum primis articulis, ob-
- 25 scura admodum: si prouectiorum ætate corpora fuerint, manifestiora: in secundis & tertijs rarissima existunt. **MATHESES**, Nulla alia re pollex pedis ab eo qui in manu est, differt? **GERON**, Nulla, nisi quod in pede os pollicis proximum, omnium sit longissimum, in manu verò, id quod medium est. Atq̃ hæc de ossibus succinctè & breuiter à me deliniata medicine candidatis sufficere videntur: de alijs autem ossiculis, vt in corde, naso, larynge & similibus, aliàs tractabimus: nunc ad ea digredi conuenit, quibus ossa inuicem colligantur, constringunturq̃. **MATHESES**, Ossium historiam satis iam intelligere videor: vnum te adhuc oro, vt
- 35 cū antea sæpe cartilaginis mentionem feceris, accuratiùs paulò explices, cuiusnam illa sit naturæ. nam mihi os propemodum referre videtur. **GERON**, Pars quædam est corporis similis ac simplex, media inter ossa & ligamenta. Nam osse tantò mollior, quantò ligamenti durior est, Græcis *χόνδριον* appellatur. Cæterum illorum modo alba est, leuis, molliter flexibilis, sensus & medullæ expers, nullis foraminibus, aut sinibus ossium instar intus peruia. **MATHESES**, Quos vsus corpori præstat? **GERON**, Pri-

*Plantæ palmis.
digiti digitis re-
spondent.*

*Pollex pedis quid
ab eo qui in man-
u est, differat.*

CARTILAGO

Cartilaginis vsus

mum vt velut os, partes subiectas suffulciat, vel illius vicem interdum subeat: deinde vt articulis incrustata impediatur, ne illi continuis, assiduiscq; motibus attriti, vitientur: tertio, vt in ossium commissuris, non ad motum constitutis, glutinis vice, sicut in pectinis connexu, intercedat. In alijs partibus, vt operimenta, & propugnacula obducitur, cum neq; frangi, neq; rumpi, veluti dura possit, neq; incidi, & contundi, quemadmodum mollia & carnosaf: idq; vt singulae partes, quibus adhæret, requirunt. MATHE-
TES, Variæ ergo cartilaginis sunt differentiæ. GERON, Sunt
Cartilagines an-
rium. vtiq; sicut etiam diuersa cognomina pro instrumentorum ratio-
ne. Aurium itaq; cartilago, quam Cicero durum & corneolum introitum vocat, mediocriter mollis est, complicata, ac promi-
nens, ne cerebrum iuxta situm, ab illis offendatur, quæ extrinsecus ei possunt incidere. Non dico, quod excipiendis continen-
disq; sonis accommodata, facilius eos intronitat. Quæ cartilagi-
nes oculorum palpebris subiacet, Græcis τάρσι vocantur, eò quod pilos serie quadam ipsis infixos, erectosq; semper contineant, quos Græci βλεφαρίδας, nos cilia vocamus. Cum autem bing vtrinq; supra & infra habeantur, superiores homini quidem maiores sunt, eisq; animantibus, quibus palpebræ superius extantes, 20 mouentur, inferioribus immotis: quibus verò secus habent, vt aubus ferè vniuersis, ijs inferiores superioribus maiores existunt. Ac in naribus tres cartilagines cernuntur, duæ quidem in priorem partem deorsum exporriguntur, inuicemq; coniunctæ, sensim molliores euadunt, ac iuxta extrema narium in ligamentum 25 cartilagineum degenerant. Tertia verò ab osseo narium septo foramine distinguente enascitur, mollis quoq; ac ligamenti naturæ compos, quæ internæ reliquarum sedi per longitudinem adhærescit. His tribus cartilaginibus aliæ duæ, vtrinq; singulae accedunt, quæ magis adhuc quàm aliæ ligamentorum naturam imitantur, & singula narium foramina orbiculatim constituunt. hæc, inquam, internis suis lateribus inuicem colliguntur, & alarum extrema integunt, solæq; motu pollent voluntario, qui per musculos extrorsum, non introrsum illa trahentes, vt dilatentur, perficitur, Græci eiusmodi alas πτερύγια vocant, inspirationi expirationiq; insigniter conferentes. MATHETES, Quales sunt aliarum corporis partium cartilagines? GERON, Vbi maxilla ossibus que ob duritiem à petra nomen apud Græcos inuenerunt, inseritur, præter cartilaginem, omnium ossium extremis communem, aliud quoddam corpus cartilaginofum occurrit, medio articulo interiectum, crassum, tenerum, & mucosa quadam, viscosaq; essentia refertum. Adhæc iuxta ossis, quod à græcalitera Y, ὕψος ap-
pellauit

Corpus cartilagi-
nosum articulis
interiectum.

Cartilago hyoidei.

- pellauimus extrema, vtrinque singulae habentur cartilaginee, styl-
 los figura imitantes, quae summae asperae arteriae musculorum
 tendines, confirmant. MATHETES, Quid vocas summam aspe-
 ram arteriam? GERON, Caput arteriae, quod GYTTVR Latini, *Arteria aspera.*
 5 *λαύσα* Graeci dicunt. MATHETES, Quot arteria & caput eius
 constat cartilaginibus? GERON, Tribus magnis. si verò diligen-
 tius consideres, non ex cartilaginibus simpliciter, sed osseis carti-
 laginibus, aut ossiculis potius quibusdam, praesertim in aetate fir-
 miore conflatum esse dixeris. Prima reliquas magnitudine supe-
 10 rat, priore parte sita, foris gibba, intus caua, praelongo scuto non
 rotundo, vndique similis, vnde Graecis *θυροειδής* dicitur, vulgò scu-
 talis, quod veluti clipeus aduersus externas iniurias obiecta sit;
 alias parum ad vocis modulationem utilis. In brutis autem, ma-
 xime bobus & porcis, superius arctior, inferius latior existit. Se-
 15 cunda, minor quidem prima; tertia verò maior, & magna ex parte
 in posteriore gutturis sede consistit, quae stomachus deorsum à
 faucibus descendit. haec perfecti magis circuli figuram, quam pri-
 ma absoluit, idque ima eius parte potissimum, nominis expers est,
 eoque Graecè *ἀσπονδής* appellatur. Tertia ad gutturis amplitudinem
 20 infernam conuersa est, & ab olearii vasis similitudine *δεϋροειδής* di-
 citur. atque eiusmodi ossea corpuscula, quae summam asperae arte-
 riae partem constituunt, Graeci *βερόγχια*, vt arteriam ipsam *βερόγχον*
 appellant. Locus autem asperae arteriae meatus circulis cartilagi-
 nosis constat, non integris & absolutis, sed literam Latinorum C
 25 imitantibus, Graeci à figura literae *ς*, *σπυροειδής* appellant, ligamen-
 tis membranosis contentos. Adhuc arteriae asperae incumbit par-
 ticula quaedam cartilaginea, non ossea, quae illam eleganter ope-
 rit, ne quid cibi, aut potus in ipsam defluat, Graeci ideo *πυλωίδια*,
 Latini ligulam vocant. eadem haec quae palatum respicit, gibba
 30 est, ac mollior: quae verò gutturi inmittitur, caua, sinuata, ac mul-
 to quam superiore parte durior: in extremo autem ipsius, quae sto-
 machum spectat, mollis admodum est, ac pingui obducta mem-
 brana, ligamenti naturam quodammodo referens. non autem est
 illa praecipuum, & peculiare vocis instrumentum, vt plerique fal-
 35 so opinantur. At asperae arteriae ductus sub iugulo desinit, ubi in
 duos ramos scinditur, & hi rursus in alios, atque etiam in alios:
 denique omnes in pulmonum essentiam disperguntur, aëris in-
 spirationi & expirationi inseruientes. MATHETES, Qualis carti-
 lago costis adhærescit, de qua superius nonnihil egisti? GERON,
 40 Thoracis quidem costae, quae pectori connectuntur, in rotun-
 dam ac flexibilem quandam cartilaginem degenerant, vt liberius
 moueri possint. spuriae autem in copiosam quoque cartilaginem

*Ligula.**Thoracis cartila-
go.*

terminantur, quò minus iniurijs sint opportunæ. MATHETES, In genu quocq; articulo, cartilaginis cuiusdam meministi: quid præterea de illa habes? GERON, Paulò post audies. hoc vnum adhuc te scire volo, nullam articulorum iuncturam existere; in cuius extremo non sit adnata cartilago, vt in spina, humeris, brachijs, scapulis, cubitis, manibus, coxis, femoribus, cruribus, & pedibus videmus. MATHET. De cartilaginibus & ossibus nihil amplius desidero, quàm vt deinceps edisseras, quæ vincula illa colligent, confirmentq; ne in tam varijs motibus disjungantur. GERON,

LIGAMEN-
TA.

Corpora simplicia ex semine concreta, ab ossibus prodeuntia, alba, exanguia, solida, nullo ferè sensu prædita, Græci *συνδίσμους*, Latini ligamenta nominant. non prorsus dura adeò, vt validè quidem ligent, motum autem impediane, sed mollia, vt facilè obsequantur, sic tamen, vt non rumpantur. Cæterum partim ab osse ad os, vt in articulis, partim in musculos transeunt, ex quibus si

*Ligamenta vera
in quas partes ter-
minantur.*

nerui admisceantur, tendines proueniunt. at quæ propriè ligamenta vocantur, ab osse ad os pertinent, quæ iuncturas articulorum, & internodia tantum ligant confirmantq;: tenuia autem & nervosa, paruorum ossium articulis seruiunt. Quæ porrò neruis mixta in musculos inferuntur, hos præcipuè contextunt. nam caro ossa ambiens vinculis fibrarum modo tenuibus adhærescit. MATHETES, Variant igitur inter se, quantum ex verbis tuis intelligo. GERON, Maximè, & primum ortu vt paulò antè admonui. nam alia ex solis ossibus in genu, humero, cubito, & reliquis articulis trahunt originem: alia ex solis cartilaginibus, vt in summa aspera arteria. Deinde essentia differunt. nam alia molliori magisq; membranosa constant, vt omnia quæ in orbem articulos ambiunt: alia verò dura sunt, & mediam inter ligamenta articu-

*Ligamenta inter
se variant.*

lorum & cartilaginis naturam, representant, quæ Græci *συνδίσμους*, quasi è neruis cartilaginosa ligamenta vocant, vt sunt generatim omnia, quæ inter ossa latent. Tertiò situ discrepant: quædam enim extrinsecus ossibus obducuntur, vt quæ molliora existunt: quædam inter ipsa, vbi se mutuò contingunt, vt cartilaginea propemodum vniuersa. Quartò figura differunt: hæc namq; prorsus lata, membranosa, & tenuia, vt quod inter cubitum & radium, secundum longitudinem exporrigitur, nonnullaq; alia. illa verò crassa sunt, & ex his quædam rotunda, vt quod ex secundæ vertebræ dente, in occipitis os procedit: quædam ampla sunt, & lata, vt tendinum in humeri articulo, quædam continua, & non perforata cernuntur. quædam foraminibus patent, vt instar annulorum aliquid transmittant. Postremò etiam partium quas connectunt, ratione variant. nonnulla enim

solas

- folas cartilagineas, vt in larynge & naribus, colligant: nonnulla tantum ossa, vt omnium ferè articularum. sunt quæ cartilaginem ossi connectant, vt in costis & pectore cernimus. alia aliam partem quampiam ossi, aut cartilagini committunt, vt omnes ferè corporis membranae. Atque hæc duabus semper partibus sunt communia: alia vni tantum ossi peculiaria censentur, vt exteriora cubiti ligamenta, ex quibus quinque transuersim ducuntur, vnum cubito radioque commune, non ad vnum tantum os refertur. MATHETES, Nihilne habent inter se commune ligamenta? GERON, *Ligamentorum communia.*
- 10 Vtique, nempe quod nullo, aut certè obscuro sensu prædita sint, ne propter crebrum motum, & continuum affectum indolescant. Ideo etiam ligamenta articularum, cum sicca natura sint, mucoso quodam lenioque humore, sicut etiam cartilagineas articularum, imbuuntur, ne celerius exiccantur. quæ autem cum nervis musculos ingrediuntur, ea ex illis nonnihil sensus accipiunt. MATHETES, Quem præstant usum ligamenta? GERON, Cum non vnus omnia sint essentia, varijs quoque modis corpori inseriunt: primum, vt ossa inuicem colligent, contineantque: deinde, vt partes subiectas muniant tueanturque, vt in primæ palmæ partis tendinibus videmus: tertio, vt ventriculi indumenta, his ipsis tendinibus extrinsecus in orbem quodammodo circundentur: quarto, vt musculos interstitij loco intercedant, durumque ossis modo renixum præbeant: quinto, vt musculis non exiguam portionem suppedient. In summa, crassa & rotunda ligamenta, quæ interna regione ab ossium capitibus medijs acetabulis inseruntur, in hoc præcipue constructa sunt, vt articulos vndiquaque tueantur, colligent, ac constringant, ne in validis multisque actionibus laxentur. membranosa autem, ac longa, vt illos in minus violentis actionibus, laxiores seruent, conuestiantque. At quæ ab aliqua ossis
- 25 particula prodeunt, extrinsecus, tendines potius, quam ossa iuvant, sicut id quod ex tibiæ extremo in calcem desinens, simul & tendines subiectos constringit, & ipsa ossa ligat. quæ autem ab osse orta in os non desinunt, nervis commixta per varias corporis partes oberrant, musculis subiectis communia. postremo, quod à pectine ad naturalia pertinet, solum ex omnibus cauum existit. MATHETES, Quid vocas tendines? GERON, Exiles nervorum & ligamentorum fibras, in vnum confluentes, sicut in musculorum extremis videre licet. Græci *τενόνες*, vel *δυνάμεις*, quasi dicas nervosas exilitates, vocant, de quibus postea, sicut etiam de
- 40 ligamenti & nervi vberius tractabitur: nunc ista tibi medicinæ nuper initiato sufficient. MATHETES, Cum nervorum memineris, dic amabo quidnam illi sunt, & quot illorum species. *TENDINES.*

NERVI.

*Nervorum differe-
rentie.**Sensum bi, motu
illi adferunt.**Motorij.*

RON, Partes similares, quæ sensum motumq; corpori tribuunt, à cerebro & spinali medulla, vt in processu audies, exoriantes. Dug autem eorum species habentur. alij namq; sensorij, vt ita dicam, alij motores appellantur. sensorij, quod sensum partibus suppe-
dicent, non autem eas moueant: atq; hi alijs nobiliores è cerebro, 5
partim ad oculos, aures, nares, & linguam perueniunt, essentia molles: partim ad viscera, nempe ventrem, iecur, intestina: partim ad dentes, & cutem propagantur. hi verò illis, etsi exiliores, tamen minus sunt molles. Motores vocantur, qui partibus corporis mouendis præcipuè destinati sunt. Caterum tactus etiam 10
sensum illis ministrant, essentia duri: quia longius ab origine sua recedunt. MATHESES, Vnde hi prodeunt: GERON, A cerebro & spinali medulla, & in singulos artus per vertebrarum foramina distribuuntur. At nervorum, sicut etiam venarum & artularum natura & officium, commodè satis percipi non potest, nisi partes 15
vnde oriuntur, & quibus communicentur, prius sint cognitæ & perspectæ. MATHESES, Quare te obsecro, vt reliquam corporis humani historiam partitionemq; quo cœpisti ordine, indicare aggrediaris. GERON, Id cras si DEO visum fuerit, in gratiam tuam facturus. nunc me ad cœnam conferam.

Ioannis



Ioannis Guintherij Ander-

naci Medici Clarissimi

DE MEDICINA VETERI ET NOVA

COGNOSCENDA, COM.

MENTARII PRIMI

DIALOGVS QVINTVS.

- 10 **M**ATHEVS, Gaudeo te, humanissime præceptor, ad-
esse, vt reliquas corporis partes mihi ostendas. GERON, *Internarum par-
tium corporis hu-
mani Anatome.*
Quamquam alij quidam, post ossa statim exteriores
corporis, mulculos, ligamenta, nervos, venas, & arterias: postre-
mò viscera, adipem, & glandulas indicare soleant: ego tamen post
15 illa interiores potius inspiciundas esse censeo. MATHEVS. Quam-
obrem? GERON, Primum, quia hæ tanquam dignitate & origi-
ne priores, nutrimentum, vitam, & sensum externis præbent; de-
inde, quia si vno in cadauere exteriores primum aggrediaris, in-
teriores à putredine & grauitate odoris, tandiu conseruari ne-
20 queunt, donec illæ absolutè perdiscantur. Sin autem corporum
suppetat copia, & interanea omnia fuerint cognita, modò à mu-
sculis & ligamentis incisionem, modò à venis & arterijs, modò à
nervis auspicari licet. MATHEVS, Tu pro tuo iudicio & volun-
tate structuram corporis humani pergas, explicare. GERON, Cor-
25 pus integrum trifariam, nempe in superiora, media, & inferiora
receptacula, vt caput, thoracem, & ventrem partiri soleo: sed ita,
vt quæ extrinsecus illud ambiant, partes nonnihil etiam attin-
gam. his enim adhuc integris interanea conspici, nequeunt. MA-
THEVS, Non dubito, quin rectè omnia sis administraturus, quæ
30 ad quaslibet partes cognoscendas pertinent: verum hoc te oro,
vt dum illarum sedem, positum, ordinem, figuram interpretaris,
etiam incidendi modum ostendas, quo instructus, meo quoque mar-
te & industria, interdum corpora aperire possim. GERON, Faci-
am id libenter, sed paucis, & quantum possum apertè, ne remper
35 se difficilem & obscuram, nondum exercitatis adhuc, reddam ob-
scuriorem.

Incisionis ordo.

*Corporis humani
partitio.*

- Commune igitur omnium corporis partium tegumentum,
in primis hac parte inspicendum est, quod græcè *derma*, eò quòd
excoriari possit, nobis Cutis, in alijs animantibus corium, appel-
40 latur: temperamento, duritia, & mollitie media, quamuis non
planè exanguis, vt nervus, nec sanguine prædita, vt caro: sangui-
nis tamen, spiritus vitalis, & sensus compos est, eò quòd vena-

CUTIS.

rum, arteriarum, & neruorum tenuissimorum, à subiectis partibus ad ipsam excurrentium, sit particeps. MATHETES, Estne similis in omnibus partibus? GERON, Nequaquam. nam quæ internam manum vestit, sola inter vniuersas mediocritatem temperamenti, duritiæ, & mollietis obtinet, nisi labore callosior euaserit, & plurimæ neruorum fibræ in eam propagentur, sicut in verticis cutem paucissimæ. Porro ipsa in plantis pedum, & capitis vertice durior, in facie mollior & tenuior existit: non autem æquali in omnibus modo. MATHETES, Continuumne & perpetuam texturam cuticula vndiq; habet? GERON, Vtiq; nisi quod in palpebris, naribus, auribus, ore, ano, pudendis, & circa ungues perforata sit: nec non vbi naturales meatus, fuliginosiscrementis expellendis, pilisq; educendis dicati extant: vnde etiam alibi pilosa apparet, vt in capite, alis, naturalibus, & mento, si vir est: alibi glabra, vt in manu interiore, & planta pedis. MATHETES, Similiternè etiam vbiq; subiectis adhæret? GERON, In vertice, fronte, & tota propemodum facie cōnita est: in manu autem, & pede, spinæq; connata: in labris & ano, commixta: in reliquis corporis partibus, appensa, vt membratim singula in processu condiscas. MATHETES, At cutis de qua agitur, conspectui ne est obuia? GERON, Nequaquam: sed externa illius superficies, & veluti efflorescentia, quæ Græcis *Ἰνδερῆς*, Celso pellicula summa, nonnullis cuticula vocatur: ea interdum per ignem & aquam ardentem adusta, in scabie, aliæ de causa à cute interna recedit, prompteq; contra illius modum & naturam, renascitur. MATHETES, Quænam cuti proximè subiacent? GERON, Primum sanè pinguedo, seu adeps, præsertim in corporibus natura frigidis: deinde membrana admodum valida, & crassa, pertinacissimè in omnibus illi committitur: postremò abdomen, quod Græci *Ἰντὴρ* appellant, octo musculis comprehensum, de quibus ordine dicitur. MATHETES, Quomodo musculi membranæ, & hæc pinguedini (si adest) cutiq; adhæret? GERON, Fibris quibusdam raris, ac araneorum modo subtilibus. nam plurimæ quidem venæ, paucissimæ autem, tenuissimæq; arteriæ ad cutem nutriendam, & neruorum propagines ad sensum communicandum, membranam permeant. MATHETES, At membrana hæc, in omnibusne partibus sibi responderet? GERON, In ceruice tota, fronte, & capite ipso, carnosius auctior fibris, crassiorq; apparet: imò adeò carnosæ, vt musculi naturam representet. quanquam in externa etiam ventris regione, hanc Arabes membranam carnosam, barbari panniculum carnosum, pro carnosâ pellicula appellant, quæ in emaciatis tantum, aut gracilibus corporibus conspicitur.

Cutis continua.
Cutis perforata.

Cutis pilosa vbi.
Glabra.

Connata.
Connata.
Commixta.

Pellicula summa

ADEPS.

MEMBRANA

ABDOMEN.

Pellicula carnosâ.

- titur: in obæsis autem & cræsis, adeò confusa est adipi, vt nulla prorsus appareat. MATHETES, Quare adeps inter cutem, & membranam generatur? GERON, Quia plurimum sanguinis ob vasorum transitus, illuc refudat, qui ob frigidam membranæ naturam, & caloris inopiam concrefcit gelascitq: ac ideo frigidioribus natura copiosior, calidioribus pauca, aut nulla nascitur. nullis autem aliarum partium membranis obducitur, vtpote inutilis ac noxia, præterquàm quòd manui pediq: summo, extrinsecus modica admodum, natibus autem copiosissima, puluini instar subsit. MATHETES, Quomodo in cute incisionem ordiar, vt quæ sub ea latent, in conspectum veniant? GERON, Vbi tres ventris regiones, summam, mediam, & imam, nec non vtraq: illius latera consideraues, quæ nostris præcordia dextra, & laua, Græcis autem, quòd sub costarum cartilaginibus incipiant, *Χορδία* nominantur, lineam orbicularem, in vmbilici ambitu, acutius scalpello duces, sed non latius, quàm vt cutem penetret: mox à pectoris osse alteram, quæ ad vmbilicum rectà pertingat: deinde tertiam, quæ ab imo vmbilico ad mediam pubem, vbi naturalia inchoantur, excurrat: in fœminis autem pectinem, inter vulgæ ceruicis colliculos, non nihil excedat: postea transuersam lineam duces ab vtroq: vmbilici latere, quæ ad lumbos vsq: procedat, cura semper adhibita, ne interiùs quàm cutis est, scalpellum adigas, quod sanè in obesioribus facilius, quàm in emaciatis & tenuibus, obseruari potest. Porro lineis in hunc modum ductis, cutem hamulo, aut vnguibus attolles, acutissimoq: scalpello ab adipe discernes, inferiore illius partem ad coxas, superiorem versus deorsum reijciens. MATHETES, Quid obseruandum putas, vbi cutis ab adipe fuerit liberata? GERON, Neruulos, venas, arteriasq: exiles, qui super membranam in adipe prorepentes, cutem adiungunt. MATHETES, Qua ratione adeps à membrana seiungi debet? GERON, Qua cutis ab adipe, cauens, ne membranā cum illa simul, per imprudentiam auferas, eorum more, qui membranam in homine reperiri negant. MATHETES, Adipe ablata, quomodo membranam à subiectis musculis separare conuenit? GERON, Vbi scalpello membranam, leuiter ad musculos vsq: diuiseris, & digitis hinc inde per incisionem abegeris, statim illa à subiectis liberatur, sicuti bobus, vitulis, ouibus, leporibus, & hœdis cutem, imò membranam cum cute auferri cernis, quam auulsionem, nos excoiationem, Græci *ἰσχυρὴν* nominant. MATHETES, Quinam, & quales sunt abdominis musculi? GERON,
- Præquam eos aggrediar, considerandum existimo, naturam triplicia in corpore instrumenta condidisse: quædam prima

Adeps inter cutem & membranam nascitur.

Inciso quomodo in cute ordiendus.

Cutis ab adipe quomodo scirienda.

Adeps à membrana qua ratione seiungenda.

Membrana à musculis quomodo separanda.

ABDOMINIS
MUSCULI.

ratione ad alimentum concipiendum elaborandumq̃, & in totum corpus deferendum: quædam secunda, quæ excrementorum sunt receptacula: quædam tertia, quæ horum excretionibus seruiunt, cuiusmodi sunt, cum alijs, tum abdominis muscoli: quatuor sanè obliqui, duo recti, & totidem transuersi. Primi duo in vtroq̃ latere obliqui: vnus à costis exorians, versus Ilium ossa tendit: alter ab Ilijs procedens, ad costas emergit: ac ambo sibi inuicem incumbentes, fibras quoq̃ contrarias, ad similitudinem literę Gregorum X, se mutuo intersecantes extant, ac vulgò descendentes ideo vocantur, quod è superioribus partibus oriuntur, ad inferiores desinant: obliqui verò ideo, quod talibus sint fibris præditi: aliàs lati admodum, sitiq̃ ad latera. MATHESES, Quinam musculi recti existunt? GERON, Qui vtroq̃ latere fibras secundum corporis longitudinem obtinent. MATHESES, Qui transuersi? GERON, Qui vtrinq̃ fibras secundum corporis latitudinem expansas representant, nullo autem obliquo ductu feruntur. MATHESES, Qui musculi inter omnes hos commemoratos, primi occurrunt? GERON, Qui à costis inferius descendunt, hoc est, obliqui superiores, alijs omnibus incumbentes. MATHESES, Vnde hī suam habent originem? GERON, Ex sexta, septima, octaua, & nona costā, manus plæruncq̃ instar amplam, carnosamq̃, sed tenuem, elatiori thoracis musculo, & ei qui brachium admouet, coherentes: paulatim autem in latam, neruofam, membranofamq̃ degenerant, quæ reliquę Ilium ossis appendici, & pectini annectitur. MATHESES, Vbi musculi isti finiunt? GERON, In medio abdomine, à mucronata scilicet cartilagine, vsq̃ ad os pectinis rectā vergentes, vbi candida cernitur linea, iuxta quam tendines musculorū, vnā cum obliquis ascendentibus, & transuersis committuntur. MATHESES, Vnde inferiores obliqui musculi oriuntur? GERON, Ex ossis Ilium, sacri, & lumborum vertebrarum spinis, membranosī, in processu carnosī paulatim augentur fibris, nutriunturq̃. atq̃ hic qui sursum carnosī ascendunt, illos qui descendunt vtrinque integunt, & quatuor inferiorum costarum finibus inseruntur, neruoso exiliq̃ tendine præditi, qui inter rectos musculos ei subiectos, et membraneum superioris obliqui musculi tendinem, mediam regionem intercedit, pectiniq̃ & mucronatę pectoris cartilagini, inseruntur: ambo autem singulis vtrinq̃ tendinibus, sic priore loco vniuntur, vt toti propemodum abdomini tegumentum præstent. adeò verò valide superiores, inferioresq̃ musculi, super abdomen adnati videntur, vt quatuor ipsorum tendines, in vnum coalescere putes, nisi accurata sectio, & librarum diuisio, duos vtrinq̃ haberi, indicarent. Ascendens porrò vtrinq̃ tendo,

Musculi recti.

Transuersi.

Obliqui.

Obliquorum musculorum superiorum origo & finis.

Musculorum obliquorum inferiorum origo & finis.

- tendo, vbi rectis musculis occurrit, in duos scinditur: quorum alter supra illos, alter sub ipsis incedit, mirabili naturæ industria. Tandem autem tendines isti rursus vniuntur, vbi linea candida apparet, & nervosis quibusdam partibus rectorum musculorum
- 5 adhærescunt, finiuntq; eo modo, quo ascendentes. *MATHESES, Quis vsus obliquo-
rum est musculorum, tum descenditum,
tum ascenditum?* GERON, Vt intestina constringant, & costas deorsum trahant, quò thorax dilatetur. *MATHESES, Vbi recti
musculi reconduntur, & vnde procedunt?* GERON, Sub obliquo-
- 10 rum tendinibus, singuli ex medio pectine duplicem trahunt originem: vnam quidem superiorem interioremq; carnosam; alteram inferiorem, & exteriorem nervosam. Interdum dextrum sinistro pectinis ossi, sinistrum dextro inferi aduertimus. Hinc rectà sursum contigui ad vmbilicum vsque porriguntur. Ibi
- 15 autem nonnihil inuicem distantes, amplioresq; paulò ad pectus vsq; feruntur, eiq; ad latera paululùm, supra mucronatam cartilagine[m] lati & carnosi inferuntur, tendinis expertes: imò per longitudinem tales existunt, sicut etiam in primo ipsorum exordio. *MATHESES, Quales fibras per longitudinem ipsorum
obtinent?* GERON, Non quidem simplices, sed varias singuli de-
- 20 scriptiones, transuersas & incuruas repræsentant, quæ alba linea exprimuntur, quasi diuersi in ipsis musculi contineantur, atque obliqui illis adhæreant. *MATHESES, Quem vsum recti musculi
præstant?* GERON, Priora abdominis constringunt, magis autem
- 25 thoracem deorsum trahunt, vt supra dilatari possit. *MATHESES, Vnde transuersi musculi emergunt?* GERON, Ex transuersis lum-
- borum vertebrarum processibus, tenues membraneiq; in processu autem fibris adaucti, carnosiores multò superioribus, lijs, & mendacium costarum finibus annascuntur. Quemadmodum
- 30 verò musculi hi fibrarum accessione carnosi facti sunt, ita rursus in priore parte ipsis destituti, in latos tendines membranæ, quam Græci *σπλην* vocant, contumaciter adhærentes, desinunt: non autem æquè, vt obliquo-
rum, latos. nam illi sub rectis, præsertim iuxta pectus nonnihil carnosi existunt. *MATHESES, Quis horum
etiam vsus est?* GERON, Vt abdomen comprimant, & præcordia
- 35 astringant. Hic autem notandum est, musculos tum obliquos vtrosq; tum transuersos perforatos esse, primùm iuxta vmbilici regionem, deinde propè os pectinis. ac per ea foramina descendunt vasa, semini testibus præparando dicata: ascenduntq; ea que
- 40 semen deferunt, & in glandulas parastatas tandem inferuntur: atq; per eadem foramina ramices siue herniæ fiunt. solent ipsa in foeminis quoq; inueniri. *MATHESES, Nunc musculorum horum*

*Musculorum obliquo-
rum vsus.**Musculorum re-
ctorum origo &
finis.**Musculorum si-
bra.**Musculorum re-
ctorum vsus.**Musculorum trans-
uersorum origo.**Musculorum trans-
uersorum vsus.*

Musculorum incidendorum ratio

Linea candida rectos musculos distinguens.

Musculorum obliquorum abdominis administratio.

incidendorum rationem edoceas. GERON, Vbi membranam musculis singulis peculiarem, leuemq; et fibrosam, vnguibus hinc inde auulseris, linea candida notari debet, quæ à mucronata cartilagine per medium vmbilicum, ad pubem vsq; procedens, rectos musculos distinguit. ideo autem illis quæ eam ambiunt, candidior apparet, quòd nulla ei caro subiecta sit. MATHETES, Quare hanc intuendam præcipis? GERON, Quia iuxta huius candelæ, membranosi obliquorum musculorum tendines coeunt, rectis incumbentes. MATHETES, Hincne incisionem ordiri placeat? GERON, Quidni: cura autem adhibenda est, ne dum cutem iuxta lineam hanc diuidis, ea quæ subiecta sunt, conuulneres: non altius scalpellum adigas, quam vt obliquorum tendines rectis insidentes, illicq; coeuntes penetret: deinde superioris oblique descendētis musculi tendinem hamulo attolles, ac à subiecto ad dorsis spinam vsq; liberabis. Post hunc, inferioris oblique ascendētis musculi tendinem, à recto separabis, ab alba quoq; linea exorsus: ac videbis hîc, quomodo ille transuersis recti musculi inscriptionibus annascatur, ac cum neruoso, tenuiq; transuersi musculi tendine, iuxta externum musculi recti latus, coalescat. MATHET. Quomodo tu obliquos incidere consueuisti? GERON, Primum superiorem abdominis musculum dextrum, & oblique descendētem, à costis vnde incipit, exiguo scalpello ad medium vsq; pectinem, cui inseritur, ita liberaui, vt nihil eorum quæ subsunt offenderem: paulatim autem illum ab inferiore, qui oblique ascendit, ad medium abdomen vsq; separavi, curam adhibens, ne exilem musculum, qui ad decimam vndecimamq; thoracis costam, cum obliquo committitur, & tunicam seminaria vasa integrentem, violarem. quanquam adeò cautè ac prudenter fieri nequit, vt iuxta lineam, de qua iam dixi, coeuntes amborum vtrinq; musculorum tendines integros seruare potuerim. MATHETES, Quid ergo deinceps agendum erit? GERON, Primum superiorem musculum obliquum, à media recti amplitudine reflectes, suspensumq; tenebis: deinde inferiorem aggredieris. MATHETES, Quomodo? GERON, A pectine, illium osse, lumborumq; vertebris, & quatuor inferiorum costarum finibus, leui sectione dirimes: ab illo, qui decimæ, & vndecimæ costæ, potissimum respirationis gratia inseritur, abstineas. Postea musculi huius obliqui principia hamulo, aut vnguibus attolles, & in priora procedens, à transuerso, cui insidet, imò pertinacissimè coheret, liberabis: maximè autem vbi recti musculi supra vmbilicum inuicem separantur, & ad externum eorum latus. MATHETES, Cum iam superficialium dextri lateris obliqui musculi tendinem, deinde interiorem sub ipso, à rectis

rectis musculis, & tranſuerſis ſeparaueris, ac vtrunq; vtriq; conne-
xum oſtenderis, rectorum muſculorum inciſionem aggredere.
Sic enim totum opus clarum euadet, & nihil confundetur, muſcu-
lis ſimul cum neruoſis, tenuibusq; ipſorum tendinibus diſtinctis.

5 Nam ſi tendo à carne fuerit auulſus, vix ipſum poſtea ſeparare
poteris, vt ijs, qui rectos primùm incidere ſolent, uſu venit. MAT-
HETES, Si recti obliquis ſubiacent, exponas nunc, quo pacto
ipſos incidere conueniat. GERON, Ex rectis muſculis vtrum ve-
lis, dextrum, aut ſiniſtrum, vel ambos ſimul hamulo eleuabis, dex-

*Muſculorum re-
ctorum abdomi-
nis adminiſtratio*

10 træq; manus digitis externo latere, ad abdominis longitudinem,
ſubter huc illuc iniectis, à tranſuerſorum tendinibus liberabis:
deinde eos à thorace ſeparatos, ad pubem uſq; detrahes, ibiq; ini-
tia ipſorum diligenter examinabis. MATHETES, Quid in muſcu-
lis hiſce rectis ita ex abdomine auulſis, inſpiciendum cenſes? GE-

15 RON, Primùm circumscriptiones illas ex diuerſis fibris conſta-
tas: deinde venas, & arterias: quæ partim ex vaſis ad crura ten-
dentibus, in muſculos hoſce interiùs propagatæ ſuſum: partim
à glandio ortæ, per thoracem ad præcordia deorſum, feruntur,
mutuiſq; inuicem extremis coeunt: per quæ potiſſimùm mamil-

20 lis cum vtero eſt communio, vt ſuo loco dicitur. Poſtremo ner-
uuli quidam eodem in loco obſeruari debent, illorum ſoboles,
qui mendacium coſtarum interuallis inſeruntur, & à lumborum
vertebris in ipſos rectos muſculos, variè diſpenſantur. MATHE T.

*Tranſuerſorum
muſculorum inci-
ſio.*

Quomodo tranſuerſi muſculi tractandi ſunt? GERON, Iuxta albę

25 lineę longitudinem, ſcalpellum non altiùs adiges, quàm vt ner-
uoſum, tenuemq; illius tendinem penetret, arteria quæ ſub eſt, il-
læſa. Nam muſculi hi, membranofis tenuibusq; tendinibus adeo
peritonęo obhereſcunt, vt pars eius videri poſſint, niſi fibræ ip-
ſos percurrentes, diſtinguerent. Alij à peſtine exorſi, per Iliã tranſ-

30 uerſos lumborum vertebrarum proceſſus, aut potius per muſcu-
los ſpinam huc mouentes exterius, uſq; ad mendacium coſtarum
terminos inciſionem moliantur, quæ etiam ſubiectam ipſius
membranam penetret. MATHETES, Quæ corporis pars poſt
muſculos iam commemoratos occurrit?

35 GERON, Membrana cuius nuper memini, ſubtilis inſigni-
ter, latis, & continuis aranearum telis ſimillima, ex numero ſim-
plicium & ſimilarium partium: Gręcis ea περιτονάιον, vel περιτονάιος ὑ-
μῶν, vel περιτονάιον ὀστέον, vel περιτονάιον σπένσμα dicitur: Latinis etiam
PERITONAEON vocatur: Arabibus & barbaris Ziphac, quod ven-

*PERITO-
NAEVM.*

40 triculo inteſtiniſ, omento, meſenterio, iecori, lien, renibus, veſi-
cæ, vtero, & vaſis omnibus, quæ inter ſeptum tranſuerſum, &
crura habentur, veluti inuolucrum obtendatur: unde etiam duæ

*Peritonæi regio-
nes.*

*Peritonæum vnde
desumat origi-
nem.*

*Peritonæum qui-
bus connectatur.*

*Peritonæum
quale.*

*Peritonæum du-
plex.*

*Peritonæum ubi
peruium.*

tunicæ, vtero & vesicæ attribuantur, quibus vna tantum est pro-
pria: ventriculo autem & intestinis tres: quibus duæ solum pecu-
liares existunt. Ac sedes ipsius peritonæi in corpore supino, quod
incidendum suscepisti, aliæ sublimes, ut supra vmbilicum, mus-
culosq; indidem, & præcordia habentur: aliæ humiles & demis-
sæ in imo iuxta spinam, & prope os sacrum vsq; ad coxas, pubem-
que consistunt. **MATHESES**, Vnde peritonæum trahit originem:
GERON, Ex ligamentis, quæ tum lumborum vertebrae, tum os
sacrum & illa inuicem connectunt. hinc enim procedens, omni-
bus supradictis partibus circumtenditur, & lumborum musculis
incumbit. **MATHESES**, Quibusnam partibus connectitur, aut
adherescit? **GERON**, Superior ipsius finis, inferiori septi transuer-
si parti obnascitur: hinc ad sinistram, primum ventriculi initio
(quod os ipsius dicitur) adnectitur: deinde toti ipsius corpori,
adeo interea crassescens, ut vix inde auelli queat. prope vmbili-
cum autem, tenui transuersorum musculorum tendini, coniun-
ctum est: imò omnibus ferè abdominis musculis, licet non æqua-
liter, adiungitur. **MATHESES**, In omnibusne quibus obtenditur,
æquè crassum apparet? **GERON**, Iuxta originem quidem suam,
crassissimum cernitur: priore verò parte mucronatæ cartilaginis,
vsq; ad pubem, tenue & inuolidius, quàm ad latera & lumbos exis-
tit. nam omnibus quæ ei subsunt partibus, tunicam exhibet,
qualem singula requirunt, crassam putâ, vel tenuem: iccori sanè
tenuissimam: lienem autem minus tenuem; renibus, ventriculo, in-
testinis, vesicæ, & vuluæ crassiores: septo autem transuerso, om-
nium crassissimam solidissimamq; præsertim iuxta inferiorem
eius partem, quam vndiq; comprehendit. **MATHESES**, Quare
crassius hisce interaneis obducitur? **GERON**, Ne dum illa in tu-
morem attolluntur (id quod sæpe accidit) offensionem aliquam
experiatur. Crassities enim magis, quàm tenuitas extensionem su-
stinere potest: vnde etiam fit, ut iuxta extuberantiorem ventricu-
li partem, quâ spinam attingit, duplex ex implexu habeatur: ubi
vena magna cum arteria ipsi toti sublimius insidet, & numerosa
quædam tenuium vasorum series, ex magnis illis in eandem pro-
pagatur, alia post aliam consequenter, vnaq; linea & ordine. **MATHESES**,
Simplèxne peritonæum existit? **GERON**, Non, sed quod
extrinsecus omnibus obducitur, magnum appellatur: quod au-
tem partes aliquas seorsum integit, exiguum: quos processus la-
xos grandioris ideo nominare licet. Est autem id iuxta elatas ipsi-
us partes, ad vtraq; inguina foramine peruium, per quod semi-
naria vasa ad testes perueniunt. Cæterum si a medio abdo-
mine sursum, & versus peritonæum spectes, simplicem esse mem-
branam

- branamiudicabis: si ab vmbilico deorsum cernas, duplicem esse
dices. MATHETES, Quare sic eam natura fabricata est? GERON,
Vt arteriæ vmbilico familiares, vas quod Græcis *ὀμφαλὸς* dicitur,
venæ, arteriæq; sub rectis abdominis musculis ascendentes, nec
5 non vesica, & intestina validius tutiusq; inter eam contineantur.
MATHETES, Qualis ipsius est essentia? GERON, Intus læuis, ex-
trinscus aspera, idq; vt musculis prædictis, atq; eorum tendinibus
10 fortius adhæreat. MATHETES, Qua figura est præditum? GERON, Si ipsum priuatim absq; omnibus quæ contegit, inspicias,
circulum quendam, aut orbem propemodum representat, idq;
non multo post vmbilici regionem, vbi primum à transuersis mu-
sculis secernitur, & solum relinquitur: in vmbilico autem, tendi-
nibus eorum connexum est. MATHETES, Repetas, obsecro, quot-
nam peritonæi membranae sint vsus? GERON, Quinq; si bene
15 memini. primus, vt partes vniuersas intra corpus sitas, ventrem,
intestina, visceraq; infra septum transuersum, de quo posterius,
contegat. alter, vt hæc ipsa à musculis extrinsecus incumbentibus
interstinguat, ne quando intestinorum aliqua, in media inter ip-
20 sos spatia incidant, & ne dum premunt, aut premuntur, arctant,
aut arctantur, inflant, aut inflantur, motus illorum impediatur, ip-
saq;crementa difficillimè deorsum transmittat. tertius, vt sicci
alimenti superflua transuersi septi auxilio propellat. nam cum ip-
sum eodem perueniat, quò septum, expulsorio ventris & intesti-
norum motui non nihil succurrit. MATHETES, Quando hoc ac-
25 cidit? GERON, Cum octo abdominis musculi, & septum transuer-
sum tanquam manus supra quidem vnita, infra verò dirempta,
ea quæ in medio ventre excrementa cibi continentur, deorsum
premere ac propellere conantur, tunc eis peritonæum opitulatur.
MATHETES, Quis autem quartus peritonæi vsus est? GERON,
30 Vt, cum veluti inuolucrum accuratè circumdatum sit, omnia quæ
in ventre sunt, stringat, ne ille ex facili flatibus infestetur: id
quod fieri solet, cum ipse est imbecillior. MATHETES, Intelligo
hæc: quis autem quintus tandem vsus illius est? GERON, Vt om-
nia quæ sub septo transuerso sunt, comprehendat, & veluti pellis
35 quædam seorsim tegat. MATHETES, Quid, si quando tenuitas
eius violetur? GERON, Magnum sequitur periculum, præser-
tim, si quod interaneorum vnà sit vulneratum. sin autem solum
ipsum circa seminalium vaforum (de quibus postea) transitum, ru-
ptum, aut extensum fuerit, intestina in scrotum deuoluuntur, ac
40 affectus hic Græcis *ἐντεροκηλη*, nobis ramex ac hernia intestinorum
dicitur, ex ictu, saltu, clamore, vociferationeq; aut alia partium im-
becillitate proueniens. si verò disrumpatur, aut laeditur sic, vt in-

Peritonæi essentia qualis.

Peritonæum qua figura sit præditum.

Peritonæi membranae vsus quinque.

Peritonæi ruptura.

Hernia intestinorum.

- Hernia inguinū.* testinum aliquod non ad scrotum, sed ad inguina abscedat, græcè βεβωνοκήλη, latinè inguinum hernia vocatur. si omentum, de quo
- Hernia omenti.* mox audies, descendat, illis επιπλοκήλη, quasi omenti hernia. si
- Hernia aquosa.* aqua, υδροκήλη illis, hoc est, hernia aquosa latinis vocatur: quamquam aqua in morbo hydropico inter hanc membranam, & intestina colligi soleat. Quòd si crassus ac melancholicus sanguis, in
- Hernia varicosa & flatuosa.* vasorum anfractibus coaceruetur, κισσοκήλη: si spiritus, πνευματικήλη, id est varicosa, & flatuosa hernia appellatur. sed de his aliàs: nunc reliqua inspicito. MATHESES, Quid post peritonæum occurrat? GERON,
- OMENTVM.** Hoc per rectam lineam secto, & vmbilici vasis in aliud tempus referuatis, corpus quoddam apparet, quod veteres Græci επιπλουν, & επιπλυν, nos omentum appellamus. MATHESES, Qualis illius est essentia? GERON, Non alia quam peritonæi. imò est peritonæum ipsum duplicatum, hoc est, duabus tunicis densis, subtilibus, mutuo sibi incumbentibus, nec non venis, arterijs, nervo ex sexto pari, sensus gratia, & pinguedine siue adipè copiosa contextum. MATHESES, Quam habet figuram? GERON, Marsupij, sacculi, aut pere: id quod deprehendere licet, si ipsum integrum & continuum à spinæ partibus, & ventriculi fundo abscessum, nullaq; parte vel perforatum, vel diuulsum materia vel liquida, vel solida implere cupias. MATHESES, Idémne situs eius, & magnitudo in omnibus existit? GERON, In quibusdam non multò infra vmbilicum, in quibusdam ad pubis ossa descendit: interdum ad alterum latus sursum reuulsum apparet. Homines id maximum habent, vnde nonnulli etiam Græcis επιπλοκομήται, quasi omenti gestatores dicuntur: inter bruta, simiæ grandius obtinent. MATHESES, Vbi oritur? GERON, Ad spinam, vbi magna vena arteriaq; exporrigitur. recipit enim multas propagines, capillorum modo tenues ex vena, quas portas dicunt: id quod clarè patet, si illud ad pubem vnguibus laceres, & superiorem ipsius tunicam thoraci expandas, inferiorem intestinis porrectam ideo relinquens, vt spatium membranas intercedens ad præcordia cernas. MATHESES, Quibus connectitur? GERON, Non paucis ventris partibus, de quibus postea tractabo, mesenterio, carniq; glandulosæ (quæ πάγκρεας græcè vocatur) tenuis intestini initio εκφύσσι dictæ, colo, ventriculo: adhæc lieni, vasorum quorundam interuentu, iecoris quoq; fibræ: aliàs alij, sed rariùs, & spurig cuidam costæ: neq; huic vni perpetuò, sed vt euenit. MATHESES, Cur tam multis partibus connectitur? GERON, Ne ipsum frequenter circa se inuoluatur, implicetur, & multa operimenti indiga relinquatur. MATHESES, Quis tandem præcipuus omenti usus

usus est: GERON, Vt ventrem, cuius fundo insidet, foueat, innatumque calorem per inediam tueatur, quibus enim per vulnera id excidit, vt præsindi sit necessarium, ij ventrem habent frigidum, minus concoquunt, & operimentis plurimis indigent. MATHE-

5 TES, Quæ post omentum aperiunda sunt?

GERON, Intestina, sed prius illud ab his, quibus perrara & INTESTINA.
tenuia ligamenta coheret, liberato: deinde ipsa iam nonnihil comota, in locum suum quantum licet, reponito: postea vt situm eorum condiscas, vel ab exortu eorum, vel ab extremo incipito.

10 Sunt autem eorum numero sex, antiquorum sententia: quia verò inuicem sunt cōtinua, in vnum duntaxat redigi possunt: quod hic tenue, illic crassum existit. MATHETES, Quæ sunt omnium nomina, si sex numeres? GERON, Si ab imo exordiaris, primum intestinum, longum & rectum: alterum, colon: tertium, cæcum:

15 quartum, ilium: quintum, ieiunum: sextum, duodenum appellatur. MATHETES, Quæ natura ipsorum existit? GERON, Corpora sunt neruosa, oblonga, rotunda, caua, binis tunicis proprijs obducta, quibus etiam tertia communio accedit, quam à peritonæo mutuò accipiunt. At prior ipsorum membrana interior obliquis

20 donata est fibris, nimirum vt alimenta continere: secunda transversis, vt excrementa propellere possit: rectæ autem fibræ aut nullæ, aut paucae in illis apparent. MATHETES, Quis singulorum Intestinarum singulorum situs.
situs est? GERON, Rectum, spinæ è directo incumbit, spatiosum, & à summo osse sacro, ad extremum vsque coccygem defertur, atque

25 in ano terminatur, vnde etiam nomen suum esse sortitum videtur, excrementi receptaculum. Hoc sequitur colon, intestinum Rectum intestinum.
oblongum satis, & crassius reliquis sequentibus, ac carnosius, sinibusque hic illic refertum: ob quod ligamenta duo, veluti zonas, vnum superius, alterum inferius annexa habet. Cæterum à sini-

30 stro rene ad dextrum, super ventriculi fundum fertur, donec sæpenumero & lienem, & iecur attingat. cum ad sinistra tendit, duos gyros efficit, & in rectum tandem intestinum in summo osse sacro terminatur. Tertium intestinum cæcum, latinis monocolum, & sacculus barbaris appellatur, anfractuosum, medio intesti- Colon.
norum, quod Græci *μικρὸν* vocant, modicè innitens. MATHE-

35 TES, Quare hoc nomen sortitum est? GERON, Quia vno tantum donatum est foramine, quod coli ipsius pars esse videtur. adest etiam cæco huic sua quædam appendix longiuscula tenuisque. Hactenus recitata, crassa & sunt & nuncupantur: reliqua verò tria te-

40 nuia, ilium scilicet, ieiunum, & duodenum. Ilium ob varias spiras sic appellatur, quia longum satis existit: morbus etiam iliacus inde vocatur. Ieiunum, quia in cadauerum incisone, siue aper- Ilium.
Ieiunum.

*Intestini Ilei, &
ieiunii differentia.*

Duodenum.

*Intestini Ilei, &
ieiunii differentia.*

*Intestini Ilei, &
ieiunii differentia.*

MESENTE-
RION.

tione vacuum semper reperitur, nam chylus, seu cremor, in ventriculo ex cibis confectus, huc procurrens, valde est fluidus, & à valis compluribus, illi intertextis, statim exugitur, atq; inde ad iecur defertur. Hæc duo iam dicta intestina in varios gyros implicantur, & elatiorem ventris inferni regionem, ad vmbilicum vsq; occupant. MATHESES, Quomodo hæc duo gracilia intestina inter se differunt? GERON, Illy principium, & ieiunii finis non facile à quouis dignoscuntur, vt quæ eandem essentiam & colorem representent. hoc autem mihi discriminis satis esse videtur, quòd ilium nec vacuum reperiatur, nec venis tam frequentibus & magnis, quàm ieiunum scateat, idq; parte caua. Nam cum multi in eis sint anfractuum gyri, necessariò pars ipsorum altera gibba, altera caua existit: adhæc quòd illy finis à coli principio excipiat. MATHESES, Quod sextum intestinum nominas? GERON, Huic contiguum, quod à ventriculo originem trahit, Græci *ἐκφυσιν δωδεκαυλον*, hoc est, processum, siue exortum, qui ab initio suo ad finem vsq; duodecim digitos longitudine explet, vnde recentiores anatomici duodenum appellant: nonnunquam Græci etiam *πυλωρον*, quasi ianitorem, siue ostiarium vocant, quòd cibus ex ventriculo, per hoc veluti ostium transire cogatur. Hoc, inquam, intestinum, post suum à ventriculo exortum, spinam versus descendit, quò vbi peruenierit, assurgit, & in gyros anfractusq; circumuoluitur, ibiq; desinit. Quòd si à ventriculo incisionem moliri volueris, primum erit intestinum duodenum: secundum, ieiunum: tertium, ilium: quartum, cæcum: quintum, colon: sextum & extremum, rectum. siue autem à ventriculo, an ab ano, intestinorum contemplationem auspiceris, optimum erit illa ex toto corpore exempta, seorsim examinare. nam ad lucem ipsa pro tuo arbitrio poteris vertere, & varijs modis ad aliam atq; aliam figuram transferre, exactamq; particularum constructionem in ipsis tenere. MATHESES, Quomodo intestina eximere, citra anatomica administrationis confusionem, poterò? GERON, Reseca duodenum à ventriculo, vel rectum intestinum ab ano, amplo satis spatio, ne quem ex ipsius musculis vulneres: sic autem, vt fines præcidendorum, nec non insignem venæ portæ raram, qui ad mesenterium, & ieiunii principium consistit, liges: cauens, ne biliosum meatum, qui ipsi inferitur, violes: postremò mesenterij arterias, quarum vnam circa illos, qui in renes feruntur, ramos, alteram infrà renes, vel mesenterij medium, inuenies: de quibus omnibus paulò post audies.

Hac præparatione facta, intestina tota explices, expandasque, ac strum membrum quoddam, medium inter intestina

- stina situm, ipsisque vndique adhærescens apparet. est autem id nihil aliud, quam peritonæum ipsum duplex, Græci à situ *μεσεντερικόν*, & à propria eius essentia *μεσεντερικόν* vocant. nonnulli illud in tres partes diuidunt, sic vt vna ferè omenti portio existat: altera, tenuia intestina: tertia, crassa contineat, nonnulli duplex: nonnulli simplex esse pronunciant: quoscunque autem sequi malis, nihil refert. Extant in eo variæ venæ, arteriæ, nerui, & glandulosa quædam corpora, quæ Græcis *πυγκτός*, vel *καρκινός*, latini lactes vel affusiones nuncupant. MATHETES, Cur in tenuioribus intestinis, multò frequentiores & ampliores venæ, in crassis autem sensim rariiores, minoresque existunt? GERON, Quia per illas quicquid chyli intestinis inest, exugi, & ad iecur deferri oportet: per has autem nihil, eò quòd chylus in durum excrementum transijt. MATHETES, Ob quid gracilia intestina in tot gyros circumuoluta sunt? GERON, Vt cibus diutius in eis commoretur, & si quid illius non satis adhuc concoctum, primum orbem siue anfractum transierit, in secundo tunicam ipsorum, ad quam vasa oris hiant, contingat, elaboreturque: si hunc quoque permearit, in tertio, vel in quarto, vel in quinto, vel in alio deinceps conficiatur.
- 20 MATHETES, Quare crassa quoque intestina, in gyros circumuoluta, anfractuosaque existunt? GERON, Ne recrementa subito ac vniuersim prodeant. huc etiam facit coli amplitudo, & varia circumuolutio, ne illa continuè egerantur. MATHET. Quem usum mesenterium totum præbet? GERON, Vt intestina contineat, ne temerè implicentur, vel deorsum delabantur. In summa, omnes venas ex iecore ad ipsum descendentes, vnà cum vicinis arterijs, & neruis, in orbem complectitur, sicut intestina, ad quæ illæ excurrunt, vbi ceu radices in arboribus inferuntur, ac deinde inuicem coeuntes, ad vnum omnes principium perueniunt. MATHETES, Quæ
- 30 Quid numerosæ illæ venæ in mesenterio agunt? GERON, Quæ versus iecoris portas tendunt, chylo distribuendo sunt accommodatæ, vnde etiam manus iecoris dicuntur, & primum quoque sanguinem generant, propriæ verò, quæ non ad iecur, sed ad complures illas glandulas desinunt, à natura factæ sunt, vt intestina nutriant. MATHET. Cur autem hæc glandule, tam numerosæ mesenterio sunt appositæ, præsertim sub ventriculo? GERON, Non solum ob vasorum diuisionem, sed etiam ne ventriculus spinæ contactu lædatur. MATHETES, De arterijs & neruis nihil adhuc retulisti, quid in his locis efficiant? GERON, Arteriæ sanè non adeò multum cibi ad intestina rapiunt, sed vitalem vim roburque illis suppeditant. Nerui tunicis intestinorum ex cerebro inserti sunt, vt tum sensui, tum excretioni ipsorum inferriant. MATHE-

Mesenterij vsus quæ.

Venarum in mesenterio vsus & officium.

Glandularum in mesenterio vsus.

Arteriarum & neruorum in mesenterio officium.

*Tunicæ intesti-
norum cur dupli-
ces existant.*

TES, Oblitus ferè sum, causam ex te quærere, ob quam duplices sint intestinorum tunicæ: GERON, Partim, vt illa minus afficiantur (nam interior tunica, aliquando per dysenterias, aliosq; longos affectus putrescit, exteriore salua, eoq; ægri nonnunquam periculum euadunt): partim vt facultas illorum excretoria sit valentior. MATHESES, Satis iam affequer, quæ hactenus commemorasti: quæ intestinis exemptis, incidi examinariq; debent:

**VENTRICU-
LVS.**

*Ventriculi signu-
ra, ortus, & situs.*

GERON, Ventriculus, qui figura cucurbitam oblongam, rotundamq; repræsentat, Græcis γαστήρ dicitur, à mucronata cartilagine sub septo transuerso exorsus, ad vmbilicum ferè descen-

*Ventriculus cur
iecore & liene
obtegatur.*

dit, medio quasi corpore inter dextra & sinistra præcordia: maior tamen eius portio, sinistra occupat, eò quòd amplius spatium in hoc latere, quàm in dextro, propter iecoris magnitudinem, & lienis paruitatem relinquatur. nam hisce visceribus utrobique ob-

*Ventriculus cur
rotundus, & ob-
longus.*

tegitur, vt ab eis concalescat. MATHESES, Quare est rotundus? GERON, Quoniam hæc figura, & minimè iniuriæ oportuna, & maximè capax. MATHESES, Cur oblongus? GERON, Quia superius stomacho committitur, inferius ad intestina procedit: at-

*Orificia duo in
ventriculo, eaq;
cur crassa sint.*

que ita duobus orificijs, ijsq; crassioribus constat, superiore potum cibumq; suscipit: inferiore autem iter præbet cibo, quem ip-

*Fibræ orificiorū
quales, & cur.*

se confecit, & in chylum conuertit. MATHESES, Quare crassioribus dixisti? GERON, Ne cibus, vel nondum coctus elabatur, vel retrocedat: eaq; de causa fibris orbicularibus, quæ illum retineant, intertexta sunt: natura verò iubente dilatantur, sinuntq; cibum tum ingredi, tum egredi. Sunt qui inferius ostium situm es-

*Ventriculi essen-
tia, ex quibus
constet.*

se, glandulaq; obductum scripserint, cum tamen superiora versus spectet, illiusq; expers cernatur. MATHESES, Ex quibus tota essentia ventriculi constat? GERON, Tribus tunicis, ijsq; neruosis:

*Tunicæ ventri-
culi quot, & qua-
les.*

(quanquam secunda nonnihil carnosa sit: non tamen magis in fundo, quàm in superiore parte). Duæ ex his propriæ sunt ventriculi: tertia communis, quæ peritonæi soboles est, & inuolucris

*Quatuor ventri-
culi facultates.*

vices gerit, fibrarum expers. MATHESES, Habentne reliquæ duæ fibras? GERON, Vtiq; prima obliquas, quæ cibum potumq; tandiu continent, donec concocti fuerint: secunda transuersas, quæ iam concoctos extrà pellunt. MATHESES, Cur interna ven-

*Ventriculi offi-
cia.*

triculi, rectis fibris caret? GERON, Quia quæcunq; gula deuorat, ad ventriculum deducit: quod nisi faceret, certè etiam rectis fibris opus haberet. MATHESES, Quamuis igitur rectæ fibræ in ventriculo desiderentur, adfuntne tamen ei quatuor facultates, quæ aliis membris adesse consueuere, nempe attractrix, retentrix, con-

trix, atq; expultrix? GERON, Quid nisi gula enim attractricem hanc promo-

- tium est: GERON, Vt cibum potumq; in albam materiam, lacti similem, quam chylum vocauimus, immutet: vnde merito culina officinaq; alimenti præparandi, quod corpus nostrum sustentet, dici potest: idcirco ille etiam duobus visceribus, nempe iecore & *Ventriculus vna de nutrimentum sumat.*
- 5 liene obtegitur, vt illius calorem natium adiuuent, quò facilius concoctio absoluat. MATHETES, Vnde nutrimentum accipit, à chylone, quem ipse ex cibis conficit: GERON, Minimè, sed vt aliq; corporis partes à sanguine, quem venæ tam numerosæ à iecoris portis profectæ, ad eum deferunt. fit interdum, vt ventriculus sanguinem euomat, sed motu violento, & naturæ contrario: atq; tunc fibræ obliquæ simul, & transversæ, ipsius magno conatu propellunt: rectæ autem gulæ contrario motu agunt, quàm natura postulet. cùm enim deorsum trahere debeant, sursum hoc nituntur. MATHETES, Quæ aliæ venæ ventriculo inseruntur: GERON, Vna quartæ venæ portarum rami propago, quæ lieni inseritur, in quibusdam eximia, in quibusdam maior, in quibusdam multò amplior: interdum autem non adeò altè ascendit, sed primùm ad fundum excurrit: deinde os illius perrepat. *Vena que ventriculo inferatur.*
- 15 MATHETES, Ad quid ventriculo confert: GERON, Vt humorem acidum, qui in liene alendo gignitur, ad illum transmittat, famis in nobis excitandæ gratia. nam sæpè fit, vt negotijs multis occupati, cibi captandi obliuiscamur. Porro qui venam illam portarum sobolem exiguum habent, hi facilius inediā ferre possunt: qui verò maiorem, minus. tales etiam si consuetum tempus edendi *Famem cur alia qui facilius, alia qui difficilius ferant.*
- 25 vel paululum differant, in animi defectionem incidunt. MATHETES, Quibus ventriculus connexus est: GERON, Antè quidem omento vasorum interuentu, retrò verò spinæ, musculorum filamentis, qua parte gibbus est, cohæret. MATHETES, Quæ membra corporis humani, post ventriculum examinari debent: *Ventriculi connexus.*
- 30 GERON, Iecur & lien, quæ ventriculo insidere dixi. Iecur autem primum membrum est, quod in corpore humano gignitur, id quod postea indicabitur. MATHETES, Qua in parte situm est: GERON, Quamuis magna eius portio dextram, non exigua tamen sinistram occupat, vbi ligamenti cuiusdam validi auxilio *IECUR.*
- 35 septo transuerso affigitur. MATHETES, Quam figuram ei ascribis: GERON, Non ad amulsi rotundam, neq; in omnibus animantibus similem latitudine, longitudine, crassitie, altitudine, æqualitate, & fibris. Nam in hominibus integrum, non diuisum existit: nisi priore in parte, atq; extrema, vt veng, quam vmbilicalem vulgò appellant, aditum præbeat. habet autem duas, & exiles eminentias, vbi vena portarum exit, ne ea à vertebis comprimatur, sed illæ fibræ dici non debent. MATHETES, Quæ Iecur hominis *Iecoris situs.*
- 40 *Iecur qua figura sit prædictum.*

*Iecur hominis
cur integrum, &
animantium verò
diuisum existat.*

*Iecoris essentia
qualis.*

*Iecur venarum
omnium situs, &
origo, & radix.*

*Iecur sanguinis
fons.*

*Venae principales
in iecore quae.*

*Venae portarum
distributio.*

*Venae portarum
septem rami.*

*Venarum rami
cur in ventricu-
lum spargantur.*

integrum, alijs animantibus diuisum est. GERON, Quia cum ere-
cta à DEO figura donati simus, iecur vniuersam priorem ven-
triculi regionem obtinet, vt hunc, eiusq; os sub mucronata carti-
laginè foueat, calfaciatq;. MATHETES, Si igitur iecur membrum
natura calidum, sub mucronata cartilagine os ventriculi conte-
git, medici non videntur mihi rectè agere, cum vnguentis cali-
dis huic illitis, frigidam ori ventriculi intemperiem, tollere co-
nantur. nam sic iecoris aliàs calidi, cum mucronata cartilagini
subiectum sit, feruorem, huiusmodi medicamentis adaugent.
GERON, Rectè sentis: sed de his alio tempore. MATHETES, Quae
iecoris est essentia? GERON, Nihil aliud quàm sanguis concretus,
venis numerosis, nonnullisq; arterijs intertextus, omnium ve-
narum situs, origo, & radix, eoq; nusquam, quàm in hoc sanguis
gignitur: quamuis Aristoteles aliter sentiat. In summa excellens
est viscus, & permagnum, in quo sanguinis efficiendi facultas, &
vis appetitoria, quae Græcis *ἡδονοειδής* dicitur, consistit. Duas
est: hæc caua & aspera, rupium præcipitij modo, qua ventriculo
insidet, tenuissimaq; peritonæi membrana circundatur: in quam
ramulus sexti neruorum cerebri paris, inseritur: cuius gratia illud
etiam extrinsecus sensus expers non est. Quòd autem spiritus na-
turales in eo gignantur, adhuc sub iudice lis est. MATHETES, Cum
venarum fontem illud esse dixeris, quae sunt in eo principales?
GERON, Vna in caua eius parte oritur, quae à trunco Græcis
σπληνική, Latinis vena portae, dicitur, illi quae ab umbilico *ομφα-
λικά* Græcè vocatur, continua. MATHETES, Quomodo vena il-
la portæ in corporis partes dispargitur? GERON, Radices eius sa-
tis crassae in cauam iecoris partem, præcipuè tunicam variè disse-
minantur, & in vnam tandem coeunt, crassumq; truncum consti-
tuunt: postea in multos ramos sub ventriculo diuiditur. Pri-
mus ad superiorem ventriculum tendit, cuius pars vna longitu-
dinem illius perrepat: altera os ipsius superius instar coronae am-
plexatur, vnde etiam coronalis dicta est. Secundus portarum ra-
mus inferiorem ventriculum adit, ibiq; per longitudinem eius
dispargitur. MATHETES, Cur venarum rami huc mittuntur?
GERON, Vt ventriculus illarum sanguine alatur, cum chylo nu-
triri nequeat, eo quòd crassus nimis sit, & omne excrementorum
genus in se contineat, quibus nulla pars corporis, præter lienem,
nutriri possit. Tertius ramus ad omentum alendum pergit, atq;
ibi varias propagines emittit. Quartus ad lienem, de quo statim
agemus, non alia de causa tendit, quàm vt sanguinem melanco-
licum à iecore huc deferat, sub ventriculo serpens, satis insi-
gnis.

- gnis. is autem ne à vertebrais offendatur, natura plures ei glandulas subiecit: neue comprimatur, sursum attollitur, & lienis longitudinem intersecat, eiq; inseritur. Hinc alia orta soboles ad ventriculi os ascendit, quemadmodum superius expositum est.
- 5 tus portarum ramus colon intestinum accedit. sextus omnium maximus, gracilibus intestinis communicatur. septimus recto. Atq; hi sunt præcipui portarum rami. Tres horum, quos ad intestina deferri diximus, cum ad mesenterium perueniunt, in soboles propè infinitas propagantur, intestinaq; nō modo amplectuntur,
- 10 sed etiam introrsum penetrant. Hic autem notari debet, terminis vniuscuiusq; illarum, membranam appositam esse, ne chylus, quem ipsæ susceperunt, rursus egrediatur. MATHETES, Nullus alius ramus venæ portarum restat. GERON, Vnus adhuc, qui inter venæ illius ramos etiam annumeratur. at soboles eius
- 15 lienī dicata est, & ad regionem sinistram per mesenterium descendit, tandemq; rectum intestinum petit, & venas ani, quas Græci αἰμορροϊδᾶς vocant, gignit, per quas sanguis melancholicus expurgatur. MATHETES, Multiplex venæ portarum, eiúsq; propaginum vsus esse videtur. GERON, Est sanè: sed hic præcipuus, vt
- 20 chylum, sicut diximus, ad cauam iecoris partem deferat, & per ipsum dispergat, à quo ille concoquatur, ac in rubrum sanguinem conuertatur. MATHETES, Nihil aliud præter sanguinem generat. GERON, Dum chylus in eo concoquitur, duo sanguinis excrementa parit, vnum tenue, alterum crassum, nempe bilem flauam & atram, siue succum melancholicum. Illam, vesicula quædam oblonga & membranæa, in caua iecoris parte sita, quam etiam fellis receptaculum appellant, suscipit: hanc, quartus portarum
- 25 ramus lienī nutriendo transmittit: sicut aliæ ipsius propagines eandem, mesenterio, ventriculo, & intestinis alendis distribuunt. quanquam ipsæ nullam sanguinis efficiendi facultatem habeant. Ex vesicula illa, de qua iam diximus, etiam bilis per meatum quendam, quem Græci πύλον χοληδόχον vocant, ad intestina non procul à pyloro tendentem, excrementorum expellendorū gratia transmittitur: quamvis alij fundo ventriculi inseri pronuncient. Por-
- 30 rò meatus à iecore ad bilis vesiculam deferretur, qui ab ipso illam huic inducit. Sunt autem complures inter venæ cauæ & portarum iecoris ramos, surculi, qui licet per totum iecur dispergantur, omnes tamen in meatum iam dictum desinunt: qui vbi bilem susceperit, hanc ad vesiculam ei peculiarem deducit. MATHETES.
- 40 Quæ altera iocinoris vena insignis existit. GERON, Ex gibba ipsius regione procedit, omnium quæ in toto corpore habentur, maxima; ob quod Græcis κωίλη, hoc est, caua dicitur, ex varijs, cras-

*Venæ portarum
vsus multiplex.*

*Venæ cauæ origo,
essentia, & processus.*

sis & amplis radicibus ipsi insertis, conflata. Coeunt autem cauae iecoris partis venae cum ijs, quae gibbam perreptant, non manifeste, sed osculis obscuris, & latentibus. Cæterum vena illa magna, per totam animalis longitudinem excurrit: sursum quidem ad cor & caput: infra autem ad pedes ramis suis propagatur, sanguinis deferendi gratia: à quo vniuersi corporis nostri membra aluntur: vnde Hippocrates illam alimenti vehiculum nominauit. Vbi iam ipsa supra iecur ascenderit, septum transuersum penetrat: & à vertebri nonnihil ibi distat, duosque ramos edit, qui in propagines scissi, per ipsum septum distribuuntur: deinde statim cor accedit, vt posterius audies, vbi de illo agendum erit. MATHESES, Quibus partibus corporis iecur est connexum: GERON, Ventri quidem, & omnibus intestinis, idque venarum & tunicae, quae à peritonæo ducit originem, ea colligantis commercio. septo autem alio ligaculo, quod etiam peritonæo responderet, ex membrana, quae ipsum contegit, orto: quamuis robustiore, firmioreque, ne illud in vehementiore motu rumpatur. quia cum erecti stamus, iecur à septo suspendi est necesse. Cordi autem per venam cauam alligatum est, quae dextri illius ventriculi ostium, foris vndique complectitur, ne dicam propaginis cuiusdam arteriae magnae insertionem, vt nerui in id processu, cerebro, & vasis venosi communicatione, lieni. MATHESES, Qua in regione corporis LIEN consistit:

Iecur quibus corporis partibus sit annexum.

GERON, In sinistris præcordijs sub costis, septo transuerso adhæret. MATHESES, Quae eius figura: GERON, Oblonga: exterius aliquantum gibba: interius caua. atque hac parte versus iecur & ventriculum tendit: ibidem lineam quandam obtinet, cui tum venae, tum arteriae insignes ac conspicuae inseruntur, eoque illis est eminentior. in gibba parte nullis donatus est vasis, sed paucis fibrosis ligaminibus, alias alijs vicinis partibus committitur. MATHESES, Qualis ipsius essentia & color est: GERON, Illa quidem spongie instar rara & laxa, vt melancholicum, crassum, terreumque humorem facilius ex iecore tum alliciat, tum suscipiat: leuiorque est quam iecoris, non tamen rubicundior, aut flauior. In animantibus fortibus & calidis, nigra admodum: in humidioribus & frigidioribus, magis albicans apparet. MATHESES, Vnde vasa lienis oriuntur: GERON, Venae à iecoris portis, quarum sunt propagines: arteriae à magna arteria, aorta dicta, de qua inferius agitur. MATHESES, Quid prosunt lieni tot vasa intertexta: GERON, Vt venis crassius, arterijs subtilius alimentum attrahat. quam hae potissimum huc conducant, primum, vt humores ex iecore suscepti, conficiant elaborentque: deinde vt carnem lienis

LIEN, eius situs, figura, essentia, & color.

raram

Lienis vasa unde oriuntur, & eorum usus.

raram tueantur: ne non genuinum lienis calorem conseruent:
 eleuatione refrigerantes, summiffione fuliginofa recrementa
 expellentes, quæ cum copiofa, ob humorum in eo fubfiftentium
 prauitatem, & crassitiem, exiftant, meritò illæ tum multæ, tum
 5 grandes funt procreatæ. Si quid tamen fanguinis crassi, elabora-
 tionem in liene effugiat, nec poffit in tenuis probiq; fpeciem con-
 uerti, in acidum humorem tranfit. hic ab alijs fegregatur, & per
 venæ portarum ramum, cuius antea memini, ad ventriculum de-
 fertur, cibi cupiditatis excitandæ gratia. **MATHESES**, Quibus
 10 igitur membris coniunctus eft lien? **GERON**, Caua ipsius parte,
 per venarum commercium, iecori, earumq; propaginum confor-
 tio ventriculo, & omento: arteriarum, cordi: neruuli autem, qui
 ex fexto pari tunica ipsius, à tenui peritonæi membrana profe-
 ctæ, inferitur, ratione, cerebro. **MATHESES**, Quis præcipuus lie-
 15 nis vfus eft? **GERON**, Vt fanguinem melancholicum à iecore at-
 trahat, præfertim, quia eo alitur. **MATHESES**, Quomodo ad re-
 liquas partes infpiciundas aptè accedam?

GERON, Rectum inteflinum, duodeni exortum, aut fi ven-
 triculum fimul auferre voles, fuperius eius orificium funiculo ex
 20 cipies: deinde vafa, quæ in iecoris cauo funt: nec non arterias, quæ
 in partes nuper recitatas diffunduntur, & illam, quæ in mefente-
 rium fub renibus pertinet. His fic diuifis, omnia ad manum con-
 fequentur, fi mefenterium duntaxat fortiùs à fpina diuulferis:
 ac mihi videntur partes inferiores, præfertim vrinæ dicatæ, nunc
 25 rectè infpici poffe. Itaq; dextra iecoris pars, manu eleuari debet,
 quò venæ cauæ diuifio, in confpectum veniat: quæ vt fuperius
 recensui, quàm primùm iecur egressa fuerit, vbi fepto annectitur,
 partim furfum, partim deorfum, magnæ arteriæ incumbens, con-
 torquetur. Priusquam verò ad lumbos defcenderit, non exigui
 30 rami duo, finguli in fingulos renes propagantur: finifter elatius,
 dexter inferius: ambo non modò ferosum humorem à fanguine
 fecretum ad renes, fed etiam boni fanguinis portionem aliquam,
 ad ipfos alendos deferunt, & iecur exugunt: vulgò emulgentes
 venas appellant. **MATHESES**, Vbi ergo renes potiffimum fiti
 35 funt?

GERON, Prope cauam venam, paululum fub iocinore & **RENES**.
 liene, tum dorfo, tum mendacibus costis annexi. verùm ren fini-
 40 fter, altiore quàm dexter locum, obtinet. in brutis contrario
 modo habet. **MATHESES**, Quare, obsecrò, homines alium fitum
 renum, quàm cæteræ animantes habent? **GERON**, Quia in no-
 bis iecur eft peramplum, & lien paruus: fit, vt dexter ren cogatur
 effe inferior, & cedere iocinori. **MATHESES**, Quæ figura funt

*Lien quibdam
membris coniun-
ctus.*

Lienis vfus.

VENTRIS
*inferioris admi-
nistratio.*

RENES.
Renum fitus.

Renum figura & color.

præditi: GERON, Phaseoli vulgaris: ad spinam verò gibbi: quâ viscera spectant, caui: carne densa, solidaq̃, cordis instar, & colore subrubro donati. Integuntur autem non solum peritonæo crasso satis, sed etiam tunica peculiari: ad quam neruulus ex sexto pari descendit. MATHETES, Quid habent officij renes? GERON, Vt

Renum officium.

serosum sanguinem attrahant, eumq̃ à iecore expurgent. quam etiam bonum, quo ipsi aluntur, alliciant, vt superius admonui: nec non biliosum excrementum, tenue, quod vrinas reddit flauas. Vbi verò lotium in renibus, à sanguine segregatum fuerit, ad alium quendam sinum transmittitur. Ex hoc meatus vtrin-

Meatus vrinarij quales.

que singuli nascuntur, qui Græcis *ουρηητες* dicuntur, quod vrinam ad vesicam deferant. MATHETES, Quales isti sunt meatus? GERON, Alba, crassaq̃, & arteriarum modo admodum neruosa vasa, in vesicam pertinentia. nam sub peritonæo lumbis adhærentia, tandem vesicæ, versus ipsius ceruicem, inseruntur. MATHET.

Membrana dua in meseraicarum finibus, & eorum vsus.

Habentne renes aliud quippiam notatu dignum, præter ista iam commemorata? GERON, Membranas duas; iuxta vasorum illorum sinus appositas, illis similes, quæ in follibus cerni solent, apparentque in meseraicarum terminis. MATHETES, In quem usum? GERON, vt postquam vesica vrinam influentem susceperit, claudantur, ne quando hæc retrocedens, elabatur, quod magno valetudinis detrimento fieri solet. Nam lotium, vbi sanguis per corpus fuerit distributus, inutile ei existit. MATHETES, Ergo membranarum illarum præsidio, vrina ab huius meatibus in vesica recipitur, ne sursum reuertatur? GERON, Maximè. ingeniosa enim natura, quàm primùm cauæ venæ rami, sanguinis ferro educendo addicti, renes ingrediuntur, membranas istas his adiungit, ne sanguis nimium præceps fluat, excidatq̃: sicut in renibus malè affectis sæpe accidit. Ideo etiam hi ipsi, prominentiores colliculorum modo efformati sunt, vt sanguini cum sero suo erumpenti, obijciantur resistentq̃, ne ille ad membranas deferatur, vnde vrinarij meatus prodeunt. Cùm itaq̃ sic elabi prohibeatur, prius in renes ipsos per ramos distribuitur. MATHETES, Vbi vesica ad quam meatus vrinarius tendit, sita est?

VESICA.

GERON, Sub abdomine: priore quidem parte pubis ossibus: posteriore autem intestino recto, & sacro ossi veluti tutis munimentis adhærescit: quod autem illa magis in conspectum veniat, necesse est, vt iam dicta pubis ossa, grandiore scalpello dirimas: deinde vtrunq̃ os Ileum in exteriora detorqueas. MATHET.

Vesicæ situs.

Quænam vesicæ figura, structuraq̃ existit? GERON, Rotunda quidem, sed oblongiuscula, intus caua, ac in ceruicem, & iter vrinæ desinit: caeterum neruosa, benè crassa, & tribus fibrarum generibus

Vesicæ figura, & essentia.

- neribus prædita, nempe rectis, transuersis & obliquis, nimirum
 vt attrahat, contineat, & expellat. Duabus constat tunicis: vna pe
 culiari, quæ extenditur, contrahiturq; : altera à peritonæo orta, *Vesicæ tunica.*
 eaq; integitur, *MATHE TES*, Qualis eius ceruix est, & quibus par
 5 tibus annexa? *GERON*, Dimidij digiti instar oblonga, angusta, *Vesicæ ceruix.*
 plena, & ferè carnosa. alsistunt ei etiam glandulæ quædam cras
 sæ, & albæ, græcis *παράστυν* dictæ, quæ per vasâ varicum modo
 anfractuosa, vnde græcis *νεκροδὴν* vocantur, semen excipiunt: id
 deinde in meatum huic & lotio communem, ad extremum vsq;
 10 genitale tendentem, in coitu defertur, & ab eo tandem forâs ia
 ctatur. Præterea pars quædam eminentior, & oblonga, inter
 glandulas istas, ceruici vesicæ astantes, apparet. *MATHE TES*, Per
 quod foramen, glandulæ illæ semen susceptum excernunt? *GE*
RON, Per nullum quidem euident & conspicuum, sed per exigua *Glandulæ paræ*
 15 complura, veluti in spongijs existunt, eoq; primo intuitu non cer
 nuntur, sed quàm primum illas comprimis, tum demum appa
 rent, eò quòd tunc semen erumpat, quod in eis delitescibat. In *state in feminis*
 foeminis huiusmodi glandulæ parastatæ dictæ non inueniuntur. *non inueniuntur*
 at musculus transuersis fibris donatus, ceruicem ipsam vesicæ *Musculus ceruicis*
 20 ambit, ne vrina nobis inuitis, & aliud agentibus, exeat. Quin etiâ *cent vesicæ ambis*
 venæ, arteriæ, & nerui duplices, putâ ex sexto pari, & ex medulla *ens.*
 spinali orti ipsam ingrediuntur: ille quidem, vt alimentum ei ad
 ferant: hæ verò, vt vitam suppedient: nerui, vt tum sensum, tum *Venæ, arteriæ, &*
 motum largiantur. *MATHE TES*, Quem autem peculiarem vsum *nerui, cur vesica*
 25 vesica per se præstat? *GERON*, Cùm ex earum partium numero *cent vesicæ ambis*
 existat, quæ recrementorum sunt receptacula, instar lagenæ vrin
 nam per meatus vrinarios obliquo itinere ei insertos, primò reci
 pit: deinde aliquandiu retinet: & postremò expellit. in foeminis,
 vtero adhæret. Hæc tibi de membris nutritioni dicatis, satis esse
 30 poterunt: nunc ad ea, quæ liberis procreandis inseruiunt, digre
 diar. *MATHE TES*, Id mihi placet: sed iube prius, vt Monachi &
 alij celebres, qui non cupiunt fieri mariti, hinc discedant. *GERON*,
 Ne sis sollicitus, nisi enim abierint sua sponte, curabo, vt semen in
 os illorum erumpat, quod olim Lutetiæ Parisiorum accidit, cum
 35 cadaueris foeminæ incisioni publicè in scholis, Andrea Vesalio
 tunc mihi operam dante, præesset.

Nonnullæ igitur ex partibus genitalibus, vtriq; sexui sunt *VASA SEMI*
 communes, vt vasâ seminaria, & testiculi: nonnullæ vero peculia
 res: in masculis coles: in foeminis, vulua, siue vterus. Porro semi
 40 naria: vasâ partim superiora, partim inferiora existunt: illa vulga
 res anatomici preparatoria vocant, vt quæ materiam ex qua semē
 elaboratur, ad testiculos deferant: hæc deferentia nuncupant, vt

*Vasa seminaria
preparatoria
quatuor.*

*Vasa seminaria
deficientia duo.*

*Vene seminales
vnde oriuntur.*

Vena emulgens.

quæ istud iam in testiculis elaboratum, ab eis suscipiant, & ad penis radicem deferant. **MATHESES**, Quot sunt vasa preparando semini accommodata? **GERON**, Quatuor: duæ putâ venæ, & totidem arteriæ: cuiusq; generis vtrâq; parte singulæ, tum in masculis, tum in foeminis: quanquam in his breuiores, in illis longiores existant, magnæ venæ, magnæq; arteriæ propagines. **MATHESES**, Quot vasa, semini deferendo ad naturalia, dicata sunt? **GERON**, Duo in vtroq; sexu cernuntur. **MATHESES**, Venæ illæ superiores ortûne suo inuicem conueniunt? **GERON**, Nequaquam, sed variant. nam dextra ab ipsius cauo non latere, sed medio ferè originem trahit, idq; sub ea vena, quæ emulgens anatomicis recentioribus vocatur, ad renes eius lateris tendens, sinistra ab eiusdem partis emulgente dicta, oritur, & hinc obliquè sub peritonæum descendit: mox supra os pubis fertur: deinde in testiculum desinit: idq; in viris tantum, non in mulieribus. quamuis enim eandem habeat originem & finem: tamen non adeò est longa: neq; summum os sacrum præterit, & in abdomine cessat. **MATHESES**, Quamobrem? **GERON**, Quia nulla vena sub dextra seminaria, sursum ad quartam vsq; lumborum vertebam, sed deorsum tantum mittitur. Nam vena caua, à iecore ad hunc vsq; locum inter vertebas, vbi nerui exeunt, propagines ædit: quæ tum spinæ medullam, tum vertebrarum corpora nutriunt. **MATHESES**, Cur hæc seminaria vena sinistra, ex illa emulgente, non autem ex caua ipsa, sicuti dextra prodijt? **GERON**, Quia, cum ei super arteriam transeundum esset, per magnas huius dilatationes, ac motus perennes, faciliè disrumperetur, utpote exilis admodum, & parua. Alij falsò comminiscuntur, ideo hinc trahere originem, ut serosum humorem, ad sinistrum testiculum deferat, quò maior in coitu voluptas sentiatur: cum tamen ij, quibus ille exectus est, non minus quàm antea, in coitu oblectentur. **MATHESES**, Vnde arteriæ seminales prodeunt?

*ARTERIE
seminaria.*

GERON, Ex magno arteriæ trunco, sub emulgentibus appellatis. Vt autem faciliùs illas inuenias, dum anatomen administras, cauam venam ab arteria magna, quæ illi ad sinistram subiacet, digitis tuis, aut vnguibus diuelles, adipeq; liberabis: deinde vtrâq; seminarias arterias inferiùs paulò, quàm vbi dextram venam oriri diximus, ex media ipsius magnæ arteriæ regione, scaturire cernes, ex aduerso sibi oppositas, ac propemodum contrarias: quæ adipe cum membranis detracta, ad venas communi velamine, super pubis ossa per peritonæum deferri, conspiciuntur. Ac primò quidem dum descendunt, aliquantulum distant: postea verò sic implicantur, ut vena arteriam, arteria venam ingrediat, tur,

tur, fiatq; mutua illa adapertio, quæ Græcis ἀναστροφὴς dicitur, sicut in alijs quoq; partibus, præcipuè in brachijs & cruribus: unde accidit, vt vena quandoq; vulnerata, non solum naturalis sanguis vniuersus, sed etiam vitalis simul effluat, & ægri intereant.

Venarum, & arteriarum complexus.

5 MATHETES, Quò tandem arteriæ, & venæ seminariæ tendunt? GERON, Ad vtruncq; testiculum, non autem recto itinere, sed multifariam prius inuolutæ, vitium capreolorum ac hederæ modo, et priusquam illos ingrediantur, exiguas ex se propagines tunicæ ipsorum, quæ ἰνδιδυμὴ vocatur, transmittunt. In his multis an-

Arteriæ & venæ seminariæ quousq; progrediantur.

10 fractibus vena arteriæ superiacet, flexusq; multos & æquales numero, ambæ retium instar efficiunt. MATHETES, Cur tam varius seminariorum vasorum plexus, à natura conditus est? GERON, Vt materia seminis, quæ prius in ipsis rubra est, sensim alteretur, conficiatur, & albescat. Nam sanguis in illis, antequam ad testiculos perueniat, modicè albidus conspicitur: vbi verò eadem vasa testiculos attingerint, semen ipsum, quamuis paucum, & roris modo sanguini permixtum, sicut in testiculis, merum & elaboratum clarè apparet, præsertim si arteriam & venam specillo prius in-

Seminariorum vasorum plexus varius.

20 iectò, ad testes vsque recta linea, diuidas. MATHETES, Quantum igitur intelligo vasorum istorum complexus, & adapertio, quam græcè ἀναστροφὴν appellasti, semen præparare & conficere incipiunt? GERON, Probè intelligis. nisi enim ipsa seminis quasi rudimentum pararent, testes illud totum perficere, & absolvere cogerentur. ideo etiam vasa ista deorsum ad testes descendunt, &

25 tunica eorum perforata, ad ipsosmet penetrant. MATHETES, Quid aliud cognitu dignum, de his duobus vasis seminarijs habes? GERON, Nihil, nisi quòd ex eis oriatur vas, semini deferendo idoneum, crassum, anfractuosum, & vario modo tortuosum, vnde κρυπταὶ δὲς Græcis dicitur, superq; testem inuertatur; deinde

Vas semen deferens idoneum.

30 sensim eodem itinere assurgat, quo deorsum flectitur, sic vt vasa superius dicta eò reuertantur, vnde exierint. MATHETES, Per quod foramen ingreditur? GERON, Per id, quod in tendinibus musculorum abdominis descendantium, ascendantiumq;, & obli-

35 quorum, supra os pubis situm est: vbi hoc cauitatem superficiariam habet, quæ illis rotundis cedat. Postquam autem ad abdominis spatium peruenerit, deorsum prope pubem fertur, & sub vesica, vbi magis ac magis amplificatur, & iuxta fines ipsius multum implicatur, contorqueturq;, donec glandulis assessorijs παραστάτες appellauimus, tandem inseratur. MATHETES, Quid tot gyri, circum-

40 uolutiones, implexus, & glandulæ profunt? GERON, Vt semen contineant, soboli procreandæ accommodatum: nonnunquam autem tam copiosum inest, præsertim in sæculis prioribus, vt tri-

Glandularum, implexum, & gyrorum utilitas.

bus, quatuorq̃ fœtibus generandis, citra seminalem testium materiam, sufficiant. **MATHESES**, In mulieribusne eadem hæc vasa, generationi dicata, existunt? **GERON**, Nequaquam. nam in illis neq̃ abdomen prætereunt, neq̃ in glandulas parastatas desinunt, quibus fœminæ carent, neq̃ ad vesicam perueniunt, sed ad vteri sinum duntaxat, in quem semen transfundunt. **MATHESES**, Cur fœminæ parastatis destituuntur? **GERON**, Quia ceruix vesicæ in illis tum breuior, tum latior, quàm in maribus existit. **MATHESES**, Quid tandem de testiculis adfers?

TESTICVL.

Testiculorum situs & figura.

GERON, Hi Græcis nominantur *διδυμοι*, quòd duo existant: 10

siti autem sunt in scroto, quod græcè *σχάτον* dicitur: figura rotundi, etsi non in totum, sed ouorum modo oblongi, corpore raro, laxo, albo, molliq̃ in viris præditi: in mulieribus autem intus in abdomine occluduntur, & non adeò crassi, neq̃ rotundi, mollesq̃

Testes in utroq̃ sexu creati.

vt in illis apparent. **MATHESES**. Quare testes in utroq̃ sexu creati sunt? **GERON**, Nimirum seminis elaborandi gratia. nam citra horum facultatem, neq̃ semen gigni, neq̃ procreatio fieri possit. 15

Testium membranæ quot & quales.

MATHESES, Quot membranis obducuntur? **GERON**, In viris quidem pluribus, ijsq̃ partim communibus, partim peculiaribus. Dum enim scrotum incidis, primum occurrit cuticula: deinde cutis subtilissima, rugosaq̃: postea carnosa: inter quam & cutem, nulla pinguetudo habetur, vt facilius extendi & contrahi, 20

prolongariq̃ & corrugari possit. **MATHESES**, Quot testium membranæ sunt propriæ? **GERON**, Tres exteriores: quarum prima ex neruea musculorum obliquoꝝ descendentiū exilitate oritur, Græcis *ἐμβροχιδής* appellatur, carnosis intertexta fibris, que testiculi utraq̃ parte musculus conficiunt. secunda nuncupatur 25

Membranæ testium quibus nominibus appellatur.

Græcis *δαρτός*, ac nihil aliud est, quàm peritonæi ipsius portio alba, & vasis adhærescens. Hisce duabus membranis, partim proprijs, partim communibus, tum vasa seminaria, tum testiculi conteguntur. 30

tertia ipsum testiculum peculiariter integit, alba, & crassa, græci *Ἰνδιδυμον* vocant: quanquam plæricq̃ anatomici, aliter de his sentiant. nonnulli enim plexum illum vasorum, qui supra testiculum cernitur *Ἰνδιδυμον* appellant. **MATHESES**, Quot in fœminarum testibus sunt membranæ? **GERON**, Vna tantum- 35

Fœminæ cur tam paucis testium membranis indigeant.

modo, quæ etiam à peritonæo circundatur, *Ἰνδιδυμός* græcorum voce dicta. **MATHESES**, Cur tam paucis membranis mulieres indigent? **GERON**, Quia illæ in occulto, securoq̃ loco, tanquam in

Testium mulierum situs.

naturę penitralibus continentur. Testes autem mulierum in alto siti sunt, eò quòd ipsæ natura viris frigidiore existant. **MATHESES**, 40

Cur viris testes prominent.

Cur viris extrinsecus prominent? **GERON**, Ne assidua coeundi cupiditate afficiantur, quòd tum vitam reddit breuiorem, tum homi-

homines ad negotia peragenda minus habiles efficit. **MATHE-**
TES, Per quod membrum semen in testibus elaboratum emittitur?

- GERON,** Per meatum quendam tum illi, tum lotio commu- **COLES.**
 nem, qui partim à ceruice vesicæ, partim à vesica ipsa originem
 5 ducit, & per totum genitale in viris penetrat. **MATHE TES,** Quo
 modo hoc ipsum genitale vocatur? ex quibus constat, & vnde
 originem suam ducit? **GERON,** In viris latine **COLES,** & penis, gre-
 cè *κῶλος* appellatur, ex spongiosa, rara, fungosâq; essentia conflu-
 tus. Originem autem ab inferiore parte ovis sub pube ducit: v-
 10 trinq; singula habet ligamenta dura, quæ ipsum suffulciant, fir-
 mentq; sic vt dextrum cum sinistro, iuxta longitudinem illius v-
 niatur. Adhæc natura duas arterias in eundem, à radice ipsius, vsq;
 ad extremam partem, quæ glans dicitur, tendentes, diffundit, nu-
 merosasq; & capillares istarum propagines, huc illuc dispergit.
 15 **MATHE TES,** Quare obsecrô ligamenta coli apposuit? **GERON,** Pri-
 mum vt eum corroborent: deinde ne spiritus nimis citò absum-
 pti euanescant, **MATHE TES,** Quid commodant coli arteriæ? **GE-**
RON, Vt magnam spirituum vim ad illum deferant, & per hanc
 essentia ipsius paulò antè rugosa, & flauescens attollatur, arriga-
 20 tur, indurescat, & rigeat: adhæc vt alimentum suppeditent, cum
 nulla in cole vena, nullusq; nervus adsit, quod etiam **Realdus** ob-
 seruauit, reliqui neglexerunt. **MATHE TES,** Nihil aliud ad fabri-
 cam colis desideratur? **GERON,** Super sunt adhuc quatuor muscu- **Colis musculi,**
 li, & tegumenta. primi ab eo, qui aluum constringit (*σφύγγη* Gre- **eorumq; officii.**
 cis dicitur) oriuntur: longiusculi, subter incedentes, & media
 25 quasi ipsius parte in vrinarium meatum, semini quoq; commu-
 nem, inserti, hunc comprehendunt, subtilesq; sunt. **MATHE TES,**
 Quid habent officij? **GERON,** Vt cum lotium, vel semen emit-
 tendum est, meatum hunc dilatent. Reliqui duo à coxendicis ap-
 30 pendice, sub colis ipsius origine prodeunt, breues quidem, sed
 prædictis crassiores, in eundemmet desinentes. hoc autem habet
 officij, vt magnam in reddendo lotio opem, maiorem verò in con-
 cubendo, membro genitali adferant. nam hoc sustentant, ere-
 ctumq; detinent, donec actio venerea absoluat. **MATHE TES,**
 35 Quidnam meatus ille, tum lotio, tum semini excernendo com-
 munitis prodest? **GERON,** Nihil aliud, quàm vesicæ essentia, ad col-
 lis fines exporrecta. **MATHE TES,** Quibus autem ista integuntur?
GERON, Cuticula, cute, membrana carnosâ, citra vllam pinguetu-
 dinem, quæ hîc propter motum abesse putatur, & ne coles in ni-
 40 miam molem excrescat, & vtero fiat inutilis. **MATHE TES,** Quid
 de extrema parte colis sentis? **GERON,** Pellis est, quæ glans integri-
 tur, præputium nuncupatur. hæc cum in concubitu nunc sursum, **Præputium.**

*Colis, siue penis
origo, et essentia.*

*Coles cur liga-
mentis, & artea-
rijs sit donatus.*

*Realdi inueni-
tum.*

*Colis musculi,
eorumq; officii.*

*Meatus vrina-
rius quid.*

*Colis integumen-
ta.*

nunc deorsum fertur, magna voluptate mulieres afficere creditur, eoq; Iudas quod maritis eorum præputium ademptum sit, minus voluptatis sentire. MATHETES, Qualia sunt naturalia muliebria?

NATUR
lia muliebria.

Quando mulie-
res concubitum
appetant.

Vteri situs, et fi-
gura.

Vteri figura.

Vtero vnus tan-
tum sinus.

Vteri sinus qua-
lis intus appare-
at.

Vteri figura.

Vteri foramen, et
ius officium.

GERON, Genitale mulieris sinus est, inter pubis ossa situs: 5
extremæ ipsius partes vtriq; colliculi sunt, & cuticulares carun-
culæ prominentes: quæ cum mulier venerem appetit, quod ma-
ximè antè, & post menses accidit, extuberant, alæ dicuntur lati-
nis. Post hunc sequitur vterus, qui latinioribus vulua, vulgo au-
tem matrix, grecis μήτρα siue ὤστρον vocatur. Situs est sub abdomine 10
vesicam & rectū intestinum: munitus verò vndiq; tanquam inter
validissimis munimentis: priore parte osse, quod pubi subest: po-
steriore, osse sacro: ad latera ossibus Ilium, ex quibus sacro, & pu-
bis ossi subiecto connectitur. In sinu suo crassus est, carnosus ner-
uosaq; essentia mixtus, vt dum fœtum continet, facilius extendi, 15
dilatariq; possit. Fibris constat rectis, obliquis & transuersis, vt
semen ad fœtum procreationem attrahat, retineat, & statò tempo-
re expellat. MATHETES, Estne æqualis in omnibus? GERON,
In virginibus quidem admodum exigua est, in mulieribus verò,
nisi vbi grauidæ sunt, non multò maior, quàm vt manu compre- 20
hendi queat. in illis enim & fœcundis amplior esse solet. rursus
minor illius quæ venerem nondū experta est, quàm eius quæ iam
coiuit. postremò puellarum quæ adhuc crescunt, vesicæ amplio-
res, quàm vuluæ existunt: in adultis vulua maior est, quàm vesica.
MATHE. Vnòne donata est sinu, an pluribus? GERON, Vno dun- 25
taxat: in quo licet exiguo, tamen gemini fœtus, vel tres, vel etiam
plures, pro seminis iniecti copia, formari possunt, id quod in ple-
risq; Europæ regionibus sepius accidit. Nugantur quidam vtero
septem inesse cellas, in quibus plures fœtus efformentur, cùm ta-
men illi, suis singulis membranis, in vno sinu inuicem distinguan- 30
tur. MATHET., Qualis sinus vteri intus apparet? GERON, Læuis,
nisi acetabula in eum descendencia, quæ venarum & arteriarum
capita sunt, nonnihil ipsum exasperent. quia cauæ sunt partes,
quibus semen adhæret, atq; tunc arteriæ arterias, venæ venas
gignunt. MATHETES, Figura eius qualis existit? GERON, Ro- 35
tunda propemodum, & arcto satis foramine peruiâ, quod orifici-
um ipsius appellatur, extrinsecus catuli recens nati os repræsen-
tans. MATHETES, Quò tendit foramen illius? GERON, In cer-
uicem eiusdem. MATHETES, Quid habet officij? GERON, Vt se-
men viri, per ceruicem immissum, recipiat. nam cùm vterus ve- 40
nere oblectatur, illud dilatescit: aperitur autem, quando mulier
semen emittit. MATHETES, Qualis vterus est extrinsecus? GE-
RON,

- R^{ON}, Membranofus, admodum pinguis, mufculorum expers: ob
 quod etiam motu voluntario deftituitur. MATHETES, Quam
 partem vocas propriè ceruicem vteri? GERON, Illam, cui tan-
 quam vaginæ genitale viri immittitur, vñdecim ferè digitorum
 5 longa, membranofa, & rugis circularibus prædita, vt genitale vi-
 ri in coitione amplexetur, atq; exugat: deinde quia hifce ipfa affri-
 catur, venierem ineuntes, multum voluptatis percipiant. MATHETES,
 Cur ceruix tam longa eft? GERON, Vt pariendi tempore dilatari
 poffit, & infans faciliùs in lucem prodire. MATHETES, Quid præ-
 10 terea ceruici ineft? GERON, In finibus ipfius verfus vuluam, ca-
 runculae quædam prominent, ex quibus voluptas in concubitu
 augetur. Infra has, latæ duæ membranæ ad latera extant, quas
 Græci *νύμφας* appellant, in hoc creatæ, vt vuluam à puluere, fri-
 gore, & aëre vindicent. Sub his alia membrana, græcè *ὕμην* dicta,
 15 in quibusdam virginibus nonnunquam apparet: hæc cum adefit,
 impedit ne genitale viri in vterum mittatur. craffa enim eft val-
 dè, & fuperiùs veficam verfus, foramen habet, per quod men-
 ftrua effluunt. MATHETES, Quibus membranis vterus contegi-
 tur? GERON, Præterquàm peritonæo, etiam propria ac peculia-
 20 ri. Hoc non prætereundum eft, veficæ ceruicem, ad vuluæ cer-
 uicis extremum definere. MATHETES, Qualia fœminis infunt
 vafa feminaria? GERON, Qualia in maribus cernuntur, fed bre-
 uiora. MATHETES, Habentne illæ etiam testiculos? GERON,
 Vtiq; fed multò minores, quàm mafculi: item oblongiores, mi-
 25 nusq; rotundos, & fuperiore in parte aliquantum depreffos, atq;
 craffiores. MATHETES, Qua in vuluæ parte fiti funt? GERON,
 In illius lateribus, paulò autem elatiùs, quàm fuperior fundi regio
 confiftit, idq; in ijs mulieribus, quæ non funt grauidæ: in illis au-
 tem, quæ vterum gerunt, quò hic magis extenditur, eò inferiùs,
 30 quàm cum libere funt. MATHETES, Quid testiculi fœminarum
 in fe continent? GERON, Anfractuofos venarum, arteriarumq;
 plexus, & finus quofdam non femper fibi fimiles, tenui, aquofoq;
 humore plenos. ficut autem is humor, veluti craffiusculum lactis
 ferum, in fanis mulieribus albus eft, ita quoq; luteus admodum,
 35 croceusq;, & paulò craffior aliquando in virginibus, & mulieri-
 bus strangulatu vteri oppreffis, apparet, qui grauem odorem, &
 venenofum quippiam præ fe fert. Porro iuxta testiculos, particu-
 læ duæ membranofæ, & latæ hærent, fibris quibusdam carnofis
 prædite. In fuma harum regione, vafa femen deferentia à testi-
 40 bus, hoc eft, preparantia ipfum, proficifcuntur, eque anfractuofa,
 vt in maribus, & in vuluæ finum definunt. Prope hæc, proceffus
 quidam mamillares vtrinq; finguli prominent, quos Herophi-

*Vteri ceruix quis
propriè dicatur.*

*Vteri ceruix
longa.*

*Membrana in
ceruice vteri.*

Hymen.

*Vterus quibus te
gatur membra-
nis.*

*Vafa feminaria
in fœminis qua-
lia.*

*Testiculi fœmi-
narum.*

*Testiculi fœmi-
narum quid con-
tineant in fe.*

*Humor testicu-
lis fœminarum
inclusus.*

*Vafa femen defe-
rentia in fœmi-
nis.*

*Proceffus mamil-
lares.*

*Vterus quibus sit
appensus.*

*Ligamenta vte-
ri.*

*Vterum alimen-
to indigere.*

UMBILICVS.

lus cornua vteri appellauit: quanquam in mulieribus non tam verè, quàm in brutis, eam figuram repræsentent. nam vterus humanus, longè ab his distat. **MATHESES**, Quibusnam vterus appensus est? **GERON**, Vasorum seminariorum, membranæq; illius subsidio, sacro osi, in extremo simul cum eius ceruice, osi quod sub pube est, & coxendici connectitur. Cæterum duo quoq; ligamenta neruosa, et caualateribus vteri adhærent: non autem ad summum os, quod pubi subest, perueniunt, sed per ea foramina transeunt, quæ in neruosis musculorum obliquorum, tum descendantium, tum ascendantium, & transuerforum tendinibus sita sunt, sicut in viris vasa feminaria per eadem transeunt. nam hi tendines in foeminis perforati cernuntur. Ligamenta itaq; prope vteri orificium exorta, extra abdomen procedunt, supraq; os quod pubi subiectum est, ascendunt: in excelsam autem quandam particulam, in vteri apice circumuolutam, desinunt, idq; supra foramen, ex quo lotium emanat. **MATHESES**, De illa particula nihil vnquam audiui. **GERON**, Credo equidem. fuit enim omnibus anatomicis hactenus incognita, præterquam Realdo Columbo, qui mulieres ex ea, si confricetur, magnam voluptatem capescere, adèd vt statim semen emittant, memoriæ prodidit: & si attingatur, duriusculam, & oblongam deprehendi, vt propemodum genitalis viri repræsentet. sed ista obscœniora sunt, quàm vt piæ iuuentuti conueniant: relinquamus ergo ista impudicis, & veneris amatoribus. **MATHESES**, Indigētne etiam vterus & foetus, si quem conceperit, vt reliquæ omnes corporis partes, alimento? **GERON**, Indubiè: atq; hoc, nempe probum sanguinem, tum venarum, tum arteriarum, & vasorum seminalium propagines, ad vterum tendentes, ei suppeditant. Nam ipsa vasa feminaria in foeminis, non in testiculorum capite, sed deorsum vteri ipsius alendi gratia effunduntur. Ne putes autem, vt communis est opinio, me hîc de illis venis agere, per quas menstruus sanguis expurgatur. nam hæc ex cauarum venarum ramis exortæ, in vteri ceruicis principium inferuntur. **MATHESES**, Quæ pars adhuc, post illas iam indicatas, est reliqua?

GERON, Nulla, nisi vmbilicus, per quem, dum in vtero latitamus, nutrimur, & excrementa reddimus. **MATHESES**, Vnde constat vmbilicus? **GERON**, Ex quatuor vasis, primùm venæ, quæ ab vtero exoriens, per ipsum, partem quandam diuisam socii minoris, sursum ingreditur, desinitq; in portas: deinde duabus arterijs, etiam nomina ab illo sortitis, quæ deorsum per foetus abdomen penetrantes, in duplicatione peritonæi, iuxta vesicam deferuntur, desinunt, vbi magna arteria diuiditur: postremò vasè, quod

quod græcè ὄρχος appellatur, quia à fundo vesicæ prodiens, vrinam ex foetu attrahit, & reservatur inter membranas duas, Græci ὀρχηφον & ὀρχηφιδῆ nuncupant. Sed hæc quatuor vasa prædicta, cum foetus in lucem prodit, quasi in funiculum quendam degenerant. **MATHESES**, Membra foetui generando idonea, iam ferè absoluisse videris, oro te, vt deinceps mihi exponas, quomodo ille in vtero formari soleat.

Vas vrinam ex
fetu attrahens.

GERON, Ad foetum concipiendum non solum marem, sed etiam foeminam semen emittere in concubitu oportet: aliàs angustum vteri os non aperitur. Debet autem aperiri, vt semen maris ad sinum illius effundatur, penetretq̃. Quod si tum mas, tum foemina benè valeant, & semen vtriusq̃ probè concoctum in vtero commisceatur, aduniaturq̃, fit conceptio. **MATHESES**, Quo potissimum tempore? **GERON**, Menstruis aut incipientibus, aut desinentibus. **MATHESES**, Qua ratione mascula, aut foemina proles generatur? **GERON**, Quando maior virilis seminis copia, efficaciq̃ existit, mascula gignitur: quando foemineum semen abundantius est, & valentius, foemella. adhæc, cum omnes naturaliberos nostri similes procreare, desideremus, fieri solet, vt cum maris semen excellit, masculus, cum foeminæ, foemella generetur.

DE FORMAN
do fetu, eiusque
situ in vtero.

Conceptio quam
dos fiat.

Mares aut foemi
ne quando gign
nantur.

MATHESES, Quid si foemina marem gignere appetat, vt plærumque accidit? **GERON**, Ea voluntatis non naturæ affectio est. si verò natura dominetur, voluntas rem appetitam non mutat. Cum itaq̃ vterus benè affectus, semen viri concoctum attrahit, in sinumq̃ suum recipit, tunc statim os vteri naturæ providentiæ coarctatur, ne illud rursus excidat. non enim semper retinetur, quamvis ad vteri fundum penetrarit, sed iterum elabitur: idq̃ dûas ob causas: vel quia minus concoctum sit: vel quia muliebres loci, vt in scortis, & alijs mulieribus parum pudicis, nimium humidi & lubrici existant.

Semen viri cur
non semper in v
tero contineatur.

MATHESES, Quid primum ex semine iam concepto, retentoq̃ nascitur? **GERON**, Membrana quædam insignis & magna, quæ vniuersum foetum, antè, retrò, infrà, supraq̃ tanquam exterum inuolucrum ambit: in brutis, vt boue, & alijs farciminis modo constructa, vnde Græcis ὀρχηφιδῆς appellatur, & vuluæ sinui adhæret. **MATHESES**, Quid post hanc gignitur?

Semine concepto
quid primum nas
citur.

GERON, Venæ quædam seminalium vteri propagines, quæ vbi inuicem coierint, aliam venam, recentiores anatomici, vmbilicalem vocant, progignunt. hæc superius dictam membranam, siue tunicam tenuem, mollemq̃ adhuc, vtpote recens natam, permeat. Dum itaq̃ ipsa, semen ὀρχηφιδῆς inuolutum, ad medium vsque penetrat, iecur efficit, eò quòd per vmbilicū ingreditur, & illud ascendat. Mox portæ iecoris procreantur, quæ hæc venæ vmbi-

Vena.

Vena vmbilicalis

Iecur.

licali sunt continuæ. MATHETES, Quæ post has, vena oritur?
 GERON, Cava, eaq; seminis alendi gratia. MATHETES, Gene-
 rantur ne etiam tunc arteriæ? GERON, Ab arterijs seminalium ra-
 nui, aliæ gignuntur, quæ in duas ymbilicales dictas degenerant,
 non autem ascendunt, vt vena ymbilicalis: sed versus os, quod
 sub pube est, potius descendunt, & supra lilia distribuuntur: po-
 stea magna arteria nascitur, & statim cor, arteriæq; ascendentes,
 aded vt priusquam cor ipsum generetur, arteriæ nascantur. MATHETES, In quem vsum amabod? GERON, Vt spiritu vitali foveant, prima enim nostra origine, plantarum: postea brutorum animalium, vitam in vtero agimus. Postremò cerebrum nascitur, vt nervi ab eo profecti, sensum per initia, deinde motum ad foetum vniuersum deferant: MATHETES, Ergo cor non erit originis nostræ principium, et fons sanguinis, omniumq; sensuum, vt olim ex meis præceptoribus, & Aristotele, didici, GERON, Nequaquam. nam foetus primum in vtero venarum, & iecoris beneficio crescit: deinde ex cordis facultate viuunt, postea ex cerebri, & nervorum auxilio mouetur & sentit: deniq; ex eiusdem ope intellectum & rationem consequitur. MATHETES, Si viscera ab origine ipsorum iudicari debent, iecur esset corde, & cor cerebro nobilius. GERON, Rectè colligis, sed cerebrum non ideo reliqua dignitate superat, sed quòd ipsum ex semine, non ex vtero, vt cor progeneretur. quanquàm in animalibus, quæ oua pariunt, cor primum oriatur, sicut in homine iecur, & inter ossa illius, vertebrae, seu spina. MATHETES, Quæ post genitam membranam allantoiden, natura creare solet? GERON, Affusionem quandam placenta: modo orbicularem, hoc est, materiam quandam excrementorum instar crassam, vt venas, arteriasq; plurimas, per ymbilicum tendentes, suffulciat, vnitasq; detineat: Galenus *χωλερον* vocat, quasi secundas, quæ non in mulierculis, sed in brutis potius inueniuntur. Affusio ista, inquam, licet allantoidi membranæ superposita sit, tamen foetum minimè ambit, vtero pertinaciter adherescens. non itaq; mirum est, quòd magna in partu fiat sanguinis profusio, cum venæ & arteriæ disrumpantur. MATHETES, Qua in parte affusio eadem sita est? GERON, In priore, vt foetus ab externis iniurijs, propugnaculi instar tueatur. MATHETES, Quæ reliqua sunt in foetus formatione? GERON, Tertia membrana tum nobis, tum brutis communis. hoc autem differt, quòd in his crassa, in humanis foetibus tenuissima sit, Græcis dicitur *αμνιον*, totus foetus hac inuoluitur, & in ea protinus situm suum habet, vapor, usq; sudor ab illo defluens, ceu excrementum, continetur. MATHETES, Quid sudor foetui commodat? GERON, Dum

Dum in eo innatat, sic suffulcitur, vt matri minus sit molestus.

MATHETES, Quæ alia excrementa, præter vrinam & sudorem, à foetu proueniunt? GERON, Nulla, eò quòd ille ex solo sanguine probò, non menstruo, & vitioso, vt vulgares opinantur, alatur.

Excrementa fœtus.

5 MATHETES, In qua membrana vrina referuatur? GERON, Inter amnion, & allantoida, idq̃ ob hanc causam, ne illa foetum attingat, & cum salsa & acris sit, ipsum adhuc tenerum exedat. Ideo etiam natura meatum, quem Græci ἔσχαλον vocant, in vesicæ fundo procreauit, qui inde sursum, versus vmbilicum fertur: ea verò par

Vrina fœtus in qua membrana continetur.

10 te prodit, per quam vena arteriaq̃ vmbilicalis ingreditur, ipsiq̃ adhærescit. meatus ille vrinæ excipiendæ addictus, amnion tunicam penetrans, illam ad allantoida perducit. MATHETES, Quî sit, vt tanta excrementorum copia citra putredinem retineatur? GERON, Id calorîs natiui ratione accidit, vt foetus, dum in vtero alitur, facilius ob excrementa detenta gestetur. vbi pariendi tempus accesserit, illamembranas amnion & allantoida disrumpit, exeuntque, & foetus simul cum ipsis in lucem prodit. MATHETES, Quo-

Meatus ἔσχαλος vbi & ad quid procreatus à natura.

modo obstetrices hæc excrementa vocant? GERON, Aquam, quam cum vident effluentem, statim foetum in lucem proditorum nunciant, & bonam spem facili, & fortunati partus faciunt.

Excrementa fœtus detenta, cur non putrescant.

dum enim loci muliebres, excrementorum humoribus irrigui, et lubrici fiunt, foetus promptius erumpit. sin autem illa remorentur, & loci mancant sicciore, difficiliorem, & grauem fore præfagiunt. MATHETES, Cur mulieres nunc facilius, nunc grauius

Partus facilis & fortunati signa.

25 parturiunt? GERON, Quia aliæ os vteri nimis angustum habent, quod tunc adeò dilatari oportet, vt partui amplitudine respondeat, per quam exire debet: aliæ durius, neruosiùsq̃: aliæ latius, molliùsq̃. vnde fit, vt aliæ statim, & exiguo cum dolore, aut quasi nullo, pariant: aliæ tardiùs, & maximis cruciatibus ante partum

Parturientium dolores tam graues vnde.

30 afficiantur, præcipuè autem circa eam oîsis sacri partem, quam Græci κόρυζα appellant: ideoq̃ mulieres de hac regione magis, quàm de alijs conqueri solent. MATHETES, Qua parte infans in vtero alimentum accipit? GERON, Per vmbilicum, idq̃ venæ quæ ab eo vmbilicalis dicitur, auxilio, non autem per os, quod

In partu cur aliæ magis, aliæ minus doleant.

35 Hippocrates voluit: idq̃ ex laudato sanguine, qui per vasa seminaria defertur, quæ materiam cum illo continuè deorsum ferunt: vt si quando ille deficiat, infans habeat, quo sustineatur. MATHETES, Cur non menstruo nutritur? GERON, Quia excrementitius est, & nutritioni ineptus. MATHETES, Si ergo hic non alit

Infans siue fœtus vnde nutritur in vtero.

40 infantem, cur in grauidis toto gestationis tempore non effluit? GERON, Quia non gignitur, tanquam naturæ inutilis, & ab vtero eijciendus, sed vniuersus ipsi foetui nutritur, & distribuitur:

Fœtus laudali sanguine nutritur, nō menstruo.

Sanguis menstruus cur in grauidis non effluit, in quibusdam verd etiam fluere non desinat.

*Sanguis menstru-
us quid propriè
sit.*

*Infans in vtero
nullius membri
officio indiget.*

*Infans per arte-
rias in vtero spi-
rat.*

*Fœtus in vtero
nihil elaborat.*

*Arterię & vene
vmbilicales quid
presint.*

*Vasorum nexus
in vmbilico.*

*Laqueus infan-
tibus obductus.*

*Monstra infan-
tium quomodo
fiant.*

quanquam sint mulieres, quibus grauidis menses statò tempore
profluant. MATHE T. Ob quid hoc euenire solet? GERON, Quia
copioso illę sanguine abundant. quę enim minus sanguineę sunt,
ijs dum vterũ gerunt, nullę menstrue purgationes adsunt. MATH.
Quid ergo sanguinem menstruum propriè esse putas? GERON, 5
Excrementitium, ac superfluum, quem nonnulli auctores adeò
venenosum existimant, vt herbas, atq; arbores, si ipso inquinentur,
cogat arescere. non enim illud, quod in fœtus intestinis contine-
tur, cibi, sed sanguinis excrementum est, eoq; non malè olet, sicut
eorum, qui iam nati sunt. quòd si cibi excrementa essent, etiam 10
vrine modo immutarentur. MATHE T. Nullo igitur membro ad
officium aliquod peragendum, infans indiget? GERON, Nullo: ne
corde quidem. MATHETES, Quae de causa? GERON, Quia spiri-
tus vitalis, siue sanguis spiritualis, per vmbilicales vteri arterias,
ad fœtum deferitur: quarum interuentu & auxilio, fœtus respirat 15
(si hoc respirare dicendum est). MATHETES, Nihil igitur fœtus in
vtero elaborare cogitur? GERON, Nihil, neq; ad sanguinem, neq;
ad spiritus vitales generandos: quia omnia iam elaborata à ma-
tre, ad omnes fœtus partes deferuntur. MATHETES, Quid tan-
dem ex arterijs hisce & vena, quę vmbilicum constituunt, effici- 20
tur? GERON, Ab vtero ad vmbilicum vsq; peritonæo satis cras-
so, longo itinere inuoluuntur: postea contorquentur, & nodos
quosdam generant, qui non æquales numero in omnibus parien-
tibus apparent: quanquam obstetrices nonnullę, tot fœtus ab v-
tero prodituros, quot ipsi sint nodi, falsò prædicent. totidem e- 25
nim omnino in extremo fœtu, quot in puerpera conspiciuntur.
MATHETES, In quem vsu vasa hæc procreata sunt? GERON, Vt
sanguinem ad fœtum paulatim deferant, sic vt is in ipso itinere
quali remoretur, & ita pedetentim eò perueniat. MATHETES,
Quò vasa hæc tendunt? GERON, A membranarum rectà ad cerui- 30
cem, ibiq; deorsum tendentes, flectuntur, atq; vmbilico inse-
runtur: deinde connexa, per sinistras scapulas ascendunt, & per
dexterascendunt, ita vt cum fœtus prodit, membranas secum
extrahat. obstetrices stolidę, nexum istum vasorum, laqueum ap-
pellant, quo infantes obductos, suspendio perituros augurantur, 35
cum magna pars eorum, qui huiusmodi laqueo implicati prode-
unt, non eo supplicij genere intereant. MATHETES, Cum supe-
rius plures fœtus in vtero concipi posse dixeris, quomodo mon-
stra infantium, sese attingentium fieri solent? GERON, Nisi fœtus,
cum semine copioso in vuluam iniecto, delincentur, proprijsq; 40
singuli membranarum distincti, simul cohæreant, in eiusmodi defor-
mitatem incidit. MATHE T. Quot, & qui partuum in vtero ha-
bitus,

- bitus, existunt: GERON, Tres. nam aut in caput conuersi sunt: qui habitus est omnium frequentissimus: aut in pedes: qui rarior habetur: aut in transuersum iacent: qui secundo rarior existit. MATHETES, Quomodo in vnoquoque habitu, in lucem prodeunt? GERON, In priore, infantes præeunte capite foras tendunt: in secundo, pedibus, vnde ipsi Agrippæ dicuntur: in tertio, natibus. facie omnes versus matris coccýgem respiciunt. MATHETES, Quam formam infantes repræsentant in vtero? GERON, Quocumque in habitu positi sint, rotundam, & globi instar orbicularem: quæ tamen in longum tendat. MATHETES, Quem singula membra positum habent? GERON, Dextrum brachium flexum est: manus extrema cum digitis extensa: digiti sub aure dextra, superque ceruicem siti sunt: sinistrum brachium ferè extensum est, supraque mammam sinistram, & faciem: caput ita flexum est, vt mentum ad thoracem perueniat. Sinistrum itaque brachium, medio cubito dextro fulcitur, digitis parum tensis, pollice deorsum vergente: cruribus sursum, & quasi in arcum incuruatis. femur, tibia, & pes extremus dexter, adeò sunt flexa, vt abdomen, femur, vmbilicus genu attingat. tibia deorsum flexa est, & calx nates sinistras attingit: pes extremus eleuatur, & naturalia occultantur. sinistrum crus semiflexum est: femur inum ventrem attingit: tibia supra abdomen, thoracemque, & sub extremum brachium vertitur: pes extremus sursum voluitur, sic vt dextrum cubiti processum, *ἀλλέεργον* Græci vocant, & sinistri brachij palmam attingat. dorsum hinc in anteriora versum est: quæ omnia rotundam oblongamque infantis figuram efficiunt, qualis semper in vtero deprehenditur. Atque hæc ad naturales partes cognoscendas satis esse possunt. reliquum nunc est, vt ad spirationis, & vitæ officinas exponendas, digrediar. MATHETES, Placet mihi, optime præceptor. nam tuo vbiq; consilio, iudicioque acquiescere, & stare decreui.

- GERON, Inspecto igitur toto ventre inferiore abiectoque, (nam citò putrescit) thoracis, qui secundus quasi venter est, strueturam persequar, vsumque singularum ipsius partium adiungam. MATHETES, Quid propriè thoracem appellas? GERON, Extrinsecus id vniuersum, quod à costis comprehenditur, sicut in ossium historia didicisti: intus pars est, in qua respirandi, & vitæ instrumenta consistunt. MATHETES, Qui fines thoracem circumscribunt? GERON, Elatior eius pars, clauiculæ existunt: inferior, septum transuersum: media eius regio, pectus. imo huius ossi cartilago triangula annata est, quæ Græcis *ἐπιφωδὴς*, quasi mucronata dicitur. Extrinsecus ei complures muscoli incumbunt, sicut mam-

Situs sue habitus infantis quos & qui.

Infantes quomodo in vnoquoque habitu in lucem prodeant.

Infans in vtero quam formam re præsentet, & quem singula membra positum habeant.

DE THORACE, eiusque partibus tum externis, tum internis.

Thorax quid propriè dicatur.

Cartilago mucronata.

mæ vtræq; parte singulæ, cordi caloris officinæ, MATHETES, Quales sunt mammæ?

MAMMÆ.

Mammæ sub
stantia qualis.

Mammæ va
sa, eorumq; usus.

Vasa ad mammas
peruenientia.

Mammæ cum
quibus corporis
partibus habent
confortium.

Venarum in mam
mis vnio, & ori
gō.

MPSCVLI
thoracis.

Thorax cur tot
musculis indi
geat.

Thoracis motus
duplex.
Naturalis.

GERON, Glandulosæ, venis, & arterijs intertextæ, penicillis similes, vt videre licet, si linea recta per medium diuiseris. MATHETES, Cur vasis donatæ sunt? GERON, Primum, vt alimentum, præsertim in mulieribus, nempe sanguinem à vasis eò pertinentibus elaboratum, & longo itineris anfractu in lac conuersum infanti præbeant: deinde, vt cor ipsum, veluti propugnacula quædam, contegant, & ab eo calefactæ, facilius sanguinem allatum immutent. MATHETES, Quænam vasa ad mammas perueniunt? GERON, Ad singulas singulæ venæ, & arteriæ insignes, quæ non statim, sed prope iugulum ex magna tum vena, tum arteria prodeunt. verum harum commoda magis fœminarum, quàm virorum mammas communicari solent. MATHETES, Cum quibus corporis partibus mammæ habent confortium? GERON, In fœminis cum vtero. nam propagines venarum, quæ mammas ex pectore distribuuntur, deorsum sub rectis excurrentes musculis, cum ijs, quæ ab inferioribus sursum feruntur, oris cœunt: nimirum ea de causa, vt quando fœtus in vtero formatur, augeturq; venæ communes alimentum ex vtriusq; suppeditatum, soli illi ministrent: vbi verò infans in lucem prodierit, vt totum id sursum mamillis influat, nam tunc fieri nequit, vt & menstrua probè fluant, & mulier lactet: quia altera pars semper siccefcit, dum sanguis in alteram defertur. MATHETES, In omnibusne mulieribus superiores venæ vtriusq; mamillæ, singulæ cum inferioribus vniuntur, cœuntq; GERON, In quibusdam vnus tantum, aut ambarum ramulo perexiguo committuntur. est cum in quibusdam nulla harum venarum vnio inueniatur. MATHETES, Vnde inferiores istę venę, quæ cum superioribus cœunt, proficiscuntur? GERON, Non ab vtero, sed eius ceruicis ramis, per quos menstrua expurgantur. Sed de his aliàs audiui: nunc musculos thoracis aggrediar. vt autem illos faciliè inuenias, adipem totius thoracis, & mammas scalpello tollere oportet.

MATHET. Quot, & qui sunt thoracis musculi? GERON, Vnus & octaginta proprij: octo autem communes, in abdomine siti, qui licet huic dicati sint, tamen etiam thoraci inseruiunt. MATHETES, Cur tot musculis thorax indiget? GERON, Quia hic tum voluntate, tum natura mouetur. MATHETES, Quando naturaliter? GERON, Cum dormimus: ideo etiam corporis nostri opifex, inter costas & pectus cartilagine constituit, quæ pulmonis motui faciliè cederent. Hic namq; siue vigilemus, siue dormiamus, mouetur, præterquam cum loquimur, aut yociferamur. tunc enim pau-

lò am-

- lò amplius mouetur, eò quòd tunc illum magis dilatant. MATHE-
 TES, Vnde fit motus voluntarius? GERON, A musculis. MATHE-
 TES, Vnde naturalis? GERON, Expulmonis dilatatione, ac con-
 strictione. Hoc autem obseruatione dignum, cum inspiramus,
 5 inferiores thoracis partes dilatari, superioresq; comprimi: cum
 autem expiramus, inferiores constringi, superiores dilatari. MA-
 THETES, Qui primi sunt musculi? GERON, Vtrinq; singuli, ab
 inferiore iugulo prodeuntes, initioq; & sine oblongo præditi, in
 superiorem primæ costæ partem, quam dilatant, inseruntur. MA-
 10 THETES, Quis hunc sequitur? GERON, Magnus, latus, carno-
 susq; totus, qui à scapularum basi exoritur, interq; illam & costas
 incedit, & octo, interdum nouem costis ordine inseritur. Fines
 eius prope eam partem, qua in cartilaginem desinunt, digitorum
 modo extenduntur. MATHE TES, Quid hic habet officij? GERON,
 15 Vt octo costas dilaret. MATHE TES, Qualis est tertius? GERON, Tertius, & eius
 Exilis, & paruus, à spinis trium ceruicis vertebrarum, & à prima
 thoracis exoriens. principium habet latum & membranofum: in
 primas thoracis costas, & nonnunquam in posteriorem quartæ
 regionem desinit: in hoc à natura conditus, vt hæc costas dilaret.
 20 MATHE TES, Qualem dicis esse quartum? GERON, Exilem, &
 quadrangularem, qui à spinis duarum extremarum thoracis ver-
 tebrarum, interdum à prima lumborum prodit. initium ipsius
 latum, neruofum, & membranofum est: deinde carnosum euadit,
 atq; in tres infimas costas terminatur, digitorum instar, illasq; di-
 25 latat. MATHE TES, Nunc quintum recenseas. GERON, Is carno-
 sus, à posteriore, superioreq; sacri ossis regione, & interno Illo-
 rum osse procedit, adeoq; pertinaciter secundo dorsi musculo ad-
 hæret, vt meritò portio eius esse videatur: quanquam à dorsi mu-
 sculo sit diuersus, cum primùm ad costas peruenerit. quò magis
 30 ascendit, eò tenuior efficitur: tandem omnibus costis posteriore
 in parte, prope transuersos vertebrarum processus, vbi costæ
 asperiores eminent, neruosorum musculorum adminiculo,
 inseritur: posteriores thoracis partes constringit. MATHE TES,
 Vbi sextus est situs? GERON, In sinu thoracis interno iuxta pe-
 35 ctus, & septem legitimarum costarum cartilagine. Est autem
 oblongus, totusq; carnosus, sed exilis, in hoc genitus, vt priora
 thoracis coarctet. MATHE TES, Qui post hos iam enumeratos
 musculos, sequuntur? GERON, Intercostales: inde hoc nomen
 sortiti, quòd costarum interualla occupent. sunt autem vtrinq;
 40 triginta quatuor. MATHE TES, Quot sunt costarum interual-
 la? GERON, Vndecim: legitimarum quidem sex, quinque verò
 spuriarum. atq; in harum singulis interuallis desunt musculi,

*Voluntarius.**Primi thoracis musculi.**Secundus, eiusq; officium.**Tertius, & eius usus.**Quartus thoracis musculus.**Quintus thoracis musculus.**Sextus thoracis musculus.**Musculi intercostales.**Costarum interualla vndecim.*

Musculorum intercostalium triginta quatuor.

Musculorum intercostalium exteriorum, & interiorum habitus atq; origo.

Musculorum intercostalium versus.

SEPTI transversus musculus.

Septi transversus finis, figura, ex-

ijq; decem numero existunt: in illorum spatijs quatuor: qui in totum efficiunt viginti quatuor: & sic vniuersi coniuncti, triginta quatuor euadunt. MATHETES, Cur legitimæ & spuria in his differunt? GERON, Quia cartilagine versus pectus vertuntur. MATHETES, Quo habitu muscoli isti apparent? GERON, Exteriores, interioresq; fibris obliquis constant, ijsq; contrarijs, adeo vt exteriores cum interioribus literam X representent. MATHET. Vnde exteriores oriuntur? GERON, Ab inferiore parte costarum, ac in superiorem subsequantium desinunt, cum versus dorsum incipiant: tandem pectoris ossi inseruntur. MATHETES, Vnde interiores originem sumunt? GERON, A superiore costarum regione, & in formam supra positæ terminantur. MATHETES, Vnde incipiunt, & quod tendunt tum exteriorum, tum interiorum musculorum fibræ? GERON, Illorum quidem, à dorso ortæ, oblique versus pectus ita vergunt, vt à supernis ad inferna descendere videantur: horum, contrario modo se habent, sic vt literæ Græcorum X instar coniungantur. Sunt autem hi muscoli subtiles, & longi, nec altiori loco siti: quia quod spatium costis intercedit, breuissimum est. MATHETES, Quis horum musculorum intercostalium vsus est? GERON, Cum interiores, vel exteriores soli per se operantur, thoracem dilatant: cum verò omnes simul mouent thoracem, validè constringunt. exteriores enim sursum trahunt: interiores deorsum. atq; ita simul costas trahunt, & validè constringunt, idq; non citra rationem: nam validam constringendi vim in thorace esse oportet, eò quod foras expiremus, & vociferemur. MATHETES, Qua de causâ nonnulli anatomici, musculos istos constringere tantum putant? GERON, Quia primam costam in hoc motu immobilem permanere opinantur. si verò scirent, illam à primo thoracis musculo, qui à iugulo exoritur, erigi, sententiam mutarent. nam hæc cum attollitur, costas etiam ordine trahit, quibus muscoli sui intercostales auxiliantur: atq; ita sursum versus extenduntur, sic tamen, vt exteriores eis succurrant: deorsum verò inferiorum adiumento. Nam postrema costa, à musculo abdominis oblique ascendente, deorsum trahitur: atq; hac ratione dilatantur. vbi verò vtriq; simul functionem suam obeunt, tunc vniuersus thorax constringitur, vt antea exposui. MATHETES, Süntne alij adhuc muscoli intercostales, præter eos, quos hactenus recensuisti?

GERON, Restat vnus non vilissimus, quem Græci *ἡσέφραγμα*, Latini septum transversum appellant, eò quod membra nutritio- ni dicata, à vitæ officinis distinguat. differt ab alijs omnibus situ, figura, & excelsa. nam in ultimo thorace consistit, & corpori nostro

nostro tranſuerſus manet. figura eſt rotundus, in medio neruo-
ſum tendinem, acri ſenſu præditum obtinet: quanquam carnoſis
partibus circundetur, ſic vt fibræ à capite ipſius, ad ambientem
regionem tendant. Ideo autem cæteros muſculos excellit, quòd
5 in eo veteres quaſi mentem conſiſtere putarint, vnde Plato ip-
ſum *φρένας* appellauit. hoc enim obleſo, vitam ſepe amittimus. Ad-
hæc venę arteriæq; inſignes, ſepto huic adſunt: nec non ampliores
nerui, qui à ſpinali medulla prodeuntes, inter coſtarum ſpatia, ad
illud feſtinant. Ex illis autem duo, inter quartam & quintā cervi-
10 cis vertebram incedentes, inferius ſupra cordis inuolucrū inferun-
tur: vbi carnoſa pars ſepti in tendinem degenerat. Galenus hunc,
nunc à ſpuriarum coſtarum cartilagine, nunc à ſpina exoriri, tan-
quam rei dubius, recenſet. MATHETES, Quid ſeptum hoc tranſ-
uerſum thoraci confert? GERON, Expirationi & inſpirationi ſer-
15 uit. Cùm enim ſuo munere fungitur, retrahit ſe ad vertebras, &
aſcendens thoracis extrema ad ſe trahit, inferioremq; regionem
vniuerſam conſtringit, idq; in expiratione. cùm autem inſpira-
mus, illud laxatur, & deſcendendo inferiora thoracis dilatari per-
mittit. Notandum autem quoduis animal ſolo hoc ſepto, ſi eo
20 præditum eſt, in paruis reſpirationibus vti: vbi verò magna reſpi-
ratione opus eſt, corpore aut ob exercitium, aut febrem, aut vehe-
mentem aëris calorem, aut alium quendam affectum, digeſto,
intercoſtales illi ſuppetias ferre oportet. ſin adhuc maior reſpi-
ratio requiratur, tunc elatiores quoq; muſculi opitulantur. MA-
25 THETES, Vnde muſculus ille trahit originem? GERON, A verte-
bris, vel potius à duabus illis partibus longiuſculis, ſiue ligamen-
tis, quæ ex ipſius duodecimæ thoracis vertebræ latere prode-
unt, & ex ſuperiore lumborum regione: atq; hinc poſtea neruoſa
muſculi iſtiſus pars, ſumit initium, cartilaginiq; mucronatæ con-
30 iungitur, quæ in hoc eſt creata, vt ſeptum potius, quàm os ven-
triculi, vt vulgò putant, tueatur. MATHETES, Manétne vndiq;
neruoſum? GERON, Non, vtrinq; ſit carnoſum, & tandem in car-
tilagines coſtarum mendacium inferitur, ſic vt vltimam coſtam
amplectatur. MATHETES, Cùm itaq; totum thoracem interſepi-
35 at, continuūmne per omnia exiſtit? GERON, Nequaquam, ſed duo
habet foramina: hoc in ſiniſtris: illud in dextris. MATHETES, In
quem uſum? GERON, Vt caua vena, quæ in thoracem progre-
ditur, per dextrum aſcendat: gula verò per ſiniſtrum deſcendat,
quæ in ventriculum deſinit, ſic vt cum illa nerui duo incedant,
40 quos ſextum par cerebri effundit. Sunt qui tertium etiam for-
amen ſtatuant, per quod arteria *ἀορτή* tranſeat: ſed aliter res habet.
nam illa ſic permeat, vt vertebris ipſis adhæreſcat. Itaq; ſeptum

*cellentia, & diſfe-
rentia ab alijs.*

*Septi tranſuerſi
vilitas.*

*Septum tranſuerſum
vnde oria-
tur.*

*Cartilago mucro-
nata ſeptum tue-
tur.*

*Septi tranſuerſi
foramina duo.*

dum vertebrae amplectitur, arteriam quoque citra foramen comprehendit. Nonnulli arteriae magnae, & gulae iter commune esse produnt, sed id à vero alienum esse constat. **MATHESES**, Suntne utraque foramina iam dicta inter se consimilia? **GERON**, Non admodum, sed superius grande, infernum exile. hoc autem non plane rotundum, sed triangulo potius simile existit: cui vertex sit sublimior, basis autem spinæ innixa. **MATHESES**, Externis iam thoracis partibus, utcumque intellectis, quomodo interiores examinari debent?

INTERNE
thoracis partes.

GERON, Prius thoracis os, quod latine pectus appellavimus, medium cultro excisorio dissecandum est, ijs quæ illi incumbunt, antea ablati, totumque ad mucronatam usque cartilaginem, in duas partes dirimendum, eoque in exteriora deduci, leuiter reflectendo debent. aut costæ legitimæ à cartilaginibus suis scalpello separentur, & iugulum à pectoris osse seiungatur. quo facto diuortio, pectus soluitur, idque ad mucronatam ipsius cartilaginem modice eleuatur, ut membranæ ei annexæ, thoracem intersepientes, de quibus postea audies, considerentur: deinde vasa iuxta glandium ex grandioribus orta, quæ os pectoris intus preceptant, superioremque thoracis regionem alunt, examines.

MEMBRANÆ
na costas succingens.

Post hæc, membranam costis intra thoracem obductam, quæ Græcis *σπληνικός* dicitur, quod illas succingat, aranei modo pertenuis, sibi ex toto similis, peritonæi instar, inspicias. **MATHESES**, Suntne aliæ etiam in thorace?

MEMBRANÆ
ne intersepientes.

GERON, Ex hac succingente aliæ duæ, utraque parte singule nascuntur, quæ totum thoracem intersepunt, recta linea ad pectoris longitudinem mutuò sibi adhærentes, nisi quantum ea in parte abscedunt desinuntque, quæ cordis apex est. hoc enim medium, proprio crassioreque inuolucro, Græci *σπληνικός* appellant, intercipientes, ad mucronatam usque cartilaginem porriguntur: nonnunquam tamen, in superiore etiam regione, ad pectoris latitudinem inuicem distant, ubi pulmone circumhærescunt, cuius sunt operimentum. **MATHESES**, Vbi ipsæ terminantur? **GERON**, Posteriore parte vertebris spinalibus tutò inferuntur: priore per medium pectoris os ad iugulum usque ascendunt. Basis ipsarum supernis septi partibus obiecta est, ita ut circulum ipsius interiorum contegat. Hoc etiam obseruandum, quod nervi duo septi transuersi, supra commemorati, per has excurrant. **MATHESES**, Qualis membranarum istarum usus? **GERON**, Duplex: primus & summus, ut duos thoracis sinus efficiant: ut si quando vulnere magno in alteram eius partem recepto, respirationis opus perierit, quod per illam obibat, alter sinus incolumis actionem saltem dimidiam

Membranarum
intersepientium
usus.

mediam tueatur: secundus, quo arterias indidem, venas, gulam, pulmonemque totum thoraci colligent, omniaq; ea contegant.

MATHETES, Quæ pars post membranas istas cognoscenda est?

*COR.
Cordis situs.*

GERON, Cor, omnium arteriarum fons & origo, situm in thoracis sinu obliquum, non rectum, vt in brutis, supra septum transuersum habet, sic vt hoc attingat, in illis autem non parum distat. Basis eius in dextro propemodum latere: vertex in sinistro consistit.

MATHETES, Qui igitur illud in medio thoracis positum esse dicunt, errant?

GERON, Indubiè, sicut etiam ij, qui in medio corporis collocant.

*Cordis involu-
crum quale.*

MATHETES, Quale eius involucrium est? GERON, Crassa membrana, quæ quantò ossè mollior, tantò pulmone durior existit: atq; illi ceu vallum, & munimentum tutum circumdatur, vt quæ cor contineat, colligatq; ne decidat, nè ue os pectoris, & costas attingat: ob quod etiam cordi non cohæ-

Pericardium.

ret, sed parua quædam regio intermedia est, motui ipsius, quo attollitur, & summittitur, accommodata: in quam aquosus quidam humor colligitur, quo illud humectetur: aliàs ob crebros, et quasi perpetuos ipsius motus, exiccaretur. cum autem nimis copiosus ille existit, cordis palpitationem, quam Græci *πάλυν* vocant, excitat.

MATHETES, Vnde trahit originem? GERON, Non ex corde ipso, sed ex vasis inde procedentibus, nempe magna tum arteria, tum vena, & in homine septi transuersi tendini valde cohæret.

MATHETES, Inspecto iam pericardij ortu, annexuq; & natura, quid deinceps agendum erit?

GERON, Specillum in mucronem eius iniicies, ac ad vasorum quæ in cordis basi sunt, ortum vsq;

secabis, exilesq; venas cauæ propagines, considerabis: deinde acutiore scalpello à vasis liberabis, & adipem intermediam tuismet digitis auelles, cura adhibita, ne neruulum lædas, qui à sinistro recurrente ortus, ad membranam cor inuoluentem peruenit.

Cordis tunica.

MATHETES, Quid præterea de corde habes? GERON, Quòd præter istud pericardium, propriam habeat tunicam, quæ ipsum suo interuentu contingit, & quòd non exigua pinguetudo, inter cor & pericardium manifestè contineatur, illiq; adhaerescat.

MATHETES, Cur cordi pinguetudo est necessaria? GERON, Ne ob motus continuos exicceetur: cuius gratia etiam aliæ complures corporis nostri partes, vt oculi, & musculi temporum illam obtinent.

*Cordis pinguetudo
de quid commo-
det.*

MATHETES, Qua figura cor in homine præditum est?

Cordis figura.

GERON, Non in totum pyramidis instar, vt in brutis, sed depressum potius apparet.

MATHETES, Qualis est cordis caro? GERON, Cum sit omnium arteriarum, animæq; irascibilis,

*Cordis caro quaa-
lis.*

& caloris nativum, quo animal gubernatur, nec non spiritus vitalis officina, & domicilium, duplici motu continuo agitatur, dum se

- nunc attollit, nunc summittit (Græci hunc *συσπλω*, illum *διασπλω* nuncupant) dura, densa, minusq; iniurijs, quàm aliorum viscerū, opportuna est, ex triplici fibrarum genere conflata, nempe rectis, vt trahat: transuersis, vt contineat: & obliquis, vt expellat. Hoc adhuc notari debet, duplicem etiā quietem cordis esse: nempe vnā postquā eleuatum: secundā, vbi summissum est. **MATHESES**, Ad quid attollitur? **GERON**, Vt aërem ex pulmone, qui illud comprehendit, per arteriam, refrigerandi caloris, nutriendiq; gratia recipiat, & sanguinem ex vena caua attrahat, pulmōni tantū, non sibi alimentum pręparans. **MATHESES**, Quid præstat cordis summissio? **GERON**, Vt fuliginosa recrementa expellantur, & sanguis elaboratus pulmōni nutriendo suppeditetur. **MATHESES**, Quare duplex, inter duos illos motus, quies intercedit? **GERON**, Vt aëre, ex pulmone attracto, interea fruatur. verū primā faciliē tactu in omnibus pulsibus percipimus: alterā verō non nisi in maximis, & vehementissimis pulsibus experimur. **MATHESES**, Quid cordi præterea extrinsecus annexum est? **GERON**, Venę cauę soboles, superficiem eius coronę modo cingit, quę inde Græcis *σφαιναία* dicitur, nimirum alimentum illi suppeditans: nec non arteria, huic socia, similiter illud ambit, vt scilicet spiritus vitalis eius facultate refocilletur: interdum binę inueniuntur. Adhęc neruulus ab eo deriuans (qui à sinistro recurrente ortus, ad cordis caput obscurē admodum pertinet) inuolucris ipsius basim penetrat, sensum eorum quę offendunt, communicans. Alsistunt etiā cordi iuxta ipsius basim vtrinq; duę quędam particule, brutorum animantium auriculis similes, membranosę, cutis modo tenues, anfractuosaq; in hoc procreatę, vt venam cauam, arteriamq; venosam tueantur, ne dum cor mouetur, ipse disrumpantur, vt quę nonnunquam sanguine scateant. Atq; hęc de exterioribus partibus cordis exposui: si viles, nunc interiores persequar. **MATHESES**, Placet utiq; si tibi molestum non erit. **GERON**, Cor duos intus habet sinus, siue ventriculos, in vtroq; latere singulos, medio quodam discretos septo carnoso & crasso: dexter à capite seu basi cordis, ad apicem vsq; deorsum, semicirculi caui instar, descendit: sinister autem multò licet dextro maior existat, ampla tamen basi incipiens, in angustum mucronem desinit. **MATHESES**, Quid vterq; sinus continet? **GERON**, Dexter sanguinem naturalem, sinister vitalem: sic vt illum tenuior cordis caro, hunc crassa ambiat: idq; tum æquilibri momenti ac ponderis gratia, tum ne tenuissimus vitę sanguis extrorsum refudet. **MATHESES**, Quotnam, & quę vasa his insunt ventriculis? **GERON**, Quatuor nimirum: in vtroq; binā, cir-

- na, circa cordis basim. dextro sanè vena caua, quæ ex iecore, non ex corde, vt quidam opinantur, prognata est. cùm autem ibi diuisa sit, & lata, dextri sinus ori tantùm adhærescit: & vena satis ampla, arteriosa dicta, quòd tunicam arteriæ similem nanciscatur, *Cordis vasa.*
- 5 nempe crassam, duram, & duplicem, quæ & ipsa ex iecore exoritur: quatenus autem arteriosa, ex corde, ad pulmonem accedit, vt sanguinem ei nutriendo conferat, eumq; pro corde contemperet. diuiditur autem in duos caudices, tum ad dextrum, tum ad sinistrum pulmonem: deinde in varios ramos dispergitur. Sinistro sinu, qui caloris & spiritus officina est, arteria magna, quæ *Arteria magna ægrè dicta, omnium artiarum est mater.*
- 10 Græcis ἀορτή dicitur, omnium aliarum per totum corpus excurrentium origo, magna, crassa, alba continetur. MATHETES, Cur crassa? GERON, Ne sanguis spirituosus facile euanescat, nèue illa crebris motibus disrumpatur, eò quòd ipsa non propter se, sed ob
- 15 spiritus continuò moueatur, ac sursum ascendat. Adhæc arteria venosa, admodum insignis, apposita est, quæ, vt vena arteriosa, in pulmones diuiditur. vocatur quidem arteria, quòd spiritibus, *Arteria venosa quare dicatur.*
- et sanguini arterioso inferuiat: vena autem appellatur, quòd tunicam simplicem, raram, & tenuem, venæ similem obtineat. MATHETES, Quod huius est officium? GERON, Vt sanguinem cum
- 20 aère à pulmonibus mixtum, ad sinistrum sinum deferat: non vt aërem immutatam ad pulmones ferat, qui ventum cordi, instar flabelli faciat, illudq; refrigeret, quemadmodum alij quidam sentiunt: sed vt in illis prius extenuetur, deinde simul cum aère per
- 25 arteriam venosam, ad sinistrum cordis ventriculum deferat. MATHETES, Arteriæ & venę tunicis inuicem differunt? GERON, Maximè. nam hæ vna tantùm peculiari constant: quæ autem extrinsecus cernitur membrana, non est his propria, sed omnibus communis obhærescit, vbi colligari quibusdam, aut fulciri, contigiq; desiderat. Arteriæ verò duas habent tunicas peculiare,
- 30 exteriorem sanè, qualis venarum est: interiorem verò multò crassiore, durioremq; in transuersas distinctam fibras: quanquam externam rectis fibris, vt venæ, & quibusdam mediocriter obliquis, transuersis autem nullis contextam. MATHETES, Quot ora
- 35 vasorum in vtroq; sinu cernuntur? GERON, Singula singulorum, vt vniuersa quatuor numero existant. duo sanè in sinistro, sed magnæ arteriæ, maius, cuius consortio, cor omnibus arterijs est continuatum: venosæ autem arteriæ, minus, cuius commercio, pulmonum arterijs cohæret. in dextro sinu etiam totidem
- 40 habentur. quamuis autem superioribus iam recitatis minus excellentia, alijs tamen cordis partibus præstantiora existunt: venę quidem cauæ maius, venæ autem arteriosæ minus: vtroq; ab in-

ternis forâs tendunt, vt sanguinem emittant. aliorum duorum vasorum ora ab exteris introrsum feruntur, vt sanguinem inclusum contineant. Priora iam dicta, quæ ab interioribus forâs prodeunt, filamentis quibusdam huc illuc dispersis constant, quæ nonnulli falsò neruos esse putarunt. **MATHETES**, Quæ ratione sinus isti cordis, intus examinari poterunt? **GERON**, Primum sanè dextrum iuxta aurem, recta linea diuides, distendesq; ac sanguinem nigrum inde profluentem, spongia ac penicillo elues, ne inspectionem impediât. Eodem modo sinistrum aperies, scalpellum iuxta arteriam venosam adigens, non ita ad latus, sed ex aduerso anguli inferioris, qui à dextro sinu, è cordis interstitio existit. **MATHETES**, Ora illa vasorum quid habent adiunctum? **GERON**, Membranas ex ipsis ortas, veluti opercula quædam obducta. quæ videre poteris, si specillo eleuare coneris, in eum nimirum vsu, ne rursus materia tum sanguinis, tum spiritus ex corde effluat, aut in ipsum refluat. **MATHETES**, Quot sunt eiusmodi membranæ? **GERON**, Vndecim, quæ structura cuspidum telorum eminentijs, atq; angulis penitus respondent, vnde Græcis *πεντάκωντες* quasi trifulcæ vocantur, à foris intrò pertinentes: crassitie, robore, magnitudine insignes: quæ impediunt, ne sanguis semel ingressus retrocedat: quanquam & attractionis sint instrumenta. Etenim vasorum tunica, dum per has membranas à corde tenduntur, promptius contrahuntur, pellunturq; facilius, corde materias trahente: cum non sua sponte materia ingreditur, tanquam in solium quoddam inanimatum, sed ipsum cor, fabrorum follium instar, attrahat: deinde cum contrahitur, oras membranæ claudât, ne quid attractum recurrat. Sunt autem ad cauam venam, ad arteriam *ἀορτήν*, ad venam arteriosam, nouem, hoc est, ad singulas, tres: ad arteriam autem venosam duæ sitæ. **MATHETES**, Quânam figura? **GERON**, Non eadem, sed quæ ad cauam, & arteriam venosam habentur, instar sagittarum formatæ: quæ ad magnam arteriam, & venam arteriosam collocatæ sunt, alia quàm magna arteria, & vena arteriosa figura apparent, quæ latinam literam C repræsentant. **MATHETES**, Si ergo rectè intelligo, duo ex his vasa materiam intrò ad cor deferunt: duo autem alia forâs emittunt. **GERON**, Ita habet, sed illud accidit, quando cor dilatatur: hoc autem, quando constringitur. ideo cum dilatatur, sanguinem à caua vena in dextrum ventriculum suscipit, & ab arteria venosa, non modò sanguinem elaboratum, sed etiam cum aëre in sinistrum admittit. hinc est, quòd membranæ vasorum summittantur, materiæq; ingredienti cedant. Nam dum cor constringitur, ora illorum membranis clauduntur, ne id

Sinuum cordis administratio.

Membrana trifulcæ in orificio cordis vasorum earumq; vsus.

Membrarum trifulcarum figura.

Vasorum in corde vsus.

- ne id quod susceperunt, per easdem vias retrocedat: nec non oratum magnæ arteriæ, tum venæ arteriosæ, eodem tempore referuntur, sanguiniquē spirituoſo exeunti, qui vniuerſo corpori diſtribuitur, & naturali ad pulmones delato, aditum præbent. In
- 5 ſumma, vbi cor dilatatur, ora vaſorum dictorum adaperiuntur, membranæ elatis: reliquorum occluduntur, illis ſummiſſis. *Cor ſanguinis non principium.* Hac ratione ſanguis in dextrum ſinum cordis ingreſſus, neq; in cauam venam regredi, neq; cor ipſius principium dici poteſt, cū à caua vena diſtribuat. MATHETES, Nihil aliudne obſeruatu dignum, in corde reſtat? GERON, Nihil, niſi voles radicem magnæ arteriæ, verſus arterioſam venam ſpectare, quæ adeo dura eſt, vt cartilago videri queat: non autē oſſeum quippiam reſert, vt in brutis animalibus, præſertim grandioribus, vt boue, ceruo, & ſimilibus: & quantò corpus eorum mole vaſtius fuerit, tantò magis radix
- 10 illa oſſeam naturam, ſeu cartilagineam obtinet, vt in oſſe cordis ceruini oſtenditur, quo medici hodie ad viriū corroboratiōnem vtuntur. MATHETES, Qua in parte os cordis ceruini inueniri poterit? GERON, Sinistro detecto ſinu, maximæq; arteriæ tota baſi aperta, radices illius & membranarum ſequere, ac facile
- 20 reperiēs. nam arteriæ aortæ, venæq; arterioſæ, & membranarum earundem radix, ex oſſea iſta cartilagine cordis procedit. MATHETES, Quomodo arteriæ iſtæ omnes, in totum corpus diſtribuantur? GERON, Id aliō dicitur loco, vbi etiam de venis & nervis ſeorſum agam. Hoc adhuc de arteria aorta hīc adſciam, quod
- 25 cū ipſa cor prætergreſſa fuerit, exiguam quandam propaginem, ei orbiculatim communicet, quæ inde Græcis *εσφαιαία*, nobis coronalis vocatur, quod coronæ modo cor ambiat, ipſiq; vim vitalem ſuppeditet. in quibuſdam coronalis arteria non vnica, ſed duplex apparet. MATHETES, Quomodo arteria aorta, poſt hanc
- 30 exilem editam propaginem, deinceps ſcinditur? GERON, Altiūſ aſcendens in duos truncos non æquales, maior deſcendit, minor aſcendit. ille talis factus eſt, quod grandiore corporis partem, vitali facultate conſeruare debeat: hic aſcendens à ſiniſtris ramum emittit, quem alarem ſiniſtram appellant. MATHE T. Quæ
- 35 pars corporis poſt arterias & membranas, cordi vicinioreſt? GERON, Pulmo, qui illud fibris quatuor, vngulæ bubulæ *PVLMO*, ſimilibus comprehendit, duabus in dextra, & totidem in ſiniſtra regione, iſſq; dum animal viuit, plenīs & turgidis: poſt obitum autem ſemper collapſis & exanguibus: id quod thoracis intercapedo, tam amplior facta, quàm in vita erat, oſtendit. Ideo autem in tot fibras (quanquam Galeni ſententia in quinque etiam, ſed falſo) pulmo diuiditur, vt agiliūſ moueri, & cor ipſum am-

Arteria magnæ radix.

Os cordis ceruini qua in parte inueniatur.

Arteria coronalis.

Arteriæ aortæ in duos truncos diuiſio.

Pulmonis habitus.

plexari possit. in brutis quinque fibræ inueniuntur, & postrema caua venæ substernitur. **MATHESES**, Qualis eius est habitus? **GERON**, Cum non ex se, verum à thorace moueatur, levis, rarus, fungosus, aërius, spirituofus, ac veluti ex spuma quadam sanguinis concretus est: foris rotundus, intus cauus, vt tum cordi, tum eius inuolucro pericardio cedat: colore rubido præditus, qualem massam Græci *μεγέχυμα*, quasi affusionem appellant. **MATHESES**, Quem vsum præstat? **GERON**, Primum vt cor tueatur, ne exte-

Pulmonis vsus.

riore quidem parte ad os thoracis, interiore autem ad spinam illidatur: deinde vt cordi, cum perpetuo motu incalcescat, refrigerium adferat: postea vt inspirationi, expirationi, & voci inferuiat: adhæc vt spiritus vitales cordi præparet, & quasi generet, illud postmodum magis absoluat. Nam aërem per nares & os inspiratum, in omnes suos meatus, asperæ arteriæ vehiculo, excipit, vnaque cum sanguine illo miscet, qui à dextro cordis ventriculo profectus, per venam arteriosam deferitur. hæc enim & sanguinem pro alimento deducit, & adeò ampla est, vt alterius rei causa, eundem deferre possit. **MATHESES**, Qualis is sanguis existit? **GERON**, Quia absiduo pulmonum motu agitur, tenuis euadit, & simul cum aëre miscetur, qui ipse quoque sic collisus infractusque, temperatur, vt ambo & languis, & aër simul mixti, per arteriæ venosæ ramos, suscipiantur, tandemque per ipsius caudicem, ad sinistram cordis ventriculum deferantur. adeò autem probe mixti, atque attenuati cordi inferuntur, vt id facili negotio elaborare, & conficere queat. Postremò verò, vitales hi spiritus sic absoluti, arteriæ aortæ subsidio, per omnes corporis partes distribuuntur. Nam vt cor sanguinem purum, vaporosum, & tenuem, pulmoni in alimoniam conficit, suggeritque, ita hic illi vicissim gratificaturus, aërem per respirationem attrahit, & immutat, tandemque sic præparatum ipsi suppeditat. hinc etiam vasis compluribus, retis modo intertextus est: ex dextro quidem cordis sinu, vena arteriosa: ex sinistro autem, arteria venosa, seu leuis: ex faucibus, aspera, quæ voci edendæ seruit. **MATHESES**, Quomodo hæc vasa in pulmones sparguntur? **GERON**, Omnia primum similiter in duos ramos diuariantur: quorum hic dextram, ille sinistram pulmonis regionem, perrepat: postea uterque rursus bifariam scinditur, partim in superiorem, partim in regionem inferiorem: tandem multiplices in quatuor fibras propaggines, mittit. **MATHESES**, Cur tot & talia vasa inferuntur? **GERON**, Vena sanè, quam arteriosam vocauimus, pulmoni inseritur maxima, vt quantò minus

Cordis & pulmonis mutua officia

Pulmo plurimis vasis intertextus.

alimento, quod sufficit, suggerendo, propter tunicæ crassitiem respondet, tantum arteria venosa, seu leuis, sua amplitudine compenset.

penſet. nam ſanguinem vaporofum vnà cum ſpiritu vitali, ex ſi-
niſtro cordis ventriculo, illi communicat, & fuliginofa recremen-
ta expellit.

- 5 *Aspera arteria per colli longitudinem, ſub larynge, in thora-*
cem deducitur, & pluribus conſtructa circulis, magna quidem
parte cartilagineis, quos Græci *βρόγχους* appellant, ſed non perfe-
ctis, vt quos tenuis membrana, poſteriore parte committat, quâ
ſpinam reſpicit, & ſtomacho cohæret, ne ille, dum cibum aſſumit,
ob cartilaginis comprehensionem infeſtetur. *MATHESES, Qua-*
10 *les arteriæ huius circuli, ſiue annuli apparent, ſi membrana ſub-*
trahatur? GERON, Literæ noſtræ C imaginem repræſentant,
foris gibbi, intus caui. *MATHESES, Qualis tunica hiſ intus ob-*
tenditur? GERON, Admuſſim rotunda, omnia demulcens, den-
ſa, tenuis, moderatè ſicca, rectis ad longitudinem fibris contexta,
15 ei continua, quæ totum os, partemq; ſtomachi, & ventriculi toti-
us internam, ſubliniit. *MATHESES, Qua de cauſa? GERON, Ne*
cartilago eroſionem exulcerationemq; ſentiat, dum ſerum pitui-
tæ, à capite in arteriam deſluit: nec non dum potus aliquid & ci-
bi, inter deuorandum illabitur. præterea cùm acris aëris qualitas,
20 aut fumi, aut cineris, aut carbonum, aut alterius facultatis medi-
catæ particeps, eò pergit: aut cùm pus quandoq; malignum, & ro-
dens, aut alius quidam humor, ſiue ſlaua bilis, ſiue atra, ſiue pituita
falſa intus putredinē experta, per hanc effertur. Nam cartilago cu-
ratu difficillima, tunica autem ipſius facillima exiſtit: niſi portio
25 eiſ aliqua ob magnam putredinem corroſa, nudam illam relin-
quat. *MATHESES, Quare tunica illius ſubtilis eſt, & denſa? GE-*
RON, Ne magnam totius arteriæ amplitudinem occupet, & hu-
mores eò conſuentes arceat, vnde & modicè ſicca eſt, quippe ir-
rigata & madida, raucam vocem edit: moderatè autem ſicca, me-
30 lius ſonat: immoderatè, deterius: id quod in febris ardentiffi-
mis facilè deprehenditur. *MATHESES, Vbi aſperæ arteriæ iter de-*
ſinit? GERON, In iugulo: atq; ibi in duos ramos ſcinditur: hi ruruſ
in alios duos. tandem autem omnes in totum pulmonem diſper-
guntur: per quos aër externuſ inſpiratur: ſuperfluuſ eiſ & cor-
dis excrementa educuntur. atq; illa inſpiratio, hæc expiratione di-
35 citur: ambæ verò reſpirationis nomine comprehenduntur. *MAT-*
THESES, Cur aſpera arteria exanguis, & partim cartilaginofa, par-
tim membranofa facta eſt? GERON, Ne aëris iter in voce eden-
da, & reſpiratione, aliquantum impediatur: ſubſidere autem, diſten-
40 diq; poſſit. Nam cùm pulmo & ipſa, cum illo à thorace dilatatur,
aër per nares: ſi maior neceſſitas vrget, per os etiam, veluti per ſol-
lem attrahitur, cuius alia portio per fauces in earum aſperam ar-

ASPERA
arteria.

Aspera arteriæ
circuli quales apa-
pareant.

Tunica aſpera
arteriæ circuliſ
obtenſæ, quales
exiſtant.

Aspera arteria
cui exanguis.

*Vena arteriosa
sanguinem aëre-
um cordi adfert.*

*Vena pulmonis
cur arteriosa ve-
nosaq; facta, &
ad quid.*

*Vasa in pulmoni-
bus, eorumq; ve-
sus.*

*Sanguis quomo-
do in asperam ar-
teriam erumpat.*

*Nervi pulmonis
tunicam attin-
gentes.*

*Tunica aspera
arteria.*

*LARYNX
aspera arteria
caput.*

teriam subit, pulmonem totum impletur: cum autem summitti-
tur, aëris superfluum, & recrementa cordis, vt supra docui, prop-
ellit. MATHETES, Ideone arteriosa vena facta est, vt sanguinem,
quo dixisti modo elaboratum, cordi ipsi introrsum adferat,
non autem ab illo eliciat, extraq; educat? GERON, Ita res habet,
indicioque est, sanguinem è pulmonibus emanare, non solum
quod cum tussi erumpat, sed etiam quod floridus sit, tenuis, &
pulcher. MATHETES, Cur vena pulmonis facta est arteriosa,
quod tu interpretaris densa & crassa? GERON, Ne sanguinem
crassum, illi natura leui & aërio, transmittat. MATHET. Cur item
arteria venosa facta est? GERON, Vt cum crassa sit, quanto minus
sanguinis fœculenti emittit, tanto plus aërei, & vaporosi, ob tex-
turæ raritatem admittat. MATHETES, Vasa hæc pulmonis, oris ne
etiam, vt in corde, patent? GERON, Nimirum. nam suo quæque,
in membranam pulmones ambientem, desinunt, inter se proxi-
ma. verum asperæ arteriæ, multo amplioribus quàm leuis & ve-
nosæ constant. vnde fit etiam, vt humorem intra thoracem col-
lectum, pulmone dilatato, ora asperæ arteriæ hiantia, ad se recipi-
ant, tussiq; expellant. MATHETES, Nunquàmne in asperam arte-
riam, quam exanguem esse dixisti, sanguis erumpit? GERON, Cum
vasa niodò commemorata rupturam, vel adapertionem, vel ero-
sionem experiuntur, tunc in illam quoq; sanguinis aliquid effun-
ditur, qui vias spiritus intercipiens, pulmonem afficit, tussimq;
excitat: ac deinde per fauces in os effertur. MATHETES, Nervi ne
etiam ad hanc tunicam perueniunt? GERON, Minimè illorum
propagines, qui ex sexto pari, iuxta stomachum deorsum versus,
ad ventriculum feruntur, illam attingunt, nec tamen intrò pene-
trant. quamuis autem pulmo, ideo exigui sensus compos est, ta-
men plurimum homini utilis, & pernecessarius existit. Tunica
ipsius, de qua dixi, cum raræ sit texturæ, sanguinem in membra-
næ, costas cingentis, & pulmonum inflammatione suscipit. MATHETES,
Quid extrinsecus, cartilagineis istis circulis arterig aspe-
ræ, obducitur? GERON, Alia membrana, à summis, ad extremas
vsq; pulmonis fibras, apparet. MATHE. Quomodo hæc aptè con-
spici poterunt? GERON, Pulmonum fibris inuicem separatis, ve-
nas, arterias, & nervos contiguos, stomachumq; subditum, obtu-
fiore cultello, ab aspera arteria secernes. vt autem caput ipsius,
quod Græci λαρυγία vocant, commodiùs intuearis, mentum me-
dium diuidere oportet.

MATHETES, Quale illam esse instrumentum dicis? GERON, Spiritus admittendi, reddendi, & vocis efformandæ. MATHE. Ex quibus constitat? GERON, Ex ossiculis, cartilaginibus, liga-
mentis,

mentis, musculis, membranis, venis, arterijs, & neruis. **MATHESES**, Quot sunt ipsius ossicula? **GERON**, Quinq; atq; ex his duo magna, totam ferè ipsam constituunt: posteriore parte inuicem latè disiuncta: priore acutiùs vnita, scuti imaginem referunt, *Græci πυροειδῆ vocant.* tertium circulare est, stomachum versus latius, & spinæ modo fastigiatur, nullo insignitum nomine: recentiores cartilaginem innominatam nuncupant. quartum & quintum os, alij tertiam cartilaginem appellant. **MATHESES**, Habetne larynx alias coniunctas particulas? **GERON**, Habet: iuxta

15 inani ossis, scutum referentis, regionem, rimam voci modulandæ idoneum, Græcis γλωττις, Latinis ligula dicitur, sicut in fistulis & tibijs, ligulæ quædam imponi solent. Huc accedit alia particula, quæ ligulæ iam dictæ incumbit, veluti operculum: in hoc à natura facta, vt impediatur, ne quid cibi, aut potus per laryngem, in

25 asperam arteriam incidat: Græci ἀντὶ γλωττιδα nuncupant: eoq; huius ore paulò amplior existit, vt ipsum vndiquaq; claudat, non vt prorsus nihil contrarijs ostijs incidat, sed ne multum, neq; vniuersum. Nam ex potu momentum in arteriam, circa eius membranam, ceu aqua ad parietem, non per medium intus spatium

30 illabens, irrorat, humectatq; pulmonem, spiritum non impedit. **MATHESES**, Quali corpore prædita est ἀντὶ γλωττις? **GERON**, Cartilagineo, non osseo, vt continuum motum sine noxa ferre possit, qui non solum fit expirando, & inspirando, sed etiam diglutiendo, loquendoq; dum nunc attollitur, nunc deprimitur, nunc ad

35 contraria, vt in vomitu, reuellitur. Quando enim respiramus, hoc operculum aperitur, rectumq; consistit: quando deglutimus, inclinatur, rursus subsidit, caditq; supra laryngem, in vomitu inuertitur, ne materia in arteriam deferatur. **MATHESES**, Cum ergo larynx tot agitari motionibus cogatur, indubiè etiam musculis donata erit, si ex alijs de hac quoq; licet iudicare? **GERON**, Rectè colligis. habet enim in totum quatuordecim: horum autem nouem

40 proprios, & quinq; communes. alij vniuersos numerant viginti, hoc est, proprios duodecim, & communes octo. quia verò difficilis est eorum incisio, satius erit, eam in aliud tempus differre.

35 **MATHESES**, Quas igitur partes proximæ asperæ arteriæ, inspicendas censes? **GERON**, Non possum aliam inuenire comodiorem, quàm stomachum, qui arteriæ illi inferiùs adheret. Nam cum animal duo habeat itinera, seu meatus in ore, quorum alter spiritum, alter cibum & potionem recipit, ille exterior ad pulmonem, hic interior ad ventriculū fertur, de primo iam diximus: restat, vt secundū quoq; exponam, quem Græci οισοφάγον nominant.

MATHESES, Vbinam incipit, & quorsum tandem fertur? **STOMACHVS**

GERON, Ab imis faucibus, iuxta mediam ceruicis sedem oritur: hinc inter vertebrae, & asperam arteriam, versus cor procedit (vt autem huic cedat, ad dextram vergit): deinde prope transversum septum, ad laeuam iterum reuertitur. vbi verò illud penetraverit, ori ventriculi committitur, sic vt huic non modò sit contriguus, sed etiam continuus, sicut ventriculus intestinis, & hec alio. MATHE T. Habetne etiam duas, vt ille, tunicas? GERON, Duas quidem habet, sed diuersas. nam interior magis neruosa, dura, pauloq; subtilior est, & rectis fibris. ciborum attractioni proprijs donata, toti ori palatoq; continuat: exterior verò crassior, mollior, & prope carnosior existit, transversis constans fibris, cibo ad ventriculum pellendo accommodatis. Nullus autem cibus, potusq; in stomachum recipitur, nisi prius à lingua sit probatus. MATHE T. Huius ergo naturam mihi nunc explices.

LINGVA.

Lingua qua natura sit prædita, eiusq; figura & tunica.

Lingua musculis donata.

Caro linguae qualis.

Linguae musculi

GERON, Vtile homini instrumentum lingua est, tum in cibo, potusq; assumendo, tum in loquela exprimenda, & saporibus percipiendis. Figura linguae oblonga est, lataq; magis, & crassa iuxta radicem, securitatis gratia: ad finem autem tenuis apparet, nimirum, quia celerius vndiq; moueri debet. Tunica ori communi vestita, musculisq; omni ex parte donata est, vt i audies. In medio candidam lineam habet, quæ dextram partem à sinistra distinguit, sub qua ligamentum situm est, quod infantibus sæpe incidi oportet, eò quod loquelam impediatur, præsertim cum nimium crescit, augeturq;. MATHE T. Quæ carne constat? GERON, Molli, rara, & spongiosa: atq; hac ratione musculis non videtur ascribenda, quia verò motu regitur voluntario, non aliena ab illis iudicari potest. MATHE T. Quot igitur sunt illius musculi? GERON, Primum duo, à base ossis hyoidis dicti, emergunt, & in summam etiam linguam desinunt, omnis generis fibris adeò intertexti, vt aliæ ab alijs, sicut in reliquis musculis, distingui nequeant. Tertius & quartus musculus in medio mento exoritur: vbi duæ extant eminentiæ asperæ, quæ rectà ad linguæ radicem tendunt: nisi diligenter eos incideris, non facile reperies. MATHE T. Quam musculi isti figuram & fibras obtinent? GERON, Rotundi sunt, & rectis fibris præditi, ideoq; à natura conditi, vt linguam extra dentes & labia exerant. MATHE T. Vnde quintus, & sextus musculus nascuntur? GERON, A styloide processu, gracilesq; sunt, & in linguæ radicem, iuxta ipsius latera desinunt. MATHE T. Quem habent vsum? GERON, Cum vterq; mouetur, linguam versus se ipsos ducunt: cum alter tantum, sursum in latus trahunt. Septimus & octauus, quoq; ex ossis hyoidis processibus nascuntur, linguæq; lateribus inferuntur, deorsum ipsam

- ipsam trahentes. **MATHESES**, Vnde nonus & decimus prouidentur. **GERON**, Ex maxilla, & in eius latera firunt. **MATHESES**, Quid officij præstant? **GERON**, Maxillam nunc huc, nunc illuc cum edimus, aut deglutimus, impellunt. Postremum etiam ab hyoide osse oritur; ad radicem linguæ situs; cibo assumendum accommodatus: videtur autem quasi miscella ex carne, pinguedine, & glandulis conflatus. **MATHESES**, Quid præter muiculos linguæ inesse dicis? **GERON**, Arterias duas, vtrinque singulas: duas item venas, quas in affectibus quibusdam incidere solemus: adhuc duo nervorum paria, alterum molle, alterum durum: illud ex tertio pari, exteriori ipsius tunicæ distribuitur, saporibus discernendis dicatum: hoc ex septimo, voluntario motui conueniens. Postremo ligamenta quoque duo valida, vtrinque singula, in inferiore eius regione habentur, quæ ab osse hyoide profecta, ad musculos eius motui dicatos, pertinent, iuxta laryngis cartilaginem, quæ scutum repræsentat. **MATHESES**, Quæ partes linguæ sunt vicinæ?
- GERON**, Glandulæ genere triplices. primæ sanè vtrinque singulæ, ad laryngis radicem adhærent, magnæ & fungosæ admodum, carniq; propemodum colore similes, nisi quod magis nigricent: venis bene conspicuis obductæ. secundæ, laryngi apponuntur, vtrinque etiam singulæ, non ita amplæ, sed oblongæ, in medijs faucibus, ore admodum hiante, apparent: quæ communi oris tunica vestitæ, sursum & deorsum, secundum longitudinem exporriguntur: essentia alijs glandulis per similes: nisi quod magis sint spongiosæ, vt scilicet humorem pituitosum, liquidumq; nempe saluam procreent, quæ per obliquas inferioresq; partes descendens, asperam arteriam, stomachum, ipsamq; linguam humectet, nam hæc deficcata vix moueri potest: id quod in ijs apparet, qui vehementer sitiunt, quibusq; per febres ardentes, totus oris humor, veluti arefactus, absimitur. **MATHESES**, Quomodo glandulæ istæ vocantur? **GERON**, Græcis *ωαγιδρμα*, tum quod angustijs hisce oris contineantur, tum quod veteres gurgulionem *ιωγυον* quoque nuncuparint. Quinetiam eadem hæc glandulæ Græcis *αμυγδαλεις* vocantur, eò quod sibi inuicem sint oppositæ:
- Latini** tonsillæ: vulgares ab amygdalarum similitudine, amygdalinas nominant. Atq; hæc Græcorum nomina, non solum partibus, sed etiam affectibus quibusdam attribuuntur. nam illæ inflammationes glandularum, quæ in faucium initio sibi opponuntur, *αμυγδαλεις*: earum verò quæ in faucibus ipsis existunt, *αμυγδαλεις* appellant, non adijcentes, quânam his significari velint. Latini, Græcos imitantes, & partes, & morbos, tonsillarum nomine vocitant. **MATHESES**, Quæ tertiæ existunt glandulæ? **GERON**,

*Arteriae linguae.**Nervi in lingua.**Ligamenta duo in lingua.**GLANDULÆ.**Tonsillæ.**Glandularum inflammatio.**Amiades, & pa-
ritybma quomo-
do differant.*

Nullo peculiari nomine sunt donatæ: ijs autem respondent, quæ in inguinibus & alis habentur: item illis, quæ numerosæ sub aurium radicibus, & vniuerso maxillæ spatio continentur, omnes cavitates accuratè implentes, valisq; deferendis ac commodata, præterquam quòd partes suprà dictas etiam humectent. Has omnes glandularum species in ore sitas, sicut etiam gurgulionem, & palatum lues venerea infestare solet. **MATHESES**, Quænam oris

*Gurgulio quæ
pars oris dicitur.*

pars gurgulio dicitur? **GERON**, Quæ in summa illius regione, carnosior suspensa apparet: in viuo autem, si quis toto ore latissimè adaperito, linguam deprimat. **MATHESES**, Quomodo Gra-

*Columella, sive
vna, eiusq; vsus.*

cis vocatur? **GERON**, Veteribus γαργαλιών, & κύων: alijs autem recentioribus quia frequenter ex influxu humorum accidit, κυψύλη, quasi columella & vna nuncupatur: Latini & partem, & affectum eius, eodem vna vocabulo nominant. **MATHESES**, Quis eius vsus est? **GERON**, Vocis tanquam plectrum est, non parum ad magnitudinem, & elegantiam eius conferens: deinde aëris per os ingrediētis vehementiam, & frigiditatem temperat. Nam quibus columella ad radicem præfecta est, hi non vocis tantum læsionem, sed etiam frigidiorē inspirationem experiuntur: vnde fit, vt thorace, & pulmonibus quandoq; refrigeratis, multi id hominum genus interierint. Cæterum illa madorem à cerebro recipit, quo superiores palati partes humectat. vbi plus iusto humoris admiserit, laxatur, ac fastigiata descendit: interim inflammationem experitur, impeditq; ne potus, neq; cibus deuorari possit. Atq; hæc sunt partes propemodum omnes, quæ ad medium ventrem corporis pertinent: nunc tempus est, vt hinc discedamus, cras capitis structuram aggrediemur. **MATHESES**, Nihil aliud ex oris historia, ac confectione adhuc restat? **GERON**, Dentium, labrorum, & faciei structura. verum quia partim superius exposita est, partim ad musculorum confectionem pertinet, cogitavi eam hoc loco prætermittere. **MATHESES**, Ne quid hodiernę inspectioni desit, adijcias oro, quæ sit labrorum, & faciei constructio. nondum enim de his aliquid tractasti.

LABRA.

GERON, Labra naturam singularem, eximiamq; obtinent, ex cute & musculis, illi commixtis, conflata: vnde eam aut musculum cuticularem, aut musculosam cutem rectè dixeris. quippe flectere ipsam licet, & à situ suo auertere, attrahere, distendere, stringere, & laxare, quocunq; edentium, vel bibentium, vel differentium, vel aliam quandam functionem obeuntium, vsus vocauerit. **MATHESES**, Quot eorum sunt musculi? **GERON**, Quatuor. duo sanè lati & graciles, à spina cervicis incipientes, in buccam cessant, vnde membranosum ligamentum procedens, ipsos consti-

*Labrorum mus-
culi.*

- constituit: duo item ab vltima maxillæ regione, oriuntur. MATHETES, Quot motus musculi prædicti perficiunt? GERON, *Musculorum labrorum motus octo.* Octo, nempe in vtroque labro binos, dum vnus illa ad dextram, alter ad leuam circumagit. adhuc dum alius labra (cùm plurimum à sese distant) sursum ad nasum agat, alius deorsum ad mentum: præterea, cùm illa inter se committuntur, alius superior ipsa deorsum, alius inferior sursum trahat. MATH. Præter hos quatuor musculos, nulli alij extant? GERON, Extrinsecus vtrinque singuli, lati, & graciles illis subiiciuntur, ad ceruicis spinam pertinentes, qui ad sermonem & mandendum, valde conferunt. Ad motus autem superiores peragendos, per genas, & maxillam, nervi tenuissimis foraminibus transmittuntur, quæ per summa vtrinque patent. Ad eundem modum etiam venæ, & arteriæ, à propinquis regionibus, eò pertinent. MATHETES, Quotnam sunt ori mouendo peculiare musculi? GERON, Tres. vnus sanè maximus vtrinque maxillæ, & maxillæ acumini inferitur, qui statim à medio, non extremo, quemadmodum alij, in latum tendinem desinunt, in capitis ossibus abditus, vt exigua eius pars, ad finem frontis emineat: Græcis à temporibus, quibus potissimum inhæret, *κροταφίτης* dicitur: hic tensus, maxillam veluti pendentem sursum attollit, ac sustinet: quod cùm fit, os clauditur. Vbi huiusmodi musculorum regio offenditur, conuulsiones, febres, cari, & deliria ideo oboriri solent, eò quòd magni sint, & nervorum principio proximi: quæ de causa etiam os iugale eis obiectum est. MATH. Vbi secundus oris habetur musculus? GERON, In ore delitescit, vtrinque ex cuneato osse prodiens. primæ ac vltimæ eius partes carnosæ sunt: mediæ verò nervosæ, id quod in alijs non inuenitur. MATHETES, In quam partem immittitur? GERON, In maxillam, statim post flexuram, iuxta mentum. MATHETES, Qualem obit motum? GERON, Tensus, os ipsum aperit. MATHETES, Nunc tertium musculum exponas. GERON, Hic amplo & valido principio, à malis exortus, deorsum tendit, ac maxillæ partim carnosus, partim nervosus amplissimè inferitur, à mandendo Græcis *μασθήτης* dicitur, triangularis figura, quod tres nervorum tendines repræsentet. is maxillam circumagit prorsum, retrorsum, & in latera, pro varia ipsius fibrarum natura. Omitto nunc, breuitatis gratia, musculos, qui narium alas mouent, & musculosam compaginem, cuti in facie subiectam: aliàs de ipsis priuatim dicturus. atque sic iam de vniuersis nutritorijs, & spiritalibus membris satis dictum esse videtur: proximum est, vt post illa, mentis ac rationis quocq; sedem aggrediamur. MATHETES, Id mihi erit pergratum, in, honore præce-

præceptor, edoceas itaq; quomodo illius incisionem aggredi de-
beam.

CAPVT.

GERON, Primum capilli in superiore parte capitis apparent,
ex fuliginosis recrementis, sursum elatis, prouenientes: mox cu-
tis densa, dura, sicca & crassa, cui illi radicibus inhaerent. in fronte 5
& genis, non facile à subiectis partibus separari potest. nam in il-
la musculosa compago est: in his fibrarum musculorum textura.

Pericranion.

Cute ablata, membrana occurrit, quæ quod caluariam extrinsecus
ambiat, græcè περικρανίος dicitur. Sub ea pinguedo, & alia tenuis
membrana consistit, cæteris quoq; ossibus corporis communis, 10

Periostion.

græcè περιόστιον nuncupatur. MATHETES, Quid his tandem ab-
ralis apparet? GERON, Caluaria nuda, ex multis conflata ossibus,
quæ futuris, vt antea didicisti, committuntur. hanc autem linea
orbiculari in cute scalpello facta, tenui serra ex duriorē ferro, di-
uides, auferesq; vt cerebrum omnium viscerum nobilissimum, 15
& veluti principale accuratè possis intueri, & cognoscere. MA-
THETES, Cur cerebro tribuis principatum?

CEREBRVM.

GERON, Quia DEVS OPT. MAX. illud in excelsissimo
loco, tanquam arce munitissima constituit, vt iniurijs minus sit
opportunitum: deinde quod figuram ei omnium tutissimam indi- 20
derit: postea quod extrinsecus capillos, cutem crassissimam, pin-
guedinem, membranam carnosam, περιμεράνιον, περιόστιον, & ossa tanto
artificio effecta, circundederit: nouissime quod in eo mens, ratio,
& animæ sedes consistat: item quod ab ipso sensus & motus, vi-
sus, auditus, gustus, odoratus, & sermo procedat. falsum est quod 25
nonnulli dicunt, cerebrum ideo creatum esse, vt feruidum cordis

Cerebri natura.

calorem attemperet, refrigeretq;. MATHETES, Quæ cerebri est
natura? GERON, Medullosa, alba, & mollis, in gyros quasi cir-
cumuoluta, tenuium intestinorum instar, tum leuitatis gratia,
tum vt facilius moueatur. caluariam totam implet vndiq; vt nul- 30
lacius pars sit vacua. MATHETES, Explica igitur copiosius, quas
summus ille noster Architectus, partes cerebro circundedit, per
quas homini ea, quæ superius enumerasti, officia & munera præ-

Membrane me-
nynges.

stare potest. GERON, Primum membranas duas, Græci μηνυγγας
appellant: priorem περιχόαν, quod est crassam, vulgè duram ma- 35
trem: alteram λεπίην, vel λείαν, hoc est, tenuem, & leuem, barbarola-
tinis piam matrem. Priusquam verò eas examines, cerebrum in

Cerebellum.

tres diuidi partes considerato, nempe dextram, sinistram, & vlti-
mam, quæ illis à tergo adiacet, vnde etiam Græcis πνευγισφαλῆς ap-
pendix cerebri, nobis cerebellum vocatur. MATHE T. Qualisnam 40
prior illa cerebri membrana, existit? GERON, Crassa, dura, & cu-
ticularis: quia, contra caluariæ occursum, propugnaculum cerebri
magis,

magis quàm velamen existit, vt quæ illam succingat, eiq; citra vilius corporis interuentum, vndiq; est contigua, præterquam incuneati osis medio: vbi nonnihil ab illa recedit. basi autem caluariæ, acutisq; eius processibus, ac tuberculis, firmitus quàm in lateribus, vertice, fronte, & occipitio affirmatur: futuris etiam, licet minus validè, connascitur: tenues autem fibras, per hæc extorsum transmittit, & pericranion membranam progignit. Notari autem debet, duram istam cerebri membranam, non simplicem siue vnam, sed duplicem, siue duas existere. prima introrsum versus cerebrum spectat: altera extorsum ad caluariam tendit. atq; hæc minus est sensibilis, vt quam os durum attingere oporteat: prior siue interior, magis sentit. *MATHESES*, Qua in parte capitis, membranæ istæ sitæ sunt? *GERON*, In vertice, sub recta futura duplicatæ, descendunt, dextramq; cerebri regionem, à sinistra separant, ita tamen, vt ad dimidium eius tantum, non ad imum pertingant, vbi pars callosa dicta consistit. *MATHESES*, Apparentne membranæ iam dictæ, vbiq; sibi similes? *GERON*, Nequaquam, sed priore parte versus frontem minus latæ sunt, quàm posteriore. atq; hæc etiam quadruplices cernuntur: quia cerebrum à cerebello se iungunt. *MATHESES*, Quid inter has membranas extat? *GERON*, Quatuor sinus repleti sanguine, ad quos interiores vena *Membrana cerebri quales existant.* iugulares ingrediuntur, perguntq; ad extremum vsq;. quare sanguis in his extra sua vasa, esse nequit. *MATHESES*, Quo in loco primi sinus habentur? *GERON*, Ad basim, vbi interiores venæ iugulares accedunt, iuxta occipitium & future lambdoidis apicem. atq; hic dextra cum sinistra iungitur: vnde tertius fit sinus, qui iuxta vniuersi capitis longitudinem protenditur, desinitq; in id foramen, quod in nasi summitate, inter frontem, & os ethmoides situm est. *MATHESES*, Qualis hic sinus est? *GERON*, Latera eius, trianguli imaginem referunt: pars superior, semicirculum imitatur: cui rotunditati, atq; eminentiæ, synciput cedit. nam sinus ille sub futura recta conditus est. Ab hoc eodem sinu venæ complures, tum à lateribus, tum infra propagantur, quæ per tenuem membranam disperguntur. *MATHESES*, Ad quid tam innumeræ venæ gignuntur? *GERON*, Vt cerebrum vniuersum alant, sicut aliæ propagines supra hunc sinum exortæ ossa nutrant, per suturas transeuntes. *MATHESES*, Vbi quartus sinus collocatus est? *GERON*, Inter cerebrum, & cerebellum, quem locum Greci λῑνον, quasi torcular nominant, à quo venæ prodeunt, quæ per cerebrum ipsum, tenuemq; eius membranam, qua cerebellum inuoluitur, delatæ, reticulari plexui, de quo statim agetur, conficiuntur. *MATHESES*, Cerebrone etiam dura hæc membrana coniuncta est? *Penarion cerebri sinus.*

*Cerebrum attol-
litur, & submit-
titur.*

*Membrana cere-
bri ad dimidiam
v/3 partem eius
peruenit.*

*Cerebri interna
structura qualis.*

*Ventriculi cere-
bri totum qua-
tuor, quid in sin-
gulis contineantur.*

*Plexus Chorifo-
r-
mes.*

*Cerebri ventricu-
li ubi oriuntur,
& quomodo spi-
ritus procreant.*

*Spirituum ani-
malium v/3us.*

*Reliqui duo ven-
triculi.*

Prior.

Secundus.

GERON, Minime, sed plurimum ab eo distat, vt pericardium à corde: vasis tantum, quæ ab inferioribus sursum distributa sunt, cohærens. MATHETES, Quamobrem? GERON, Vt cerebrum liberè, sicut cor, attolli & summitti queat. MATHETES, Estne illa vndiq; ab hoc seiuncta? GERON, In vertice, cerebrum iuxta lon-
gitudinem, non ad imam, sed ad dimidiam eius sedem vsq; in-
greditur, in duas partes æquales ipsum diuidens, sub recta potis-
simum futura. à tergo similiter cerebrum à cerebello distinguit,
medio se spatio insinuans. MATHETES, In omnibusne cerebri lo-
cis, crassa æquè apparet? GERON, Vbi cerebellum integit, triplo
crassior & durior, quàm alibi, euadit, omni adipe destituta. MA-
THETES, Quæ cerebri interioris est structura? GERON, Vbi
media propemodum portio eius ablata fuerit, duo ventriculi in
dextra & sinistra parte singuli, ampli fatis, oblongi, anfractuosi, à
priori regione ad posteriorem tendentes, & tenui membrana in-
duti. MATHETES, Quid in huius superioribus ventriculis contine-
tur? GERON, Plexus choriformes, quos reticulares vocant, in
hoc constructi, vt spiritus animales generent. MATHETES, Vbi
potissimum ventriculi isti oriuntur, & quomodo spiritus illos
procreant? GERON, Supra os σφραγισσας, versus id quod ἡβουσεας
vocaui, trahunt originem: cum autem aer per nares attractus, in
frontis cuneatiq; ossis cavitare retinetur, immutatur: deinde ad
illos per foramina ossis ethmoidis ascendit, atq; ibi ob continu-
um tum cerebri, tum reticularis plexus motum elaboratus, cum
vitalibus spiritibus miscetur. atq; sic spiritus animales ex vitali-
bus, & aëre, vt dixi, preparato efficiuntur. MATHETES, Quis spi-
rituum animalium v/3us est? GERON, Multiplex, vt qui ad omnes
sensus pertineat. nam in ventriculis modò commemoratis, & ca-
uitatibus geniti, ad basim cerebri descendunt. MATHETES, Plu-
resne ventriculos præter hos duos cerebrum obtinet? GERON, 30
Duos adhuc, inter quos prior iuxta prædictam cerebri basim ex-
tat, longiusculus, rectusq; à priore illius parte ad posteriorem
procedens, iuxta quem ferè nervi spinæ medullæ exoriuntur: cu-
ius rei gratia, spiritus animales faciliè nervos accedere, & penetra-
re possunt, aut certè per hos ad sensuum instrumenta deferri: atq;
singulis, pro sua cuiusq; actione, opitulari: sicut oculis videndi fa-
cultatem per nervos opticos: ita gustum, auditum, & quamvis
facultatem, quæ à cerebro proficiscitur, subministrant. MATHETES.
Vbi secundus tandem, in toto autem ordine quartus ventricu-
lus, situm habet? GERON, Inter cerebellum, & spinæ medullam, 40
quo loco existim adest foramen, à tertio sinu ad quartum vsque
pertingens, idè à natura factum, vt spiritus animales per ipsum,
ex tertio

- ex tertio ad quartum ventriculum transeant. MATHETES, Quallis est quartus ille cerebri ventriculus? GERON, Non admodum capax, tenui membrana obductus. in eo spinæ medulla, calami scriptorij instar, foramine patet, per quod spiritus contenti, ad illam faciliè perueniunt. In summa, aër per inspirationem attractus, & spiritus vitalis à corde ad ipsos transmissus, in animale, peculiari cerebri facultate mutatur: qui postea per neruos, ad sensus motusq; instrumenta, distribuitur, vt eius beneficio oculi videant: nares odorentur: aures sonos percipiant: lingua sapores dinoscat: muscoli moueantur: postremò vt omnis particula, cui neruus impartitur, tactiles qualitates diiudicet. MATHETES, Quæ partes hisce ventriculis omnibus sunt propinquæ? GERON, Super tertium cerebri ventriculum, particula quædam in medio illius consistit, callosa & candida: huic subest alia portio, fornix, & psaloides dicta, semicirculi imaginem referens, vel pontis potius, qui posteriore parte duobus cruribus, posteriore verò vnico duntaxat, innititur. MATHETES, In quem vsum? GERON, Vt tertium ventriculum integrum amplumq; seruet, ne cerebri pars illam obruat, repleatq;. MATHETES, Quid inter has cerebri partes, nempe callosum corpus, & cameratum continetur? GERON, Speculum, græcè dictum *διὰ φανερῶς*, hoc est, perspicuum. nihil autem id aliud est, quàm tenuis cerebri membrana, hoc loco duplex, qua superiores ventriculi circundantur, & diuiduntur, qui hinc deorsum redeunt. MATHETES, Quæ aliæ partes post fornicem extant? GERON, In extremo cerebro, versus cerebellum, & in finibus proximæ tertij ventriculi regionis, partes quædam eminentes consistunt, quas veteres Græci *διδύμους*, quali testes & gemellas appellarunt. Iuxta has alię duę partes paulò minores, duobus sibi commissis natibus simillimæ, vnde Græcis quoq; multitudinis numero *γλῦσσας*, hoc est, clunes, siue nates dicuntur. Inter has foramen situm est, quod à tertio ventriculo ad quartum progreditur, & ano simile videri potest. Insuper in priore testium loco, ad tertium ventriculum tendenti, alia pars cerebri occurrit, quæ scēminarum genitale eleganter representat. Non longè hinc glandula duriuscula cernitur, colore modicè luteo, & tenui quadam membrana obducta, *κωνάριον*, & *κωνοειδής* græcè dicitur: torculari affigitur, & virorum genitale imitatur, ob vasorum diuisionem procreata. In priore tertij ventriculi regione, sinus profundior apparet, qui tandem supra ovis sphenoidis sedem emergit, peluis & infundibulum appellatur, huc confert, vt excrementa in ventriculis hisce collecta, excipiat, & glandulæ in sphenoidæ ossis sitæ, transmittat. hæc autem glans crassa, extra duas membranas

Quartus ventriculus cerebri qualis.

Partes ventriculis cerebri propinquæ.

Callosa, candida. Fornix.

Vsus.

Speculum tenuis cerebri membrana.

Gemelli cerebri.

Clunes, siue nates. Foramen ano simile.

Conarium.

Peluis, siue infundibulum.

sita, cerebri excrementa excipit. atq; hoc loco tenuis membrana assurgit, quæ hos ventriculos inuestiat, quod nonnulli non obseruauerunt. Sed iam de his satis. **MATHESES**, Noli tam citò ad alia discedere: nondum enim cerebellum, & alia ei proxima exposuisti. **GERON**, Id in posteriore caluaria situm, duris membranis, & tenui quoq; circumdari, diximus: non autem sic, vt cerebrum, gyris circumuolutum apparet, sed peculiaribus deorsum in binos processus definit, qui albis breuibusq; vermibus ijs respondent, qui in lignis cariosis sæpe cernuntur: *σκαλοειδὴ ἐκφυον*, Græci vocant, vt impediant, ne quartus ventriculus, cerebelli pondere pressus, obsruatur. Notandum autem illud, cerebro non esse durius, vt alij opinantur, nec vllum ex eo neruum ducere originem. **MATHESES**, Quæ cerebri pars posterius adiacet?

SPINÆ MEDULLÆ.

GERON, Spinæ medulla, quæ nihil aliud est, quàm oblongum illud cerebrum, quod per vertebrae, & os sacrum deducitur, eandemq; cum illo naturam habet, nempe frigidam: quamuis Aristoteles calidam esse doceat. In brutis nonnihil variat, nam in his ad extremum vsq; medullaris ea, in homine ad lumborum initium vsq; medullam refert. **MATHESES**, Quid autem in homine, medullæ ista spinæ, & cerebrum inter se inuicem conueniunt? **GERON**, Non, sed bifariam differunt. hoc enim primum veluti cor attollitur, & summittitur, quam motionem græcè *ἀνακαταλίσσει*, & *συσκαταλίσσει* vocauimus: illa motu caret. deinde ossa caluariæ, quæ cerebrum ipsum ambiunt, firma existunt: medulla verò per ea, quæ moueri possunt, deducitur, eoq; duplex habet principium, nempe vnum maius, alterum minus: illud à cerebro: hoc à cerebello emanat. maius rursus vnicum, minus bifidum existit: atq; idcirco tum in dextrum, tum in sinistrum demittitur. **MATHESES**, Dic ergo summam, vnde potissimum medulla spinæ oriatur?

Medulla spinæ vnde oriatur.

GERON, A cerebri priore parte, non vbi vertebrae ingreditur, vt quidam opinati sunt. eaq; ratione tertium, quartum, quintum, sextum, septimum, & octauum neruorum par, non ex cerebro, sed medulla spinæ oritur: id quod tu quoq; sic comperies, si rem diligenter examines. **MATHESES**, Seruatne eandem crassitiem in omnibus partibus, per quas transit? **GERON**, Foramen occipitij elapsa, ingressaq; primum vertebrarum sinum, descendendo ibi aliquantulum crassior, quàm in reliquo itinere apparet. Postquam verò ad summum thoracem, & extremum os sacrum vsq; peruenerit, æqualem crassitiem retinet: in hoc autem duntaxat tenuior existit. alij falsò (pace eorum dixerim) illam in neruis gignendis absun- prodidit. **MATHESES**, Quomodo deinceps medulla spinæ procedit? **GERON**, Caluariam egrediens, ytracq; cere-

Medulla spinæ an eandem crassitiem in omnibus partibus seruet.

bri membrana, & molli, & dura inuoluitur, nervosq; ex ipsa prodeuntes circumdat. cum autem per mobilia transire cogatur, natura aliam membranam tenuem ei induit, ne ab ossis duritie offendantur. Est itaq; medulla spinæ vsq; ad thoracem extremum
 5 sui similis: in processu verò neruosa euadit, quasi dicas funicularum instar, idq; propter ipsius diuisionem. Ea de causa, cum materia per medullam descendit, magis inferiore parte, quàm superiore lædit: quoniam ibi medulla neruosa, in alijs locis sui similis existit. Non admodum propriè conuenit huic spinæ medullæ
 10 nomenclatura ipsius, cum nihil simile cum ea medulla, qua ossa aluntur, habeat, sed cerebri potius naturam referre videatur. Qui etiam hanc spinæ medullam molliorem ea, quæ ossa nutrit, esse prædicant, in errore versantur. Natura enim talem ipsam creauit, ex qua nerui, tum sensui, tum motui, reliquis partibus deferendo idonei, oriuntur: cerebrum autem omnem illam tum sentiendi, tum mouendi facultatem suppeditat. MATHET. Quæ reliqua in capite sunt obseruanda?

*Medulla spinæ
neruosa euadit.*

GERON, Plexus ille reticularis, nec non visus, odoratus, & PLEXVS
 auditus instrumenta. MATHET. Ex quot, & quibus partibus ple-
 20 xus iste constat? GERON, Ex quatuor: quarum duæ sub spinæ medulla sursum attolluntur, & post multas earum propagines, in tenuem membranam dispersas, iuxta conarion in superiorum ventriculorum extremo, cerebrum ingrediuntur: deinde aliæ quoq; duæ arteriæ carotides in illud mittuntur: atq; sic omnes quatuor
 25 iunctæ, implexæ, & intertextæ cernuntur: quamuis Galenus admirabilem illum arteriarum plexum, super sphenoidem collocet, vbi glandula illa adest, omnis excrementi, quod in cerebro gignitur, receptaculum. sed natura nobiliorem plexum istum reticularem existimauit, quàm vt excrementis ipsum excipiendis dicarit. MATHETES, Quæ est oculorum fabricatio?

*OCULORVM
fabricatio.*

GERON, Siti sunt in loco edito, tanquam in specula, vt hinc actionem suam commodius obire queant: ne autem extrinsecus iniurijs afficiantur, palpebris, cilijs, & ossibus circumdati mununtur, figuram orbicularem sortiti, qualem aliorum animalium
 35 oculi non habent, sed vel obliquam, vel depressam. MATHETES, Oculorum partes
 Quæ sunt eorum partes? GERON, Quinq; musculi, membranæ quæ.
 sex, tres humores, nerui, venæ, arteriæ, glandulæ, & copiosa pinguetudo. MATHETES, Vnde musculi oriuntur, & quales existunt, quidq; singuli agunt? GERON, A sphenoidis commissura,
 40 duræq; cerebri membrana: figura autem oblongi sunt, fibrisq; re-
 ctis præditi: vnde tendinea membrana efficitur, quæ in corneam post iridem desinit. MATHETES, Quid musculi per se agunt?

*Musculi oculorum
vnde oriuntur,
quidq; illorum
sit officium.*

GERON, Oculos trahunt, vel sursum, vel deorsum, vel in latera. At si eodem tempore in actione coeant, tunc oculum sistunt: vbi verò non simul eodemq; tempore, sed paulatim operantur, quatuor prædictis musculis oculus in gyrum vertitur, vt etiam in quatuor musculis iuncturæ, qua manus cum brachio committitur, videre licet. Hinc itaq; fit, vt à musculis motoribus, diuerso modo agentibus, varij motus edantur. MATHETES, Quidnam quintus musculus agit? GERON, Oculi dimidium, & amplius amplectitur situ transuerso. hic, inquam, non modò oculum attollit, sed etiam sistit, & in gyrum conuertit, nec non in sua sede immotum continet, ne huc atq; illuc temerè flectatur. MATHET. Qui nerui in hos musculos distribuuntur? GERON, Secundum illorum coniugium ipsis inseritur. hoc autem animaduertendum, copiosam pinguetudinem, inter musculos, oculum, & neruum visorium, quem Græci ὀφθαλμοειδής vocant, sitam esse, ne oculus continuo motu exiccetur, tabescatq;. MATHETES, Quæ aliæ partes oculis adfunt? GERON, Duæ glandulæ, quarum vna superius, altera inferius existit, per quas lacrymæ erumpunt, dum vel misericordia afficimur, vel dum alios ad illam commouere, muliercularum callidarum more, conamur. quanquam etiam in hoc factæ fuerint, vt humectent oculos. MATHETES, Quenam sunt sex oculorum membranæ? GERON, Prima exterior est, pluribus nominibus appellata, nempe alba, annata, coniuncta, & adhærens, nimirum idèò, quòd tunicis alijs extrinsecus annascatur, ligetq; totum oculum ofsibus ambientibus: tenuis est, & candida, à pericranio trahens originem. definit autem in maiorem iridis circumlum, qui varijs coloribus præditus est. MATHETES, Vnde ista oculorum frigiditas? GERON, Ex membrana, à folliculo παρωπιδης dicta, non ab humoribus, vt Aristoteles asserit, proficiscens. MATHETES, In omnibusne hominibus idem huius membranæ color existit? GERON, Minimè. sed in hoc nigrrior, in illo magis albus, in alio cæruleus, ac varius apparet. MATHETES, Vnde nomen iridis in oculo profectum est? GERON, A cœlestis iridis similitudine: quod autem in oculi centro, nigrum puncti instar cer nitur, PUPILLA nominatur, cuius beneficio videmus. quamuis autem nigra admodum appareat: tamen neq; ipsa, neq; aliud, quod eidem sublit, nigrum est, sed pellucidum, perspicuumq;. MATHETES, Quomodo secunda oculi membrana vocatur? GERON, Nominine caret: à nerueis autem musculorum oculi tendinibus generatur, & super annatam membranam prope iridem definit. MATHETES, Quomodo tertia membrana nuncupatur? GERON, A cornu figura Græcè κέρατος, latinobarbaris cornea duratq; dicitur,

Nerui qui musculis oculorum distribuuntur.

Glandule oculorum, earumq; situs.

Oculorum membranæ.

Oculorum frigiditas vnde.

Iridis nomen.

Pupilla.

Membrana cornea, eiusq; officium

- citur. Est enim dura crassaq̃, eò quòd à crassiori cerebri inuolu-
cro gignatur: priore autem eius parte perspicua est, cornuq̃ in-
star lucida tenuisq̃, vt in qua tres humores, & totidem etiam
membranae contineantur: ea in regione iris & pupilla quoq̃ sita
5 est, MATHETES, Quid ista membrana præstat? GERON, Ocu-
lum sistit, & neruum visorium oculumq̃ inuestit. MATHETES,
Quo nomine quarta membrana appellatur? GERON, Ab vuae
grano, cui capulus ademptus sit, græcè *παροιδής*, recentioribus
vuae, ex molli cerebri membrana perueniens, vnde etiam græcis
10 *χοροειδής*, quasi secundæ, appellata est, neruum primum visorium
integrit: deinde sub cornea dilaturatur, & ad priorem oculi sedem,
vsq̃ porrigitur: verum non totum illum ambit, veluti cornea.
vbi verò ad pupillæ sedem peruenerit, quam *παροιδής* effingit, ver-
sus posteriora reflectitur, & ad iridis initium procedit, ibidemq̃
15 duplex perficitur. atq̃ hæc à cornea, quousq̃ perspicua est, abscē-
dit, quamuis illi in alijs partibus admodum connectatur. MATHETES,
Cur in hac membrana varij colores, putâ niger, puniceus,
cæruleus, ruber, & in boue etiam viridis, & cyaneus cernitur?
GERON, Vt oculi defessi, ea varietate recreentur. atq̃ hac de cau-
20 sa oculum claudimus, quo spiritus visori, ad tam varios colores
conuersi, refocillentur. MATHETES, Quod nomen habet quinta
membrana, & qualis est? GERON, Græcè *αμφιγλωσσος*, à retis si-
militudine, vnde nonnullis retina, siue reticularis vocatur, ex ip-
somet visorio neruo prodiens: quanquam verè non sit membra-
25 na, sed res mollis, & alba: quam si colligas, coniunctamq̃ spectes,
cerebrum esse iudicabis. hæc penitus, quàm *παροιδής* sita est, &
paulò vterius, ad dimidium vsq̃ oculum, progreditur. MATHETES,
Qualis est sexta membrana? GERON, Telæ araneæ modo tenuis:
vnde etiam græcis *δραχνοειδής* dicta. oritur autem & ipsa, ex molli
30 cerebri tegumento, admodum subtilis, & splendida, illis pellicu-
lis similis, quæ in cæparum interuallis, conspiciuntur. MATHETES,
Quis eius vsus est? GERON, Vt humorem vitreum, & cry-
stallinum complectatur. atq̃ vnica, non duplex est, vt Galenus
& alij opinantur. MATHETES, Quot sunt humores in oculis?
35 GERON, Tres. primus ob aquæ similitudinem, Græcis *ὕδαλος*,
quasi aqueus: alijs etiam albugineus dicitur, priori in parte, inter
membranam ragoïdem, & corneam situs, vbi duplex, & in uersa
redditur. Humor iste modicus admodum est, in quo suffusiones
sunt, quas cataractas recentiores vocant. est autem nihil aliud
40 quàm excrementum, quod interdum prorsus ob vulnera effun-
ditur, & spatio temporis iterum nascitur, vt idem oculus, ex quo
prodierit, cernere possit. Secundus græcè *κρυσταλλοειδής*, quasi cry-

Membrana vuae

Colores varij in
membrana cor-
nea.Membrana reti-
cularis.Membrana Ara-
chnoides, eiusq̃
vsus.Humores in oculo
lis quot existant.Aqueus, siue al-
bugineus.

Crystalloïdēs.

stallo similis nuncupatur, eò quòd ita splendeat, vt lumine & perspicuitate crystallum referat. consistit priore oculi parte, in centro ipsius propemodum, eumq; humor vitreus posteriori parte amplectitur, nullaq; inter ipsos membrana intercedit: antea tamen à membrana arachnoidi obtegatur: rotundam planè figuram haberet, nisi priori parte, lentis modo depressior esset, qua humorem aqueum spectat: natura duriusculus. Quòd si eum è sede sua ademptum, scriptis characteribus admoueas, hi maiores esse videbuntur, faciliusq; conspiciuntur, vnde specilla inuenta esse putantur. **MATHESES**, Quis vsus humoris crystalloidis existit? **GERON**, Magnus, atq; insignis. nam princeps, fereq; summum visus instrumentum censetur: vnde etiam idolum, & simulacrum visus, meritò Galenus appellat. **MATHESES**, Qualis tertius oculi humor est? **GERON**, Vitro mediocriter fuso, solutoq; similis, vnde etiam græcis *υαλοειδες*, dicitur. situs eius est posteriori in parte oculi caua: sic tamen, vt etiam amplam prioris portionem occupet, hoc est, vt ex quatuor oculi partibus, tres obtineat, **MATHESES**. Quare humor iste in medio cauus factus est? **GERON**, Quia ibi crystalloidi cedere cogitur, ipseq; splendidissimus, & visui iucundus existit. Is etiam simul cum crystalloide membrana, arachnoidi obtegatur, & reticularem vicinam habet, à qua ipse alitur, alitq; crystalloidem. Quare cum vitreus humor, crystalloidis præclari, alimentum protinus futurum sit, meritò etiam pellucet, & inter nutriendum aquosus humor nascitur, non tam copiosus, quam vitreus. **MATHESES**. Quæ partes oculi, præter iam dictas, in illo reperiuntur? **GERON**, Complures venæ & arteriæ, per musculos pinguetudinemq;, & mēbranas ceratoidem, & ragoidem dispersæ. **MATHESES**, Quo pacto me geram, vt omnia rectè in conspectum mihi veniant? **GERON**, Cutem superciliorum, à cilio vsque auferro, & os ambiens, superius figura triangula excindito, neruumq; visorium, cum musculo ambiente præscindito, oculumq; caluaria eximito, tunicæ adnatæ reliquijs abstrahens, & oculi basin ministro tenendam dato: ipse autem, musculos separato, capitq; eorum liberato, quibus neruo visorio, qua oculo innascitur, incumbunt. deinde leuiter secando, ad oculi iridem accediro, in quam illi rectè delati, nervosis tendinibus finiunt. erasis musculis, oculus vndiq; rotundus apparet, ceratoidi tunica vestitus, quam iuxta iridem, recta linea in longum scalpello acutiore, vnoque ictu secato: deinde humores effluentes, sinistra vola excipito: hac modicè inclinata, tenuis emanat: atq; hoc excreto crystalloides vitro *υαλοειδες* natans, medius apparet. abiectis humoribus, tunicas ex quibus exciderunt; super sinistrum pollicem inuertito, ac

Crystalloidis humoris vsus.

Vitreus siue hyaloides, in medio cauus.

Venæ & arteriæ oculorum complures.

Administratio sectionis.

Statim

statim reticularis, visui se offert, mox ragoides, in qua pupillæ foramen existit, ea est ceratoidi in iride orbiculatim, firmiter annexa. **MATHESES**, Quot, & vbi odoratus instrumenta consistunt?

GERON, Duo, eaq; circa prioris cerebri basim inveniuntur, alijs processus mamillares dicuntur, oblongi, tenui, mollicq; duntaxat membrana inuoluti. **MATHESES**, Per quam regionem feruntur? **GERON**, Per eam, quæ cerebrum, os sphenoides, & frontis intercedit, supraq; ipsam membranam duram, sita est. **MATHESES**, Quis odoratus instrumentorum vsus? **GERON**, Vt odores bonos à malis distinguamus. Desinunt autem illa ad nasum, membrum nulli non cognitum, quod etiam odoratui inservit: siquidem eo alstricto, per os inspirantes, nullum odorem percipimus: ad aperto autem, statim de illo iudicamus. Extremæ nasi partes, latinis scriptoribus **NARES**, barbaris pinulæ, seu alæ dicuntur, ex parvis musculis conflati. singule habent vtrinq; foramen, quæ in medio septum cartilagineum intercipit. Tunica nares intus ambit exanguis: membrana crassior, ei continua, quæ os, linguam, pharyngem, laryngem, asperam arteriam, & stomachum integit. **MATHESES**, Quid de auditu instrumento dicis?

ODORATVS
instrumenta.

*Nares quæ patet
dici dicantur.*

GERON, Nihil aliud, quàm quòd membranula quædam sit, ad quam etiam quintum nervorum coniugium, per foramen, ex cerebro perveniat, ut nuper in ossium historia expositum est. Vbi autem foramen illud foras prodire incipit, vtrinq; cartilaginofum natura euadit, ac **AVRES** vocantur, in temporum extremis sitæ, ut cerebrum eis vicinum, ab externis iniurijs tueantur: extrinsecus autem gibbæ & cavæ, ne quid in meatum incidat, neq; promptè afficiantur: sinubus multis anfractuosa: eorq; cæca earum foramina dicuntur. sub his, particula pinguis appensa, inferior auricula siue fibra, superior pinna vocatur. **MATHESES**, Quænam propria gustus, & tactus instrumenta esse dicis?

AVDITVS
instrumenta.

Aures.

GERON, Non tibi alia adferre possum, quàm nervos, ad saporem quidem percipiendum linguæ insertos: ad tactus autem sensum præstandum, omnes per totum corpus dispersos, inservire. Habes nunc omnes singulares totius humanæ fabricæ partes explicatas. Superfunt quædam communes, quibus reliquæ prope modum univæ conseruantur, reguntur, & actiones suas obeunt: quæ licet in singularibus enumeratis obiter etiam sint attackæ: tamen si absolutam ipsarum cognitionem habere cupis, cras eas tibi enumerabo, si recens cadauer consequi poterimus. **MATHESES**, Ego dabo operam, ut consequamur, nam magna hic suppetit copia.

GUSTVS & TACTVS
instrumenta.

GERON, Nervi ex cerebri basi, prope terram in ventriculum **NERVL**

oriuntur, sic ut dextri dextrorsum, sinistri sinistrorsum, & variè per totum corpus, sicut riuuli per agros, deferantur, tenui & crassa membrana induti, ut sint tutiores: figura prædicti oblonga, rotunda, & molli, rara, & spongiosa, ut animales spiritus ipsi insinuari possint. nam per hos sentiendi, mouendiq; facultatem toti corpori, distribuunt. Quotiescunq; igitur partes, nervis carent, sensu quoq; destituuntur. MATHE T. Quotnam sunt in cerebro nervi? GERON, Omnes anatomici, septem eorum paria siue coniugia, aut si malis dicere quatuordecim, hoc est, dextra & sinistra parte, singulos septenarios esse constituunt.

Nervorum septem paria existunt.

Primum par nervorum.

Nervi optici.

Primi duo crassi & molles, spongiosiq; existunt. Etsi verò nullus meatus evidens, in eis appareat; tamen transitus spiritibus, præsertim purioribus, in illis patet. nam videndi facultatem ad oculos transferunt, unde Græcis ὀπτικοὶ dicuntur. MATHE T. Quæ cerebri parte potissimum oriuntur? GERON, Non procul à priore, & supra sphenoidis sinum ambo uniuntur, non crucis instar, ut in aubus. Vbi verò aliquandiu iuncti permanserint, rursus separantur, & dexter ad dextrum, sinister ad sinistram oculum deferitur. unde fit, ut altero clauso oculo, totus spiritus per communem meatum ad alterum perveniat. ambo inquam, ab origine sua, usq; ad foramen in oculi orbita situm, per quod prætereunt, tenui tantum membrana inuoluuntur. Inde ad oculum usq; ad quem desinunt, retinamq; dictam membranam efficiunt, tum hac tum dura membrana, inuestiuntur.

Secundum par nervorum.

Secundum par nervorum, primo proximum, ad quinque oculorum musculos, & ad duos palpebrarum proprijs foraminibus, & per retinam orbitæ fertur. huius coniugij ramuli, in temporum musculos, præterquam in alios, inferuntur. Magna est oculi temporalisq; musculi consensus, ut hoc læso, ille quoq; offendantur, & contrà.

Tertium par nervorum.

Tertium par retrò, magis versus latera, duplici principio oritur: sed hoc maiore, illo minore, caluariamq; penetrat, deorsum descendens per foramen, quod cum quarto coniugio commune habet, & in varios ramos partitur: qui deinde in varias soboles propagantur. Primus inquam ramus, ad musculum temporum tendit: alter ad oculi orbitam, per supercilium ad frontem vergit: nec non ad musculos: hunc qui palpebras constringit; illum qui nasum dilatat: deinde ad ipsum quoq; reptat, & innumeros propemodum furculos, procreat. Alius per eandem quidem orbitam, sed inferiùs per tertium os malarum transit, perq; illud foramen, quod ad mediam regionem situm est, atq; ibi in complures nervos partitur, qui per labrum superius, & musculum

lum maffetera, & eos qui buccæ dicati sunt, diffeſminantur: portio illorum naſi etiam ſinum ingreditur. Alius ad ſuperiorum dentium radicem: alius ad maxillam tendit. atq; huius ſurculi propago inferioribus quoq; dentibus diſtribuitur: reliqua pars, foramen illius elabens, prope mentum, labris in ea regione ſitis, & dentium radicibus ſenſus gratia communicatur.

Quartum par tertio minus eſt, & huic adeo propinquum, vt idem foramen ambo commune habeant, & illius origo huius portio eſſe videatur, deſcendit verſus os, & in quatuor ſurculos diuiditur, qui quintum malarum os tranſeunt, per palati tunicam, verſus priorem regionem procedunt, adhæc duo alij ramuli iuxta tonſillas, quas Græci *παριέδµα* appellant, & ſtyloidem proceſſum ad linguæ radicem deſcendunt, & per ſuperiorem iplius tunicam diſtribuntur. *MATHETES*, Quis huius quarti paris vſus eſt? *GERON*, Vt guſtandi facultatem linguæ præbeat. quamuis Galenus, & alij hoc muneris tertio coniugio tribuerint: forte, quod hoc, & quartum, nimis vicina inuicem exiſtant.

Quintum coniugium etiam circa baſim cerebri, & latera ad mediam ferè eius regionem exoritur, meatumq; auditorium, & tertium foramen labyrinthumq; in oſſe temporum ingreditur, cum autem ad mediam labyrinthi, qui in aures ipſas deſinit, partem peruenerit, craſſius redditur, & ferè membranofum. Ex hoc quinto duo neruuli partim in oſſiculum auris, femori ſimile, partim in labyrinthum diſperguntur.

Sextum par iuxta poſteriora baſis cerebri, & retrò magis apparet, varijs ſurculis, & radicibus donatum: per illud autem foramen deſcendit, quod occipitio, atq; oſſi temporum interiacet, nempe vbi iugularis vena interior ad caluariam aſcendit. Hoc coniugium omnibus viſceribus interaneisq; ſolius ſenſus

gratia communicatur. vbi iam dexter neruus ſexti paris, ab eodem quem dixi, egreſſus eſt, propaſines quaſdam hyoidis, & laryngis muſculis diſpenſat: deinde inter venam iugularem, atque arteriam carotidem, prope aſperam arteriam, ad iugulum vſque deſcendit, qua in regione neruulus ſub alari arteria dextra mittitur, verſusq; caput reſlectitur, & aſperæ arteriæ adhæret, & in laryngis ſinum ſe iſerit, tandemq; ligulæ, ſeu parvæ rimæ, quam

γλωττίδα vocauit, inſinuatur. Sub iuguli regione propaſinem exilem, tum ad membranam coſtas cingentem, tum ad radices illarum diſtribuit: aliam rurfus pulmoni dextro tranſmittit, reliquum eius deſcendit, ita vt ſtomacho vſq; ad ſuperius ventriculi os, adhæreſcat. *MATHETES*, Quomodo ſiniſter neruus recurrens diuiditur? *GERON*, Cum à prima ſua origine proſat, ramulos eiſ

Quartum neruorum coniugium.

Vſus quarti paris.

Quintum neruorum par.

Sextum.

Propaſines ſexti coniugij.

Neruus recurrens quomodo diuidas.

dem musculis impartit, quibus dexter, eademq; via descendit, & in sinistri iuguli regione propagines costarum tunicae, illarumq; radicibus, & pulmone sinistro distribuit: postea descendit adhuc, donec ramum maiorem arteriae ^{ἀορτῆς} propemodum attingat. Hoc loco neruum edit, qui sub hac arteria reflectitur, & rursus 5
 sursum, versus originem suam reuertitur, asperae arteriae adhærens: nec non inter os ^{ἀνώγειον}, & ea quæ scutum referunt, sub inferiore laryngis regione procedit, & in glottidem ingreditur. MATHETES, Non satis intelligo, quare sexti huius paris nerui, recurrentes appellantur? GERON, Quia per ceruicem in pectus usque 10
 descendentes, iterum per ceruicem eandem, ad gutturis cartilagineas reuertuntur: ac præcipua sunt vocis instrumenta. Nam si illi incidantur, aut contundantur, aut laqueo distringantur, vox animalis prorsus aboletur. Quapropter si pectus, pulmo, aspera arteria, musculi, qui guttur tum aperiunt, tum claudunt, laryngis operculum, glottis seu rima, & communis gutturis & stomachi membrana, spirationis & vocis sunt officinae, certe nerui recurrentes, illorum præcipui sunt auctores: id quod in viuorum animalium incisione manifestum redditur. nam si alterum neruum ex his præcidas, semiuocalia redduntur: si vtrumq;, prorsus obmutescere co- 20
 guntur. MATHETES, Nullane soboles ex sinistro neruo recurrente exoritur? GERON, Paruula, radices magnae arteriae sequitur, & per cordis tunicam dispergitur: quia verò admodum exilis est, minime penetrat cor ipsum. atq; hac de causa sinister neruus recurrens, sub magna arteria, non alari reflectitur, ne scilicet, neruus iste adeò tenuis, atq; exiguus, in continuis cordis motibus, dum animal spirat, disrumpatur. MATHETES. Quò reliquiae huius nerui recurrentis tendunt? GERON, Descendentes stomacho ad superius ventriculi os usq; adhærescunt: quamprimum autem 25
 tum dexter, tum sinister eò peruenerint, in multos furculos retis instar propagantur, & os illud amplexantur, cuius rei gratia tam acri sensu præditum est, vt in oris ventriculi doloribus, cor ipsum dolere videatur. Adhæc neruus ille dexter, hinc ad membranam iecur inuestientem pergit, atq; ei sobolem immittit: aliam quoq; bilis vesiculæ: aliam inferius sinistro reni: aliam superiori omenti parti: alias quoq; mesenterio impartit. similiter sinister recurrens, ramulum ad lienem sinistram, & ad vesicam, in scemini 35
 nis ad vterum transmittit.

In oris ventriculi dolore, cur cor dolere dicatur.

Septimum neruorum coniugium.

Septimum par versus occiput ortum habet, eumq; à cerebro potius, quàm à cerebello, idq; variis & exiguis radicibus: proprio foramine obliquo in occipitio donatum est. postquam verò caluariam egressum est, primum versus priorem partem tendit: 40
 deinde

deinde in complures ramulos, ad linguæ, hyoïdisq; & laryngis musculos procedentes, scinditur: quorum maximus sub maxilla & lingua, vsq; ad eius extremum propagatur, vt illud sensus omnino & motus participem efficiat, sicut quartum par, vt dixi, gustandi sensum, priuatim illi communicat. Quippe inter reliqua linguæ officia summa est saporum discretio, atq; iam habes omnia septem cerebri neruorum paria. Sunt autem, qui duo adhuc coniugia his addunt, nempe octauum & nonum. **MATHESES**, Vnde origo ipforum procedit? **GERON**, A quinto coniugio distat, illud sub basi cerebri, versus priorem partem incedere aiunt, & proprio foramine in sphenoides sito, ad temporum musculum, latitantemq; & massetorum, siue massetera transire: hoc exiliū par neruorum, ex binis illis processibus, quos nates appellauī, oriri, faciem accedere, transireq; apud tertium & secundum coniugium, & tertio palpebræ musculo inseri: quamquam soboles huius ad quintum oculi musculum deferatur. Alij hæc non vera neruorum paria, sed priorum radices esse iudicant: quidquid autem sint, negligi non debent. **MATHESES**, Differunt ne inuicem origine vtriq; nerui, tum qui sensum, tum qui motum membrīs deferunt? **GERON**, Omnes motorij, duriq; similiter, vt secundum tertiumq; coniugium, ex priore cerebri parte oriuntur: quamquam Galenus molles priore ex parte, duros ex posteriore prodire affirmer. **MATHESES**, Quinam sensum propriē, qui verò motum deferunt? **GERON**, Visorij, quos Græci *ὀφθαλμικοί* appellant, sensum tantum adferunt: reliqui omnes tum sensum, tum motum partibus inducunt. **MATHESES**, Ex qua parte medulla spinæ primum neruorum par emittit?

Nerui tum qui sensum, tum qui motum deferunt, quomodo inuicem differant.

GERON, Ex posteriore inter occipitium, primamq; vertebra: quod vt commodiūs fiat, exiguus adest sinus, cui illud tam occultē inseritur, vt mirabile videatur naturalium rerum studio, quo pacto exeat, ne in motibus capitis offendatur. **MATHESES**, Quomodo egressa caluariam, dispargitur? **GERON**, In perexiguas propagines, quæ paruulis illis musculis capiti inseruientibus, communicantur.

NERVI MEDULLÆ SPINÆ.

Secundum.
35 Secundum neruorum medullæ coniugium, binis insignitur principijs, cum vertebrarum latera egredi nequeat. Ex quibus maius posteriora versus emanans, hinc atq; illinc per secundæ vertebræ latera fertur: egressum iam, in complures ramulos scinditur, qui sursum reflexi, tum capitis cutem, tum aures, tum
40 musculos nonnullos accedunt. Minus siue alterum ipsius principium, per priora inter primam secundamq; vertebra, à dentis superius dicti lateribus egreditur, hoc autem ad quintum muscu-

Primum par medullæ spinæ.

lum, laryngi atq; stomacho communem, distribuitur.

Tertium.

Tertium par per commune secundæ & tertiæ vertebræ forame, nex earum lateribus egreditur, & primum quatuor soboles edit: mox alias plurimas, tum quibusdam capituli musculis, tum quadrangulo illi oblongo, qui ex carnosa membrana profectus est, & labrum obliquè deorsum trahit, tum cuti cervicis impartit communicatq;.

Quartum.

Quartum coniugium inter tertiam quartamq; vertebram, per foramen vtriusq; commune exit: idq; de omnibus nervis intelligendum est, nempe quod per foramen duabus vertebra communē, egrediantur. At ubi quartum illud par exierit, in multas propaggines scinditur, quarum aliæ ascendunt descenduntq;: alię per posteriorem regionem reflectuntur: aliæ exiles, musculis cervicis, & ei quem cucullarem vocant, transmittuntur. priore parte quædam soboles, musculis stomacho substratis, inseruntur: vna ex his valde exilis, quinti paris ramo consociatur, & quintus sexti. Ex his tribus principijs, ij nervi conflantur, qui ad septum transversum tendunt, & ad membranam intermediam, vulgo mediastinum dictam, supraq; pericardium descendunt.

Quintum.

Quintum coniugium inter quartam & quintam vertebram exit, secaturq; in multos furculos tum priores, tum posteriores. prior magis quam cæteri conspicuus, quarti paris ramo coniungitur, & in quibusdam propaginem à subsequētib; recipit: atq; ita ex tribus conflatus, iuxta stomachi latus per cervicis vertebra priores, ad nervosam vsq; septi transversæ regionem descendit, ibiq; desinit. in quibusdam verò ex quarto coniugio trahit originem, sed rariùs quam à primo. statim autem ubi ad thoracis limum peruenit, membranis superius & infra colligatur, ne ob assiduos pulmonum motus disrumpatur, & pericardium superat, habetq; venam comitem. Reliqua eius portio, varijs modis distribuitur, vt quæ ramum vena & arteria comitante, per medium illud foramen, quod in posterioribus scapulis situm est, transmittat: atq; ibi musculis è scapulis ortis, & humerarijs dispergatur. Alius nervorum ramulus, per cervicis latera ad superiorem humerum, & musculum cucullarem dispensatur: alijs ad humeros: alijs ad quadratum musculum, qui labra obliquè deorsum trahit, & ad quartum hyoidi ossi dicatum, pergunt: alijs furculi scapularum sinui immittuntur: ubi musculo in hoc latitanti, & secundo thoracis, sitoq; ad cutem, disseminantur. Sunt qui hoc quintum par, brachiorum proprijs musculis ideo annumerant, quod ijs qui humero serviunt distribuatur. MATHESES, Quot, & quinam sunt manus n. peculiares?

GERON, Decem, hoc est, quinque eorum paria, nempe tria ad extremos digitos, duo ad summam usque manum. MATHETES, Cur natura tot nervos manui exhibuit? GERON, Ut acriorem inde sensum acciperet. MATHETES, Unde ducunt originem? GERON, Ex spinæ medulla, & prima thoracis vertebra, exeuntque per communia ceruicis vertebrarum subsequenti foramina. postquam verò egressa fuerint, sic inuicem vniuntur, ut ea vel exercitissimus in confectionibus, vix discernere possit: quamvis potest ea separentur. MATHETES, Quo itinere hæc quinque nervorum coniugia incedunt? GERON, Eodem sub iugulo internoque eius processu, ubi etiam vena iecoraria, vulgo basilica dicta, & arteria alaris, ipsis associatae sunt, eoque vulnera hoc loco facta, periculosa existunt. MATHETES, Singulorum propagationem explices. GERON, Primum coniugium, quod inter quintam & sextam vertebrae ferri dixi, postquam ad alarum sinum venerit, propagationem quandam ad primum thoracis musculum, aliam ad secundum scapularum, aliam quoque ad cubiti primum, & secundum musculum, à quibus flectitur, transmittit: deinde communi venæ, sub primo musculo bicipiti, post cubiti flexuram consociatur, & simul cum illa ad summam manum porrigitur: furculos varijs locis ad cutem ipsam dispergit. Secundum per eandem viam, quam primum transit: tres soboles humeri musculis impertit: quarum una per id scapularum foramen, quod sub alis latet, egreditur, & variè initio distribuitur: mox ad flexuram usque recta tendit, sic ut priore humeri parte inter cubitum, & radius transeat: in flexura autem, quarto, quinto, et sexto musculo furculos, à quibus omnes quinque digitus in totum flectuntur, communicat. Postquam radius medium transierit, ramum insignem altius emittit: hic ligamento, quod inter cubitum radiusque situm est, adhærens, quadrato tandem musculo inferitur, qui manum in pronum ducit: quamquam alij aliter sentiant. Amplior huius nervi portio, ubi inferius descendit, sub inferiore. quæ manus cum brachio iungitur, ligamento transit, atque ibi propaggines musculis pollicis mittit: alias ad quosdam, oblongos dictos, & à quinti tendinibus exorientes: alias præterea illis largitur musculis, qui post iuncturam manus cum brachio enati, primos digitorum articulos flectunt: deinde quinque, interdum septem, ut plurimum, nervulos, manus volæ distribuit. Ex his quinque duo per latera pollicis, ad ipsius extremum usque propagantur, sic ut interdum soboles ex illis ad cutem diffeminantur: alij duo ad indicem, vel ad eius terminum usque potius excurrunt, cutique furculos per intervalla submittunt. quintus per interiorem medij digiti regionem ipcedit. In ceteris autem vola

NERVI manus quot & qui existant.

Primum coniugium nervorum manus.

Secundum nervorum manus coniugium.

*Tertium nervo-
rum manus con-
iugium.*

manus, septem nervis prædita est, ut nonnunquam fieri solet, se-
xtus per externam mediæ digiti partem, septimus per internam
tertium manus nervorum coniugium. GERON, Per eundem iux-
ta internam humerum, cubitumque internam: deinde supra ar-
ticulum inter cubiti flexum, interiusque humeri tuberculum,
ubi propagines edit, quæ per musculus priorem, unde fit tendo,
dispertitur: nec non ad secundum, & tertium iuncturæ manus
cum brachio tendit: mox iuxta cubiti longitudinem internam
procedit. postquam huius dimidium amplius præterierit, in du-
os ramos impares dividitur: quorum hic introsum, alter extro-
sum fertur. Interior sub internam manus cum brachio iunctæ li-
gamento incedit, sobolesque ad primum musculus, qui latum ten-
dinem dilatat, mittit: nec non ad sextum, qui minimum digitum
ab alijs deducit: nonnullas etiam alijs distribuit musculus, qui di-
gitos extendunt, & à tendinibus quinti musculi, tertium digito-
rum articulum flectentis, oriuntur. præterea mittit alias propa-
gines ad reliquos musculos primum internodium flectentes, ad-
hærescentesque ossibus palmæ, Græci *μετὰ τὸν κόρυμβον* dicunt. post istas,
in tres surculos, aliquando in quinque dividitur, qui in extremos
digitos desinunt, per latera auricularis & anularis delati. quamvis
in nonnullis ad mediæ digiti mediam regionem consistat. quin-
etiam ramulos cuti, & volæ ipsi impartit. unde interior manus
pars ad eam acris, & accurato sensu est prædita. MATHETES, De
maiore ramo dixisti: qua viâ minor pergit. GERON, Per interio-
ra illius, & supra iuncturam, quæ manus brachio iuncta est, refle-
ctitur, atque in tres, vel quinque interdum scinditur, idque per supe-
riorem palmæ, & lateralem auricularis & anularis, mediæ digiti
mediam regionem, ad quorum extrema terminantur, sicut de
interioribus dictum est. hoc autem intercedit discriminis, quod
interiores exterioribus multo sint maiores: quia hi facilius ab illis
offendi possent. MATHETES, Quid de quarto nervorum manus
coniugio dicis? GERON, Omnium qui in manu cernuntur, ma-
ximum existit, similique viâ & itinere, ut alij, exit: ubi verò ad hu-
meri dimidium pervenerit, ad externam, superioremque illius se-
dem reflectitur. atque huius exiles surculi, ad duos cubitum flecten-
tes musculos, nec non ad alios exteriores, & ad humeri, cubiti-
cutem excurrunt. Adhæc quartum istud nervorum par, inter ali-
os musculos delitescit, & per cubitum, radiusque transiens, ramu-
los illis quoque musculis transmittit, qui è medio cubito prognati,
pollicis inferiunt. Postquam ad iuncturam manus & brachij per-
venerit, statim quasi caudex in quinque propagines scinditur: sic ut

*Quartum nervo-
rum manus con-
iugium.*

bini ad pollicem, & totidem ad indicem relegendur: quintus autem ad medijs digiti extremum, vt alij, faciescit. At ex illis, qui pollicem accedunt, exigui ramuli ad musculum, inter pollicem, & indicem situm, pullulant. Postremò plures soboles ad extremos cubiti musculos, distribuuntur. **MATHESES**, Quale quintum est neruorum manus coniugium? **GERON**, Tenue admodum, vt quod ramulos ad humeri, cubitiq; cutem mittat, sensilemque reddat: adhuc furculos sub alam distribuit. reliqua eius portio comitatur venam, vulgò basilicam dictam: cum qua ideo hîc idem neruus deducitur, qui varias propagines per cutem ipsam distribuit, & tandem in summa manu desinit. **MATHESES**, Aliæ ne ex hoc quinto neruo soboles prodeunt? **GERON**, Ita. quædam enim ad septimum capitis musculum: quædam ad primum, & quartum hyoïdis: quædam ad primum, & secundum thoracis mittuntur: alia ad septimum humeri: alia ad binos cervicis musculos, qui ad latus propagantur. atq; hæc est regio, vnde ramuli ad carnem oculorum membranam, deinde ad cervicis cutem deferuntur. At non in omnibus hominibus eadem est exilium neruorum manus propagatio; quanquam magni illorum trunci, & caudices rarò variant. **MATHESES**, Quomodo igitur disseminantur? **GERON**, In his per medium musculum, in illis per latera: vnde in vulneratis alijs sensus quandoq; amittitur, motus autem manet integer: in alijs rursus motus aboletur, sensus autem remanet. Etenim nerui ad cutem desinentes, sensum duntaxat adferunt, eò quòd illa motu careat: musculis autē dicati, tum sensum, tum motum suppeditant. hinc cutis, si nerui violentur, aut materia acri infestentur, id tunc non sentit. **MATHESES**, Cur obsecro? **GERON**, Quia dum cutis attingitur, ipsius tantum sensus nobis occurrit. nec enim musculi extant in superficie. Sin autem horum nerui offendantur, ijs qui in cutem feruntur saluis, motus quidem aboletur, sensus autem remanet. Si verò vtrique lædantur, & sensus, & motus perit, sic vt neruus prius offendatur, quàm musculus in ea parte, que retrahi contrahiq; possit: ob quod vniri & coalescere prorsus nequeat. nam si neruus, vbi iam musculum ingressus est, obledatur, vniri poterit, & sensus motusq; redibunt. **MATHESES**, Manus neruorum historiam diligenter, & compendiosè es persecutus, dic nunc quales, & quot sint thoracis, quomodoq; propagentur.

GERON, Thoracis longè exiliores sunt, quàm manus, ijsq; vndecim numero. quamuis autem vertebræ duodecim existant, tamen foramina vndecim habent, totidemq; costarum spatia. **MATHESES**, Vnde hi nerui oriuntur? **GERON**, Etiam ex me-

Quantum neruorum manus coniugium.

Sensus cur quandoq; amittatur, motus autem maneat: rursus cur motus aboletur, sensus verò remaneat.

Cutis si nerui violentur, cur non sentiat.

NERVI thoracis.

dulla spinæ: prodeunt autem è foraminibus vertebrarum, & thoracis communibus, ac post exitum diuiduntur bifariam, sed non æqualiter: siquidem vnus maior, alter minor existit: nec non hic priora, ille posteriora versus reflectitur. *MATHETES*, Per quam regionem priores nerui procedunt? *GERON*, Per inferiorem costarum partem, vbi sinus ille ad longitudinem ipsorum extensus apparet, qui neruorum, venarumque solitarie, quæ Græcis *ἀρτηραι* dicitur, & magnæ arteriæ singulos ramos simul repentes, suscipit. atque hi tres per eandem sedem transeunt, sic vt à vertebrae ad pectoris os usque, tanquam lineæ æquidistantes, sub membrana succingente, prope musculos intercostales incedant, quibus tum externis, tum internis numero sexaginta, propagines distribuunt. *MATHETES*, Quæ alie præter has, stoboles illarum existunt? *GERON*, Quæ sexto thoracis musculo, in interiore eius regione posito, prioremque constringenti, sensum adferunt: adhæc, quæ à superioribus, per primum humeri musculum: item, quæ per secundum scapularum: nec non, quæ ad mamillas, earumque papillas deferuntur, ex illis prognatæ, quæ ordine consequuntur. deinde quædam deorsum magis, à ramis in media thoracis regione sitis, prodeunt: quæ obliquis abdominis musculis descendentes, admodum copiosæ inferuntur. A postremis autem thoracis neruis, alij ramuli, in carneam septi transuersi partem, dispensantur: reliquæ priorum neruorum tum ad thoracis, tum ad abdominis cutem distribuuntur. præterea furculi musculis stomacho subiectis, costarumque radicibus mittuntur, & sextum neruorum cerebri par, simul cum illis implicatur. *MATHETES*, Quorsum altera thoracis neruorum partitio tendit? *GERON*, Ad posteriora ipsius reflectitur, & è superioribus enati nerui, sensum primis, secundisque capitis musculis: nec non ceruici dicatis, & quinto sextoque humerum circumagenti: item primo & quarto scapularum, tertio thoracis, scapularumque cuti, deferunt. Iam alij ad dorsi musculos, ad quartum thoracis, & cutem dorsi, disperguntur. *MATHETES*, Hæcne superficiaria cutis neruorum distributio, in omnibus est æqualis? *GERON*, Nequaquam. aliàs enim trunci neruorum in plures ramos: aliàs in pauciores: nunc elatiùs, nunc demissiùs explicantur. *MATHET*, Adde nunc reliquarum partium vicinarum neruos. *GERON*, Proxima thoraci lumborum est regio, cuius nerui maiores, quam illius existunt. *MATHETES*, Quot autem paria neruorum, in lumbis reperiuntur? *GERON*, Quinq, licet quatuor tantum foramina in vertebraeprehendantur. *MATHET*, Cur hoc accidit? nam meo iudicio quatuor duntaxat esse deberent. *GERON*, Quia primum coniugium inter extremas thoracis vertebrae,

NERVI
lumborum.

Neruum in
lumbis cur quin-
que existant.

- tebras, & primam lumborum incedit. cum autem ab vltima costa
 recedat, inter lumborum potius, quàm thoracis nervos annume-
 randum censeo. non dico quòd ventri inferiori magis, quàm
 thoraci inseruiant. **MATHETES**, Quo itinere, lumborum nerui
 5 procedunt? **GERON**, Primum coniugium per foramen illud
 commune, inter duodecimam thoracis vertebram, & lumborum
 primam situm, sub peritonæo egreditur, admodum tenue: dein-
 de in ramos duos scinditur inæquales. maior enim ad priora
 tendit, sic vt propagines antea principijs septi transversi distribu-
 10 at: alios initijs quinti femoris musculi, de quo postea. minor au-
 tem ad posteriora declinans, in musculos dorsi definit. **Secundum coniu-
 gium.**
 dum coniugium, inter primam & secundam lumborum verte-
 bram, sub peritoneo, quintoq; femoris musculo incedit: in quem
 paris illius soboles perferuntur: deinde etiam sub peritongo assur-
 15 git, & ramus à summo Ilium osse abscinditur, qui abdomen exi-
 ens, sensum motumq; primis femoris musculis, & tibiæ sexto ad-
 fert: præterea alius ramus ad sextum femoris musculum, & tibiæ
 primum. **MATHET.** Quis præter istos nervos, ex secundo exori-
 tur? **GERON**, Tenuissimus, & oblongus, qui vasa seminaria comi-
 20 tatur, & tandem in testiculum definit. **MATHETES**, Qua via
 procedit tertium nervorum in lumbis coniugium? **GERON**, Inter
 secundam tertiamq; vertebram, etiam sub peritonæo, & quinto
 femoris musculo defertur. **MATHETES**, Quomodo distribuitur?
GERON, Prima ipsius soboles, sub os pubis transit, non longè ab
 25 Ilibus: atq; hic in imas propagines scinditur. prima per superiora,
 cute tenui fertur, in genu desinens: altera comitatur venam tali,
 quæ vulgo saphena dicitur: reliqua huius nerui portio post dorsi
 musculos, cutemq; reflectitur. **MATHETES**, Vnde quartum ner-
 uorum par in lumbis procedit? **GERON**, Ex tertia & quarta verte-
 30 bra: estq; inter cetera maximum. fertur autem sub quinto femoris
 musculo, & sub pubis osse: habetq; comitem venam, & arteriam,
 in ipsum inguen desinens: vbi ramulos peni & scroto communi-
 cat superficialiores, non penitiùs descendentes. ibidem mox in sep-
 tem propagines diuiditur: quæ omnibus musculis prioribus dis-
 35 pensantur, & partim tibiæ, partim femori inseruiunt. nonnullæ ex
 his ad genu vsq; descendunt. **MATHETES**, Vbi quintum coniu-
 gium egreditur? **GERON**, Iuxta vertebra quartam, ac quintam:
 deinde bifariam, vt alia, diuiditur. maior autem portio sub peri-
 tongo priora versus per foramen inter ossa coxarum, pubis & Ili-
 40 orum situm transit. Hinc furculi nervorum ad nonum & deci-
 mum femoris musculum, qui illud in gyrum mouet, alij ad septi-
 mum & octauum femoris propagantur: alij a Sobolis musculos;

*Primum nervo-
rum coniugium
in lumbis.*

*Secundum coniu-
gium.*

*Tertium nervo-
rum coniugium.*

*Quartum nervo-
rum par in lumbis
vnde procedat.*

*Quintum nervo-
rum coniugium
vbi egrediatur.*

alij ad vesicam disperguntur. In sceminis non solum ad vesicam, sed etiam ad uterum deferuntur: cui pariter ab hoc quinto lumborum regionis coniugio soboles accedunt, præter illas quæ ex sexta cerebri neruorum pari obueniunt. MATHESES, Quorsum secunda pars coniugij tendit? GERON, Post dorsi musculos reflectitur, & ad cutem vergit, quod etiam in quarto coniugio accidit. Hoc autem aduerti debet, primum coniugium cum secundo, hoc cum tertio, id rursus cum quarto, & cum hoc quintum similiter connecti, sicut in brachij neruis etiam conspicitur. MATHESES. Inueniuntur ne in omnibus, hæc quinque neruorum coniugia? GERON, Nequaquam, sed interdum quatuor duntaxat, eo quod quartum & quintum in quibusdam coeant, ita ut vnum ex duobus efficiatur. MATHESES, Vnde nerui ossis sacri prodeunt?

NERVI ossis sacri, & pedis.

Nervus corporis maximus.

GERON, Inter ultimas lumborum vertebrae, & illius summitatem: nec non ex primo, secundo, & tertio ipsius foramine. 15
quamprimum autem quatuor hæc neruorum initia exilierint, conueniunt, maximumque totius nostri corporis neruum efficiunt. MATHESES. Quorsum, & quo itinere tam insignis neruus vertitur? GERON, Ab interiore abdominis parte sub peritoneo, ad exteriorē versus clunes procedit, interque coxam, & coccygem, supra quartum 20
musculum, quo femur circumagitur, permeat: deinde ramulos quosdam ad tres musculos à coxa ortos, qui tibiam flectunt, prope maiorem rotatorem dictum, emittit: alios ad octauum musculum, liuidum vocatum, distribuit, qui etiam à maiori rotatore originem trahit, & recta per femoris posteriora, inter quartum 25
quintumque tibiæ musculum, ad ipsam genu flexuram ferè tendit. hic autem in duos ramos insignes scinditur inæquales: maior posteriorem: minor priorem tibiæ partem occupat. idem rursus propagines sub genu flexura ad primos extremi pedis musculos distribuit: ille verò surculum musculo, sub poplite latitanti, immit- 30
tit: alium quoque tertio musculo ab exteriori femoris parte ortū, communicat. Vbi verò maior ampli istius nerui portio, flexuram genu transierit, in alios ramos diuiditur: quorum vnus sub primis duobus pedis musculis protenditur, partemque carnosam prætergressus, sub cutem fertur: in qua per posteriorem tibiæ sedem, 35
ad summum usque pedem festinat. minor grandis istius musculi portio, surculos ad quartum musculum emittit: qui inter posteriores tibiæ musculos maior existit: mox per tibiæ posteriorem interioremque regionem, sub talo transiens, pedisque plantam subiens, ramulos in cutem distribuit: initio ad primum, secundum, & 40
tertium pedis musculum: deinde propagines omnibus illis musculis exhibet, qui in planta delitescunt, dispergit: postea adhuc in decem

- decem soboles diuiditur: ex quibus duæ per singulos digitos ad extrema eorum deferuntur, sic vt furculos inferiores ad cutem ipsorum dispargant. *MATHE TES*, Quorsum alter ramus penetrat? *GERON*, Altius, permeatq; inter tibiam & suram, ligamentisq; illi adhæreat, quod inter tibiam & suram est situm: quo posteriores musculi ab interioribus distinguuntur. adhæc furculos etiam ad quintum, sextum, & septimum pedis muscolum transmittit. *MATHE TES*, Quò maior truncus vergit? *GERON*, Sub appendice suræ prætergressus ad priorem partem fertur, ibiq; propagines edit, quæ musculis à tibia & sura profectis inferuntur: ipse verò caudex, deorsum per suræ ipsius priorem sedem descendit. Quòd si tibi ferramentum candens, quod Græci *καυθίσιον* vocant, ad mouere libet, vide ne ad suram, sed ad tibiam duntaxat accedas: sic vt primum muscolum non prætereas, nam si altius penetres, neruum istum, quem nuper dixi, offendes: vnde graues casus subsequi solent: vel certè regio, in qua candens ferrum adhibitum est, nunquam dolore aliquo vacabit. *MATHE T*, Quò reliqua pars nerui huius tendit? *GERON*, Deorsum sub ligamento, prioreq; pedis sede, iuxta exteriorem talum, per extremi pedis superiora transit: atq; hinc neruorum soboles decimo octauo pedis musculo distribuuntur. reliqua portio in decem furculos diuisa, in extremos digitos inferitur, desinitq;. Ab eodem caudice alius ramulus in cutem dispersus, ad extremum vsq; pedem progreditur. *MATHE TES*, Quot alia sacri ossis foramina, post tria ista existunt? *GERON*, Duo, nempe quartum, & in nonnullis quintum: non autem in omnibus idem est numerus. nam in alijs quinque, in alijs sex ossibus constat, nunquam autem tribus. Vbi igitur quinque ossa inueniuntur, quatuor sunt foramina: vbi sex, quinque. sic ex duobus foraminibus duo alia neruorum coniugia egrediuntur, quæ deinde ipsa quoq; coniunguntur, neruumq; gignunt, qui reflectitur, musculisq; natiū, & cuti illarum distribuitur. adhæc interiori abdominis regioni ramulos, ad recti intestini musculos transmittit. in quibusdam non ad hos solum, sed etiam ad vesicæ musculos, nec non in fœminis nonnullis ad vterum, eiusq; ceruicem, & earum vesicæ musculos deducit. item alij quoq; furculi ad perinæum, & scrotum mittuntur. *MATHE TES*, Qui nerui ex posteriori ossis sacri parte procedunt? *GERON*, Parui admodum breuesq; per ea foramina: atq; hi ad dorsi musculos natesq;, & ad posteriorem cutem perueniunt. *MATHE TES*, Sûntne omnes isti nerui, quos hactenus recēsuisti, coniuges? an aliqui etiam reperiuntur coniugij expertes? *GERON*, Sunt qui vnum absq; pari esse dictitent, sed is in brutis potius, quàm in hominibus in-

*Nervi omnibus
musculis inserun-
tur.*

uenitur. **MATHESES**, Cum iam nervos omnes accuratè sis per-
secutus, vnum adhuc ex te audire cupio, an illi in omnes muscu-
los perueniant? **GERON**, Nullus musculus tam parvus est, cui
non sit nervus inditus: imò in quibusdam duo, in alijs tres, aut
quatuor, in alijs quinque apparent. Si enim musculi nervis care-
rent, neutiquam consisterent. quamvis nonnulli anatomici, mu-
sculos aliquos absque nervis inueniri, falsò scripserint. **MATHESES**,
Cum ergo nervi sine musculis esse nequeant, cupio ex te nunc di-
scere, quid potissimum ipsi sint, & quomodo per totum corpus
distribuantur.

*DE MUSCU-
LIS.
Musculus quid
sit, qualis eius
essentia.
Musculorum for-
mæ variæ.*

GERON, Musculi voluntarij, siue arbitrarij motus sunt in-
strumenta, ex carne fibrosa, nervis, ligamenti, venis, arterijs, &
membranis conflata. Sunt autem complures ipsorum formæ,
nunc lata, nunc trilatera, nunc orbicularis: aliàs crassa, aliàs tenuis
exilisque: modò brevis, modò proluxa. Interdum vno fibrarum ge-
nere, interdum duplici, interdum triplici, interdum omnibus si-
mul constant. Quinetiam sine inuicem differunt. alij siquidem in
tendinem desinunt: alij non pauci eo carent: alijs tendo adest in
sua origine, alijs in medio, sicut quartus, qui maxillam aperit, &
alter quartus, à quo hyoides deorsum trahitur. Iam aliquibus mu-
sculis vnus tendo, aliquibus duo, tresue, aut quatuor, aliquibus
complures insunt, vt longissimo dorsi & thoracis quinto. Sunt
musculi, qui longum rotundumque tendinem obtineant: sunt eti-
am, qui rotundum, sed breuem: nonnulli oblongum & latum:
nonnulli latum & breuem. atque ita multiplex & varia musculo-
rum forma inuenitur. **MATHESES**, Vnde prodeunt musculi?

*Musculi vnde
prodeant.*

GERON, Ab ossibus, in easque desinunt, sed non omnes, nam aliqui
à cartilaginibus: alij à membranis exoriuntur, & in eadem quoque
finiunt: nonnulli post exortum descendunt: nonnulli ascen-
dunt: quidam transfuersim, quidam oblique siti sunt. Adhæc va-
riam quoque musculi originem habent. quidam enim oblongus:
quidam brevis, alius crassus, alius pertenuis: hic carneus, ille ten-
dineus: aliquis ex carne tendini mixta ortus apparet. **MATHESES**,
Quales sunt musculorum tendines?

*Musculi variam
originem habent.*

*Musculorum ten-
dines quales.*

GERON, Alij perforati, alij
non sunt: quidam vnico foramine, alij pluribus patent. **MATHESES**,
Ecquid potissimum tendo musculi existit? **GERON**, Pars alba,
dura, densaque & pellucida. differt autem à nervo, licet ipse quoque
sensu magno sit præditus, quòd graues casus ipso offenso restan-
tur. nam si tendinem incidas, solidum esse deprehendes: si ner-
uum contrà, vt qui licet albescat, tamen neque adeò durus, neque ro-
tundus, neque pellucidus, vt tendo apparet: qui si secetur, multis fu-
niculis intertextus, illisque circumdatus deprehenditur. **MATHESES**,
Vnde

*Tendo musculi
quid potissimum
existat.*

*Tendo, et nervus
quomodo differe-
rant.*

10

15

20

25

30

35

40

Vnde motus voluntarij facultas ad musculos peruenit: GERON. *Motus voluntarij facultas vnde ad musculos perueniat.*
 A neruis, qui illam à cerebro consequuntur. ideo quoq; singuli nerui, vel plures interdum, cuiq; musculo, etiam minimo communicantur, hoc est, nerui per musculos ipsos disseminantur: quamuis quidam falsò affirmant, complures musculos carere neruis, præcipuè illum quadratum, iuncturæ manus cum brachio vicinum, qui radium in pronum agit: cùm tamen adèd perspicuus neruus ei insit, vt quiuus alius: nec non qui latum tendinem efficit, sed facilius in singulis corporis membris neruorum historiam cognoscet. MATHETES. Explica igitur, qui musculi in singulis partibus existant.

CAPITIS musculi.

GERON, Caput, vt ab hoc exordiar, cùm variè moueatur, nempe versus priora, posteriora, latera, & in orbem, necesse est etiam, vt musculos habeat diuersos, qui nunc primario, nunc secundario, hoc est, proprio, vel communi motui ipsius inferuiant.

Capitis motus duplex.

MATHE. Quem vocas primarium, seu proprium capitis motum? GERON, Quando illud cum prima secundaq; vertebra mouetur: MATHETES, Quem secundarium? GERON, Quando idem cum tota ceruice mouetur. MATHETES, Quot igitur musculi proprij ipsius motibus inferuiere recensentur? GERON, Septem vtrinque: ac primi satis carnosi, à quinq; superiorum vertebrarum thoracis spinis oriuntur, sursumq; ad tertiam vsq; ascendentes, postea à ceruicis vertebris seiunguntur, versusq; occipitium oblique incedunt: vbi tandem inter posteriorem eius regionem, &

Primarius.

Secundarius.

aures desinunt. fibræ eorum statim ab origine, donec diuidantur, rectæ: deinde sursum vergentes oblique sunt. MATHETES, Quæ functio illis commissæ est? GERON, Vt caput ad posteriora tunc attrahant, cùm ambo simul operantur, cùm alter duntaxat, in laterus orbiculatim illud vertat. Habent autem hi musculi tria latera, vnum ab initio vsq; quo à coniuge diuiditur: alterum verò inde ad occiput vsq;: tertium ab hoc vsq; ad ipsius originem.

Musculi capitis motibus inferuentes.

Primi musculi caput mouentes.

MATHETES, Quales sunt musculi secundi caput mouentes? GERON, Admodum varij, vt qui & multas figuras, & diuersas impressiones habeant, multisq; partibus tendineis, & compluribus carnosis consent, ita vt plures quàm quinq; musculi esse videantur. quanquam vnum tantummodo par existat, nempe dextrum, & sinistrum: originem sumunt acutam, à transuerso quartæ, quintæq; thoracis vertebræ processu: sursum ascendentes, tandem in occipitio medio figuntur, rectis fibris præditi, caput in posteriora recta attrahunt. MATHETES, Quales sunt tertij musculi? GERON, Graciles, qui à spina secundæ ceruicis vertebræ orti, tandem in occiput desinunt: sed aliquantulum distanti incedunt,

Secundi musculi mouentes caput.

Tertij musculi caput mouentes.

*Quartimusculi
caput mouentes.*

aliâs fibris rectis constant, caputq; in posteriora rectâ ducunt. MATHETES, Quales quarti existunt? GERON, Carnosi omnes, sicut tertij, sed breues sub his occultantur, à posteriore primâ vertebrâ parte oriuntur, vbi eadem vertebra in spinam desinit, quâcauit ne tertius musculos offendant. cæterum in medio occipitio

Quinti caput mouentes musculi.

finiuntur, ipsiq; rectâ caput retrahunt. MATHETES, Curnatura tot capiti retrahendo musculos designauit? GERON, Eò quòd prior ipsius pars grauis admodum esset, vt cui facies maxillâq; coniuncta sit. MATHETES, Quintum par musculorum capitis, qualem situm obtinet? GERON, Obliquum, atq; ipsi à spina secundâ vertebrâ exorti, in transuersum primâ vertebrâ processum terminantur, caput orbiculatim vnâ cum primâ vertebrâ trahentes: omnes egregiè carnosi, licet graciles existant.

Sexti caput mouentes musculi.

MATHETES, Quales sexti capitis motores sunt? GERON, Obliqui, sed inter se contrarij, triangulumq; efficiunt, ex primâ vertebrâ processu emergunt, versusq; priora caput trahunt, in medium occipitium desinentes. MATHETES, Ergo duo hi iam dicti

*Quinti & sexti musculi caput propriè in orbem mouentes.
Septimi caput mouentes musculi.*

musculi, quintus & sextus, propriè capitis sunt? GERON, Vtq; & illud orbiculatim mouent, sic tamen, vt à primis atq; extremis, de quibus postea agemus, adiuuentur. MATHETES, Qui septimo loco musculi occurrunt? GERON, Longi, rotundi, & validi, qui vel in cadauere nondum excoriato, vel in viuentibus apparent situ obliqui, quorum fibræ à summo pectore atq; iugulo oriuntur. Duo autem habent initia, inter quæ sinus inest. cæterum nervosi, & in origine lati sunt, carnosiq; sunt, & mammillari processu sui insinuantur, quem etiam amplectuntur. MATHETES, Quid officij præstant? GERON, Cum vterq; operatur, caput in priorem partem inclinant: vbi vnus tantum, in latus agunt. admodum valentes idoneiq; sunt, vt caput in prouum flectant: coniuncti autem quarti hyoidis ossis musculo, magnam in ceruice crucem efficiunt. MATHETES, Intellego nunc, per quos musculos caput primariò moueatur: eos autem qui secundarium motum efficiunt, deinceps scire desidero. GERON, Illi sanè ceruici inseruiunt, qua mota, caput etiam ipsum moueri solet, eò quòd hæc illic per articulum commissa sit, & annexa. MATHETES, Quot igitur musculi ceruicis sunt?

CERVICIS musculi octo.

Primi ceruicis musculi.

Musculi sub esophago latitantes.

GERON, Octo, vtrinq; quatuor, qui caput versus priora, posteriora, & ad latera mouent. primi in priore ceruicis regione siti sunt recti, à quinta thoracis vertebra oriuntur, vbi ceruix cum costa connectitur, ascendensq; vniuersis vertebris adhærescit, sed mediam regionem, qua gula incedit, detectam relinquit. At hi musculi, quos sub illa latitantes appellant, in prio-

priorem primæ vertebræ processum, tendine acuto desinunt: ea de causa orti, vt ceruicem versus priorem partem flectant. Quin etiam musculi isti occipitio quandoq; sed rarò annectuntur, vbi foramen habetur, per quod spinalis medulla descendit. MATHE T.

5 Quales secundi ceruicis sunt musculi? GERON, Carnosi ampliꝫ *Secundi ceruicis musculi.*
à prima costa nascuntur, ascendentes ita attenuantur, vt ferè triangulum repræsentent: à transuersis autem vertebrarum ceruicis processibus, à priore parte stabiliuntur. MATHE TES, Vnde tertij ceruicis musculi oriuntur? GERON, Ex radice transuersi sextæ

10 vertebræ thoracis processus, sursumq; ascendentes à ceteris quoq; transuersis vertebrarum thoracis, & tandem à singulis vertebrarum ceruicis processibus, posteriore in regione connectuntur. hi secundi, inquam musculi, ceruicem rectà ad scapulas, id est, ad latus flectunt, cum vterq; eodem tempore operatur: quando vero

15 alter solus munere suo fungitur, tunc obliquè mouet. Porro nerui à spinali medulla prodeuntes, inter binos hosce musculos & vertebrae ceruicis exeunt. MATHE TES, Vnde oriuntur quartij? GERON, A septima thoracis vertebra, supra omnes huius, & ceruicis spinas: tandem in secundæ vertebræ ceruicis spinam desinunt. officium ipforum est, vt ceruicem ad posteriora attrahant. MATHE TES, Quinam, & quot spinæ musculi existunt?

GERON, Spine, quæ variè mouetur, vt in priorem posterioremq; partem, nec non ad latera, & in orbem, octo sunt numero musculi: quatuor vtrinꝫ. primi à sinu superiore, posterioremq; *SPINÆ musculi.*
25 osis Ilium parte exoriuntur, lati carnosiq; & in parte abdominis interiore ascendunt, transuersisq; vertebrarum processibus, & infimæ costæ adhærent, carnosi toti, & figura lateribus quadrata. MATHE TES, In quem vsum sic conformati sunt? GERON, Vt dorsum versus priorem partem flectant, ambo simul operan

30 tes: sin autem seorsum moueant, ad latus trahant. MATHE TES, Quales sunt secundi? GERON, Omnium corporis nostri musculorum longissimi, vt qui ab imo sacro osse, ad caput vsq; extendantur. originem ducunt ab ipso sacro osse extremo, eamq; neruofam, & validam. deinde in carnem degenerant, & transuersis

35 vertebrarum lumborum processibus, versus posteriorem sedem adhærescunt. postea tendinem omnibus transuersis vertebrarum thoracis processibus, ad primam vsq; illius vertebrae, & ad singulos transuersos processus mittunt. Alij aliter sentiunt, & cum musculis capitis hos confundunt. MATHE TES, Quid agunt musculi superius adducti? GERON, Vniuersam spinam, & caput etiam ad posteriora flectunt, efficiuntq; vt corpus flectentes semicirculi figuram imitari possimus. MATHE T. Vnde tertij nascuntur? *Secundi spine musculi.*

40 ad posteriora flectunt, efficiuntq; vt corpus flectentes semicirculi figuram imitari possimus. MATHE T. Vnde quartij nascuntur? *Tertij spine musculi.*

*Quarti spine
musculi, eor
umq; usus.*

GERON, A posteriore ossis sacri parte per initia in acutum tendentes, vertebrarum lumborum spinis hîc annectuntur, & in duodecimæ vertebræ thoracis spinam acuto sine desinunt: aliquando in vndecimam. ansulis autem nervosis præditi, lumbos flectunt, vt vsum intelligas. MATHETES, Tres iam absoluiisti, adde nunc, vnde quarti sumant initium. GERON, A duodecimæ vertebræ thoracis spina, acutum, vt superior, principium sortiti sunt, & omnibus vertebrarum thoracis spinis alligantur, primæq; etiam sine acuto inseruntur, in medio circa sextam vertebram lati. Quod si officium eorum scire desideres, thoracem erigunt, & cum simul tres supra dicti operantur, spinam vniuersam rectam detinent. sin autem quatuor pariter agant, vt vnus scilicet alterum subsequatur, in orbem agunt. si verò illi operentur, qui in altera duntaxat parte consistunt, corpus in latus declinât. Priores tres muscoli lumbis ascribuntur: tres postremi ad eò annexi inuicem sunt, vt ægrè inueniantur, distinguanturq;. Atq; hæc de spinæ musculis, dicta sunt. MATHETES, Qui muscoli in reliquis corporis humani partibus extant?

*FACIEI
musculi.*

GERON, In facie complures: primi duo in fronte siti, qui superiori in parte exoriuntur, inferiùs in communi futura desinunt, quæ ossa capitis à genis separat: quamvis nerui huic parti subditi sint. Cæterum muscoli isti obliquis fibris non rectis, vt alij volunt, à summo naso versus tempora constant: atq; hi ipsi supercilia attollunt, & vniuersam frontem, tantamq; musculorum temporalium portionem obtinent, quantum ipsi oblique ascendunt, præterquam media in fronte, vbi nos cutem corrugamus, quoties vehementer commouemur, aut admiramur, ad eò vt in multis supercilia inter sese contineant: quæ, inquam, frontis contractio, si vnus duntaxat musculus esset, nullo pacto fieri posset: id experiri poteris, si totam frontis cutem detrahas. nam in media eius parte nullum musculum conspicias, nisi summo in naso, vbi dexter cum sinistro ita committitur, vt vnus esse videatur, vbi etiam carnosiores, quam vllò in loco reperiuntur. quò magis autem ascendunt, eò tenuiores euadunt, & supercilia sursum trahunt, non modò ipsi soli, sed etiam alij duo, de quibus postea agetur.

*NASI musculi
duo existunt.*

*Nasi musculo-
rum exortus.*

Cæterum duo occurrunt, qui nasum dilatant, exteriore in parte siti. alij anatomici hos, cum superioris labri musculo confundunt. MATHETES. Vnde isti oriuntur? GERON, A futura superiùs dicta, figura acuti carnosiq;, frontis musculorum terminis permixti, qui deorsum tendentes latiores amplioresq; euadunt, super præq; nasi ossa deferuntur, & in eius pinnis desinunt, vnde triangulus prope, dum efficitur, cuius duo sunt latera oblonga, & tertium

tertium breue. hi ipsi pinnas sursum trahunt, & fibras rectas habent, eoq̃ eas dilatant. at illi, quos alij anatomici descripserunt, eorum numero sunt, qui superiori labro inseruiunt. MATHETES,

Quibus musculis nasus clauditur? GERON, Ab ijs qui dicto

*Nasus quibus
musculis clauda-
tur.*

iam labro auxiliantur, non à proprijs. nam quoties aliquid per nares attrahimus, labrum illud constringere cogimur. MATHET.

Qui alij sequuntur musculi? GERON, Duo penè quadrati in ceruice siti, qui labra oblique deorsum trahūt, membranosi, carnosiq̃ à iuguli regione, & posteriore ceruicis parte orientes. horum fi-

*Musculi lati in
collo duo.*

brae oblique ascendunt, eoq̃ tandem perueniunt, vbi labrum inferius cum superiore iungitur. atq̃ hi lati musculi quamuis in ceruice siti, tamen faciei inseruiunt, mentoq̃ plurimum cohærent, eoq̃ oris apertioni opitulari videntur. MATHETES, Quot labro-
rum sunt musculi?

GERON, Quatuor, nempe in vtrisque duo. MATHET. Vnde oriuntur? GERON, Superiores ab extrema ossis iugalis sutura,

*LABIORVM
musculi quatuor*

nec non ab ea, quæ primum os genarum à tertio separat: reliqui duo à malarum osse procedunt: atq̃ omnes oblique labrum ver-

sus incedunt, inter quos vnus, narium pinnis adhærescit, eoq̃

hunc naso dilatando addictum quidam autumant (quanquam superiorum labri musculorū portio tantum existat) quod si admit-

tamus, quatuor erunt musculi, qui nasum ipsum dilatent. reliqui

duo, ex quibus labrum inferius constat, ab ea menti regione originem ducunt, vbi asperitas quædam in osse est conspicua. MAT-

*Musculorum lab-
rorum officium.*

THESES, Quæ sunt quatuor istorum musculorum actiones? GERON, Quia varijs fibris præditi, atq̃ inter se commiscuntur,

implicanturq̃, ideo varios quoq̃ motus edunt, & cum cuti ipsa plerunq̃ confunduntur: quamuis, si corpus, quod incidendum ti

bi obtigerit, musculosum, & pinguedinis expers fuerit, & tu diligenti-
am in excoriando adhibueris, distinctè & clarè satis conspici poterunt. MATHETES, Qui alij, & quot musculi iam dictis

*Buccarum mus-
culi duo.*

faciei accedunt? GERON, Duo buccarum, inter genas & maxillam siti, qui à gingiuis oriuntur, & in eas desinunt, admodum tenues, circulum referentes, varijs intertexti fibris, eoq̃ diuersis functio-

nibus præsent. nam manus instar, cibum nunc huc, nunc illuc pro-
pellunt: loquelæ etiam viles, cum efflare, vel inflare buccam vo-
lumus. quinetiam iidem musculi tibia tubaque canentibus valdè
conferunt. Præter hos, adhuc alij bini in posterioris capitis par-
te extant, qui à futura lambdoide supra mamillares excessus ori-
untur, triangulari figura donati, in carnosam membranam ces-
sant, quæ etiam frontis musculos excipit. MATHETES, Quis
vsus musculorum illorum, qui supercilium trahunt?

*MYSCVLI
supercilium tra-
bentes, & palpe-
brarum.*

*Primi palpebra-
rum musculi.*

*Secundi palpe-
brarum musculi.*

*Tertij musculi
oculos aperiētes*

*OCVLOVVM
musculi.
Musculi oculo-
rum quot exi-
stant.*

*Oculorum mo-
tus.*

GERON, Vt frontem cutemq; capitis in posteriora agant, quod in ijs videre licet, qui vniuersam capitis partem valde moeuent. MATHETES, Quid de palpebrarum musculis habes? GERON, Sex eorum sunt numero, hoc est, vtrinq; tres, ex quibus duo orbitam oculorum foris ambiunt, reliqui intrò iuxta oculorum musculos consistunt: quamuis alij anatomici ipsos non palpebris, sed oculis inferuire putent. Primi ipsorum rotundi sunt, fibrisq; circularibus donati: oriuntur ex magno oculorum angulo, futuraq; capiti & genis communi, per initia acuti: tendentes autem sursum versus frontem, dilatescunt, vbi cum musculis illius commiscuntur. deinde versus aurem vergentes, quò magis minorem angulum accedunt, eò ampliores euadunt, & inferius circa orbitam oculorum reflectuntur, vt tandem acuto sine, prope suum initium terminentur. in hoc creati sunt, vt oculos claudant, valdeq; astringant, & eos ab externis iniurijs vindicent. MATHETES, Qui secundi erunt musculi? GERON, Duo recti, lati, in superiore oculorum parte carnosì. MATHET. Vbi trahunt originem? GERON, In orbita oculorum interiore, ex neruo visorio, vt reliqui alij, ac desinunt latiusculo sine, in suprema vertebra. officium illorum est, vt palpebras sursum trahant, oculosq; aperiant. MATHET. Quales tertij sunt musculi oculos aperiētes? GERON, Rotundi & tenues, ex eadem regione nati. oblique autem versus magnum oculi angulum in palpebra, tendini quasi rotundo terminantur: interdum tendinis huius portio, in corneam membranam inferitur: in hoc præcipue geniti, vt palpebras trahant, oculosq; aperiant, idq; tum in hominibus, tum in brutis. quare anatomici, quatuor hosce musculos palpebris inferuientes, oculorum musculis annumerare non debent. MATHETES, Quòtnam oculorum musculi existunt? GERON, Si hominum, non brutorum proponis, decem esse puto, quinq; scilicet in vtroq;. quatuor enim ibidem siti, qui palpebris aperiendis inferuiunt, nequaquam oculorum musculis sunt annumerandi: quatuor autem deinde sunt oblongi, qui versus visorij nerui radicem emergunt, rectis fibris intertexti, innervosos tendines desinunt. membranæ autem corneæ orbiculatim annectuntur, aliam membranam constituentes, quæ ad iridem non peruenit. MATHETES, Quot motus hi edunt? GERON, Duos, sursum alios infra: alios sursum, vel deorsum: alios ad dextram, vel ad sinistram, cum singuli ex his seorsum, vel duo simul operantur. quòd si omnes simul eandem edant actionem, motus fit circularis, sicut fit à quatuor musculis, iuncturæ manus cum brachio inferuientibus. præterea oculum sistunt, quando scilicet

- vno & eodem tempore operantur. **MATHESES**, Quisnam quintus oculi musculus est? **GERON**, Qui sub alijs quatuor subsistit, & inter quem atq; illum, pinguetudo intercedit. situs transuersus mediam oculi regionem complectitur: incipit à carnea membrana, & in eandem desinit, adèd vt qui eius terminus sit, quæue origo, non ita facilè deprehendas: sicut neq; quis proprius sit illius motus. si initium musculorum à nervis prodiret, certè eius origo in medio esset. nam ibi insignis crassusq; satis ramus, si cum musculo conferatur, à secundo neruorum cerebri coniugio progreditur: adèd hic tenuis est, vt aliquando tendo musculi huius putari queat. is si attrahatur, oculum sursum agit, circumagitq;, quamuis ei musculus subsit. **MATHESES**, Quis vsus huius quinti musculi existit? **GERON**, Fortè hic est, vt per eum, nerui illius adiumento, cœlum intueri sursum possimus. idem hic musculus à latere, siue fine, siue initio, tendine latiore, corneæ membranæ adhærescit. Notanda etiam est in his musculis, & alijs quatuor, pinguetudo, sicut inter hunc & visorium neruum, præterea obseruari debet, musculum istum non in hominis, sed bruti oculo reperiri, quem alij anatomici descripsere, à quibus nunc primo, nunc septimo loco numeratur: atq; in tres pluresq; musculos diuidi potest. **MATHESES**, Quid hic musculus in brutis præstat? **GERON**, Illorum sententia oculum sistit, quod in homine quatuor illi primi tunc efficiunt, cum omnes eodem in tempore operari desinunt, quietiq; permanent. **MATHESES**, Quos musculos, qui aures mouent, incidisti?
- GERON**, Nullos ferè, quanquam aliquando vnum inuenierim, qui à buccis nascatur, in aurisq; pinnam desinit, atq; eam in priorem partem mouet: interdum etiam alium deprehendi, qui à mamillari processu posterius prodeat. verùm hi duo rarissimè in homine, semper autem in brutis conspiciuntur. **MATHESES**, Quot maxillæ hominis musculi numerantur?
- GERON**, Tribus voluntarijs motibus præfecti, vtrinq; quatuor, vt qui illam aperiant, claudant, & in orbem agant: prior ex his, temporum nuncupatur, validus & nobilis, eò quòd cerebro proximus existat, variòsq; habeat nervos insertos: cuius rei gratia cum dextra tempora vulnerata sunt, sinistra conuelluntur. **MATHESES**, Vnde hic oritur? **GERON**, A primo genarum osse, à cuneato, à fronte, à syncipite, & à squamoso temporum osse, lateraq; capitis, vsq; ad posteriorem auris, & superiorem regionem, circiter tres digiti apices, obtinet. quamuis autem latum & semicirculare habeat initium, tamen in acutum & validum tendinem desinit, qui altè satis, & intrinsecus incipiens, angustus & tenui maxil-

Quintus oculi musculus.

Vsus quinti musculi.

AURIUM musculi.

MAXILLÆ musculi.

Musculi maxillæ quot existant.

Maxillæ tres motus voluntarij.

Coronon processus.

læ processui immittitur, quem Græci *κορωνον* appellant. Iam alius quoq; tendo membranofus occurrit, qui musculus extrinsecus liuidum reddit, & sub osse iugali deferretur. vnicum ipsius officium duntaxat, non triplex, vt quidam autumant, existit, nempe vt maxillam claudat. fibris constat eiusmodi, quæ à superficie ad centrum procedant, chyrurgis diligenter obseruandæ, dum vulnera dilatant, & abscessus hanc partē obsidentes incidunt, ne illas in transuersum diuidant. inde enim vsus ipsarum cessaret, eoq; abo-

Musculus in ore latitans.

lito, vita deficeret. Preter hunc temporum musculus, alium quoque natura addidit valentem admodum in ore, vt alterum in claudenda maxilla, pluresq; res effringendo, adiuuet. *MATHE T.* Vnde sumit originem? *GERON*, Ab eo sinu, qui in cunealis ossis situ est, & in maxillæ parte interiore, quæ aspera esse desinit: fibras habet rectas, & tendinem egregiè validum: idem præstat quod temporum: crassusq; & brevis existit. *MATHE TES*, Quis tertius est

Musculus manus foris dictus.

musculus maxillæ? *GERON*, Qui à mandendo Græcis *μασθήτης* dicitur, propè crassus, hoc officio præditus, vt illam circumagat. oritur à iuguli, & primo genarum osse, non autem à quarta & tertia ceruicis vertebra: tendineum carnosumq; habet initium, terminum autem in maxilla triangularem propemodum, acutoq; ipsius processui adhæret, vbi temporum musculo coniunctus esse videtur. quanquam Galenus dixerit, temporum musculus, tendinem in medio sui, vtrinq; autem partem carneam obtinere. *MATHE TES*, Quem vsus huius musculi esse dicis? *GERON*, Quia fibras habet diuersas, maxillam antè, retrò, in latera, & in orbem mouet. *MATHE TES*, Qualis quartus est musculus?

Musculus quartus os aperiens.

GERON, Duos habet carnosos ventres, initiumq; & finem minimum, vt cuius media regio sit tendinea: incipit carnosus à processu styloide: sub maxilla autem, & aure deferretur: figuram rotundam oblongamq; referens, non admodum crassus sicut illi, qui maxillam claudunt: in medio mento carnosus esse desinit: vbi interior quædam asperitas conspicitur. *MATHE TES*, Quid habet officij? *GERON*, Vt os & maxillam aperiat. *MATHE TES*, Cur tam exiguus factus est? *GERON*, Quia cùm ipse suapte natura maxillæ quasi grauis sit, duobus illis vtrinq; musculis (quorum mentionem suprâ feci) relaxatis, deorsum inclinatur. *MATHE TES*, Cur media eius pars, tendinis instar attenuata est? *GERON*, Ne maius spatium occupet. locus enim angustus admodum est, in quo multa instrumenta collocari oportet. *MATHE TES*, Quorum partium musculi post hos sequuntur?

OSSIS HYOIDIS MUSCULI.

GERON, Ossis hyoidis, octo numero, vtraq; parte quatuor. Primus carnosus est, tenuis, rectus, qui à summo pectoris osse in-

tus

- tus exoritur, proceditq; super asperam arteriam, & laryngem: in inferiore autem iam dicti ossis parte, citra tendinem definit: quia verò rectas fibras habet, deorsum etiam rectā trahit. Secundus à mento sumit originem, & in summam hyoidis ossis partem terminatur, tendinis expers: totus autem carnosus, rectis fibris sursum agit, contrario modo, quàm proximè commemoratus. Tertius paruus, & tenuis est, oriturq; à processu styloide, & in laterales hyoidis partes definit, situ obliquus: in hoc procreatus, vt sursum attrahat. Quartus à superiori scapularum regione prodit, & obliquè sub septimo capite musculi sursum ascendit, tenuis & longus, non tamen alijs prolixior, neq; gracilior: definit autem iuxta ossis hyoidis latera: in medio tendinem, sicut etiam quartus maxillæ musculus, obtrinet, quamuis Galenus illum duntaxat, præterea nullum esse, qui tendinem habeat in medio, affirmet. quod licet negari non possit, tamen non adeò longus tendo existit. Musculi huius vsus est, vt hyoidem deorsum obliquè trahat, ac contrario modo quàm tertius operetur, non autem potest tam tenuis musculus, ingens scapularum pondus, vt Galenus voluit, attrahere, atq; attollere. **MATHEI.** Quot musculos lingua habet?
- GERON.** Nouem. cum autem caro ipsius ex arbitrio moueatur, musculis prædictis duo adhuc addendi videntur, ita vt in totum numero sint vndecim. duo enim apparent, cum lingua candidam lineam in medio habeat, quæ dextram partem à sinistra distinguit. sub ea etiam ligamentum consistit, quod infantibus sæpè incidendum est, eò quòd locutionem nonnunq; impediat. **MATHEI.** Vnde duo isti muscoli emergunt? **GERON.** Ab ossis hyoidis basi: atq; in summam linguam desinunt. Ceterum omni fibrarum specie donati sunt, vt aliæ ab alijs seiungi nequeant, veluti in alijs musculis separantur. **MATHEI.** Cum autem omnium corporis partium musculi, nihil citra nervos prestare possint, quòsnam linguæ dicati obtinent? **GERON.** Tunicæ cuidam ipsam ambiens, quartum nervorum cerebri coniugium inseritur, à quo illa præcipuè degustandi facultatem habet. Eorum aliqui ad palati tunicam destinantur, quæ tum huic, tum stomacho, tum laryngi communis est. **MATHEI.** Quinam tertius & quartus linguæ musculus existit? **GERON.** Anatomicis vulgaribus non sunt cogniti: sin autem diligens fueris, originem eorum medio in mento conspicias, vbi duo sunt tubercula, quæ rectà ad linguæ radicem vergunt. Hi muscoli fibris rectis sunt præditi, rotundi: quorum officium est, vt linguam extra dentes & labra exerant. neq; enim id citra vllius musculi adiuuentum fieri potest. Porro quintus & sextus musculus à styloide ossis pro-

Primus hyoidis musculus.

Secundus musculus hyoidis.

Tertius hyoidis musculus.

Quartus musculus ossis hyoidis.

LINGVÆ musculi.

Musculi lingue nouem existunt.

Ligamentum lingue infantibus incidendum.

Duo lingue muscoli vnde oriuntur.

Qui nervi lingue inferantur musculis.

Lingua vnde gustus sensum habet.

Tertius & quartus lingue musculus.

Quintus & sextus lingue musculus.

Coronon processus.

læ processui immittitur, quem Græci *χρηανον* appellant. Iam alius quoq; tendo membranofus occurrit, qui musculus extrinsecus liuidum reddit, & sub osse iugali defertur. vnicum ipsius officium duntaxat, non triplex, vt quidam autumant, existit, nempe vt maxillam claudat. fibris constat eiusmodi, quæ à superficie ad centrū procedant, chyrgis diligenter obseruandæ, dum vulnera dilatant, & abscessus hanc partē obsidentes incidunt, ne illas in transuersum diuidant. inde enim vsus ipsarum cessaret, eoq; abo-

Cautio in temporum Chyurgia.

Musculus in ore latitans.

lito, vita deficeret. Preter hunc temporum musculus, alium quoque natura addidit valentem admodum in ore, vt alterum in claudenda maxilla, pluresq; res effringendo, adiuuet. MATHET. Vnde sumit originem? GERON, Ab eo sinu, qui in cunealis ossis situ est, & in maxillæ parte interiore, quæ aspera esse desinit: fibras habet rectas, & tendinem egregiè validum: idem præstat quod temporum: crassiusq; & breuis existit. MATHETES, Quis tertius est

Musculus manus fortius dictus.

musculus maxillæ? GERON, Qui à mandendo Græcis *μασθήτης* dicitur, propè crassus, hoc officio præditus, vt illam circumagat. oritur à iuguli, & primo genarum osse, non autem à quarta & tertia ceruicis vertebra: tendineum carnosumq; habet initium, terminum autem in maxilla triangularem propemodum, acutoq; ipsius processui adhæret, vbi temporum musculo coniunctus esse videtur. quanquam Galenus dixerit, temporum musculus, tendinem in medio sui, vtrinq; autem partem carneam obtinere. MATHETES, Quem vsus huius musculi esse dicis? GERON, Quia fibras habet diuerfas, maxillam antè, retrò, in latera, & in orbem mouet. MATHETES, Qualis quartus est musculus? GERON, Duos habet carnosos ventres, initiumq; & finem minimum, vt cuius media regio sit tendinea: incipit carnosus à processu styloide: sub maxilla autem, & aure defertur: figuram rotundam oblongamq; referens, non admodum crassus sicut illi, qui maxillam claudunt: in medio mento carnosus esse desinit: vbi interior quædam asperitas conspicitur. MATHETES, Quid habet officij? GERON, Vt os & maxillam aperiatur. MATHETES, Cur tam exiguus factus est? GERON, Quia cùm ipse suapte natura maxillæ quasi grauis sit, duobus illis vtrinq; musculis (quorum mentionem supra feci) relaxatis, deorsum inclinatur. MATHETES, Cur media eius pars, tendinis instar attenuata est? GERON, Ne maius spatium occupet. locus enim angustus admodum est, in quo multa instrumenta collocari oportet. MATHETES, Quorum partium musculi post hos sequuntur?

Musculus quatuor os aperiens.

GERON, Ossis hyoïdis, octo numero, vtriusq; parte quatuor. Primus carnosus est, tenuis, rectus, qui à summo pectoris osse in-

Ossis Hyoïdis musculus.

cus

- duos esse statuunt, putantq; à posteriore stomachi membranosa molliq; sede oriri, vt laryngem tanquam rem duram ac grauem attrahat. At nulla ratione musculi illi inde proficiſcuntur, nec fibras ipsas diuiſas, ſed perpetuas obtinent. poſſunt quidem alij
- 5 quocq; duo musculi communes, ab interiore hyoidis ſede orti, inſertiq; epiglottidi, in boue, bubulo, & alijs id genus animantibus, ſed non in homine, reperiri. Si ergo à communibus illis octo, in homine tres detraxeris, quinq; erunt reliqui. **MATHE T.** Qui proprij ſunt laryngis muſculi? **GERON,** Qui ab ea oriuntur, in eamq; deſinunt, & vni ipſi inferuiunt, ſic vt ligulam aperiant, claudantq;.
- 10 **MATHE.** Quid eſt ligula? **GERON,** Græcis dicitur γλῶττις, id eſt, rima ſiue fiſſura oblonga, in media larynge ſita. Duo ex his nouem muſculis, primi ab oſſe annulari, vel à cartilagine, quam ἀνώγειον græci, latini innominatam appellant, oriuntur exigui, fibrisq; obliquis donati: in imam oſſium ſcutiformis ſedem deſinunt. actio eorum eſt, vt inferiorem laryngis partem conſtringant, ſuperiorem dilatent. Ex his autem muſculis vnus dexter, alter ſiniſter inuenitur: licet alij quatuor hoc loco proprios deſcribant, quanquam falſo.
- 15 **MATHE TES,** Vbi ſecundi muſculi peculiareſ ſiti ſunt? **GERON,** In posteriore ſtomachi parte prolixi, & aliquantulum perſpicui. oriuntur autem carnoſi à poſteriori, & laterali oſſis angularis ſede, rectaq; in quartum & quintum os per tendinem deſinunt, hoc eſt, inferius vbi cum tertio committitur. **MATHE TES,** In quem vſum creati ſunt? **GERON,** Vt rectà trahant, eoq; talibus fibris
- 25 donati, ligulam verſus latera dilatant, faciuntq; vt graues voces emittantur. **MATHE TES,** Vnde tertij laryngis muſculi eduntur? **GERON,** A priore oſſis annularis ſede, & cum obliqui ſint, in quartum quintumq; os terminantur, idq; illic, vbi duo ſecundi deſinunt, non in partem, quæ ſcutum reſentat: hoc munere donati, vt ligulæ priores partes aſtringant, & poſteriores dilatent. **MATHE TES,** Vnde quarti enaſcuntur? **GERON,** Ab interiore oſſium ſcuta reſerentium parte, quibus committuntur inceduntq; oblique, donec iam dictis oſſibus inferantur, quæ arytaenoidem conſtituunt, id eſt, in regione laterali. ijdem muſculi cum priores partes
- 35 arcant, poſteriores amplificant. **MATHE TES,** Qualis extremus laryngis muſculus exiſtit? **GERON,** Omnium qui in toto corpore ſunt, minimus, tranſuerſim in eorum duorum oſſium, de quibus mentio facta eſt, radice ſitus, fibrisq; tranſuerſis præditus, ſimilibus ijs, quas vltimus muſculus ex communibus, qui ſtomachum complectitur, obtinet. **MATHE TES,** Quid præſtat? **GERON,** Poſteriorem laryngis partem conſtringit, muſculq; priorem dilatat. **MATHE TES,** Quot ſcapularum muſculi reperiuntur?

Musculi proprij laryngis qui.

Ligula in homine quid ſit.

Ex nouem muſculis laryngis vnus de duo primi oriuntur.

Voces graues cuius beneficio emittantur.

Tertij laryngis muſculi.

Quarti laryngis muſculi.

Musculus extremus laryngis omnium minimus.

SCAPULARUM musculi.

Primus scapularum musculus cuculle monachorum similis.

Secundus scapularum musculus.

Tertius scapularum musculus.

Quartus scapularum musculus.

HUMERI musculi.

Primus humeri musculus qualis existat.

GERON, In homine quatuor duntaxat vtrinque, cum totidem etiam motus ipsarum existant, nempe sursum & deorsum, in priora & posteriora: alij septem vtrinque statuunt, forte in brutis inuentos. MATHETES, Qualis primus ex quatuor illis existit? GERON, Figura monachorum cucullæ, si cum coniuge suo consideretur, similis apparet: exoritur ex illis, tum ab occipitio, tum à summis spinis omnium vertebrarum, cervicis, & thoracis ad octauam vsq;. Cæterum lineam transuersam in occipitio, spatiumq; huic & auri interpositum occupat: definit in summis humeris, iuxta maiorem scapularum processum totum, & iuguli partem. MATHETES, Quot motus edit? GERON, Cum varijs fibris sit conflatus, varios: obliquis sanè, scapulas sursum, summi humeri adiumento, obliquè trahit: medijs, versus dorsum adducit: inferioribus deorsum trahit. De hoc musculo Galenus & alij anatomici aliter sentiunt. nam ille hunc in duos diuidit, vt in simijs: licet in homine vnus sit. MATHETES, Vbi secundus scapularum musculus situs est? GERON, Sub primo humeri musculo, à secunda, tertia, quarta, quinta, raro à sexta costa innascens, vbi in cartilaginem degenerat, & sursum obliquè ascendens, in angustias cogitur, & in minorem scapularum processum ancyroidem, cum carnosus, tum tendineus definit: hoc munere præditus, vt scapulas ad priora versus pectus adducat, non autem, vt humero inferuiat, sicut Galeno videtur. MATHETES, Vnde tertius prodit? GERON, A transuerso secundæ, tertiæ, quartæ, quintæq; cervicis vertebræ processu, carnosusq; descendens crassescit inualefcitq;, & superius interiusq; scapularum regioni inferitur: fibris rectis ferè omnibus constat, eò quòd nonnullæ etiam oblique existant. Hic musculus scapulas attollit, prioriq; fert auxilium: quia os illarum graue admodum existit. MATHETES, Qualis est quartus scapularum musculus? GERON, Latus, tenuis, quadrangulus. MATHETES, Vnde procedit? GERON, A spina quintæ, sextæ, septimæq; vertebræ cervicis, & à tribus thoracis primis superioribusq; initium habet carnosum, & partim tendineum, fibrasq; obliquas: definit in vniuersas scapulas, iuxta longitudinem, easq; dorso ad mouet, id est, retrorsum trahit. MATHETES, Quid de humeri musculis habes? GERON, Eorum septem sunt numero, non vndecim, vt Galeno placuit, qui illum moueant sursum, deorsum, prorsum, retrorsum, & in orbem. MATHETES, Qualis primus est? GERON, Magnus, carnosus, priorem thoracis regionem occupans, à medio iugulo, & cartilaginibus septimæ & octauæ costæ, cui mammilla innititur: versus pectus ad ipsius ferè totius longitudinem, progre-

- progreditur. **MATHESES**, Quale est ipsius principium? **GERON**, Amplum et magnum, sic tamen, vt in processu imminuatur, fiatq; acutus, & postremò in breuem quidem tendinem, sed latum desinat: qui interiori humeri parti, sub ipsius ceruice, inseritur.
- 5 **MATHESES**, Quid musculus iste agit? **GERON**, Cùm varijs fibris donatus sit, humerum multifariam ad pectus deducit, nempe superius, in medio, & inferius: nec non quinq; lateribus præditus est. In quibusdam hominibus inferior istius musculi sedes, nonnunquam acuta quodammodo existit, ita vt alius musculus esse vide-
- 10 atur, cùm tamen non sit. Galenus ex hoc vnico tres fecit, in homine tot esse, quot in simia, persuasus. **MATHESES**, Qualis secundus humeri musculus est? **GERON**, Triangularis, crassius, & varijs fibris intertextus. anatomici Græci *επωμίδα*, & *δελτοειδής*, Latini humerarium vocant. **MATHESES**, Vnde enascitur? **GERON**, Ex
- 15 medio iugulo, summoq; humero, & maiori scapularum processu vniuerso, initium autem ipsius latum est, tendineumq;: quod tamen in acutum desinat. fertur supra humeri caput, & in eius medio, in validum transuersumq; tendinem cessat, qui medium humerum, quā crassior est, amplectitur, multiplicibus fibris in-
- 20 tertextus, quibus brachium, superius, in medio, antè & retrò, attollit. **MATHESES**, Qualis tertius apparet musculus? **GERON**, Carnosus & rotundus, qui ex inferiorum scapularum regione, carnea origine egreditur: fibris à principio ad finem vsq; rectis donatus, & situ obliquo super gibbam priorem scapularum partem
- 25 procedit, nec non in validum latumq; tendinem desinit, qui posteriori humeri sedi inseritur. **MATHESES**, Quem vsus hic musculus habet? **GERON**, Vt brachium deorsum versus posteriora trahat. **MATHESES**, Qualis quartus habetur? **GERON**, Ingens & latissimus, à fastigio spine sextæ vertebræ thoracis ortus, descen-
- 30 dit, iuxta omnium vertebrarum inferiorum apicem, ad os sacri dimidium vsq; principium eius admodum prolixum, & vndiq; neruosum est, sed gracile: deinde sursum ascendens, in angustum redigitur, & in validum tendinem, breuem, latumq; degenerat, idq; sub humeri capite, iuxta eum locum, cui primus musculus, pectus
- 35 brachio adducens, inhaeret: inter quos alij sinus relinquitur. **MATHESES**, Quis eius vsus & figura existit? **GERON**, Cùm varijs fibris constet, etiam brachium multifariam deorsum trahit, sed oblique potius, quàm alio modo: tribus angulis inæqualibus constat, ex quibus vnus brevis, duo verò longi sunt. brevis à
- 40 sexta vertebra, vsq; ad ipsius finem ex longis trahit originem: alter ab eadem vertebra, vsq; ad os sacri dimidium: tertius inde ad ipsius terminum pertingit. **MATHESES**, Num quintum enu-

Secundus humeri musculus, cuiusque officium & ortus.

Tertius humeri musculus, cuiusque vsus existat

Quartus humeri musculus, cuiusque vsus & figura existat.

*Quintus humeri
musculus.*

meres? GERON, Is totum sinum occupat, qui inter summas scapulas, & maiorem illarum processum situs, à posteriore parte ipsarum nascitur carnosus, & in validum tendinem desinit. Cum autem sub eo ligamento procedat, quod humerum cum scapulis annectit, in caput humeri superioris finit, multumq; scapulis ipsis adhæret. MATHETES, Nunc sextum humeri musculum expo-

*Sextus humeri
musculus.*

nas? GERON, Vniuersam scapularum regionem gibbam ambit, carnosus, scapulis admodum inherens: ex posteriore autem illius sede, ad ipsius longitudinem nascitur, desinitq; in crassum & latum tendinem, ac tandem in caput humeri, versus posteriora im-

*Septimus humeri
musculus quid
praestet.*

mittitur. MATHETES, Quomodo septimus musculus deniq; se habet? GERON, Vniuersum scapularum sinum interiorem occupat, vbi costis inhæret, ex tota posteriorum scapularum regione provenit. situs est inter costas scapulasq; & in tendinem satis latum desinit, interioriq; humero inferitur, si trium horum musculorum vsum queras, quos postremo iam commemoravi, brachium circumagunt. Atq; hæc de humero satis dicta existimo: nunc de thoracis musculis agam. MATHETES, Antequam pergas, explices mihi vehementer oro, quomodo ille moueatur, nam audio de eo esse controuersiam.

*DE THORACIS
musculis.*

*Thoracis motus
duplex, voluntarius,
& naturalis.*

GERON, Tum voluntate tum natura. quamuis Galenus ex voluntate solum moueri tradiderit. Cum dormimus, thorax naturaliter, non voluntate mouetur: eoq; cartilagine inter costas, & os pectorale constituit, quæ pulmonis motui facile cedunt. hic similiter, & cum vigilamus, & cum dormimus, mouetur, præterquam cum orationem proferimus, ac vociferamus. tunc enim illæ paulò amplius mouentur, eo quòd musculi thoracem magis dilatent. Voluntarius motus à musculis, naturalis à pulmonis dilatatione ac constrictione provenit. MATHET. Qui

*Motuum singulorum
origo.*

*Thoracis proprii
musculi sunt 81.
& octo communes.*

ergo musculi hoc præstant? GERON, Proprii quidem vnus, & octoginta: communes autem octo, in abdomine siti. qui quamuis illi inserviant, tamen thoraci quoq; famulantur. atq; ita omnes in vniuersum sunt octoginta nouem. Hoc autem obseruari debet, cum inspiramus, inferiores partes thoracis attolli, superioresq; summitti. contra cum expiramus, inferiora summitti, superiora

*Primi thoracis
musculi.*

*Secundus thoracis
musculus.*

attolli. MATHETES, Quot primum musculi occurrunt? GERON, Bini, vtrinq; singuli, ab inferiore iugulo prodeuntes: initium finemq; oblongum habent, & superiori primæ costæ parti, quam attollunt, inferuntur. Secundus magnus est, latus, carnosus totus: qui à base iuguli emergit, inter ipsum & costas incedens: primæq; costæ, secundæ, quartæ, quintæ, sextæ, septimæ, octauæ, & nonnunquam nonnisi inferitur: vbi verò istæ in cartilaginem ferè de-

gene-

- generant, digitorum instar desinit, in hoc factus, vt costas octo attollat. *MATHESES*, Qualis tertius apparet? *GERON*, Exilis & paruus, qui à trium ceruicis vertebrarum extremarum spinis, & à prima thoracis exoritur, principio lato, membranosoq; in prima thoracis costam, aliàs in quartæ posteriorem sedem desinit: in hunc vsu à natura constructus, vt costas illas attollat. *MATHESES*, Perge nunc reliquos ordine persequi? *GERON*, Quartus etiam ipse exilis & quadrangularis est, à thoracis extremarum duarum vertebrarum spinis, & nonnunquam à lumborum prima, initio lato, neruoso, membranosoq; deinde carnosoprodit, & in tres infimas costas terminatur, digitorum in morem, easq; costas attollit. Quintus carnosus, à parte posteriore superioreq; ossis sacri & llium interiore, ortum habet: adeò per tinaciter secundo musculo spinæ adhærens, vt meritò portio illius esse videatur. quanquam vbi ad costas peruenerit, planè diuersus à spinæ musculo esse cognoscatur: quò autem magis ascendit, eò tenuior euadit. nouissimè omnibus costis, posteriore in regione, non procul admodum à transuersis vertebrarum processibus, vbi costæ asperitatem habent eminentem, neruorum musculorum subsidio inseritur: posteriores thoracis partes constringit. Sextus in sinu thoracis interiore, iuxta os pectorale, & septem verarum costarum cartilagine, situs est, oblongus, carnosus totus, sed exiguus: in hoc autem creatus, vt priorem thoracis regionem coarctet. *MATHESES*, Qui musculi hos sequuntur?
- GERON*, Intercostales, sic vocati, quod spatia, siue interualla costarum occupent: numero sunt vtrinq; triginta quatuor, eò quòd vndecim sint interualla, verarum costarum sex, quinq; spuriarum: in his duo sunt, in singulis interuallis, in illis quatuor: idq; ea de causa, quòd cartilagine versus pectus vertantur. nam pro harum ratione fibræ deducuntur. Porro intercostales sunt partim exteriores, partim interiores, fibris obliquis eisq; contrarijs præditi, sic vt exteriores cum interioribus X literam efficiant. *MATHESES*, Vnde exteriores nascuntur? *GERON*, Ab inferiore costarum parte, ac in subsequentiū superiorem regionem desinunt: versus spinam incipiunt, & tandem in os pectorale inferuntur. *MATHESES*, Vnde interiores sumunt initium? *GERON*, A superiore costarum regione, & in inferiorem terminantur. Fibræ exteriorum, à spina obliquè versus pectus ita procedunt, vt à superioribus ad inferiora descendere videantur: interiorum fibræ contrario modo se habent, sic vt literæ X instar coniungantur: tenues quidem, sed longi, non altiore loco siti, quòd enim intercedit costas spatij, perbreue est. Reliqui anatomici falsò assue-

Tertius thoracis musculus, eiusq; vsus.

Quartus thoracis musculus.

Quintus thoracis musculus.

Sextus thoracis musculus, eiusq; officium.

MUSCULI intercostales vtrinq; triginta quatuor.

Musculi intercostales exteriores.

Musculi intercostales interiores.

rant interiores musculos, non aliter quàm exteriores genitos esse, vt costas tantùm constringant. exteriores enim sursum tollunt, interiores deorsum: atq; ita simul costas trahunt, valideq; constringunt. fortis enim comprimendi vis thoraci inesse debet, eò quòd foràs expiremus & vociferemus: qui motus in viuorum animalium, præcipuè tanum incisionibus obseruari potest. **MATHESES**, Qui post hos reliqui sunt enumerandi?

SEPTI transuersi musculus.

GERON, Septi transuersi musculus, qui naturalia membra à vitalibus diuidit, & animam appetitoriam ab irascibili, si Platoni credimus. situs hic musculus est in vltimo thorace: & in corpore nostro transuersus, figura orbicularis, neruosum tendinem in medio obtinet: quamuis carnosus partibus circundetur, sic vt fibræ à centro ad superficiem tendant, tam nobilis is musculus à veteribus habitus est, vt mentem in eo sitam esse dixerint: vnde etiam Græci *φρενός* appellarint. hoc enim læso, rarò aut nunquam mortem euadimus. **MATHESES**, Nihil aliud ne, præter neruosum illum tendinem, quem multi sensus participem esse dicunt, adiunctum habet? **GERON**, Indubiè: adsunt ei venæ, arteriæq; non paruæ: præterea complures nerui, qui à spinæ medulla emergentes, inter costarum interualla, ad septum ipsum accedunt: quorum 15

Venæ, arteriæ, & nerui septum transuersum ingrediuntur.

duo, inter quartam quintamq; ceruicis vertebram incidentes, inferiùs supra pericardium inferuntur: vbi carnosæ septi pars in tendinem degenerat. qua de causa Galenus de ortu ipsius non per omnia sibi ipsi conuenit. **MATHESES**, Quis vsus huius musculi est, quem septum appellasti? **GERON**, Expirationi inspirationiq; inseruit. quando enim suo fungitur officio, seipsum versus vertebrae retrahit, ascendensq; extremas thoracis partes ad se adducit, & vniuersam sedem inferiorem constringit, idq; cum expiramus: quando autem inspiramus, remittit, & descendens, inferiora thoracis dilatari sinit. atq; hic est septi transuersi vsus, 25 quem in viuorum incisione spectare licet. Musculus idem à vertebrae exorsus, tum supra, tum infra, quasi velamine tegitur: supra quidem à membrana costas cingente, quam Græci *μεμβράνη* vocant: infra verò ab intestinorum inuolucro, quod Græci *περιτόνιον* appellant. alij originem ipsius neruosam esse arbitrantur: cum ta-

Septum transuersum esse musculum, inspirationi & expirationi seruiens.

men duæ illæ, longiusculæ ipsius partes, siue ligamenta existant, quæ ex latere duodecimæ thoracis vertebrae, ac lumborum superioribus prodeunt, illinc postea neruosa illius portio, quæ cartilagini mucronatæ coniungitur, sumit initium. **MATHESES**, Quid mucronata ista cartilago muneris habet? **GERON**, Vt septi transuersi, non oris ventriculi (vt vulgò putant) propugnaculum existat, cui etiam cæcum innititur. Fit autem septum vtrinq; carnosum, & in

Mucronata cartilago quid præstat.

& in costarum spuriarum cartilagine tandem inferitur, vltimamq; costam amplectitur. sic autem nobile istud septum constructum est, vt alijs corporis nostri partibus cedat. Cuius rei gratia duobus foraminibus peruium est, dextro & sinistro latere lingulis: per hoc stomachus descendit, qui in ventriculum desinit: per illud caua vena ascendit, quæ in thoracem procedit. Verum cum stomacho bini nerui incedunt, quos sextum cerebri neruorum coniugium procreat. atq; hæc propria sunt septi transversa foramina. alij quoq; tertium adiiciunt, per quod arteria *in* iter faciat: quod ego necessarium esse nego, cum illa sanè vertebri ipsi adhærens, transeat. etsi enim septum, dum vertebra amplectitur, arteriam quoq; comprehendat: non tamen ideo perforatur. Hippocrates & Galenus stomachum, & magnam arteriam per idem foramen transgredi docuere. MATHETES, Qui alij sunt in ventris regione musculi?

Duo septi transversa propria foramina.

Tertium foramen in septo transverso.

GERON, Abdominis, quod Græci *Ἀνδράσπιον*, Arabes mirrach, Latini ventrem inferiorem appellant: in cuius medio umbilicus, & membra tum nutriendi, tum generandi continentur. musculi ipsius octo sunt, vt antea diximus: qui licet illi peculiari dicati sint, thoraci tamen etiam auxiliantur, dum eum dilatant: quando autem comprimunt, alui excrementorum, vrinæq; & foetus expulsionem promouent, præsertim à septo transverso adiuti: nec non omnibus ijs, quæ in hac regione sita sunt, detinendis, magnam opem ferunt. Primi duo, obliqui descendentes vocantur: eo quod è superioribus orti, ad inferiora vergant: fibris obliquis donati: vnde etiam obliquorum nomen receperunt: lati admodum, & in lateribus siti. originem trahunt à sexta, septima, octaua, nona q; costa, antequam in cartilaginem desinere incipiant: deinde à subsequentibus costis, & transversorum in vertebri lumborum processuum fastigio, dimidia q; ossis Ilium appendice, latissimum habent exordium, & carnosum, digitorum vt plurimum instar. qui inter eos, fines secundi musculi thoracis incedunt, octo costas dilatant. vbi verò longius progressi sunt, in latum tendinem, neruosum, membranosumq; degenerant, qui reliquæ parti appendicis ossis Ilium, de qua egimus, & pubis adheret, non autem coxæ. in medio ventre, nempe in mucronata cartilagine, rectà vsq; ad os pubis finiunt: qua in parte candida linea apparet, & horum musculorum tendines, cum obliquis ascendentibus, & transversis coniunguntur. MATHETES, Cur hæc pars albicat? GERON, Eo quod caro illi non subiecta sit: ideo candida illa linea dictorum musculorum terminus est, non in osse pubis, quia hoc non mouetur. Quomodo enim obliqui descendentes

ABDOMINIS musculi.

Musculi abdominis octo.

Primi duo abdominis musculi descendentes dicti.

Linea candida in ventre inferiore.

abdominis muscoli officio suo fungi possent, si ossi pubis inserti essent: nam præterquàm quòd tum intestina, tum alia, quæ dixi, premant, etiam inferiora thoracis constringunt, septoq; auxilium ferunt. tanta est tendinis illorum vnio, vt vnus tantundem musculus esse videatur, cui duæ carnosæ partes contigere. Si verò quis diligenter terminum fibrarum obseruet, duos esse musculos deprehendet, qui in medio vniuntur, & alios sex ventris inferioris musculos superant. **MATHE TES**, Qui secundi obliqui ascendentes dicuntur. **GERON**, Quorum fibræ aliter, quàm primorum habent. nam illæ deorsum, hæ verò sursum obliquè spectant, & sicut intercostalium musculorum fibræ, X literæ figuram imitantur. Itaq; hi carnosi ab ossis Ilium, & transuerforum in vertebri lumborum processuum initio, membranam referente, exorti, sursum quidem carnosi inferioribus costis nectuntur: deinde in latum, neruosum, membranosumq; tendinem desinunt, qui ascendens, rectis musculis occurrit, & in duos diuiditur: quorum alter supra rectum musculum, alter sub ipso incedit. nam recti hoc complexu robustiores euadunt, & in medio trium consistunt: & nisi tendo iste scissus esset, recti muscoli nequaquam in medio collocari possent. vniuntur autem rursus isti tendines, vbi linea candida sita est: atq; hoc loco, ita vt descendentes terminantur, neruosisq; nonnullis rectorum musculorum partibus adhærescunt. v. s. us eorum est, vt intestina comprimant, costasq; deorsum trahant, quòd thorax dilatetur. **MATHE TES**, Quales tertij abdominis musculi existunt. **GERON**, Recti, qui sic appellantur, quòd secundum corporis rectitudinem siti sint, rectisq; fibris præditi: ab osse pubis incipiunt: quamuis Galeno aliter videatur, qui illos à pectore oriri putat, cum in illud potius supra mucronatam cartilaginem desinant. duo habent magna ex parte principia, vnum neruosum, alterum carnosum, idq; à superioris ossis pubis regione: quanquam interdum vnum duntaxat carnosum habeant. In os autem pectorale, & in vltimarum costarum verarum cartilagine, lato sine terminantur, tendinis expertes: quamuis tribus tendineis neruosisq; intersectionibus constent, quibus muscoli obliqui ascendentes annectuntur. **MATHE TES**, Quorum intersectiones istæ pertinent. **GERON**, Vt musculos hos corroborent, ne ipsi in profundum abdomen, admodum contrahantur, venter autem magis rotundus relinquatur. in exortu proximi sunt, quo magis autem ascendunt, eò magis segregantur: crassi & validi: in hoc à natura facti, vt priora abdominis comprimant, sed euidentius tamen thoracem deorsum trahunt, vt superius dilatari possit. **MATHE TES**, Qui restant adhuc musculi abdominis. **GERON**, Postremi

Secundi abdominis musculi ascendentis dicti.

Ascendentium & descendentium musculorum vsus. Tertij abdominis musculi recti appellati.

Musculorum rectorum intersectiones ad quid pertineant.

- stremi sunt transuersi, sic appellati, quòd transuersim in corpore collocentur, à transuersis vertebrarum lumborum processibus prodeuntes, neruosi: qui deinde carnosi euadunt, & Ilium ossi, costisq; inferioribus coherent: fibras quoq; transuersas obtinent, & in latum, neruosum, membranosumq; tendinem, per lineam candidam desinunt, pubisq; ossi inhærent, quemadmodum obli-
 5 qui ascendentes, & descendentes: quamuis non ita adhærescant, peritonæo tamen adhærent, hoc habent officij, vt abdomen comprimant, & præcordia constringant. Illud adhuc adijciendum est, tendines musculorum obliquorum descendencium &
 10 ascendentiũ, transuersorumq; perforatos esse, primũ in vmbilici regione: deinde prope os pubis, & per ea foramina vasa, quæ testibus semen præparant, descendere, & quæ deferunt, ascendere: quæ tandem in glandulas assistentes, Græci *μυεσάρας* vocant, in-
 15 feruntur: atq; per hæc foramina ramices, siue herniæ apparent, inueniuntur etiam ea in mulieribus, licet hoc anatomici quidam non animaduenerint. Sunt qui decem musculos in abdomine contineri affirmant, sed perperam, nulla enim ratione, sententia illorum defendi potest. quare me ad testiculorum musculos con-
 20 uertam. *MATHESES*, Quot numero sunt, & quales?

- GERON*, Bini, tenues, oblongiq; in membrana *σπερμ* siti originem supra os pubis trahunt, vbi foramen apparet, per quod vasa seminaria descendunt, eadem membrana inuoluta. at si verum fatendum erit, non adeò veri musculi figuram repræsentant, eò quòd fibræ quædam carnosæ, rectæq; in hac darto existant.
 25 Veteres hos musculos, græcè *σπέρματος ἵστος*, quasi suspensores appellarunt, ideo namq; effecti à natura videntur, vt testes suspendant, ne temerè delabantur. alij putant hos, non modò testes detinere, ne prolabantur, sed etiam attrahere, idq; motu voluntario, dextrum à dextro, & sinistrum à sinistro. *MATHESES*, Quot & quales musculos habent virorum naturalia?

- GERON*, Coles rarus, spongiosus, crassaq; membrana inuolutus, quatuor musculos obtinet: quorum primi ab orbiculari musculo oriuntur, qui extremo recto intestino adiacet, Græci *σφρυγίλιες* vocant, longiusculi ipsi subtus incedunt, & mediâ illius parte, in meatum vrinarium inseruntur, qui semini quoq; communis est, quem ipsi amplectuntur: ideo à natura effecti, vt cum lotium nobis, vel semen emittendum est, meatum istum dilatent. Reliqui duo musculi à coxendicis appendiculo oriuntur, sub ip-
 40 sius colis exordio, quod ab inferiore pubis ossis regione sumit. sunt quidem musculi isti breues, sed prædictis valsiore, & in ipsum colem desinunt: cum vrina reddenda est magnam quoq;

Musculi abdominis transuersi vocati.

Transuersorum musculorum officium.

Tendines musculorum obliquorum ascendencium, descendencium, & transuersorum, perforatos existere.

Vasa semen præparantia, & deferentia.

TESTICULORUM musculi.

Musculi suspensores dicti.

COLES eius musculi.

ipsi opem ferunt, maiorem verò in concubitu. nam colem sustinent, erectumq; detinent, dum ille compleatur. MATHETES, Habéne etiam vterus musculos?

VTERI
musculi.

Membrane in
vtero instar ala-
rum posite.

GERON, Ad latera ipsius, vbi seminaria vasa adsunt, duæ quoq; membranae alarum instar adstunt, quæ distinctionem va-
forum illorum continent. hæ membranae non in omnibus, sed
in quibusdam duntaxat mulieribus, carnosas quasdam fibras, ve-
luti virorum dartus, habent: si igitur has pro musculo vteri acci-
pere voles, nihil refert.

VESICÆ
musculi.

Glandulae semen
continentes.

Musculus col-
lum vesicæ com-
plectens.

Proximi sunt vesicæ musculi, de quibus nunc agemus. no-
tandum autem, naturam iuxta ceruicem, eius glandulas illas, Græ-
cis *νεφροτόκας* dictas, collocasse, quæ perpetuo semine in homine
refertæ sunt, nisi ille vel puer sit, vel senex, vel macie consumptus.
Harum fini tenuis musculus orbicularis, fibrisq; circularibus præ-
ditus, appositus est, qui ceruicem vesicæ constringit, ne vrina in-
uitis nobis exeat, nisi enim hic adesset musculus, vrina singulis ho-
ris excerneretur, sicuti in quibusdam accidit, quibus ille reso-
lutus est: nec non in ijs, quibus imperiti chirurgi quidam, cal-
culorum excidendorum professores, transuersum dictum mu-
sculum, inciderunt. cum enim situm huius prorsus ignorent, im-
prudenter eum violant, morbumq; deteriorem inducunt. Qui-
bus hic musculus præcisus est, vrina semper emanat: nunquam
autem colligitur, magnusq; foetor inde ex vestimentis interiori-
bus illis madefactis percipitur. Is itaque musculus vrinam con-
tinet: cum eam reddere volumus, resoluitur, atq; sic illa effluit.
idem in mulieribus quoq; reperitur, quamuis assistentes glan-
dulas, illæ non habeant.

Mulieres glan-
dulas parastatas
non habent.

ANI musculi
tres.

Musculus rotun-
dus recti intesti-
ni sphincter di-
ctus.

Duo reliqui mu-
sculi recti intesti-
ni, eorumq; vsus.

His succedunt tres ani musculi, ex quibus vnus rotundus
est, qui inde quod alium constringat, *σφιγκτης* græcè dicitur, in ex-
tremo recto intestino situs: latus, magis crassus, fibrisq; transuer-
sis præditus, cuti admodum vnitur, ligamenti à coccyge mutuò
acceptis. idem ipsius munus est, quod vesicæ musculus obtinet,
nempe vt vrinam contineat, ne nobis inuitis elabatur. Præter
hunc, reliqui duo sunt lati quidem, sed tenues, ab ossis sacri liga-
mento, & ab Ilijs originem sumentes, in superiorem sphincteris
partem terminantur: in hoc procreati, vt rectum intestinum sur-
sum trahant, si fortè violentius excernendo, quod interdum acci-
dit, elabatur. MATHETES, Quos hactenus musculos recitasti, in-
terioribus tantum partibus inservire videntur: nunc exte-
riorum partium peculiare persequere.

MYSCVLI
femur mouen-
tes.

GERON, Morem tibi geram. Eos igitur qui femur, deinde
qui tibiam, postea qui extremum pedem, nouissimè qui cubitus,
supinamq;

- summamq; manum mouent, enumerabo. Cum igitur femur flexi, extendi, in orbemq; agi, nec non intrò forasq;, & summatim vndequaq; ferri soleat, decem musculis donatum est, ijsq; magnis, eò quòd, cum membrum tum crassum, tum oblongum moueri debet, validis musculis indigeat, à quibus hoc præstari possit. Primus iste qui nates constituit, admodum crassus & carnosus, à dimidia oſis Ilium appendice, ab oſſe sacro, & coccyge exoritur: initio lato, & semicirculari: sed ita processu attenuatur, vt tandem in acutum fastigietur. desinit autem in maiorem rotatorem, quem Græci *ροχαινή* vocant, inferiusq; adhuc in femur per latum autem tendinem, coxendicis articulum excedit. Secundi musculi maior portio sub primo latet, liuetq;, à tota Ilium appendice carnosà, & semicirculari originem trahens, super eundem articulum vehitur, & in latum validumq; tendinem terminatur, magno trochanteri à summo adhærescens. Tertius sub secundo totus latitat, ipse quoq; liuidus, carnosusq;, & semicirculari initio, ab Ilium oſſe prodit, & processu, sicut alij duo iam dicti, imminuitur, desinitq; in tendinem, quo magno trochanteri annectitur, sed per illius summa interius, vbi is nonnihil inuertitur.
- 20 tres isti musculi femur extendunt, sursum attrahunt, & ad exteriora ducunt. Quartus, obliquo situ est: à tribus inferioribus sacri oſſis partibus, principio carnosò, & rotundo oritur: in tendinem etiam rotundum finit, quo in apicem maioris trochanteris versus posteriora desinit, femurq; ad se trahit, & in circumagendo illi opitulatur. Quintus, lumborum est, in abdomine situs, rotundus, carnosus, & validus, nonnihil obliquus, & totus liuidus: incipit ab vndecima, & duodecima thoracis vertebra: à tribus autem superioribus lumborum, quà vertebrae ipsæ sunt, descendit supra os pubis, & in tendinem rotundum cessat, qui in minore trochanterem inferitur. Sextus cauam oſis Ilium partem interiore occupat vniuersam, & à tota ipsius appendice oritur: principio semicirculari in abdomine situs, descendit supra os pubis: totus carnosus est, atq; talis ad extremum eius ferè progreditur, vbi in tendinem degenerat, qui minori trochanteri inferitur.
- 35 hic quintus & sextus femur flectunt. Septimus ab oſſe pubis iuxta ipsius cartilaginem lata origine, situq; obliquo exoritur: in femur autem interius, sub minore trochantere, exiguò tendine desinit. vsus eius est, vt femur hoc versus alterum trahat, & femur femori superimponat, si rectè consideres: non autem flectendi causa, quemadmodum ab alijs falso putatur. Octauus musculus, qui alijs quintus est, omnium in humano corpore maximus existit, tam varijs fibris refertus, vt tres quatuorq; musculi possint

Femoris motus.

Musculi femur mouentes decem sunt.

Primus musculus femur mouens, nates constituit.

Secundus femoris musculus.

Tertius femoris musculus.

Quartus femoris musculus.

Quintus femoris musculus.

Sextus femoris musculus.

Septimus femoris musculus.

Octauus femoris musculus omnium maximus.

repræsentari. ab interiore ossis pubis sede incipit, & à coxendice minorem trochanterẽ complectitur: deorsumq̃ tendit, femori adhærescens oblonga illa sua aspera q̃ linea: posteriore parte carnosus. nouissimè in tendinem degenerat, qui interiori femoris capiti inferitur. id officij musculus iste habet, vt femur erigat, quod parui faciendum non est. nos enim in hoc à brutis differimus, quòd erecti incedere possimus: illa verò in terram prona ingrediantur. huc accedit, quòd ille septimo auxilium suppeditet, vt femur femori, cùm volumus, superimponamus. Nonus totum illud foramen occupat, quod in osse pubis, et coxendice exteriori in parte situm est, initium eius latum carnosumq̃ existit: extrorsum versus incedit, manetq̃ transuersus, & semper attenuatur processu, adeò vt tandem in validum tendinem desinat, qui in sinum quandam in maiori trochantere situm, finit. Decimus & vltimus femoris musculus, interiore ex parte incipit, foramenq̃ iam dictũ ipse quoq̃ obtinet, dignus qui non negligatur: valdè carnosus latusq̃ (vt de nono dixi) oritur, ferturq̃ ab interioribus ad exteriora supra coxendicem, vbi sinus ad trochleæ imaginem efformatus habetur. idem musculus, cùm ingressum flectere oportet, rtes sepe tendines efficit, interdũ quatuor, & quinque: qui postremo vniuntur, vnumq̃ tendinem duntaxat efficiunt, qui in posteriore maioris trochanteris parte terminatur. Vbi in primum tendinem degenerare, illiusq̃ essentiam referre videtur, natura carnosum sacculum construxit, cui tendinem hunc imponat, ne ab ossis, quod ipse amplectitur, duritie offendatur. MATHE T. Nunc tibiæ musculos persequere.

TIBIAM mouentes musculi.

Tibiæ motus à decem sunt musculis.

Primus tibiæ musculus.

Secundus tibiæ musculus.

GERON, Cùm illa flectatur, extendaturq̃ secundum rectitudinem, moueaturq̃ oblique versus exteriora (quanquam obsecurius, vt quidam hunc motum negent) multos etiam musculos ipsam habere oportet, qui numero decem existunt: ex quibus quinque flectunt, quatuor extendunt, vnus verò duntaxat sub poplite latitans, in obliquum mouet. Primus & neruosus, & carnosus, ab inferiore llium ossis appendice exoritur. idem carnosus oblique per femoris interiora procedit: vbi autem ad interiorius femoris caput peruenit, in neruosum tendinem latioremq̃, non autem verè rotundum (vt alij volunt) degenerat: in priorem tibiā finit. Galenus illum tibiā supra tibiā deferre docet in homine, sed id falsum esse deprehenditur: quanquā in simia verum esse possit. Secundus musculus, à priore regione ossis pubis enascitur prope cartilaginem, initiumq̃ illius latum est, iuxta longitudinem commissuræ ossis pubis: carnosus descendit, rectis fibris: fit rotundus apud interiorius femoris caput, & in nerueum tendi-

- tendinem definit, qui penè est teres: deinde verò dilatatur, & terminus eius est in anteriore tibiæ parte, quam *ἀντικνήμιον* Galenus vocauit, iuxta musculum quem primo loco retulimus. *Tertius tibiæ musculus.*
- 5 Tertius ab infima coxarum appendice, nerueo principio, longo, & rotundo oritur: deinde iuxta mediū femur carnosus euadit, fibrisque varijs per femur posterius defertur. vbi verò ad genu peruenerit, in neruosum tendinem degenerat, cuius interuentu posteriori interioriq; tibiæ inseritur. Quartus ab eadem sede, prope tertium editur: origo autem eius tum carnea, tum neruosa est, deorsumq; rotundus propemodum existit: incedit per femur posterius, rectis fibris præditus: prope genu in neruosum tendinem degenerat, qui priusquam finiatur, dilatescit, ac tandem in priorem tibiæ partem, inter primum & secundum terminatur. *Quintus tibiæ musculus.*
- 10 Quinti musculi origo est ex appendice coxendicis, prope tertij quartiq; exortum, eaq; primum acuta est, deinde crassescit, & per posterius exterioriq; femur progreditur. vbi verò medium illius attigerit, notabilem molem carnis in medio femoris nascentem, sibi asciscit: quam quis musculum ferè dicere posset, sed reuera non est, si rectè inspiramus, à quinto hoc distinctus. si tamen carneam istam
- 20 quinti musculi partem, pro nouo recensere voles, quem alij non obseruarint, parum refert. ibidem extrinsecus in tendinem degenerare incipit, qui cum prædicta carne simul ad finem vsq; descendit, sic vt in capite suræ terminetur. Porro carnis illa portio musculo huic est affixa, vt illum validiorem efficiat, medioq; à femore exilijs, vt propinquior illi esset. vnicus enim hic musculus solum in exteriori parte existit, cum quatuor sint interiores. *Quinq; priorum musculorum vsus.*
- 25 Quinq; horum musculorum est, vt illum flectant. Galenus quartum numero esse dicit, quem cursori cuidam adimendum præceperat: quamuis postea nihilominus currere potuerit. hoc enim musculo è crure sublato, flexus rectus nullo pacto fieri potest: licet Galenus in cursu, rectum fieri docuerit, tamen res ipsa aliter ostendit. *Quintus tibiæ musculus pro quarto à Galeno numeratur.*
- 30 musculo è crure sublato, flexus rectus nullo pacto fieri potest: licet Galenus in cursu, rectum fieri docuerit, tamen res ipsa aliter ostendit. MATHESES, Cum iam flexionis musculos absolueris, ad eos qui tibiam extendunt, iam accedas. GERON, Sextus ex media illius ossis appendice oritur: principio neruoso, carnosusq; aliàs brevis est, & crassiusculus, maioriq; trochanteri coniungitur. *Sextus musculus tibiam extendens.*
- 35 ibidem caro eius definit, tendo autem latus, membranofus, neruosusq; sequitur, quo nullus in toto corpore maior existit, vt qui omnes ferè musculos, qui circum femur siti sunt, amplectatur: rectis fibris præditus. Cura in hoc chyrurgis adhibenda est, ne ipsum tranuersum incidant. patellam enim genu amplectitur, & tandem in priorem tibiæ suræq; partem inseritur. *Tendo sexti tibiæ musculi omnium maximus.*
- 40 Septimus tibiæ musculus ex magno trochantere initio neruoso prodit, to-

*Octauus tibiae
musculus.*

*Nonus tibiae
musculus.*

*Decimus tibiae
musculus.*

*MVSCVLI
extremo pedi in-
seruientes.*

*Primus pedis ex-
tremi pedis mus-
culus.*

*Secundus pedis
musculus.*

*Musculi surae
construentes.*

*Tertius pedis mu-
sculus.*

*Tendo longissi-
mus humani cor-
poris.*

tumq; illum circumdat, superius exteriusq; femori adhærescens: crassus admodum, totusq; liuidus, ad patellam vsq; carnosus, rectisq; fibris progreditur: deinde in latum & membranosum tendinem, qui illam comprehendit, terminatur. Octauus neruosus, è ceruice femoris, & ex magno trochantere, quasi duplici origine emergit, statim autem carnosus euadit, femoriq; adhærescit: procedit autem ipse in priorem anterioremq; partem, carnosus ad patellam vsq;, varijs fibris intertextus: deniq; in tendinem desinit, qui genu & ipse complectitur. Nonus à priore ossis Ilium parte, supra coxarum articulum ortum habet. primum acutus neruosusq; egreditur: deinde carnosus & teres euadit: rectus ipse incedit supra priorem femoris sedem, inter septimum & octauum musculum: priusquam autem ad genu perueniat, tendinem gignit neruosum validumq;, qui ex angusto fit latior, & cum septimi octauiq; tendinibus adunitur. atq; sic iuncti, simul patellam amplexantur, & priorem in tibia finibus suis inseruntur. Quatuor isti musculi iam dicti, tibia rectâ extendunt, sicut alij quinque rectâ quoq; flectunt. non est, quod in his Galeni sententiam imiteris. Decimus sub poplite latitat, origine neruosa, rotundaq; ab exteriorè femoris capite egreditur: extrinsecus, sub ligamento fertur: mox in carnosam naturam degenerat, situ obliquo, fibrisq; dissimilibus, & carnosus in posteriorem anterioremq; tibia in sinuatur. is musculus tibia oblique versus exteriora mouet, licet alij negent. MATHESES, Qui reliqui in tibia musculi siti sunt? GERON, Qui extremo pedi inseruiunt. cum enim ille flectatur, extendatur, moueaturq; ad latera, musculorum suorum subsidio, qui in priores posterioresq; diuiduntur, numero sunt duodecim, vel ad summum tredecim. Primus ab interiore femoris capite, supra genu retrò emergit, initio carnosus & angustus: verum in processu dilatatur, & circa mediam ferè tibia in tendinem latum ac neruosum desinit, qui postea semper angustus euadit, & in posteriorem superioremq; calcem cessat. Secundus priori similis est. nam etsi ab exteriorè femoris capite prodeat, in reliquis tamen eadem quæ prior, efficit, adeò vt vnus duntaxat musculus duobus principijs præditus esse videatur. corpus enim vnum est, tendoq; vnus. hi, inquam, duo musculi, quos non immeritò in vnum cogere possumus, suram construunt. Tertius etiam ab exteriorè femoris capite, prope articulū exoritur: initio suo acutus: deinde extuberantior breuiusq; est, & in oblongum tendinem, atq; neruosum finit, quo inter rotundos, longior in corpore non tærat. idem sub duobus antea dictis latitat, situ obliquo, talibusq; moris præditus: ab exteriorè parte versus interiorem pro-

- rem progreditur, tendini superius dictorum musculorum adhærens, tandem interiori calci insinuat. hunc vsus præstat, vt pedem introrsum euertat. in simijs latum tendinem producit Galeno, in nobis verò in calcem cessat. Quartus maior est, & liuidus
- 5 sub appendice suræ: posteriore parte nascitur, principio neruoso, & valido; deinde carnosus euadit, & suræ tibieq; inhæret: latitudine ossa excedit. vbi verò mediam tibiam attigerit, in angustum tendit, & calcem versus, in tendinem desinit, quo nullus omnino valentior in corpore humano inuenitur: cum priore tendine vn-
- 10 tur, & in posteriore calce terminatur. officium primi, secundi, & quarti est, vt pedem extendant, in terramq; figant: ad quod tamen quatuor alij musculi sunt auxiliarij. Quintus à tibia & sura originem ducit, eiq; ligamento adhærescit, quod tibiam & suram interi-
 15 acet, prioresq; musculos à posterioribus seiungit: carnosus ad extremam ferè tibiam existit, & prope anteriorem talum, in robustum, neruosum, & rotundum tendinem finit: progreditur sub interiore talo, & ossi nauiculari dicto: deniq; sub planta pedis euanes-
 20 cit. si vsus huius musculi quæras, pedes versus interiora trahit, ligamenti particeps. Sextus à posteriore tibia, longo initio & carnosus emergit, quamuis postea in rotundum tendinem degeneret: incedit sub interiore talo, & sub calce ligamentum habet, à tibie appendice exortum. tendo ille sub planta, in quatuor alios rotundos perforatos diuiditur, qui processu in tertium qua-
 25 tuor digitorum articulum, pollice excepto, inferuntur. tendines isti quatuor digitos flectunt, eosdemq; validè astringunt. Septimus musculus longus, carnosusq; à sura, sub appendice ad triū digitorum spatium emergit: carnosus autem existit, donec ad calcem perueniat, vbi in rotundum tendinem transit, qui sub ligamento, talo, & planta præterit, & in os pollicis, quod flectit, mit-
 30 titur. atq; hi sunt posteriores musculi extremi pedis: de prioribus nunc agamus. Horum primus à tibia, hoc est, ab appendice iuxta suram egreditur, ipsiq; validè adhærescit satis crassus, & priorum horum maximus. vbi mediam tibie longitudinem prætergressus est, angustus redditur, & in tendinem rotundum, neruo-
 35 sum, validumq; desinit. ingreditur autem per superiorem pedis regionem, quæ τὰ πρῶτα græcè dicitur, retineturq; à ligamento, quod ab inferiore tibie, suræq; appendice, ortum habet. hic tendo adeò attollitur, vt sub cute euidenter appareat, ac in osse imo plantæ pollicis præposito terminatur. musculi huius vsus est, vt extre-
 40 mum pedem flectat. Secundus à tibie appendice prodit, & ligamento adhæret, quod tibiam suramq; interiacet: deinde carnosus quidem huius musculi radix, suræ ipsi ad sinem prope modum ad-

Quartus tibie
musculus pedi
inferuens.

Tendo quarti mu-
sculi in tibia omo-
nium robustissi-
mus.

Musculi pedem
extendentes.

Quintus muscu-
lus tibie pedi in-
feruens.

Sextus tibie mu-
sculus pedi extre-
mo inferuens.

Pedis tendines
perforati.

Tendines quatuor
digitos flecten-
tes.

Septimus tibie
musculus pedi
inferuens.

Primus muscu-
lus prioris pedis.

Tendo in pede
sub cute appa-
rens.

Secundus prioris
pedis musculus.

Tendines superiores quatuor digitorum pedis.

Tertius prioris pedis musculus.

Quartus prioris pedis musculus.

Quintus prioris pedis musculus.

Quo pacto pes huius affigatur.

MVSCVLI in extremo pede siti, pedis digitis deseruientes.

Primus musculus pedis digitis inseruiens.

Quatuor perforati tendines, eorum usus.

iacet: verum in quatuor rotundos tendines cessat, qui sub eo ligamento detinentur, quod à tibiæ & fibulæ appendice exoritur, quatuor hi tendines, postremò in superiorem omnium digitorum partem inferuntur, pollice excepto, eo nimirum usu, ut digitos illos extendant. Tertius à media sura carnosus, prope ligamentum erumpit: deinde in tendinem rotundum degenerat, qui sub transverso etiam ligamento defertur, & in ultimum pollicis articulum, quem etiam extendit, insinuat. is tendo in duos alios diuiditur, quorum alter finem habet, alter autem in os plantæ inseritur, & flectendo pedi auxiliatur. secundus tendo in musculo quoque oritur: atque hæc portio in quibusdam, licet raro, alius musculus esse videtur. si quis hunc musculum duplicem esse velit, tunc duodecim illis, decimus tertius addetur, ut scilicet tredecim sint, qui extremo pedi inseruiant. Quartus prioris pedis musculus, à superiore suræ appendice, extrorsum versus gignitur. si verò quis accuratius rem perpenderit, neque posterioribus, neque prioribus annumerandus esse videtur. initio carnosus, nervosusque constat, quanquam in processu etiam deinde carnosus fiat: tandem autem in rotundum tendinem definit, & suis finibus, ossibus plantæ inseritur, transversusque constat ligamento. porro munus huius musculi est, ut pedem ad exteriora euertat. Quintus similiter à sura exorditur initio oblongo, extrinsecus carnosus, sicut & quartus: inceditque sub exteriori talo, ubi simul cum quarto in tendinem rotundum terminatur, qui plantæ ossi immittitur, quod minimo digito præpositum est. iste musculus extrorsum trahit. Quod si omnes hæcenus enumerati musculi, unà in actione concurrant, tunc pes ab hisce vniuersis humi affigetur.

At in extremo pede siti musculi, decem & octo numerantur, qui omnes digitis inseruiunt, quamuis ex quatuor supra descriptis, alij ipsos flectant, alij extendant: atque sic musculi pedis digitos mouentes, in totum viginti duo erunt. Primus ex octodecim istis, sub media planta subsistit, ab inferiore calcis parte, hoc est appendice, natus. incumbit huic tendo latus, qui Galeno à tertio musculo oritur. nobis cum Realdo inter posteriores tibiæ tertius, Galeno quarto numeratur. Initium idem habet nervosum, carnosumque, & sub plantæ osse diuiditur, tandemque in quatuor tendines rotundos ac perforatos degenerat, qui secundo quatuor digitorum articulo, mirabili artificio inferuntur. usus illius est, ut secundum articulum illorum quatuor digitorum flectat. tendo qui huic musculo inheret latus est, sensusque acerrimo præditus: idque hæc causa, ut externas iniurias celerrime sentiat. Secundus quoque à calce prodit, & iuxta primum interiore ipsius parte

parte propemodum rotundus, ossi plantæ quod pollicis præpositum est, alligatur, tendinem producit, quo pollicis inferitur, ideo generatus, ut illum ab alijs digitis abducatur. Tertius similiter ab eadem calce, prope primum immergit, tenditq; versus exterior rem partem, & plantæ ossi, minimo digito præposito, affigitur, vbi processus illius apparet: deinde in tendinem degenerans, tandem in eundem minimum digitum terminatur, illumq; à reliquis abducit. Post hos alij quatuor sequuntur, qui sub pedis planta, eiusq; ossibus occurrunt, à tendinibus muscoli perforantis, qui in tertium quatuor digitorum articulum desinit, exorientes. verum hi cum parui rotundiq; sint, carnis portionem à calce mutuo acceptam, sibi adiscunt. hunc autem vsum muscoli isti præstant, ut quatuor digitos ferè extendant, & magis quam alij tendines, ut à perito anatomico facile deprehendi potest. Galenus & alij quidam docent, hos, quatuor digitos à pollice abducere. His decem in plantæ ossibus succedunt, ut singuli digiti binos habeant, qui ab initio ossium plantæ proueniunt, finiuntq; in primo omnium quinque digitorum articulo: carnosi sunt: in hoc conditi, ut expeditius flectant, quod accidit, quando bini simul eodè tempore mouent: cum autem alter duntaxat, digitos obliquè introrsum & extrorsum trahunt. Decimus octauus extremo in pede situs, supra tarsum & plantam, à ligamento nascitur, quod tibiam & suram cum pede connectit: latus & tenuis, in quinque tendines, aliàs in quatuor desinit, omnibusq; digitis exteriore in parte inferitur, quos obliquè extendit. MATHESES, Inferiorum partium musculos, iam omnes videor ex te audiuisse, desidero adhuc eos, qui superiores moueant.

GERON, Cum igitur cubitus rectum duntaxat motum, nullum autem obliquum habeat (quicquid de hoc Galenus scripserit) duo flectentes muscoli, totidemq; extendentes inueniuntur. Primus validus sub cutè apparet, interiore humeri parte situs, ex scapulis duobus initijs interstinctis exoritur: quorum vnum neruosum ac rotundum, à supræma supercilij acetabuli in scapulis conspicui parte prouenit: incedit autem supra humeri caput, & per rimam in hac superiore sede positam, præterlabitur, quæ huius tendinis gratia formata est. alterum à processu ancyroïde gignitur. Est autem musculus ille partim neruosus, partim carnosus, quæ carnosus est, humero adhærescit, videturq; ijs, qui acrius vident, distinctus separatusq;: humero succurrit, versus pectus illum trahens. Postea duæ istæ prædicti muscoli origines sub humeri capite vniuntur, & musculum illum crassum efficiunt, prope rotundum, validum, rectis fibris intertextum, qui apud cubiti

Secundus pedis musculus pollicem ab alijs digitis deducens.

Tertius musculus pedis inferiorem.

Quatuor musculus pedis digitis inferiorem.

Decem musculus singulis digitis pedis bini inferiorem.

Postremus pedis musculus, eius usus.

MUSCULI cubito inferiorem.

Primus musculus cubitum flectens.

*Secundus cubi-
tum flectens mu-
sculus.*

*Tertius cubiti
musculus.*

*Quartus cubiti
musculus.*

articulum in tendinem neruofum definit, & paulò antè, quàm
finiat dilatatur, radioq; annectitur: vbi is interius tuberculum, vt
musculum hunc excipiat, efformatum obtinet. Secundus ab hu-
meri offe editur, carnosus totus, fibrisq; rectis præditus, sub prio-
re latitat, supraq; cubiti articulum carnosus fertur, & cubito ra-
dioq; infigitur. hi duo musculi cubitum rectè flectunt. Tertius à
scapulis paulùm sub illarũ ceruice prodit, ferturq; per humeri po-
steriora, & tendine superiùs lato constat, carnosusq; cum suo ten-
dine in cubiti processum tendit, quem Græci *ῥάχιον* vocant: at-
que hunc etiam præterit, rectis fibris donatus. Quartus duplici
origine ab humeri ceruice, cui firmiter adhæret, initium sumit, &
cum tertio adeò vnitur, vt vnus cum quarto esse videatur: quam-
uis verè duo existant. tandem quartus hic musculus, eo quo ter-
tius loco cessat, fibrisq; rectis constructus. ambo hi, tertius nem-
pe & quartus, hoc muneris habent, vt cubitum rectà flectant: at-
que de his satis. nunc tandem manus, quæ omnium instrumen-
torum structura est, summo naturæ artificio condita, musculos
aggrediar. quanquam autem digna esset, de qua longam oratio-
nem instituerem, tamen quia diutius quàm putarim, rei anato-
micæ inhæsi, qua potero breuitate abfoluam.

*MYSCVLI
manuum mouen-
tes.*

*Musculi extre-
mæ manus in-
terni octo, exter-
ni nouem sunt.*

*Primus muscu-
lus manus inte-
rior.*

*Secundus mu-
sculus interior
manus.*

Sunt itaque manus extremæ musculi, tum interiores, tum
exteriores: illi octo, hi nouem. ac primus quidem istorum excel-
lens, ab interioris tuberculi, quod est in humero, apice originem
sumit, initio acuto neruosoque: deinde carnosus efficitur, &
paruus. quamuis autem caput exiguum habeat, mediam eius
partem latam, & finem longum angustumq; vsque ad iunctu-
ram brachij, quâ cum manu iungitur: tamen veram musculi for-
mam repræsentat, inceditq; nonnihil obliquè manum versus. fer-
tur autem retrò magis, quàm per mediũ cubitum, ac in tendi-
nem rotundum, oblongumq; definit, qui interiori iuncturæ bra-
chij, & manus ligamento innititur. atq; hoc prætergressus, latus
efficitur: per volam expanditur, sic vt duos maiores montes dete-
ctos relinquat: tandem quatuor digitis inseritur. hunc musculus
iste vsum habet, vt digitorum flexioni opituletur, & acri sensu
polleat: idq; ea de causâ, vt si quid manui, dum eam constringi-
mus, occurrat, quod eam offendat, statim reijciamus. Nonnulli,
præcipuè fures hoc musculo carent, si Realdo credimus, licet ten-
dinem habeant, qui ab interiore iuncturæ brachij cum manu li-
gamento exoritur. Secundus musculus ab interiore humeri tu-
berculo procedit, initio acuto, neruoso, carnosusq; cubito adhæ-
ret, & per eius longitudinem, vsq; ad iuncturæ brachij & manus
radicem progreditur: puluinaris instar cubito adhibitus: vbi ad
iunctu-

- iuncturam brachij manusq̃ peruenierit, in tendinem degenerat, & quarto iuncturæ brachij & manus osi inferitur, carnosio neruoſoq̃ tendine. Tertius ab eodem loco ducit originem, inceditq̃ obliquè iuxta radij longitudinem : quando verò ad iuncturam
- 5 brachij & manus acceſſerit, in rotundum validumq̃ tendinem ceſſat, qui in os illud metacarpij, quod indicem fulcit, mittitur. musculi huius vſus duplex exiſtit : vnus, quando ipſe cum altero functionem obit, extremam manum ambo ſimul ſeſtunt : alter cum ſolus agit, in obliquum illum mouet, nunc ſurſum, nunc de-
- 10 orſum, ſic tamen, vt duobus muſculis in exteriore parte ſitis, opẽ ferat. Quartus muſculus ortum admiratione dignum obtinet, vt qui neruoſus acutusq̃ ab interiori humeri tuberculo naſcatur, ſi atq̃ poſtea carnoſus : & per cubiti radijq̃ longitudinem procedat : vbi mediam illius partem præterierit, in anguſtum tendat, &
- 15 in quatuor, rotundos, neruoſos, ac perforatos tendines deſinat, qui ſub iunctura brachij, & manus ligamento (tres autem primi muſculi non) deferantur. ijdem tendines in ſecundo, quatuor digitorum articulo, quos ſeſtunt, terminantur. Natura hos egre-
- 20 ſculos tendines, ad tertium quatuor digitorum articulum penetrare poſſint. Quintus muſculus quarto longè valentior eſt, eò quod maior etiam motus, & vtilior illi commiſſus ſit. quatuor enim digitos, non quinq̃, vt Galenus ſenſit, ſeſtit, nec non fortiter conſtringit. oritur iuxta quartum, ſub quo etiam latitat, magis
- 25 autem à ſuperiore interioreq̃ cubito : in proceſſu ſenſim arcatur, & cubito adhæreſcit, antequàm ad iuncturam brachij & manus perueniat. Poſtremò in quatuor rotundos neruoſosq̃ tendines, & perforantes deſinit : qui deniq̃ in tertium quatuor digitorum articulum, pollice excepto, inferuntur : quamuis Galenus vnum
- 30 ex huiusce muſculi tendinibus, ad pollicem pertinere dixerit, quod in ſinijs, non autem in hominibus reiſa deprehenditur. hominis enim pollex à proprio muſculo ſeſtitur. Quintus iſte muſculus ligamento adhæreſcit, quod muſculos priores à poſterioribus, ſicut in tibia, diſtinguit. Sextus è radio naſcitur, illiq̃ ad-
- 35 hæret ligamento, quod interiores ab exterioribus ſeiungit, inceditq̃ per radij longitudinem, ac prope iuncturam brachij & manus, in tendinem rotundum, & neruoſum finit, qui ſub iuncturæ brachij & manus ligamento, ſimul cum quarti & quinti muſculi tendinibus procedit. nouiſſimè in vltimum pollicis articu-
- 40 lum, quem ſeſtit, inferitur. Septimus ab interiori humeri tuberculo carnoſus incipit, & obliquus à ſuperiore interioreq̃ cubito incedit, in mediâq̃ radij longitudine terminatur, partim carno-

Tertius muſculus interior manus.

Quartus manus interior muſculus.

Tendines manus perforati.

Quintus interior manus muſculus.

Quatuor manus tendines perforantes.

Sextus interior manus muſculus.

Septimus manus interior muſculus.

*Octauus interior
manus musculus*

*Musculi manus
externi.*

*Primus manus
externus muscu-
lus.*

*Causa doloris in
solutione conti-
nui inter carnem
& unguem.*

*Secundus manus
exterior muscu-
lus.*

*Tertius manus
externus muscu-
lus.*

*Quartus manus
externus muscu-
lus.*

*Quintus manus
exterior muscu-
lus.*

sus, partim nervosus, & fibris obliquis præditus. Octauus qua-
dratus est iuxta brachij & manus iuncturam situs, à cubito carno-
sus oritur, talisq; in radium desinit: fibris transversis, situq; simili
est donatus. hoc septimus & octauus habent officij, vt radium in
prorum agant. Atq; hæc de interioribus summæ manus muscu-
lis hæcenus: nunc exteriores accipe.

Primus eorum occurrit carnosus, nervosusq; & ab exteriori
humeri tuberculo prodit: deinde carnosus euadit, & crassescit, in-
ceditq; inter cubitum & radium, ad brachij & manus iuncturam
vsq;: nunc in quatuor, nunc in tres tendines, rotundos, & nervo-
sos desinens, qui per sinum in radij appendice transeunt: ab vno
autem ligamentorum, quæ ab appendice iam dicta oriuntur, al-
ligantur. iidem in processu dilatantur, & à primo ad tertium qua-
tuor digitorum articulum vsq; finiuntur, hoc est, in indice, me-
dio, annulari, atq; minimo siue auriculari. Quando autem tribus
tantum tendinibus donatus est, auricularem siue minimum, ten-
dinum expertem relinquit. sæpius autem musculus hic quatuor
tendinibus, quàm tribus instructus est, qui ad extremos digitos
sub vnguibus perducuntur: licet eorum radicibus non inseran-
tur. atq; hanc ob causam magnus dolor excitatur, si quid carnem
& ungues intercedat, ille verò non inter carnem & ungues, sed
inter tendines & carnem excruciare solet, sicut etiam ab alijs ten-
dinibus extendentibus accidit, quod pauci hæcenus animadu-
terunt. vsus illius musculi est, vt quatuor digitos extendat. Se-
cundus ab eodem tuberculo iuxta primum, initio acuto nervo-
soq; generatur, ferturq; inter primum & cubitum, secundum
eius latitudinem, versusq; iuncturam brachij & manus tendit.
deniq; in tendinem rotundum nervosumq;, qui interdum bifidus
est, terminatur: incedens autem supra brachij & manus iun-
cturam, inter radium & cubitum, minimo digito vsq; ad eius ex-
tremum inseritur. huius musculi admodum rotundi, vsus est, ut
minimum digitum, à reliquis abducat, & ad palmam gignendam
nō mediocriter iuuet. Tertius è medio quasi cubito prodit, vbi ei
linea oblonga & aspera, tribus musculis gignendis accommodata
inest. situm habet obliquum, & in tendinem rotundum, qui indi-
cem oblique extendat, terminatur. idem tendo ligamentum à ra-
dicis appendice sortitur: atq; in nōnullis bifidus est. Quartus eti-
am obliquus, in cubito prope tertium, initio carnosus egreditur,
supraq; radij appendicem incedit, desinitq; in tendinem rotundū
& nervosum, quo in tertium pollicis articulum, quem extendit
insinuatur, atq; alijs multum abducat, quod peculiare ipsius est
officium. Quintus ab eadem cubiti linea prope quartum, initio
longo

- longo carnosoque exoritur, progrediturque versus pollicem: obliquus, & in diuersos tendines definit. Posset hic ex varijs inscriptionibus, in tres, vel quatuor musculos diuidi, sed vnus tantum est, qui supra bicornem dictum incedit. in quatuor autem tendines, interdum in quinque dehiscit: quorum vnus ad tertium pollicis articulum, alius ad secundum, alius ad primum, quartus ad os iuncturæ brachij & manus procedit, quo pollex sustentatur. præter iam dictos tendines, nonnunquam alij duo hoc loco inveniuntur. hoc muneris quintus hic musculus habet, vt pollicem extendat. Sextus ab exterioris humeri tuberculi radice ortum ducit, & cubito quem tum amplexatur, tum per eius longitudinem perreptat, connectitur. vbi verò ad brachij & manus iuncturam peruenit, in tendinem rotundum, neruofum, & valentem degenerat, qui supra cubiti appendicem, in sinum quendam iuxta eiusdem processum, qui *φυλακιδης* græcè dicitur, desertur, & ab hoc ligamentum suum transuersum suscipit, in os illud palmæ, quod minimum digitum sustinet, non longè à iunctura brachij & manus terminatur. Septimus quem bicornem appellant, carnosus, longa linea, ab inferiore humero super articulum gignitur, supraque radicem ingreditur: vbi ad medium eius peruenerit, in tendinem validum, & carnosum, & bifidum finit, qui ideo bicornis appellatur. is postquam supra iuncturam brachij & manus perrexerit, ossibus palmæ inseritur, à quibus index, & medius susculiuntur. Duo proximi musculi extremam manū exporrigunt, hoc est, iuncturam brachij & manus tunc extendunt, cum vterque operatur. at cum septimus vnà cum secundo interiore agit, alijs duobus cessantibus, manum oblique deorsum ferunt: cum sextus simul cum tertio interiore mouet, tunc manus sursum oblique attollitur: atque hic primarius eius vsus est: secundarius autem, quo extrema manus, vel iunctura brachij & manus circumferitur: qui motus tunc editur, quando musculi ita conueniunt, vt statim vnus alterum in agendo subsequatur: quem vsus priores anatomici ignorarunt. Octauus musculus longissimus dictus, ab humero, origine carnosâ supra exterius tuberculum emergit, supraque radium oblique incedit, & tendine membranoso in radij appendicem inseritur. Nonus è ligamento, & superiori cubiti parte, quam *ἀλέκρογον* dicunt, obliquus progreditur, totus carnosus, tandemque in medium radium insinuat. hi duo musculi manum reddunt supinam, radiumque exterius mouent.
- Quod si extremæ manus musculorum numerum postules, vnum & viginti numero esse scias, nec plures vnquam: licet pauciores aliquando sint, nempe nouendecim, horum septem pollici

*Sextus manus
exterior muscu-
lus.*

*Septimus manus
exterior muscu-
lus.*

*Tendo bifida &
bicornis dictus.*

Motus manus.

*Octauus manus
exterior muscu-
lus longissimus
appellatus.*

*Musculi extre-
mæ manus.*

*Primus extre-
mæ manus musculus*

inseruiunt, si maiorem numerum retinere velis: si minorem, quinque: quatuor minimo digito, reliquis autem singulis, tres auxili-
antur, & vnus lato tendini. Cæterum primus musculus paruus
est, & transuersus, supraq; Veneris montem situs: à membrana
neruosa enascitur, fibris carnosis refertus, & in latum tendinem
dilatandi ipsum gratia, inseritur. de hoc nihil à veteribus prodi-
tum est. Iam alij quatuor extremitatis manus musculi sequuntur, lon-
giusculi, graciles, & rotundi, à tendinibus quinti musculi interio-
ris, qui tertium quatuor digitorum articulum flectit, egredientes.

*Quatuor extre-
mæ manus mu-
sculi.*

*Digitorum ten-
dinibus incis-
is, illi ad-
huc extenduntur.*

ijdem in vola siti sunt, prope primum quatuor digitorum articu-
lum: in tendinem autem rotundum, & neruosum desinunt, per
interiores digitos, secundum eorum latitudinem incedentes: pri-
mi musculi exterioris tendinibus adhærescunt, à quibus quatuor
digiti extenduntur, & in tertium articulum finibus suis, non au-
tem in primum immittuntur, sicut Galenus & alij arbitrati sunt.

*Sextus extre-
mæ manus musculus*

Quatuor verò hi musculi interioribus latitant, ideo quòd magis ex-
positi sint iniurijs, vnde sæpe accidit, vt exterioribus digitorum
tendinibus incis, digiti adhuc extendantur, in quo casu chirurgi
quidam, rei anatomicæ imperiti, horumq; quatuor musculorum
vñs ignari, gloriari solent, si curatio illius vulneris succederit.

*Septimus extre-
mæ manus mu-
sculus.*

Sextus à ligamento iuncturæ brachij manus, & à quarto eiusdem
osse exoritur, Venerisq; montem, vt vocant chiromantici, consti-
tuit: per inferiorem palmæ regionem incedit: propemodum ro-
tundus, finitq; in tendinem, qui in primum digiti auricularis os
inseritur. vsus eius est, vt hunc digitum ab alijs abducatur.

*Octauus extre-
mæ manus mu-
sculus.*

Septimus ex iunctura brachij & manus procedit, superiore parte situs:
carnosus totus, & in secundum pollicis os terminatur. Octauus
prope septimum egreditur carnosus: etiam ipse volam versus si-
tus, tendine admodum exiguo, in secundum os pollicis immitti-

*Nonus extre-
mæ manus musculus*

tur. Nonus sub septimo, ab eodem iuncturæ brachij & manus li-
gamento emergit, totusq; carnosus est, & in primum articulum
pollicis desinit. hi tres musculi eam pollicis partem constituunt,

*Musculi Martis
montem consti-
tuentes.*

quam chiromantici montem Martis appellant, & illum versus
iporum originem trahunt. His succedunt tres alij, ab osibus pal-
mæ, siue metacarpj, quæ in digitis, indicem, medium, & annu-
larem suffulciunt, prodeuntes: situ obliquo, vel transuerso potius,

*Musculi polli-
cem flectentes.*

sub linea vitali dicta, præditi, principiumq; habentes semicircu-
lare, in secundum pollicis articulum cessant. siue autem musculos
iam dictos vnū duntaxat existere, quòd lato sit principio, sine acu-
to, & fibris varijs intertextus, siue tres esse dixeris, parum refert.
vsus eorum, vt primum, vel vnus est, vt pollicem versus volam fle-
ctant, reliquorum trium, quos antea recitavi, officium est, vt eun-
dem ex-

dem extendant, & procul ab alijs efferant. Septimus pollicis musculus ab osse palmæ, cui index digitus innititur, progreditur, spatiumq; illud occupat, quod inter pollicem & indicem existit. situm transuersum obtinet, & in os pollicis inferitur. hoc officij musculus iste habet, vt pollicem versus indicem trahat, eiq; superponat. Adhæc alij octo musculi, præter iam dictos, inueniuntur, qui a palmæ ossibus exorti, illisq; adhærentes, in primos quatuor digitorum articulos tandem insinuantur: duo ex his vniciq; digito præter pollicem, cui nullus horum octo immittitur, dedicati sunt. cum vsum exhibent, vt cum ex his duo simul mouent, primum articulum, cui inferuntur, rectè flectant: cum autem vnus solum agit, motum obliquum flectendo efficiant. Atq; hæc de neruis & musculis satis esse tibi opinor: nunc quod de venis & arterijs restat, accipe. cum enim nuper de iecore & corde tractarem, etiam venæ cauæ, & arteriæ magnæ mentionem feci, integram autem propagationem earum in hunc locum distuli. atque hoc modo ipsa distribuitur.

Vbi ex iecore sursum prodit, primum ad septum transuersum accedit, ipsumq; perforat, & in duos ramos scinditur: hi deinde in furculos diuisi, per ipsum septum distribuuntur: postea sobolem dextræ cordis auriculæ impartit, quæ dextri illius ventriculi os, extrinsecus vndiq; complectitur: non autem intrò fertur, sed corone instar illud ambit, vnde (vt antea dictum est) Grecis *καρδιαία*, Latinis coronalis vocatur. Truncus cauæ venæ, vbi cor exceßerit, sobolem quandam solitariam sine coniuge, dextro in latere parit, quæ ad extremum vsq; thoracem descendit, dextris leuisq; costarum spatijs, propagines communicans, alimentum partibus illius suppeditandi gratia. Quamuis autem truncus illius solitariæ in dextro latere consistat, tamen ramulos ad sinistram quoq; regionem alendam, distribuit. eadem solitaria dum reflectitur, edit ramum, qui sursum ascendens, alios furculos superioribus primarum costarum interuallis sustentandis transmittit, eosq; non solum dextris, sed etiam sinistris, præter paucos admodum, quibus soboles ab alari ortu adest, modò ad duo, modò ad tria costarum spatia, modò ad vnum duntaxat deferitur. Ex his interuallorum venis, aliæ propagines ipsarum, iuxta neruorum foramen oriuntur, quæ vertebrae & spinæ medullam nutriunt. ab his, priusquam ad illam alimenti gratia accedant, dorsi musculis, & cuti inferuntur. *MATHETES*. Quò tendit caua vena, vbi solitaria ediderit? *GERON*, Rectà ad asperam arteriam, versus iugulum: atq; ibi insignes duos ramos super alis spargit, qui medicis venæ alares dicuntur, cauam thoracis sedem, inter iugu-

Septimus pollicis musculus, eius officium.

Octo alij musculi manus digitis inferuientes

Musculi manus digitos, & rectè & obliquè flectentes.

VENÆ CAUÆ propagatio quomodo se habeat in superioribus partibus corporis.

Vena coronalis cordis.

Venæ sine coniuge exortus.

Venæ ad sinistram latem alendum, & vena sine pari demissa.

Venæ vertebrae & spinæ medullam nutriendæ.

Venæ alares, seu axillares.

*Vena humeraria,
sive cephalica.*

lum, & primam costam prætereuntes. deinde humerariam, quam Græci κεφαλαιώ, Latini capitalem vocant, emittit: quamvis summum humerum non ascendat, sed versus interiorē magis regionem deferatur, & inter primum secundumq; humeri musculum incedens, extrorsum tendat, adeo ut in superficie appareat. 5
nam inter membranā carnosā, & cutim vergit, ad cubitum, extrorsum prope primum musculum, qui illum flectit, erumpens. in flexura verò cubiti, in duos ramos scinditur: quorum vnus in-

*Vena humeraria
ibi cum iecoraria
sive basilica vni-
atur.*

teriorē cubiti partem accedit, & à flexura ipsius digressus, cum alio simili iecorarię, quę basilica Arabibus vocatur, ramo aduni- 10
tur: ex quibus duabus coniunctis, vena communis efficitur. Alter verò multos surculos exteriori cubito superius, & exterius disseminat, sic tamē, ut principalis ramus iuncturam brachij & manus communem (barbari brachiale vocant) conscendat superetq; & minimum digitum annularemq; intercedat, & hoc loco diuisus, 15
ad summum vtrunq; digitum feratur. Hęc, inquam, vena Ara-

*Vena saluatella
Arabibus dicta.*

bibus, & vulgaribus medicis saluatella nuncupatur, quasi salutem adferat licnosis, si ex ea in sinistra manu sanguis detrahatur, donec sua sponte ipse fluere desinat. Vbi iam vena ista alaris ex caua thoracis regione egressa fuerit, sub iugulo altius immergitur, 20
multosq; ibi surculos producit, qui primum brachij musculum, scapularumq; & thoracis secundum, adhęc quartum, & septimum humeri, scapulasq; ipsas ad abdomen vsq; alunt: in fœminis, alię propagines ad mammas nutriendas, mittuntur. deinde ea ipsa alaris ad humerum profecta, sub primo musculo cubitum flectente, in tres soboles, easq; insignes diuiditur: quarum vna ieco- 25
raria, gręcè ημελική, vulgò basilica, Hippocrati interior cubiti nominatur. Porro alaris, quę profundius descendere dicta est, paulatim rursus in exteriorē cutem emergit, summumq; humerum

*Vena iecoraria,
basilica dicta
vulgo, interior ab
Hipp. appellatur.*

accedit iuxta cubiti flexum, in duos ramos, humerarię modo scin- 30
ditur: quorum vnus in cubito interiore cum humerario coniungitur, ac vena communis inde efficitur, hoc est, vtriusq; particeps.

*Vena communis
dicta exortus.*

rami illius exteriores, medianę barbaris dicuntur, quos vulgus medicorum semper propemodum incidi præcipit. hic quoq; no-

Vena mediana.

tandum est, nullum neruum prope humerariam, atq; eius medianam, sicut iuxta basilicam, adesse. Alter ramus etiam per exteriorē sedem dispergitur, ac alijs variè sociatur: nunc cum humerarię ramo: nunc cum comuni per oris venę adaptionem. nouissimē surculum supra iuncturam, quam brachium cum manu habet, & par- 35
nam, tum ad medium, tum ad indicem digitum, porrigit. At alia superficiali vena, quę communis dicitur, medio interioriq; cubito, supra radium obliquē fertur: variè scinditur, 40

Prope humerariam venam nullus neruus sicut iuxta basilicam existit.

tur,

tur, & ramum inter indicem ac pollicem, nec non inter indicem
 & medium dispargit, atq; in ipsorum finibus definit. hunc venæ
 furculum in capitis affectibus incidere medici solent. Altera ex
 reliquis duabus venis alaribus, penitiùs quinq; nervos subit, fe-
 5 req; os humeri attingit, & furculos expandit, qui duos musculos,
 cubitum flectentes, alunt. hinc deorsum inter primum secun-
 dumq; musculum flectitur, vbiq; supra flexum transierit, trifariam
 diuiditur, atq; inde propagines ad interiores musculos spargit.
 postea altius vergens, ad brachij & manus iuncturam declinat,
 10 postquam illæ sub ligamento ad manus volam peruenerint, so-
 boles musculis exteriorem manum alentibus communicant, mox
 binas singulis digitis distribuunt. Ceterum alius furculus alarum
 apud flexuram, id præterit ligamentum, quod inter cubitum ac
 15 radium situm est, extremisq; musculis destinatur. Adhæc alius illi-
 us furculus è medio propemodum humero, ad posteriorem eius
 regionem reflectitur, sic vt propagines ad duos musculos, qui cu-
 bitum extendunt, emittat: tandem ad longissimum musculum, ad
 bicornem, & ad eos fertur, qui ab exteriore humeri tuberculo
 20 originem trahunt: atq; inter istos, totus consumitur. Ibidem
 quatuor tenues iam propagines, ab alarum origine sub iugulo
 prodeunt, quarum duæ sub pectoris ossè descendunt, & à lateri-
 bus iuxta costarum cartilaginem deorsum vergunt, thoracemq;
 prætereuntes, per rectos abdominis musculos descendunt. hæc in
 25 foeminis quibusdam cum alaria consociantur, quæ ab inferiori re-
 gione ad musculos iam commemoratos, ascendit, dum autem iste
 inter quartam ac quintam costam, modò elatiùs, modò decluiùs
 descendunt, in exteriorem regionem se conferunt, vt in viris ex-
 teriores musculos nutrant: in foeminis in mammas dispergun-
 tur, non tantùm eius rei, sed etiam lactis generandi gratia. reliquæ
 30 duæ deorsum, supra cauam pulmonis regionem, circa intersepi-
 entem thoracis membranam, supraq; cordis inuolucrum ten-
 dunt, vnaq; cum nervis duobus, ad tendinem septi transuersi pro-
 ficiscuntur. MATHETES, Vbi alia venæ cauæ partitiõ existit:
 GERON, In iugulo quatuor rami emergunt, vtrinq; bini: inter
 35 quos alij interiores sunt, alij exteriores: hi statim supra iugulum
 ad humeri musculos vergunt, & truncus post scapulas, per cerui-
 cis latera obliquè ascendens, ramulos musculis capiti seruienti-
 bus, transmittit: post occiput, sursum capitis cuti, apud reliquam
 exterioris iugularis venæ partem: at supra maxillam inferiorem,
 40 ante masseterem musculum se effert, & per mediam faciem, ad ma-
 iorem oculi angulum obliquè transit, & propagines quasdam ad
 faciei musculos disseminat: in angulum verò sobolem supra or-

*Vena in capitis
affectibus inci-
solita.*

*Quatuor vene
ab alarum venarum
origine ad
abdominis mu-
sculos tendentes.*

*Vene quæ in vi-
ris musculos ex-
teriores abdomi-
nis alunt: in fo-
eminis quoq; lac-
generant.*

*Vene capitum mu-
sculis inservien-
tes.*

bitam propagat, idq; per musculum, qui palpebram constringit: reliquias eius, cuti capitis inter supercilia per frontem, communicat. dextra vena in quibusdam inter supercilia cum sinistra sociatur, deinde rursus separatur. Alia vena iugularis, insignis admodum est, & sursum versus caluariæ basim, per transuersos ceruicis vertebrarum processus, in exteriori parte circa asperam arteriam attollitur. hæc eadem ramum eximium sub larynge producit, cuius furculi glandulas, musculosq; laryngis nutriunt. quamuis autem illa ipsa, sub maxilla multifariam scindatur, minor tamen eius est partitio, cum ad glandulas accedit, quæ sub aure latitant, musculis hyoïdis, & linguæ inferius inseruientes: unde medici eam in angina incidere præcipiunt. reliqua istius venæ portio, tum pharyngi, tum tunicæ, quæ os inuestit, distribuitur. Maior per dictæ venæ truncus, caluariam per inæquale foramen ingreditur, & per id sextum neruorū cerebri coniugium descendit, hinc ad posteriora conuertitur, peculiariq; tunica obductus, in duram membranam immittitur, & iuxta occiput, ad summam lambdoidis futuræ sedem ascendit: vbi dextra cum sinistra iungitur, quæq; dura membrana duplicatur: posterius, ad frontem suprema cerebri sede fertur, rotundoq; foramini inter frontem, & os ethmoides inseritur: posteriore capitis parte, vbi venæ in vnum coeunt, in duram cerebri membranam quadruplicatam pertinet. inde duo caudicis furculi, per vniuersam superiorum ventriculorum longitudinem prodeunt, eorumq; germina cerebri malunt. Cæterum quadruplex ille duræ membranæ contextus, de quo superius egi, græcis λήνιον, quasi dicas torcular, appellatur, inter cerebrum, & cerebellum situs. At vena quæ per superiore cerebri longitudinem tendit, mirabilem illum plexum, siue sinum efficit. nam superius semicirculum repræsentat: inferius tres habet angulos, nunc paulò ampliores, nunc angustiores. varias ipsa propagines diffundit, quæ postquam duram membranam penetrarint, per tenuem delatæ, modò sursum, modò deorsum, multifariam in illam totam distribuuntur. tenuem autem membranam prætergressæ, vniuersum cerebrum ingrediuntur. inferius iugularis vena interior, antequàm caluariam penetret, ramulos musculis temporalibus per latera, in caluaria verò duræ membranæ lateribus, iuxta iugulum impartit. Eadem ista vena, per transuersos vertebrarum ceruicis processus ascendens, aliam exilem edit, ac furculos, ceruicis musculos alentes, communicat: in quibusdam illa ab alari vena oritur. Ea ipsa vena, vbi nerui inter ceruicis vertebrae exeunt, spinæ medullæ, & vertebris alendis appropinquat, primamq; vertebra, occipitium versus conscendit.

*Vena iugularis
versus caluariæ
basim processus.*

*Vena musculos,
glandulosq; laryn-
gi nutrienda.*

*Vena in angina
secare solita.*

*Vena quæ dura
membranæ in-
fertur.*

*Venæ cerebri ef-
sentiam alentes.*

Torcular.

*Vena mirabilem
sinum constitu-
ens.*

*Venarum in du-
ram ad tenuem
membranam co-
cerebri totum
propagatio.*

scendit, vbi foramen habetur, quod ad auditus instrumentum pertinet, eiusq; nutriendi gratia ingreditur. Hæc, inquam, iugularis, non alius peculiaris ramus, vt quidam putant, omnia capitis ossa inferiora, nec non malas, maxillamq; & dentes omnes nutrit.

Vena iugularis capitis ossa, maxillam, & dentes nutrit.

atq; hæc est venæ cauæ partitio, quæ superioribus corporis partibus dicata est: nunc eam, quæ ad inferiores pertinet, accedam.

Postquam ipsa sub septo transuerso, à iecore, tanquam fonte proprio, exierit, vertebri dextræ regionis adhæret, & paulò infra iecur, surculum idoneum vicinis partibus alendis, ita emit-

VENÆ cauæ propagatio ad partes corporis inferiores.

tit, vt in varias alias propagines scindatur. Deinde truncus ipse deorsum descendens, duos ramos, id est, vtrinq; singulos, vulgò emulgentes dictos, parit: qui tamen non semper soli, sed interdum in tres, vel quatuor, vel quinq; diuisi apparent. Obseruandum autem à sinistra cauæ venæ parte, sub ventriculo, magnum

Venæ emulgentes dicte in plurimos ramos diuisuntur.

fatius ramum, & longum oriri, ferriq; super vertebra ipsas, & arteriam aortam, nec non per medium sinistrum renem transire: in homine quidem non paulò superius, quàm dexter existit, idq; ob

Renem sinistram cur natura dextræ superiores colla carit.

lien paruitatem, vt antea monui: in brutis dexter superior sinistro, cernitur. MATHET. Qua de causa amabò? GERON, Quia cum

lien paruus, iecur autem magnum sit, lociq; plus quàm ille occupet, renem dextrum inferiorem sinistro esse oportet: sicut dexter venæ ramus, qui serum cum sanguine ad renes deducit, sinistro

Renem situs.

est inferior, & multò breuior (nonnihil enim inter cauam venam & dextrum ramum interest) inferitur, sicut sinister. MATHETES,

Quò tendit vtrinq; ramus, vbi ad summum singuli renem accesserint? GERON, Ipsummet ingrediuntur, cum in surculos diuiduntur, vtrisque alendis dicati. MATHETES, Quid sanguinem,

Sanguinem sin renibus quid retinent.

qui ex vasis illis ad renes peruenit, retinere in his solet, ne naturaliter elabatur? GERON, Eminentiæ quædam ex ipsis renibus enata, non cribrum Galeni, per quod lotium colari, eoq; dilatato, sanguinem reddi existimabat. potuisset enim natura hic membranas, sicut meseraicis, & vrinarum meatuum finibus, apponere: quanquam interdum accidat, vt calculus aliquis deorsum, tanta violentia extrahatur, vt magnam sanguinis copiam

cum vrina emittat. MATHETES, Quis harum venarum, quas emulgentes appellasti, vsus existit? GERON, Vt serosum humorem à sanguine fecernant, alimentumq; in renes deferant. MATHETES,

Penarum emulgentium vsus.

Qui alij rami ex cauâ post illos exeunt? GERON, Ex cauâ huius parte, vtrinq; singula vasa oriuntur: quæ quia vrinam exeipiunt, deferuntq; ad vesicam, Græcis *ὑπορρηγες*, Latinis vrinarij meatus nominantur. MATHETES, Quæ præterea vasa ex venâ

Meatus vrinarij exortus.

cauâ prodeunt? GERON, Semini generando consecrata: vnum

Seminalis de vena ortus.

Differentia venarum seminalium inter virum & mulierem.

Vena seminalis sinistra ortus.

Cava vena quomodo diuidatur in quarta lumborum vertebra.

Vene caue distributione ad inferiores partes.

Menstrua vnde egrediuntur.

Vasa seminaria in mulieribus quomodo constituta sint.

Vena umbilicalis

Vene duae peritonaeum alentes.

Vene per quas vterus cum mammillis vnitur.

sub dextra vena sanguinis serum deferente, vulgus emulgentem vocat, duorum digitorum apicis interuallo, quæ primum oblique descendit, mox sub peritonæum fertur, deinde super os pubis, tandem in testiculum desinit, si viri corpus incidas: in foeminis aliter habet. quamuis enim eadem origo & finis, tamen longitudo tanta non est, neque summum ossis sacri præterit, cum in abdomine cesset. Alterum vas, non à caua vena, sed sinistra, sanguinis serum deferente, originem trahit: id oblique sub peritonæo descendens, supra os pubis delatum, testiculo inditur. Mirum est nullam venam sub seminaria dextra, ad quartam lumborum vertebrae usque, versus superiora, sed ad inferiora duntaxat perferri. nam caua vena à iecore, ad hunc usque locum inter vertebrae, ubi nervi exeunt, ramos expandit, qui tum spinae medullam, tum vertebrae ipsas nutriunt. MATHETES, Quomodo caua iuxta quartam lumborum vertebrae diuiditur? GERON, In duos ramos insignes, qui oblique super os Ilium pubisque delati, ad dextrum ac sinistrum crus accedunt. post quam partitionem propagines satis amplae apparent, quæ deorsum latae, versus anum pergunt. ubi namque illa ossi sacro adhæsit, furculos per ipsius foramen spinæ medullæ, ossi sacro, musculisque lumborum, qui ab illo produnt, & natiui musculis, qui femori inseruiunt, transmittit. ab ipsidem ramis, illi venarum furculi proueniunt, qui extremo recto intestino inferuntur. Ex hac ipsa vena profisciscuntur illæ, quæ se ad vesicæ latera conferunt, ut ipsam, musculosque recto intestino dicatos, nutriant, præcipue in viris. nam in foeminis cervicis vteri initium adeunt, ex quo menstruæ purgationes ipsis emanant. Idem ramus qui vesicam vteri que cervicem alit, ipsaque nonnunquam principalis sectio, sobolem gignit, quæ descendit, lataque deorsum, eo foramine excipitur, quod in osse pubis & coxæ situm est, ut nono decimoque musculo, qui femur circumagunt, alimenti gratia communicetur: deinde ad septimum vergit, deorsumque per internum femur spargitur, & terminatur. MATHETES, In foeminisne etiam, ut in viris, vasa seminaria ad testium capita desinunt? GERON, Minime, sed deorsum effunduntur, ut vterum nutriant. MATHETES, Quæ caua soboles ab his oriuntur? GERON, Umbilici proprie, vulgo umbilicalis, cui generationis nostræ exordia accepta ferenda sunt. MATHETES, Quot alias propagines ista caua venæ diuisio edit? GERON, Duas, nempe dextram & sinistram, quæ sursum versus caput reflectentes, ac progredientes, in ramos & furculos diuiduntur, ut peritonæo, & rectis musculis alimentum præbeant. Harum venarum auxilio vterus etiam cum mammillis consensum quandam habet, nam hæc cum duabus

- duabus dictis venis aduniuntur, quæ deorsum descendentes, sub pectore ad rectorum musculorum fines consistunt: in quibusdam vna tantum parte, aut duabus, furculo exili coniunguntur: interdum eadem venæ in quibusdam feminis non inueniuntur. *MATHETES*, Oriunturne istæ ab utero? *GERON*, Nequaquam, sed ab ipsorum propaginibus, quæ non utero, sed cervici eius alende sunt dicatæ. menstrua igitur per illas expurgantur, quæ non per uterum transeunt. *MATHETES*, Quò reliqua pars causæ venæ tendit? *GERON*, Crassus ipsius ramus, cum extra abdomen super os pubis peruenierit, ad inguina fertur, multasq; propagines emit, quæ glandulas ibi sitas nutriunt, vbi bubones fieri solent. Ex eodem loco ramuli emergunt, qui per colem inter cutem & membranam carneam usq; ad præputij extremum disseminantur. inde etiam, unde omnes hæ soboles proueniunt, vena satis euident egreditur, quæ obliquè ad llium os ascendens, sub cute, versus extremas costas incedit, supraq; abdomen in varios furculos diuiditur. *MATHETES*, Quò insignis illa vena tendit? *GERON*, Vbi inguen superauerit, in tres ramulos scinditur: vnus inter cutem & membranam carneam obliquè ad interiora, versus genu descendit, superq; illud interiore regione per crus inferius pergens, ad interiorum talum pedemq; versus digitos, præsertim pollicem, progreditur, aliasq; diuersas soboles procreat. atq; hæc celebris ista vena est, quam talo ascribunt, barbaræq; saphenam vocant, ex qua sanguis in uteri affectibus mitti consuevit. complures ipsa in descensu emittit furculos, tum cuti alendæ, tum pinguetudinis gignendæ gratia. *MATHETES*, Quò reliqui duo crassi rami vergunt? *GERON*, Musculis tecti, per interiora descendunt, transeuntq; inter duo interiora femoris capita. priusquam autem ad genu deferantur, multos furculos musculis qui femur ambiunt, quæ illud flectitur, alendis communicant. Porro alia propago à maiori illo ramo quem dixi, gignitur, quæ primum sub cute, deinde per tibiæ posteriora, usq; ad pedem excurrit. alia sub eodem genu flexu editur, quæ priores tibiæ musculos, aliumq; etiam altius latentem nutrit, ac deorsum fertur, ligamentoq; adhærescit, quod tibiæ & suram intercedit. descendens autem super præpedem, eius ligamento adhæret. Maior ramus imam pedis plantam per interiorum tibiæ, & in eius regione excurrit: sub plantam varios expandit furculos. Alius quoq; insignis ramus propaginem sub duobus primis musculis post tibiæ sitis, emittit, vbi tendo eius sumit initium, assurgensq; versus priorem regionem sub cute serpit, externoq; pedis talo transmittitur. Hæc ipsa est nobilis illa vena, quam coxæ latini, barbari verò ischijs, siue scijs

Vene per quas menstrua purgantur.

Glandule in quibus bubones fieri solent.

Vena saphena dicunt in uteri morbis secari solita.

Vena coxæ, siue scijs, ischijs, & ischijs.

Vena poplitis.

ex græco vocabulo, & coxendicis appellant. ramus ille sub genu apparens, poplitis vena nuncupatur. De reliquis huius & aliarum venarum furculis, quia non admodum sunt oculis expositi, nec eundem in omnibus cursum tenent, satius esse arbitror orationem hîc finire, quàm longius frustra protrahere. **MATHETES,** Id ego quoq; sentio, si vnum hoc adieceris, cur venæ a deo opt. **MAX.** procreatæ sint? **GERON,** Vt quemadmodum riui aquam, ipsæ sanguinem in omnes corporis partes pro alimento deferant. **MATHETES,** Quemadmodum iam venæ cauæ historiam enarrasti, ita quoq; deinceps arteriæ magnæ, quam aortam appellasti, partitiones enumeres?

ARTERIÆ
magnæ partitio.

Arteria aortæ origo & essentia.

Coronalis arteria cordis origo.

GERON, Aorta ex sinistro cordis sinu, vt antea dixi, oritur, omnium aliarum arteriarum maxima, & duriore constans tunica, ne sanguis, qui in ea continetur, spiritu refertus, facile euanescat, neue ipsa propter continuos spirituum motus disrumpatur, cor ipsum egressa, sobolem exiguam ei circumdat, vnde coronalis dicta est, quæ naturam ipsius viuam reddat. deinde ascendens altius, in amplos duos caudices diuiditur: quorum vnus sanè amplior est, alter minor: ille descendit, hic ascendit. **MATHETES,** Cur descendens maior factus est? **GERON,** Quia maiorem corporis partem viuam retinere debet. **MATHETES,** Quem ramum ascendens emittit? **GERON,** In sinistris eam venam quam alam

Ascendentis trunci distributio.

Arteria alaris sinistra.

Rami alaris distributionis.

rem sinistram vocant. hæc obliquè versus alam tendens, ramulos ad superiores costas spargit, & egrediens, interiorem regionem transit, & iecorariæ, quam basilicam vocant, se consociat, & propaginem sursum mittit: nec non alias omnibus musculis, qui circa humerum, scapulas, & cauam eius sedem sunt, prioriq; thoracis regioni, & glandulis alarum, soboles distribuit. **MATHETES,** Quomodo alaris ramus dispargitur? **GERON,** Rectà per interiorem regionem humeri, vsq; ad cubiti flexum descendit. priusquàm verò hanc regionem pertranseat, ramulum quarto neruo brachij, socium musculis cubitum extendentibus, communicat. prætergressus iam cubiti flexum, in duos ramulos, sepe tres scinditur. prius autem furculos musculis humeri, & cubiti transmittit: atq; vnus iuxta id ligamentum incedit, quod inter cubitum & radium situm est, egressusq; foràs, exteriores musculos accedit. quod reliquum est, cubiti longitudinem sequitur. vbi verò sub inferiore iuncturæ brachij, & manus ligamento præterierit, multifariam in palma ipsa diuisus, ad extremos vsque digitos porrigitur. Alter furculus radium versus tendit, & postquàm medium cubitum transierit, inter musculos assurgit, & per interiorem radii sedem, cutem subit, atq; hic est ramulus siue furculus ille, cuius motum

- motum digitis explorare medici solent, de naturæ statu dicturi sententiam, idem iste ramulus, in quibusdam varium situm obtinet, vt dubites an is sit, quem hactenus memorauimus, eò quòd foras tendat. Si quis rei anatomicæ imperitus, hunc arteriæ pulsus in
- 5 agro, præcipuè loco consueto tantum exploret, neq; inueniat, is falso mortem in propinquo esse iudicabit: quamuis perraro arteria illa, huiusmodi situm habeat, vt quæ plurimum interiorem regionem occupet. Vbi hæc à iunctura brachij cum manu, per anteriorem partem discesserit, ad summos vsq; digitos procedit. alter ramulus iuxta ligamentum ingreditur.
- 10 MATHESES, Quo pacto ascendens aortæ caudex, vbi alarem ramum emisserit, distribuitur? GERON, In binas propagines, græcè à sopore *καρποιδος* dictas, quæ rectè per ceruicis latera, vsq; ad caluariæ basim feruntur, asperæ arteriæ adhærentes, venisq; iugularibus interioribus
- 15 affixæ. Priusq; autem caluariam ingrediuntur, duos furculos faciei impartiuntur: qui rursus diuisi, alias soboles musculis tum ceruicis, tum capitis, tum laryngis, tum ossis hyoidis, linguæq; distribuunt. duæ maiores ad linguam ductæ, per eius longitudinem ad extremum vsq; incedunt: deinde ascendunt sub aurem: ante &
- 20 post eam, ad temporales musculos disparguntur. Altera eius propago ad alios duos musculos, posteriore in capitis parte sitos, nec non ad cutem, capitisq; musculos mittitur. Non negligendum est arterias duas ab eodem loco, & paulò altius oriri, maxillam inferius sub auris foramine non temerè ibi sito, ad illius
- 25 longitudinem, ingredientibus: cum his etiam tum venam, tum neruum adiungi, & ad omnes radices dentium inferiorum disseminari: partem autem quæ foramen ad mentum vergit, egredi, perq; labrum incedere. MATHESES, Vnde dextra alaris arteria oritur? GERON, E loco excelsiore & minus obliquo, quàm sinistra orditur: nempe à carotide dextra, in iuguli regione, & rectè per alarem sub iugulo ad brachium dextrum ingreditur, vbi dis-
- 30 scinditur, & sinistræ in modum procedit. MATHESES, Vnde hæc carotides arteriæ, & alaris ducunt originem? GERON, Duæ arteriæ à priore parte gignuntur, deorsum tendentes, quæ ramulos ad superiora costarum interualla, & vertebrae emittunt. Aliæ duæ exiles arteriæ ibidem nascuntur, quæ sub pectore conuertuntur, descenduntq; sic vt duæ illæ venæ comitentur, quæ ad mamillas, rectorumq; musculorum fines tendunt: atq; sic illæ disperguntur. Insuper duæ aliæ propagines eadem in regione,
- 40 sed retrò versus ipsas vertebrae vergunt, quæ per transuersos ceruicis vertebrae processus peruios ideo factos, eaque foramina, in quibus nerui exiliunt, soboles spinæ medullæ, vertebrae

*Arteria medicæ
brachium tangen-
tibus se offerens.*

*Arteriæ carotidis
distributio.*

*Arteriæ denti-
um radices ingre-
dientes.*

*Dextræ alaris
arteriæ origo.*

*Arteriarum ca-
rotidum & alar-
is exortus.*

*Duæ arteriæ sub
pectore.*

*Arteriæ per trans-
uersos colli pro-
cessus.*

*Membrana v-
triusq. & cere-
belli arteriæ, ca-
rumq. utilitas.*

Auris arteriæ.

Conarium locus.

*Plexus siue rete
mirabile quatuor
construitur ar-
terijs.*

& musculis ceruicem ad latus flectentibus, transmittunt. at he ip-
sæ duæ arteriæ, in quibusdam non à carotidibus, vt in plerisq.,
sed plurimum ab alaribus trahunt originem. **MATHESES**, Quo-
rum hæ arteriæ pergunt. **GERON**, Posteriolem caluariæ partem
inter primam vertebra[m] & caput, nimirum inter illam, & spinæ
medullam, ingrediuntur. postea verò duas exiguas soboles, auris
sinui, in ingressu mixtas suppeditant. nam dextra sinistra[rum] adeò
vnitur, vt vna ex eis ad semidigiti longitudinem fiat: quæ deinde
in duas, postea in alias complures propagines diuiditur. atq; hæ
primùm duræ tenuiq; cerebri membranæ, mox cerebello distri-
buuntur. quòd si hæ duæ iam dictæ arteriæ non fuissent à natura
procreatæ, posterior caluariæ regio, arterijs caruisset. **MATHESES**,
Quid arteriæ istæ utilitatis præbent? **GERON**, Cerebellum, par-
temq; cerebri, & spinæ medullæ originem viuam conseruant.
MATHESES, Quò tendunt duæ illæ arteriæ, quæ per transuersos
vertebrarum processus, inter primam vertebra[m], atq; os occipi-
tij sursum ascendunt? **GERON**, Interiolem caluariæ regionem, in-
ter ipsam & spinæ medullam ingrediuntur. vbi verò caluariæ ca-
uum ad dimidij digiti longitudinem fuerint ingressæ, coeunt, sic
vt ex binis vnica fiat: quamuis tamen iterum in geminas, dex-
tram & sinistram diuidantur, à quibus propagines, duabus cere-
bri membranis, atq; cerebello deferuntur. deinde per hæc ipsa su-
perius ad dimidiam caluariam vsq; variè disseminantur: reliquam
illius partem, duarum carotidum ramuli viuam seruant. atque
hi, priusquàm caluariam penetrent, furculos auris labyrintho
communicant. Postquàm verò hic arteriæ ramus, caluariam in-
gressus est, vt supra dixi, ad spinæ medullam, ad duram, tenu-
emq; membranam, ad cerebrum, & cerebellum, propagines suas
transmittit, id quod paucis hætenus cognitum fuit. **MATHESES**,
Quid duæ istæ quas descripsisti, arteriæ efficiunt? **GERON**, Sub
spinæ medulla sursum attolluntur, & præter multifidas illas pro-
pagines, quas per tenuem membranam spargunt, eo loco, quem
conarium, vel pinealem glandulam appellamus, cerebrum iuxta
extremos ipsius superiores ventriculos ingrediuntur, atq; gran-
dem ibi, insignemq; plexum admiratione dignum perficiunt, qui
posteriore parte ad torcular affigitur, huic sinui etiam duæ arteriæ
carotides inferuntur. **MATHESES**, Plexus ergo iste quatuor ar-
terijs constructus est? **GERON**, Vtiq; licet id à nemine hætenus
preterquàm à Realdo obseruatum sit. **MATHESES**, Arteriæ caro-
tides vbi ad caluariæ basim peruenerint, quò tandem vergunt? **40**
GERON, Illud foramen ingredi videntur, ex quo sextum nervo-
uorum par exit, quòdq; venas iugulares internas suscipit, sic ta-
men

men, vt non affurgant, neq; duas hîc propagines edant, sicut alij opinantur. **MATHESES**, Quid hæ propagines sub caluariæ basi agunt? **GERON**, Ad primam partem conuertuntur, & per hoc foramen transeunt, quod in osse temporum latitat, non longè ab illo, cui sextum neruorum coniugium, & iugulares arteriæ interiores inferuntur. priusquam autem illæ ab interiore caluariæ parte excipiantur, duos edunt ramos, quorum variæ sunt propagines, nimirum ad palatum, interiorem nasum, dentesq; superiores tendentes. aliæ caluariam per exigua foramina ibi sita subeunt, & per duræ membranæ latera, arboris modo, vnà cum venis, quæ in membrana sunt conspicuæ, explicantur, eò quod sinciput ibi excavatum existat. Cæterum postquam hæ arteriæ ad palatum dentesq; ramulos illos diffuderint, in caluariam ipsam per id foramen quod inter sphenoidem, & os temporũ situm est, ascendunt, vbi pars tertij neruorum coniugij deorsum vergit. postquam verò sellam sphenoidis (vt dicunt) supergressæ fuerint, binos furculos oculis, post neruos visorios dictos, transmittunt, vt vitam nõ modo oculis, sed etiam ipsorum musculis præbeant: nec non illis qui malas referant, ob quod variè hi discinduntur. Reliqua carotidũ harum arteriarum portio, sellam prædictam ascendit, tenui membranæ coherens, & post callosam partem posterius, multifariamq; per tenuem membranam supra intraq; & ad latera, dispergitur. nonnulli earum furculi à tenui ad duram membranam: alij à tenui ad cerebrum ipsum deducuntur. **MATHESES**, Quorsum tot carotidum arteriarum propagines, vbi supra sellam cunealis distributæ sunt, vergunt? **GERON**, Illæ superiores cerebri ventriculos, qui anfractuosi sunt, subeunt: cum primũ tenuem membranam perforarunt, & duæ esse videntur, in exiles easq; innumeras soboles propagantur. Quare elegans illud rete ex arterijs contextum apparet, quæ omnes pro eorum ventriculorum, quo superius dixi, itinere, eò vsque progrediuntur, donec cum postremis veniant. Hæ ipsæ arteriæ venas habent socias, & in earum finibus glandula pinealis adest. Galenus has ad reticularem plexũ formandum descripsit, quasi secundas præ se ferant. mihi verò insigne illud rete esse videtur, cui tam admirabilis exilium arteriarum, innumerabiliũque plexus, & intertextus insideat. Galenus supra sphenoidem situm esse scribit, vbi glandula illa habetur, quæ omne id excrementum excipit, quod in cerebro gignitur. sed natura nobiliorem illam fecit, quàm vt tot excrementorum sentina, ne dicam, cloaca esset. nihil enim ibi nisi exilium arteriarum furculi existunt, qui partibus illis, oisq; sphenoidi vitam ministrant. **MATHESES**, Quò arteriæ illæ feruntur, ex quibus

*Sella sphenoidis.**Oculorum arteriæ.**Glandula pinealis.**Glandula excrementa à cerebro excipiens.*

*Cerebri arteria
alijs ad huc igno-
rit.*

*Ad pulmonem
nulla arteria ten-
dit.*

*Maior arteria
aortæ truncus
quomodo dispen-
satur.*

*Arteriae emul-
gentes.*

*Seminales arte-
riæ.*

*Arteriae umbili-
cales.*

*Recti intestini
arteriæ.*

*Arteriae hæmorr-
hoicæ.*

plexus ille reticularis conficitur? GERON, Surculos per cerebrum ipsum dispensant, quod anatomici intactum hactenus reliquerunt. MATHETES, Cum superioribus partibus ferè omnibus, arterias communicari dixeris, quæ tandem pulmone distribuuntur, vitales spiritus à corde susceptos, ipsi conferentes? GERON, 5
Nulla, ut dubitare possis, an in corde etiam ipso, spiritus vitales gignantur. cum enim illi, ut dixi, in ipso pulmone præparentur, & penè generentur, qui postea in corde magis perficiuntur, nullus ille arterijs indigere videtur. Atque hæc satis de superiore ac minore trunco aortæ esse videntur. MATHETES, Quomodo 10
maior in corpore humano dispensatur? GERON, Quem deorsum tendere diximus, sinistrorsum flectitur, vertebrisq; adhærescit, quod in superiore trunco non accidit, ut qui non secus ac venæ caua, à vertebris distet. Inferior igitur hic dum descendit, ramos costarum interuallis, ex posteriore ipsius parte, distribuit. atq; hi 15
rursus alios, tum ad spinæ medullam, tum ad vertebra, musculosq; in posteriore thoracis regione sitos, mittunt. At postquam septum transuersum descenderit, duos pares ramos, nempe dextrum & sinistrum, qui ad septum ipsum propagantur emittens, sub ipso quidem transit, sed nullo modo id perforat, penetratq; 20
vertebris autem adherens, ad ipsarum penultimam vsq; lumborum progreditur. Quamprimum autem septum, ut dixi, præterierit, sobolem edit, quæ ad hoc par diuiditur, ingrediturq; unde venam portarum exire suo loco docuimus, ibiq; propagines distribuit, aliam ad bilis vesiculam, aliam ad lienem, aliam ad ventriculum & omentum, aliam ad pancreas, aliam ad colum intestinum. 25
sub hac alia emergit, quæ plurimos & varios surculos per mesenterium, ad tenuia intestina dispensat, multisq; meseraicis venis socias sese præbent. Interius magis duos insignes ramos, vulgò emulgentes dictos, parit, qui renes ingrediuntur. Sub venis, quæ etiam 30
sic appellantur, adhuc paulò inferius geminas arterias seminales producit, quæ ab ipsa magna arteria, non autem à sinistra emulgente originem habent. hæ ipsæ descendentes cum venis seminarijs, tum in mare, tum in foemina ad testes vsq; implicantur: nec non in illa, ad ipsius vterum, & internam huius regionem. ab his 35
arteriæ umbilici foetus ortum habent. Alia rursus sub hisce seminarijs arterijs, medio trunco existit, quæ ad rectum intestinum deferatur, nec non ad partem coli, quæ per sinistrum llium deorsum procedit. at recti intestini arteriæ, vnà cum meseraicis venæ portarum ramis, ad extremam anum vsq; descendunt. quare tum ve- 40
næ, tum arteriæ hæmorrhoidicæ fiunt. Insuper arteriæ ab hac eodem sub septo transuerso, posteriore in parte egrediuntur, quæ ad
verte-

vertebras, spinæ medullam, & dorsi, abdominisq; musculos deferuntur. Vbi iam ad penultimam lumborum vertebra peruenit, & in nonnullis ad vltimam vsq; primùm in duos ramos insignes diuiditur, qui dextrum sinistrumq; eius latus adeunt, ca-
 5 uam autem venam in olsis sacri regione superant. hi, inquam, duo rami rursus discinduntur, descendendoq; magis propagantur: vesicæ lateribus, vteri ceruici, & musculis in caua abdominis sede residentibus, communicantur. Iam alię duę arterię per foramina in osse pubis & coxę sita transeunt: è quibus cum primùm abdomen
 10 ipsum egressę fuerint, ad duas colis partes, quę à summo ad imum feruntur, tendunt, ibiq; in ramos disperguntur. atq; hæ sunt arteriæ, quę genitalia erigunt, quod à Realdo Cremonensi primùm est obseruatum. Reliqua harum arteriarum portio, per eos musculos distribuitur, qui in femore interiore siti sunt, neque tamen
 15 genu prætereunt. A vesicę arterijs, alię quoq; proueniunt, quę ad interiorem olsis sacri regionem, perq; eius foramina delatæ, tum ad ipsum, tum ad spinæ medullam, extrà verò ad musculos femori dicatos, vergunt: quemadmodum etiam à magna arterię diuisione propagines exeunt, qui musculos femoris in abdomine si-
 20 tos, vitali sanguine nutriunt. Porrò nonnullę ex illis arterijs, quę iuxta sacrum os, & coccygem descendunt, ad constrictorem ani musculum, vnà cum quibusdam cauæ venę propaginibus perueniunt, quę & ipsę hemorrhoides dici possunt. Præterea duę soboles ex magna aortę partitione oriuntur, quę sursum reflectentes, peritonæum transeunt, & sub rectis musculis supra vmbilicum
 25 vsq; ascendunt, pluresq; in surculos per abdominis musculos finiuntur. In hac diuisione duæ arteriæ prodeunt vmbilico dicatæ, quę primę in foetu ipso gignuntur. hæ nanq; post exortum ex vmbilico per peritonæum, quā duplex est, ad vesicæ latera progrediuntur, easq; arterias pariunt, de quibus paulò antè dictū est. post
 30 vmbilici arterias ortas, cor nascitur. vbi autem nos in lucem prodierimus, illæ ipsæ arteriæ siccantur, duorumq; ligamentorum vices obeunt. MATHEI. Nihil adhuc de aortę ramis restat, quos ad crura deferri dixisti. GERON. Duo super quintum musculum
 35 lumborū femur flexentem transeunt, supraq; os pubis & Ilium, versus abdomen exeunt, eoq; loco cum venis interioribus consociantur, quę musculos intercedunt. Quemadmodū autem venæ illę propagantur, ita hæ arterię omnibus tibię, pedis, & digitorū musculis dispensantur: nec non ad inguinis glandulas, scrotum et
 40 colem, sub cute mittuntur. imò ossa suis non carent arterijs, vt calorem vitalem ab eis consequantur. Atq; hæ sunt propemodum omnes totius corporis partes: in quibus si quid adhuc desideres,

*Colis arteria.**Arteria vesicæ.**Arteria hæmorrhoides.**Arteriæ vmbilici primæ in foetu.**Cor post arterias gignitur.**Arteriæ aortæ rami ad crura vsq; propagatio.**Ossa arterijs non carent.*

indicato, antequam me aliò conuertam. **MATHE TES**, Omnia plenè satis es persecutus; paucula adhuc restant, quæ velim mihi explicari, primùm cur veram cutem præposueris cuticulæ, quam græcè *Ἀνδρική* vocasti, cum tamen hæc illam superemineat?

CYTICVLA
epidermis dicta,
sensus expers.

GERON, Quia veluti efflorentiam cutis esse dixi tenuissimā,

Cutis foraminibus est peruiā.

MATHE. Estne cutis vniuersi corporis foraminibus peruiā? **GERON**, Est vbiq; occultis meatibus cribri instar refertissima, per quos sudor erumpit. in facie autem, pene,

Pinguedo cur cuti subiecta.

scroto, vola, internisq; digitis admodum tenuis est, licet ob exercitia crassescat. **MATHE TES**, Cur pinguedo, seu adeps cuti subie-

Membrana carnis cur dicta.

cta est? **GERON**, Vt calorem natium retineat, tueaturq; & in summis inædijs cibi loco existat, cum in masculis, tum in foeminis. in omnibus partibus, præterquàm in pene & scroto inueniri solet,

sensus expers. **MATHE T**. Quamobrem membrana adipi subiecta, carnosâ dicitur? **GERON**, Quia in ceruice carnosior, adeoq; muscu-

losa euadit. veteres nomen hoc ei indiderunt, eò quòd infantibus carnea adsit, multis fibris intertextâ, quæ tandem processu temporis euanescent. aliàs ipsa, ceu quantum corporis à summo capite ad extremum vsq; pedem, inuolucrum, ac velamen existit, musculisq; adhæret. Hoc etiàm obseruandum, quòd venæ superficiariæ,

Pili è cuticula erumpentes ad quid nati.

è quibus sanguis mittitur, inter cutem & membranam absq; arterijs oberrent, præterquàm in fronte, capite, pene, scroto, & digi-

Ossa quomodo sentire dicantur.

tis, vbi exiguæ apparent. **MATHE TES**, Quid pili è cuticula erumpentes sibi volunt, & cur procreantur? **GERON**, Quamuis corpo-

ris recrementa sint, tamen illud quodammodo tegere, & tueri dicuntur, fuliginosorum tertig concoctionis vaporum soboles. nul-

lus homo adeò pilosus conspicitur, quin planta pedis & vola semper pilis careat. in lepore hæ partes leuitatis gratia pilosæ sunt.

Membrana ossa ambiens.

MATHE TES, Vnde ossa sentire dicuntur, cum tamen neruis carere ipsa docueris? **GERON**, Ob membranam neruosam, quæ illa am-

bit, magno sensu præditam. hæc in exteriore caluaria, non autem intra illam inuenitur, sicut neq; in dentibus. **MATHE TES**, Solentne omnia quæ recensuisti, in singulis corporibus conspici?

QVÆ RARO apereant in anatome.

GERON, Magna ex parte, sed interdum aliqua variare solent. at quæ rariùs in corpore humano cernuntur, de ijs doctrina certa

constitui nequit. **MATHE T**. Si non molestum esset, orarem te, vt quàm breuissimè quædam ex eis referres. **GERON**, Quædam tibi

percensebo, quæ magna ex parte alij quoq; annotarunt, præsertim Realdus. Primùm capitis futuræ non semper eodem modo se habent, sed in nonnullis prorsus sunt obscuræ, in nonnullis

Suture capitis disarse.

recta deest; alijs ossa triangula, alijs quadrangula, alijs sagittæ formæ insunt. Deinceps dentium eorumq; radicum numerus non sem-

In dentibus quid notum.

per

- per idem, sicut neque insertio similis reperitur. interdum prima vertebra occipitio ita adhæret, vt caput moueri nequeat. interdum vertebræ in ceruice nunc sex, nunc octo inueniuntur. in thorace aliâs vndecim, aliâs tredecim: in lumbis aliquando sex, aliquando quatuor: in ossæ sacro nunc quinque, nunc sex extant. Costæ modò viginti duæ, modò viginti quinque, aut viginti sex conspiciuntur. ex his nonnunquam duæ, aut tres admodum sunt connexæ: nonnunquam tumidiore apparent. Pectoris os in quibusdam duplex, in his triplex, in illis quadruplex certitur. Os Ilium sacro vnitum aliquando deprehenditur. Femur interdum processus quosdam palmi instar longos acutosque refert: sic etiam tibia, sed minus proceros. aliâs femur cum tibia vnitur, & ambo summum in tumorem efferuntur. Sex etiam digiti in manu interdum existunt, vbi extremus pollicis articulus in duos diuisus fuerit. Quinetiam monstris sæpe brachia ab origine defunt: alijs crura: alijs corpus integrum adest, & dimidium alterius ei cohæret. Visa est mulier, quæ dextra manu caret: in brachij autem fine, tres quasi verrucas, vnguiculis quibusdam præditas haberet, quibus linum ex colo trahere poterat. Realdus commemorat, homines auriculas brutorum instar sortitos se vidisse: alios cæcos natos: alios quibus cartilagines costis nondum coaluerant: alijs quartum neruorum coniugium, neque ad palatum, neque ad linguam propagines detulisse, sed ad occipitium reflexisse. Non dico quanta in musculis, cruribus, pedibus & venis, diuersitas sæpè occurrat. Nunc enim eodem in latere duæ, tres, quatuor, & plures interiores sugulares: nec non emulgentes binæ eodem latere, sicut etiam seminariæ venæ duæ visæ sunt: item meatus vrinarij quatuor: venæ in abdomine & cruribus varicosæ grandissimæ: adhæc vnus duntaxat ren, isque maximus: insuper intestina tenuia mutuo in se ingressa longius digito, in ijs præsertim, quos dolor iliacus interemerat. Præter hæc iecur peritonæo annexum, sicut etiam lienem fuisse, constat: aliâs eundem tam grandem, vt viginti libras penderet, quem cartilago extrinsecus ambiret. omentum autem peritonæo, & abdominis musculis connexum, cuiusque selibram ex vmbilico appensam: in scroto omenti libram. pulmonem membranæ costas cingenti, nunc in altero, nunc in vtroque latere adhæsisse: quod indicat, non omne vulnus thoracem penetrans, extrorsum spirare. in pulmonibus & iecore steatomata, & atheromata, nec non ossa inuenta fuisse: item in thorace magnam aquæ copiam: in corde vlcera, & tumores contra naturam duros, præsertim in sinistro illius sinu, adhæc septum, quo ventriculus cordis distinctus.

*In vertebis quibus
rariis accidat.*

*Costarum numerus
in quibusdam
variat.*

*Os Ilium sacro
vnitum.*

*Processus variorum
in femore, &
tibia.*

*In digitis quid
rarum.*

Monstra.

*Quarti neruorum
coniugij varietas.*

Musculorum, venarum, crurum, & pedum diuersitas.

*Meatus vrinarij
quatuor.*

*Ren vnus in homine
visus.
Iecur peritonæo
annexum.
Lien.*

*Cartilago circa
lienem.
Omenti varietas*

*In pulmone quid
rarum.*

Thorax aqua refertus.

*Septum cordis,
cartilagineum.*

*Pulmonis portio
exigua.*

*Membrana hy-
men dicta.*

*Calculi in veni-
bus, pulmonibus
vesica, intestino.*

*Abscessus parti-
um corporis.
Lien scyrrhosa,
& cartilaginea.*

*DE VIVA
sectione.*

*In canum sectio-
ne quæ conspici-
antur.*

*Cordis constri-
ctio, & dilatio.*

guuntur, repertum fuisse cartilagineum: aliquando sinistrum ven-
triculum defuisse, sicut in quodam alio pericardium: qua de causa
antea syncope accidisset, subindeq; eger mortuo similis apparui-
set. præter hæc exiguam pulmonis portionem, reliquum spa-
tium aquoso humore plenum extitisse. Quid de monstris mul-
ta referam, cum medicina illis subuenire non possit: qui curiosio-
res sunt, multa in historijs de his prodita inuenient. Hoc notatio-
ne dignum videtur, quod membrana, quæ Græcis *ὑμην*, nobis hy-
menæa dicitur, sub nymphea ante ceruicem vteri superiore parte
vnico foramine patens, vt menses possint effluere, sepe in virgini-
bus & puellis non inueniatur, etsi nunc nondum illæ virum sint
expertæ. De calculis notum est, quod in renibus colore varij, in
pulmonibus, in iecore, in vena portarum, in meatibus vrinarijs,
in vesica, in intestino colo, in vesicula fellis multiformes, nec non
abscessus in omento & peritoneo, iecore & liene saluis, reperti
sint: adhæc iecur scyrrho, & lien præter hunc cartilagine etiam à
foris obductus apparuerit. In Hermaphroditis non mirum est,
quod multa rara deprehendantur, cum partim marium, partim
fœminarum naturalia habeant. MATHETES, Quam causam esse
putas, cur natura sic in corporibus humanis ludat? GERON, Ego
certè nullam præter syderum influxum, intempestiuumq; concu-
bitum, & malam victus rationem existimo. Tanta enim hodie
morum & vitæ est corruptio, tantaq; libido, vt non mirum sit
homines prorsus in bestias degenerare. MATHETES, Post mor-
tuorum incisionem, quid de viuorum apertione censes?

GERON, Atrocissimum latrocinantis medici opus esse
dico, ex quo ars salutis humanæ præses, crudelissima pestis fiat,
at, præsertim cum nihil ex ea percipi queat, quod non etiam
in cadauere cognoscatur: quanquam in canibus viujs ad ana-
tomen præparatis, nonnulla euidentius, quàm in mortuo ho-
mine conspici possint. MATHETES, Quænam illa sunt, quæ
in canibus cognosci possunt? GERON, Primùm quomodo vox
per neruos recurrentes fiat, pulmòque moueatur, & is cor am-
plectatur: deinde quo pacto altera thoracis parte offensa, altera
integra maneat, & qualis septi transuersi motus sit, quo inspiran-
do dilatatur, & deorsum expirando constringitur, sursumq; agi-
tur: postea quo motu cor amplificetur, arcteturq; nec non an ar-
teriarum motus cordi respondeat, numq; arteriæ constringan-
tur, dum illud dilatatur, hæ verò dilatentur, dum id constringi-
tur, vt omnes fatentur. nouissimè an cor dum sursum trahitur, in-
tumescitq; constringatur: vbi verò se exierit, quasi relaxa-
tum, deorsum vergat, quando cor quiescit, ac summittitur: qui
motus

motus *συλλα*, siue summissio dicitur, eò quòd facilius minoreq; la-
 bore hunc suscipiat: quando autem transmittit, maiore robore
 indigeat. Id certum est corde detecto, pulsus differentias faci-
 lius quàm ex arteriarum brachij contactu, deprehendi posse:
 5 nec solum cordis, sed etiam cerebri dilatationem, constrictio-
 nemq; ex illis apertius perdisci, & quomodo humor aquosus in
 cordis inuolucro contineatur. In foemella prægante non pauca
 obseruatione digna occurrunt, de quibus Aristoteles multa falsa
 memoriæ prodidit. At si omnia accuratè in viuus canibus inuesti-
 10 gare velis, pluribus certè opus erit. Olim huiusmodi bestiarum
 confectionem Lutetiæ nunc priuatim, nunc paucis aliquot audi-
 toribus & discipulis adhibitis, frequenter exercuimus: atq; ho-
 die etiam, sicut audio, non parum illic est vñtata. *MATHESES*,
 Ignoscas mihi, humanissime præceptor, si te de quibusdam inter-
 15 rogem, antequàm ab anatome aliò digrediaris. Censésne adhuc
 Galenum omnium qui post Hippocratem vixerunt, medicorum
 præstantissimum extitisse? *GERON*, Quid ni? tanto enim inter-
 uallo alios, qui de medicina scripserunt, siue Græcos, siue Arabas,
 tum veteres, tum recentiores, ingenio, doctrina, & vsu artis supe-
 20 rauit, vt meritò princeps illorum dici meruerit. *MATHESES*, Qua
 ratione id fieri potuit, cùm ipsum rarissimè, aut nunquam in hu-
 mani corporis confectione fuisse versatum, sed alias potius ani-
 mantes, præcipuè simias incidisse, eoq; in humani corporis parti-
 um numero, situ, figura, & connexu grauiter eum errasse constet?
 25 *GERON*, Negare non possum Galenum in plerisq; illis indicandis,
 consecandisq; non semper rem attigisse, eò quòd magis se in bru-
 torum, quàm in hominum cadaueribus præsecandis exercue-
 rit. hoc tamen contrà affirmo, nullam eum ferè partem, cuius co-
 gnitio ad morborum curationem fuerit necessaria, ignorasse, per-
 30 peramq; tradidisse. *MATHESES*, Quid audio: atqui ego hæcenus
 putauim medicum omnes partes etiam minutissimas, siue interio-
 res, siue exteriores nosse oportere, si in morbis medendis feliciter
 versari cupiat. *GERON*, Multa in rerum natura extant, quorum no-
 titia non quidem medicum aptiorem facit, sed medicinæ tantum
 35 profectū reddit. sic nulli ob accuratam illam, ne dicam, curiosam
 nimis partium corporis perscrutationem medici excellentiores,
 sed ob curationes dextrè tentatas absolutasq;, censentur. Ideo
 etiam Hippocrates, Galenus, Erasistratus, pluresque id genus
 alij, tantum ex rerum natura, & corporis humani fabricatione
 40 scrutari voluerunt, quantum ad medicinam probè exercendam
 ex vsu esse putarunt. non enim eadem semper omnibus similem
 ob causam conducunt. Sic anatome aliter physici inferuit, qui

*Pulsus differe-
 rentie in viuis
 sectione.*

*Cerebri motus
 cum cordis respon-
 dent.*

*Galenus medi-
 corum præstan-
 tissimus, post
 Hippocratem.*

*Galenus animan-
 tes tantum incin-
 dit.*

*Medici excellen-
 tes qui.*

*Anatome quatuor-
 nus perscrutatio-
 da.*

disciplinas ipsas propter se amant: aliter n̄s, qui illam non ideo affectant, sed vt nihil temerè à natura factum esse demonstrent: aliter his, qui argumenta (vt ille ait) ad actionem quandam, vel naturalem, vel animalem cognoscendam, ex partium humani corporis historia adferre nituntur: aliter medico, qui manum aculeis telorumq; cuspidibus probè eximendis, vel alicui parti aptè excidendæ, vel sinibus, fistulis, & abscessibus incidendis adhibiturus est, quo anatores vsu nihil æquè est necessarium. **MATHESES,** Quo pacto igitur medicus excellens futurus, in anatome gerere se debet? **GERON,** Sic vt primùm exteriorum partium: deinde in latentium viscerum actionibus: postea in singulorum vsibus cognoscendis, diligenter se exerceat, non autem philosophorum more, qui corporis nostri structuram scrutantur, nempe vel solius contemplationis gratia, vel vt naturæ artificium qualibet in parte probè expressum doceant. **MATHESES,** Quæ igitur anatomes pars est præcipua, medicisq; vtilissima, & maximè necessaria? **GERON,** Ea, quæ circa musculos, neruos, arterias, & venas, in cruribus, manibusq;, aut thorace exteriore, iuxta spinam, aut pectus, aut costas, aut scapularum ossa, aut pubem, aut cervicem, aut caput conspicua, versatur. Quid enim vtilius medico esse possit, si vulnera in bello accepta curare, tela extrahere, ossa incidere, luxata reponere, fracturas restituere, fistularum sinus, & abscessus incidere, aliæq; id genus moliri studeat, quàm omnes & manuum, & crurum, exterioresq; scapularum, & alias supradictas partes accuratè perspectas habere? In his enim, nisi noueris vbi aut neruus, aut musculus insignis situs sit, vbi verò arteria, aut vena grandior, interdum mortis magis, quàm salutis autor eris: interdum m̄ncos efficies. **MATHESES,** Quæ pars anatomæ non adeò vtilis est medico, & necessaria? **GERON,** In qua curiosè inquiritur, quot singuli cordis, cerebriq;, aut alterius visceris sinus, membranas habeant: quot venæ ipsas nutriant: vnde & quomodo procedant: aut quo pacto neruus ex paribus illis, quæ à cerebro deorsum feruntur, eidem inseratur: quomodo ex vitali spiritu, animalis generetur: vbi plexus ille reticularis subsistat: item quot linguæ muscoli, qualesq; forma existant. Hac de causa Galenus iuuenes adhortatur, vt relictis cerebri, cordis, linguæ, pulmonis, iocinoris, lienis, renum, stomachi, laryngis, fœtus, veteriq; grauidi incisionibus, prius discant, quali connexu brachium, scapulæ, & cubitus deligentur: adhæc quomodo alia artuum membra singula cohæreant, quicq; muscoli ea moueant: item qui nerui, quæ arteriæ, quæ venæ vnāquamque partem intercurrant: quem vsu præstent. Venia igitur Galeno danda, igno-

Quomodo medicus se in anatome gerere debeat.

Anatomes pars quæ vtilissima, & necessaria.

Anatomes pars medico minus vtilis, & necessaria.

In anatome quæ primū addisci Galenus præcepit.

*Galenus veniam
meretur, quod mi-
nus curiose ana-
tomen tractarit.*

scendumque esse videtur, si quando in minutilis quibusdam, non ad-
modum medicinę necessarijs, vel ob grauiora studia, vel ob cor-
porum humanorum inopiam, minus accuratę illorū incisionem
moliri potuerit. Quis enim vnusque, præsertim in rebus obscuris et la-
tentibus, tam fuit oculatus, tam vbique certus, tamque circumspectus,
qui non aliquando aberrauerit? Non dubito, quin si omnes Ga-
leni commentarij anatomici integri adhuc, sicut ipse amicis & di-
scipulis conscripsit, hodie extarent, nostrę ætatis medici longę
præclariùs de illo sentirent. Sed tanta est hominum ingratitude,
ne dicam impietas, vt nemo libenter fateatur, per quos profecerit:
omnes autem de alijs benè meritos, ob res etiam leuissimas ca-
lumniari, leuium ingeniorum more, audeant: quę omnia sibi as-
scribere, nihil detrahere solent. Quantò honestius esset, præcipuè
in eo ministerio, quod vtilitatis causa posteris traditur, ingenuos
cuiusque conatus æqui bonique consulere: non autem contume-
liosè infectari & reprehendere. verum autem errorem paucis ci-
tra longas contentiones annotare. Vtinam id non tantum me-
dicinæ, sed etiam reliquarum artium professores agerent: qui sæpe
ob controuersias anno integro, vix vnus libelli Galeni prædi-
cuntis interpretationem in scholis absoluunt. MATHESES,
Id ego sum expertus cum magno studiorum meorum detrimen-
to. GERON, Quid agas. ita sunt omnes ferè medicinæ profes-
sores hodie affecti, vt eruditionem suam, si quam habeant, ostenta-
re potius, quàm res necessarias declarare cupiant. Hoc Galenus
quoque vitio (pace illius dixerim) laborasse videtur, dum in alio-
rum scriptis reprehendendis, confutandisque, suis autem asseren-
dis ferè ad tædium vsque prolixus existat. Quanquam autem id
à natura ipsi fuerit inditum, vtpote Asiatico: tamen id commo-
di longę eius dissertationes habent, vt lector semper aliquid memo-
ratu dignum in illis inueniat. Hippocrates omnis medicinæ pa-
rens, quanta modestia contra illos, qui ab eo dissentiebant, vsus
sit, omnes intelligunt, qui scripta illius perlegerunt. Rursus si hu-
ius temporis medicorum commentaria euolueris, maiorem ip-
sorum partem in contentionibus & calumnijs, quàm in re pro-
posita absumi deprehendes. In summa, sæculum illud, quo ipse vi-
uebat, tale scribendi genus requirebat. hodie nobis idem quod
illi, non licet, cuius vix discipuli esse meremur. Laudare non
possum illos, qui in aliorum vitijs reprehendendis sunt acutissi-
mi, in proprijs autem magna veluti caligine obducti cecutiunt.

Alexander Trallianus non obscurus medicinę scriptor, cum in
febris quartanę curatione à Galeno dissentire non nihil coactus
esset, cum magna honoris præfatione dicere incepit: MIRROR

*Galenus cur in
docendo prolixus
fuerit.*

*Alexander Tral-
lianus de Galeno.*

CVR DIVINISSIMVS GALENVS ITA IN HOC MORBO CV-
RANDO SENSERIT. Non dico hæc, quod aliorum errores con-
tra veritatem defendere cupiam, sed id modestè citra calum-
niam fieri malim. Atque sic nunc anatome finem im-
ponam: cras, si DEVS volet, ea quæ huic
proxima sunt, aggrediar.

Ioannis Guintherij Ander-
naci Medici Clarissimi

DE MEDICINA VETERI ET NOVA
COGNOSCENDA, COM-

MENTARII PRIMI

DIALOGVS SEXTVS.

20 **M**ATHETES, Ingentes tibi gratias habeo, eximie præceptor, quòd iam vniuersas corporis partes, ad eò candidè & diligenter mihi indicaris. Metuebam enim, ne obiter eas tantum, & veluti in transcurfu recitares, vt plerisq; in scholis fieri audio. GERON, Id quod feci, in tuam gratiam feci.

15 hodie siquidem permulti putant, tam accuratam partium cognitionem, ad morbos curandos non esse necessariam. Ego verò singularum situs, figuræ, connexus, temperamenti, & naturæ notitiam, medico futuro conuenire: longas autem, & curiosas nimium, de ipsis disputationes, contentionesq; superuacaneas esse existimo: cum etiam pleriq; apud veteres sine illis medici euaserint excellentissimi. Non improbo tamen eos, qui hoc nomine vel nimia quæq; perscrutantur, examinantq;, vt medicinæ studiosis ea ostendant: ita tamen, ne diutius illis immorentur, sed maturè ad maiora contendant. MATHETES, Quæ vocas maiora? GERON,

Anatome cognitio ad morbos curandos necessaria

Disputationes curiosæ, et inutiles.

20 Ea quæ vniuerso corpori eiusq; partibus vitam tribuunt, & conseruant, vti sunt calor, humorq; genuinus, spiritus, natura, & facultates singulis peculiare. MATHETES, Vnde, & quomodo calor ille natiuus in corpore humano exoritur? GERON, Ex igne quodam secretiore, nempe diuino, simul cum corpore nostro,

Anatomici ex professione non contemnendi.

25 non ex prima elementorum temperatione: vnde meritò veteribus primarius, vel primogenius, vel insitus, vel natura, vel anima, vel essentia, per se semperq; mobilis appellatur: ex calido & frigido medioèriter temperatus. ideo non intrò, neq; extrà solum fertur, sed alter ipsius motus, alterum excipit. Nam si intus omnino maneret, celeriter immobilis fieret, abolereturque: sin

Quæ partibus inhaerent, accuratius sunt inquirenda.

Calor natiuus vnde & quid.

30 autem foràs tantum efferretur, eo quoq; motu euanesceret. quare quandiu modicè restinguitur, & modicè vicissim accenditur, tantu diu mobilis perseverat. ideo etiam cum ad interiora paulatim tendit, incenditur, alimenti appetens: cum autem ab intimis medio-

35 critè effertur, vniuersis partibus robur & vitam communicat. MATHETES, Repetas iterum, curnam calor ille insitus etiam frigidi sit particeps? GERON, Cum ipse sua sponte moueatur, fera-

Calor quomodo persequetur.

Calor insitus frigidum particeps quare.

Caloris insiti actiones.

turq; in sublime, frigido mediocri opus habet, quod impetum eius impediat, ne propter leuitatem dispersus, euanescat. MATHE-
TES, Quas actiones calor iste genuinus obit? GERON, Vitam tue-
tur, alimentum attrahit, conficit, nutrit, sustentat, auget, pro-
creatq; nec non animantibus sensum motumq; præstat: & quan-
tò magis perfectæ operationes illius apparent, tantò amplior eius
essentia existit. Si enim sol (vt ab hoc exemplum sumam) omnia
quæ vita fruuntur (veluti rex summus, & orbis moderator) luce
sua illustrat, eademq; pariter caloris sui temperatione fouet, & ad
prædictas actiones excitat: frigus autem externum illas impedit,
certè in quouis corpore, quod vitam habet, calorem aliquem in-
esse oportet, qui soli hac parte respondeat, & actiones nuper di-
ctas, licet obscurius, edat. Nunquam autem ille tam imbecillus est,
vt eum vel extremæ senectæ frigus superare possit. nam ex hoc
serpentes & herbæ, stirpesq; temperamento frigidæ, papauer,
mandragora, atq; id genus aliæ viuunt contra res quedam inani-
mata, quamuis elementarem ac igneum adeò calorem habeant,

Caloris necessitas

*Calor natiuus ex
meliore quàm e-
lementorum ma-
teria procreatus.*

*Non semper sui
similis.*

*Morborum cau-
sa.*

*Calor insitus non
simpliciter refri-
geratur.*

*Flamma quotmo-
dis extinguatur.*

vt nos vrant, tamen vitali non sunt prædictæ. Qua de causa calor
iste natiuus, non ex elementorum, sed præstantiore materia pro-
creatus est. MATHESES, Manetne semper ipse in genuina sua me-
diocritate? GERON, Si hoc fieret, homo semper bene valeret, at
sæpè morbis infestatur: ergo calor insitus non omni tempore sui
similis permanet, sed interdum frigus ipse superat. vnde in-
flammationes, erysipelata, herpes, carbunculi, aliq; feruidi affe-
ctus, & febres oriuntur. interdum frigus superat calorem. vnde
conuulsiones, tetani, palpitationes, stupores, resolutiones, epilep-
siæ, paraplegiæ, & rigores nascuntur. Quamuis autem calor nati-
uus refrigeretur, quando robore, quod ipsum continet, desti-
tuitur, vel quando alimenti, quo accendebatur, penuria laborat,
neuter tamen affectus rigorem inducit, coq; non simpliciter re-
frigerari calorem in rigore dicimus. MATHESES, Quomodo
igitur refrigerari ipse potest, si rigor comitabitur? GERON, Su-
bitò, & violenter, sic tamen vt ipse robustus perseueret, neq; ef-
sentia, neq; facultate læsus, ab exteriori autem causa quadam mo-
lesteretur. MATHESES, Si placet, rem exemplo reddas clariorem?
GERON, Flamma extrinsecus nunc materiæ, vnde accendi sole-
bat, inopia interit: nunc in sole splendido contabescit, ac emori-
tur: nunc aquæ abundantia extinguitur: nunc lignorum super
eam cumulatim iniectorum copia suffocatur: atq; hi quatuor cas-
us, quatuor ex causis, non vno omnes modo flammam infestant.
MATHESES, Quonam singuli? GERON, Primo vis eius flammæ
quæ in sole matescit, dissipatur, dum aeris nos ambientis vio-
lencia

lencia discutitur. nam radiorum solis robur, igne valentius est, ac durabilius. Secundò cùm flamma materiæ penuria, non amplius accenditur, essentia abolita, interit. quod enim accensum est, id semper in motu forâs tendente digeritur, dissipaturq̃: cùm autem
 5 intrò alimenti recipiendi gratia tendit, deinde eo destituitur, euanescit. tertio, cùm flamma, aqua copiosiore humectata, extinguitur. nam illa validè aduersus omnem syncerum copiosumq̃ humorem pugnat: sicut etiam, si plenius ipsi superfundas oleum, strepitus & concussio necessariò oboritur, igne propemodum
 10 voce, vt ait ille, violentiam testante. *MATHESES*, Talisne caloris insiti affectus, rigor est? *GERON*, Vtiq̃. neq̃ enim is fieri solet, cùm natiuus calor materiæ & alimenti inopia contabescit, nec cum illius copia grauatur, aut ex imbecillitate marcescit, sed cum validus adeò existit, vt expandi possit, & deinde prohibetur.
 15 Ideo corpus etiam duplici ac composito motu agitari, vt in tremoribus, sed diuersa ratione, solet. In his enim motus ex facultatis corpus mouentis languore mixtus oritur: quo membrum prout vis ipsius remittit, erigitur: pars autem semper deorsum labitur. in rigore verò, naturalis calor motus violenter retinetur.
 20 Cupit enim ille tanquam essentia, & viribus integer expandi, & in omnes corporis partes dispergi. quando autem à motu suo prohibetur, introrsumq̃ violenter repellitur, ad principium ipsius refugit. Quia verò ibi remanere nequit (nam essentia semper mobilis, si loco sistere cogatur, interit) ipse se recolligens, & quasi in
 25 vnum congregans, non sanè æquabiliter, & libero motu introrsum repellitur, sed valido impetu, tanquam è carcere exiliens, ea sanè, quæ transitum ipsius occupant, interdum propellere, vias autem expurgare nititur. at cùm illa repellit, ab impetuoso quidem cursu suo cohibetur, totum autem corpus inuasionem sua per-
 30 turbat. *MATHESES*, Quade causa? *GERON*, Quia vaporosus tunc redditur, cùm in ea, quæ obsistunt, impingit, intrò rursus resilit, quasi ictu percussus, ac iterum ad principium reuertitur: inde rursus erumpens, inuadit violentius, iterumq̃ in hac irruptione resilit. idq̃ tandiu fit per successionem, donec noxia per-
 35 seuerant. Hac ratione fit, vt corpus & dolore afficiatur, & inæquali dupliciq̃ motu in rigore agitetur. Summatim, omnia in corpore commouentur, concutuntur, turbanturq̃. ac quilibet in rigore motus ob inæqualem, validam, & violentam insiti calor vaporosi redditus irruptionem inuasionemq̃, & repulsum, etiam
 40 inæqualis, inordinatus, & voluntati contrarius efficitur. Idcirco corpus post rigores magis incalescit, sudoresq̃ fundit, quàm cùm in naturali statu esset. Vbi enim noxia, per varios motus li-

Duplex motus in tremore.

Caloris vehementia in rigore inopeditur.

Calor insitus in naturali statu & rigore quomodo se gerat.

Motus in rigore.

Sudor post rigores erit.

*Cur corpus post
rigorem incalē-
scat.*

berè propulerit, perfecteque respirauerit, tres ob causas incallescere cogitur. MATHETES, Quænam sunt amâbo? GERON, Prima, quod calor frequenter ab exteriori perspiratu repressus, in imo corpore colligatur: secunda, quod ille totus iam foras vehementer expansus sit: tertia quod ipse inuasiōe, impulsu, violentoque motu accendatur. Si verò ignis accenditur, cum lignum, aut lapidem atteris, confricasque, quanto magis spiritus insitus, cum natura sit calidus, accendetur, si vehementer moueatur. id quod in naturalibus motibus videre licet. Nam currentes, luctantes, confricantes, aut alio quodam modo se commouentes, non minus, 19

Sudor.

*Calor natiuus
quomodo euin-
catur.*

Quinetiam sæpe accidit, ut calor, cum ita ex alto redit, ceu feruescentis humorum materiæ aliquid confertim effundat, qui sudor appellatur. Quare si quis post rigorem frige factus non iterum incalescat, periculo mortis vicinus est, ut in quo calor natiuus euictus sit. MATHE. Quot modis vincitur? GERON, Duobus: primo causæ offendentis efficacia: secundo sua ipsius imbecillitate. Si itaque 20

- » mutus ex rigore non recalescit, mors in propinquo est: nec non
- » utriusque affectus, ob quos rigores fiunt, exitiales sunt: in illo, causa
- » rigoris valida: in hoc vires ægri imbecilles sunt. Ideo rigor in fe-
- » bri non intermittente superueniens, ægro iam imbecilli mortem

*Rigoris causa
non solum frigi-
da, sed etiam ca-
lida.*

*In febris tertiana
vera & ardente.
Ex medicamen-
to calido exteri-
or.*

*Ex inflamma-
tione.*

*Ex auditu & vi-
su.*

*Ex bile, & acri
humore.*

*Fluxus solus a-
biordans, non po-
test rigorem pro-
creare.*

*Rigor quomodo
proprietas.*

in febris quoque tertiana vera, & ardente, quam magnus feruor, si- 25
tis in solabilis, bilis meræ vomitus comitantur, rigor superue-
nire solet. adhæc acris & calidum medicamentum vlceri admo-
tum, primum dolorem, mox horrorem, deinde rigorem excitat.
præterea inflammationem, cum in abscessum mutatur, rigor, hor-
rorque sequitur. postremo etiam horrendum aliquid auditu, & 30
spectatu nonnunquam, & rigorem & horrorem gignit. MATHE-
TES, Ex bile igitur, & acris humore quoque rigor excitatur? GERON,
Quid nisi? sed hoc aduertas velim, nullum humorem, siue frigi-
dum, siue calidum & acris solum abundantem, rigorem posse
procreare, sed peculiari utrunque modo: nempe si certa illius sit co- 35
pia, aut qualitas, aut locus quidam corporis, in quo illum colligi
oportet. erit autem non parua in eo, quod loco manet, aut moue-
tur, & in motus modo differentia. MATHETES, Eam, obsecro,
exponas? GERON, Vbi calida medicamenta applicantur, non-
nunquam solus horror, sæpe etiam rigor superuenit: sicut in ar- 40
dentibus, & tertianis febribus, cum flaua bilis, non in vasorum
receptaculis continetur, sed per carnes mouetur: vel si copiosior
iste

iste humor in ipsis creatus sit: vel si per ipsas à natura expurgetur. Hac enim ratione sola, ardentes febres à tertianis differunt: quòd illæ in vasis bilem habeant: hæ verò eam extra illa per sensorias partes deferant. quia bilis, cùm per illas rapitur, acrimonia sua dolorem mouet. Duo igitur interea fieri solent, nempe quòd sanguis ad corporis interiora refugiat, & quòd ipsius particulae, quæ bilem continent, singulae sua facultate alienorum excretice, illam à se ad vicinam propellant, donec ipsa bilis ex omnibus abstracta, per sudores, aut vomitum, aut aluum euacuetur. Idem accidit etiam in laborantibus cruditate, aut vitioso humore plenis, aut in sole versatis æstiuo, aut in balneum ingressis, aut exercitatis: quorum nonnulli inde statim horrent, & rigent. *MATHEVS*, Ergo, si causa quædam calida, & acris, aut frigida copiosa in nobis moueatur, rigorem protinus inducet. *GERON*, Eadem quidem causa efficiet, sed non duntaxat copiosa pariet. nisi enim vehementiore motu per sensorias partes feratur, nullum excitabit. Ideo in quartanis simul & tertianis febribus rigor ægros infestat, quamuis illæ ex contrarijs sint humoribus contractæ. Nam melancholicus natura frigidus, flaua bilis calida existit. Dum autem per rigorem sanguis, & cum eo calor natiuus ad corporis interiora, visceraque refugit, cutis crurum manuumque extrema frigida & exanguia redduntur, eò quòd longissimè ab illis distent. Itaque, si calor genuinus in alto extingatur, vel suffocetur, quòd foras non transpirauerit, vel quòd à frigidis causis euictus sit, animal emoritur. at si ille in altum quidem refugiat, relictis autem viribus, noxijs causis resistat, tum facultatis alienorum excreticis, quæ singulis inest particulis, veluti instrumentum efficitur. *MATHEVS*, Ad quid facultas illa calore natiuo indiget. *GERON*, Cùm ipsa noxijs expellendis nata sit, multò certè id efficientius præstare caloris ex alto emergentis subsidio potest: qui ipse quoque simul valido impetu illa in proximam quancunque partem extrudit: idque nunc per cutem, nunc per vomitum, nunc per ventrem inferiorem, interdum per vtruncque. *MATHEVS*, Aliusne humor frigidus præter melancholicum exuperans, ea ratione, quam dixisti, rigorem generare potest. *GERON*, Potest pituita admodum frigida, quæ à Protagora græcè *υαλωδης*, quasi vitrea appellatur. verum ex hac generatus rigor, vehemens non est, licet interdum plusculis diebus deinceps perseueret. quando autem nos conuiescimus, & nullo motu agitamur, ipse quoque desinit: contra, quando mouemur, statim pro motus ratione comitatur vehementior ob validiorem, leuior ob imbecillem. At huiusmodi rigor non tam viris, quam mulieribus, præsertim, quæ summo

Ardentes febres à tertianis differunt.

Rigor ab externis qui fiat.

Rigor in tertianis & quartanis.

Cutis manuum & crurum extrema cur frigida, & exanguia.

Animal quomodo emoritur.

Facultas excretrix ad quid calore indigeat.

Rigor quando ex pituita.

*Rigor ob varios
fructus.*

*Rigorum disse-
rentia.*

*aloy natiuus in
qua materia con-
tineatur.*

*Aura in corde &
cerebro.*

*Aura aëre inspi-
rato fouetur.*

*Corpus nostrum
aëre non indiget.*

*Flammæ mate-
ria quæ existat.*

in otio vitam degerint, & balneis à cibo vsæ fuerint: interdum e-
tiam, tum adolescentibus, tum viris, ob immoderatum frigidor-
um, & immaturorum fructuum, siue horariorum, siue autum-
narium vsu, obuenerit consuevit. **MATHESES**, Rigores, qui
tertianarijs, quartanarijs, pituita vitrea grauatis, & quibus acria
medicamenta sunt applicata, obueniunt, omnesne inuicem sunt
consimiles? **GERON**, Nullo pacto. nam in quartanarijs talis exo-
ricitur, qualis per magnum aëris frigus iter faciuntibus, accidit: in
tertianis autem, & ardentibus febribus, talis percipitur, in quo
ægri quasi aciculis acutis, & tenuibus per carnem lancinentur,
punganturq; plurimi eorum sitiunt, & calorem per imas partes
in iplo rigoris tempore sentiunt. **MATHESES**, Qualis rigor est,
quem pituita vitrea, & immodicus frigidorum, immaturorumq;
fructuum esus peperit? **GERON**, Similis ferè ei, qui in quartana
molestus est: in quo tantum frigus ægri sentiunt, vt vix rursus ex-
calescere queant: præcordia crasis humoribus obstructa tendun-
tur, grauanturq; sed de his alio tempore agendum erit. **MATHE-
SES**, Cum ergo de calore natiuo potissimum disserere hic insti-
tueris, pergas reliqua absoluere, quæ nondum explicasti. adhæ-
rescitne adeo corpori humano, vt ab eo separari nequeat? **GERON**,
Minimè, sed seiungi potest. **MATHESES**, In qua corporis mate-
ria, calor ille continetur? **GERON**, In spiritu, tanquam propria ip-
sius, & facultatum sede, primoq; functionum obeundarum in-
strumento. **MATHESES**, Id, quæso, crassius explices? **GERON**, Si-
cut in cordis sinibus, & cerebri ventriculis, aura quædam tenuis
continetur, dum animal viuit: cum autem vita defungitur, sine
sensu euanescit: ita in reliquis partibus omnibus consistit. **MATHE-
SES**, Vnde illa fouetur? **GERON**, Ex aëre inspirato. nam
hic corpori non solum refrigerium, sed etiam nutrimentum spi-
ritui administrat. **MATHESES**, Atqui ego semper existimaui cor-
pus nostrum aëris subsidio indigere? **GERON**, Errasti. nam den-
sa illius moles, crassiore pabulo ex elementorum mistione con-
creto: tenuis autem, & spirituosa essentia, aëria & sui simili susten-
tatur. **MATHESES**, Vnde materia caloris, spiritusq; in nobis co-
gnosci potest? **GERON**, Ex rebus exterioribus. summus enim fer-
uor calorq; igni, præsertim flammæ inest: hæc autem fumus est, aut
essentia aëria accensa, quæ non vno seorsum, sed ambobus con-
iunctis absoluitur. **MATHESES**, Quæ ergo flammæ est materia?
GERON, Fumus. **MATHESES**, Quis opifex? **GERON**, Calor ferui-
dus accedens. **MATHESES**, Quis eam fouet? **GERON**, Aër am-
biens, non crassus, non copioso humore madens, sed tenuis, &
sincerus. sin autem is ita impeditur, vt nequeat liberè calorem ac-
cendere,

cendere, flamma statim coarctata angustius restinguitur, & emarcescit. Vnde constat flammam ex aëre nos ambiente, & tanquam fumosa & pingui materia, quale est in lucerna oleum, foueri. Id enim omnium citissimè inflammatur, quod tenui essentia, multo
 15 aëre, spirituq; perfusa continetur: deinde adeps, & id genus similia, præsertim quæ olei naturam imitantur. Atq; sic omnia, quæ viuunt alunturq;, tribus humoribus sustentantur. primo quidem, olei naturam referente, ad inflammationem idoneo: altero
 20 verò, magis tenui ac fluido, sed non vti prior, inflammationi excitanda accommodato. *MATHESES*, Vnde iste prouenit, & qua in parte subsidet? *GERON*, Ex alimentis. quamuis autem ille ex concoctione iam mutatus fuerit, nondum tamen in corporum viuentium essentiam ex toto conuersus est, occultisq; illorum latebris inhærescit: latine alimentarius dici potest. *MATHESES*, Qualis
 25 tertius humor est? *GERON*, Aquosus, à reliquis diuersus, vt quo tanquam visco, terrenæ corporum partes iunctæ cohæreant, rebus omnibus ex elementorum permistione concretis, communis. Hoc vniuersa inanimatorum genera, vt lapides, aut metalla conglutinata sustententur, non autem alimentari, nec eo, qui oleum refert. nam isti viuentibus duntaxat peculiare sunt, vt vitam caloremq; eorum tueantur. *MATHESES*, Quis humor calorem natium & spiritum alit, ac sustentat? *GERON*, Pinguis, & oleo persimilis, non adeps, quo plurimæ partes oblinuntur, sed alijs longè dissimilis, & aërius, qui simplicium partium essentia
 30 insertus, licet conspectum effugiat, tamen arte secerni potest, atq; is tum spiritus, tum innati caloris fundamentum, primaq; est essentia. *MATHESES*, Quo nomine appellari potest? *GERON*, Primogenius, eò quòd primus sit, & omnium viuentium communis, in quo spiritus calore imbutus, primariò & seorsum consistit,
 35 adeò vt neuter illorum circa huius opem esse, aut diutius perseuerare possit. *MATHESES*, Estne eius generis humor etiam in corporis humani particulis? *GERON*, Est utiq;, in similibus: non solus autem hic pinguis, sed etiam reliqui duo supra dicti, qui tum calorem nostrum, tum vniuscuiusq; solidæ partis essentiam conseruant tuenturq;, verbi gratia, os, quandiu in animante alitur, & caloris vim in se continet, alimentario humore angustis spatijs affuso madescit, aspergiturq;: idem autem præfectum, & ab animante auulsum, ignis ardoribus cedit, statimq; ob humorem illum pinguem, qui inflammationi fouendæ est idoneus, incendi-
 40 tur. quamuis autem is ipse iam incendio fuerit absumptus, ossis tamen robur & firmitas etiamnum superstes manebit, idq; communis illius humoris viscosi beneficio. *MATHESES*, Si triplices

Que citissime in flammam.

Omnis res tribus humoribus constat.

Alimentarius.

Humor primogenius.

*Humor elementaris.
Primogenius.
Alimentarius.*

Vita & mors in quibus consistant

Calor ob frigus interclusus extinguatur.

Animi deliquium quomodo mortem adferat.

Humorum trium corporis differentie.

Primogenius proprie natus.

Simplices particule ex quibus consistant.

Essentia solida.

Carnosa.

simplicium partium humores existunt, quomodo singuli nominantur, & quid habent officij? GERON, Primus elementaris, alter primogenius, tertius nutricius. ac duo quidem propriam simplicium particularum essentiam absoluunt: tertius ascititius quodammodo, & exterior est. Quare dum animal adhuc viuunt, hic quidem absumi siccariq; potest: reliqui verò duo nunquam ex toto, neq; maiori ex parte exhauriri. nam antequam eo discriminis ventum fuerit, spiritus calorq; propria ipsorum materia detracta, marcescit, animalq; vita defungitur. Non enim fieri potest, vt spiritus essentia, calorq; diutius persistat, vbi materia quæ spiritus & caloris peculiaris est sedes, illumq; continet seruatq; dissipata fuerit. ijs autem, qui integra valitudine præditi, intolerabili frigorum vi adeò opprimuntur, vt quamprimum è vita discedant, calor interclusus extinguatur, etiamsi spiritus materia superstes quodammodo maneat. Similiter vehemens animi deliquium hominem inuadens, tum caloris, tum spiritus simul essentiam citra vllam humoris primogenij iacturam, breui dispergit. sin autem essentia spiritus perseveret, calorq; natiuus permaneat, neq; illa consumi, neq; hic dissipari poterit. MATHETES, Quomodo tres isti humores aliàs inter se differunt? GERON, Primogenius, quem peculiarem viuentium esse dixi, à nutricio dissidet, quod ipse statim ab origine prima, essentia nostræ portio quædam existat. ab aqueo autem siue elementari distat, eò quod vterq; licet nobis sit insitus, hic tamen omnium corporum etiam inanimatorum communis, nihil commercij cum calore natiuo & spiritu habeat: ille verò plurimum, vtpote horum sedes & fomentum. MATHETES, Primogenium itaq; præ cæteris natiuum appellare oportet? GERON, Maxime, nos eundem etiam vitale, & salutare humidum, barbarolatini radicale vocant, eò quod spiritus, calor, totiusque vitæ fundamentum sit & pabulum. MATHETES, Ex quibus partes similes constant? GERON, Primum ex elementis, inter se licet non ex toto æquabiliter temperatis. nam aliæ ex alijs plus minusq; assumpserunt: eaq; varietas non cognitione solum, sed etiam sensu deprehendi potest. deinde ex tribus alijs essentijs, nempe solida, carnosa, & spirituosa, vt vulgari more loquar. MATHETES, Quid est solida? GERON, Princeps rudimentum, per quod vniuersis particulis robur & firmamentum suppeditatur, cuiq; reliquæ essentia, tanquam basi innituntur. MATHETES, Quid carnosa? GERON, Quæ solidam vndiq; circumdat, obuallatq;, & spatia inter fibras vacua, quasi rimas explet. At quæ musculorum fibris innascitur, propriè caro appellatur: quæ cordi, iocinori, renibus, lienibus & pul-

& pulmoni *παρὶς χυμῶν*, quasi affusio : quæ intestinis, gulæ, ventriculo, vtero, vtriq; vesicæ, arterijs, venis, nervis, & membranis insidet, communi quoq; vocabulo carnis nominatur, vt sua cuique similiari particulæ tribuatur. *MATHETES*, Ex quot, & quibus solida essentia constat? *GERON*, Ex tribus. primum ex aqueo humore : deinde ex primogenio, vitæ & spiritus veluti fundamento : postremò ex materia carnosa. *MATHETES*, Ex quibus partes omnes corporis aluntur?

Tres solida essentia materia.

GERON, Ex sanguine potissimum, nam is primum ad exteriorum, & exilium venarum, arteriarumq; ora perducitur, elaboraturq; : deinde iam alimenti vice partium essentia influuit, eiq; apponitur : tertio circa partium fibras concrescens, illis adhæret, agglutinaturq; : postremò illis iam assimilatur, & in propriam earum naturam conuertitur. *MATHETES*, Cur naturalis calor simul adest? *GERON*, Quia omne vitale salutare calore continetur, gubernaturq;. quoniam autem ille qualitas existit, totus diuinus cœlestisq; est, & in æthereo spiritu consistit. *MATHETES*, Quæ innati caloris est essentia? *GERON*, Vel carnosa dicta, vel id humorum, quod radicibus inhærens, vitale & primogenium ap-

Partes corporis ex quibus alantur.

Natus calor qualitas.

Innati caloris essentia.

pellatur : quod olei cuiusdam speciem repræsentat. In hoc autem magis vitæ calorem, quàm in illa contineri, rationi est consentaneum. *MATHETES*, Quia de causa? *GERON*, Quia primogenium istud humidum firmum & constans est, in solida fixum essentia, quod non nisi ætate decursa imminui potest : carnosa autem essentia sæpe omni ætate, nunc augeri, nunc detrahi, & extenuari videtur. Illud igitur vbi iacturam fecerit, restitui nequit : carnosa autem essentia, marcore exhausta, iterum resarciri potest. nam magnitudo eius variatur : etsi animans præterea non augetur,

Primogenium humidum, & carnosa essentia, quando immineantur.

MATHETES, Si ergo innatus calor, vitæ opifex tutò nos ad extremum vsq; terminum vitæ moderari debet, in humore ne perpetuo eum perseverare oportet? *GERON*, Certè. *MATHETES*, Vnde igitur, ambo ista deriuantur? *GERON*, Ex semine : sicut carnosa essentia ex materno sanguine. nam in prima fœtus conformatione, dum similes partes gignuntur, semen ipsum primum in

Vitalis calor & humor primogenius vnde deriuantur.

rudimenta quædam sese extendit : deinde verò in accuratam formam transit, & similarium partium adumbrationem quandam lineamentis suis exhibet, quæ quasi fibræ sunt, tenuissimis tanquam araneorum filis contextæ. *MATHETES*, Constans igitur, & verè solida similarium partium essentia ex puro semine est concreta? *GERON*, Vtiq;. hinc deinde sanguis maternus sensim influens, fibrasq; vndiq; circumsidens, illic concreuit, & carnosa efficitur essentia, quæ locis inanibus affusa, inspersaq;, similarium

Similarium essentia diu perseverat.

partium moles euadit. MATHETES, Dic, obsecro, solidior illa partium similarium essentia, eandemne conditionem toto vitæ curriculo retinet, quam ab origine accepit? GERON, Sic arbitror, nam fibræ ex humido liquidoq; semine procreatæ, quamuis diuturnitate temporis magis magisque siccescit, donec ad extremum usque senium, quod aridissimum est, perueniant, semper tamen aliquid humoris istius seminalis, in omnem vitam siue recondunt, siue reseruant: quod ut recens natis infantibus copiosissimum inest, senibus exiguum, sic interiectis ætatibus mediocre. Quantumcunque autem in vitæ terminum reconditur, id spiritum & calorem ex semine secum aduehit, eosque, & sibi, & essentia solidæ perpetuos, ac indissolutos retinet. MATHETES, Quantum intelligo, carnosæ similarium partium essentia à sanguine procedit: solida verò, & quicquid ei inest, siue crassamentum, siue humidum primogenium, siue spiritus, siue calor insitus, à semine. GERON, Rectè intelligis, & si quæ illius portio sit incorrupta, ea quoque seminis naturam plurimum redolet. Adhæc excellens ista caloris nativi essentia, vitæ officina, non ex carnosio sanguinis alimento, sed ex humido primogenio, quod ex semine traxit originem, prouenire solet. MATHETES, Si verbatua assequor, calorem nativum, humidum primogenium, spiritu genuino, & calore perfusum esse definis? GERON, Rem acu tetigisti. Nam id humidum esse puto, cui spiritus & calor ab origine sit inditus, quodque hos conseruat, saluosque retinet. atque sic calor nativus tribus illis simul iunctis ac sociatis continetur. MATHETES, Caloris nativi essentia per omnemne ætatem calida humidaque existit? GERON, Nequaquam, sed in ea, quæ ortui nostro proxima est, validior pleniorque continetur. quamuis autem per infantiam absolutior existat, moderata tamen, beneque temperata esse dicitur. MATHETES, Quæ de causa? GERON, Quia calor in hac summus licet insit, mitis tamen, & omnino blandus, minimeque acris percipitur, eo quod humido sit imbutus: sic etiam de humore sentiendum. nam etsi amplior existat, non tamen diffluit, sed calore coercetur. Ita que summa sunt, ad moderationem quandam acurate contemperantur: ut humor in pueris, & infantibus exuperans, equali quodammodo spiritui & calore sit præditus. Hinc membra ætatis processu vi caloris paulatim siccescunt, simulque roborantur, & crescunt, sic ut non modica humoris portio, in id consumatur. Hippocrates quoque ideam affirmat, dum singula corpora, quæ augescunt, & roborantur, necessario esse calida, prodit: idque humoris illius vi & beneficio: ossa verò, nervi, & membranæ, cum non ulterius sequi, duciue possint, incrementum prorsus desinunt: membra autem

Humor seminalis in quibus copiosus.

Humor primogenius seminis naturam redolet.

Caloris nativi essentia ex humido primogenio.

Quid calor insitus.

Quid humor primogenius.

An calor semper sibi respondeat.

Membra ætate siccescunt.

summa

- summum robur, summasq; ad animales functiones obeundas, vires habent. vnde planè constat, etatem floridam, humidum primogenium iam siccius obtinere. hæc autem media inter extremas sita est, neq; vt senium ingenti siccitate inarescens, neq; vt infantia humore copioso affluens. In qua mediocritate humor, etsi non ad incrementum sufficiat, tamen insitum calorem & spiritum, quantum à primordijs acceperat, quodammodo conseruare potest. **MATHESES**, Insidet ergo calor adolescenti, & infanti æqualis? **GERON**, Sic existimo. nam quantum essentia caloris, perpetuus ille fluor ab ineunte etate dissipauit, tantum rursus qualitatatis & acrimoniae adolescentia generauit, & restituit: eò quòd cum materia sit facta siccior, omnis calor vires suas vehementius edere soleat. Quia igitur essentia exhausta, qualitas increuit, æqualis calor, quantum sensu aestimare licet, illis forsàn attribuitur. At infantis calor natiuus copiosissimus est, isq; blandus, & halitui similis: vnde Hippocrates hominem, si essentia eius spectetur, prima natali die calidissimum esse putauit. **MATHESES**, Quantus iuueni calor inest? **GERON**, Paucus, atq; exilis, eoq; minus reuera calidus est. sin autem qualitas eius aestimetur, acris & vehemens percipitur. contrà infans, qui calidissimus est, simul etiam benè temperatus est, ad vniuersas naturæ functiones obeundas accommodatus: iuuenis autem, si huic comparetur, intemperatus censetur, acri igneoq; donatus calore, qui etiam aduentitius, & exterior appellatur. non quòd à foris accesserit, sed quia temperati limites egressus, extraq; eos positus, non æqualiter ac ille, ad obeunda naturæ munera vires habeat. **MATHESES**, Quid ergò, infantes ne calore natiuo excellunt, iuuenes autem aduentitio? **GERON**, Ita, multò autem magis, qui febri infestantur. in his siquidem calor natiuus, qui iam adest pristino equalis non inest, nedum maior. **MATHESES**, Repetas amābo, quomodo calor natiuus post summum ætatis vigorem mutetur. **GERON**, Qualitas, & acrimonia ipsius marcescit & imminuitur, donec is extremo senio languidus contabescat. omne enim ipsius nutrimentum, ætatis vigore, tanquam incendio flagrat, sic vt ipse iam acerrimus omnia consumens, amplius effundere se nequeat. Quoniam igitur insiti illius, & primogenij humoris essentia, nimis absumpta exhaustaq; æquali calori fouendo non satis est idonea, necessariò accidit, vt dum ille paulatim absumitur, calor quoque simul aboleatur. Quemadmodum enim, vt Hippocrates ait, corpus, postquam arescere inceperit, vergens ad interitum, frigidius efficitur, ita homo postremis vitæ diebus, quò magis contabescit, eò frigidior necessariò redditur, ita sua ipsius ratione ex-

*Etas florida nec
sicca nec humido
nimium.*

*Calor adolescenti
& infanti æqua-
lis.*

*Calor iuuenis
Infantium.*

*Infantes, & iu-
uenes calore vò
differant.*

*Calor post æta-
tis florem.*

tremo die frigidissimus euadit. Atque hoc modo nunc essentia, nunc qualitas caloris innati, etatū progressu ad ruinam declinans, interit. **MATHE.** Si calor nutrimentum, quo ipse conseruatur, absumit, certē ipse interitus sui auctor esse videtur. **GERON.** Fateor: sed cum nihil in rerum natura primariō & per se interitum suum moliri, sed longissimē eum auersari, diuq; persistere desiderat, certē nec ipse calor sua sponte & instituto interitus autor sibi fuerit, sed illum casu, & alterius occasione tulerit. Nam cū aliud quippiam ipse agit, nempe dum humidum conficit, seipsum simul diripit, atq; vastat. Quare eadem ortus nostri & interitus causa existit, & quę nos genuit, moderaturq; ea quoq; tandem nos ad exitium ducit. **MATHESES.** Si summus ætatis vigor, calorem refert tactu acerrimum, senectus autem ignauum & imbecilem, certē mihi videtur consentaneum, vt medio transitu, moderatio quædam caloris percipiatur, qualem in superiori dialogo de temperamentis descripsisti. Cur igitur non similiter declinantium, vt infantium ætatem, temperatis licet ascribere? **GERON.** Quia in hac alia, quā in illa temperati est ratio. ibi temperaturas tactu, & secundum qualitatem, hīc pro essentiæ copia metimur ac iudicamus. Quę enim ætas iuuentuti succedit, calorem temperatum, si ex tactu iudicare velimus, obtinet: quamuis nec copiosum nec ei similem, qui summē expetitur, & in omni vita laudatur. qualis etiā in infantibus abundat, naturę functionibus maximē accommodatus. hæc nanq; ætas eius humidi facultate pollet, quod tum naturæ est gratissimum, tum calori affine, temperiem conciliat, subsidiumq; ad peragendas actiones adfert. altera verō quamuis sicciore alscititio calore existat, tamen contactu mediocri apparet. **MATHESES.** Quicunq; igitur calor natiuus integer est & valens, is semperne etiam erit temperatus? **GERON.** Nullo pacto. quamuis enim sensus iudicio temperatus affirmetur, non statim tamen genuinus, & naturæ nostræ familiaris erit. tanta nanq; humidi primogenij & caloris societas existit, vt mutuas semper operas conferant, & neutrum citra alterius opem aliquid efficere possit. Licet enim æqualis quodammodo iuueni & puero calor insideat, ille tamen naturæ operibus obscurior, & infirmior, quā in illis existit, eò quòd exhausto humore, aliqua ex parte factus sit aridior. **MATHE.** Quid audio? humor insitus, eque ac calor ad naturæ opem confert? **GERON.** Nimirum: sed certē mutatio quæ per ætates incidit, diuersos illos esse declarat, eò quòd altero perseuerante, alter sensim dissipetur. adhæc quòd humidum, caloris tanquam fomentum sit & pabulum: item quòd calor illius beneficio sustineatur, nec non quòd ille tanquam præcipuus auctor existat:

Eadem causa ortus, & interitus.

Declinantium et infantium ætates cur non similiter temperate.

Calor natiuus integer, an etiam temperatus.

Humidi primogenij & caloris societas.

Humor insitus etiam naturæ opera iuuat.

- existat: humor autem vt materia calori subijciatur, magisq; afficiatur. *MATHESES*, Id quæso magis declares. *GERON*, Quibus natiuus calor magna frigoris vi subito extinguitur, quod hyeme per alpes iter facientibus, tempestate aquilonea accidere solet, humidum primogenium ijs verè superstes manet. nihil enim ipsum tam subito, et insperata repentinaq; morte potest abolere. Contra si calor maneat incolumis, humidum euanescere, dissoluiq; nequit. at qui extrema senectæ confecti, naturæ necessitate mortem oppetunt, ijs humor innatus, vnà cum calore extinguitur, vt nihil illius, aut certè perexiguum, quod hunc conseruare satis possit, reliquum supersit. Idem accidit in ijs, qui tabifica febri arêscen-
Calor natiuus in quibus extinguitur, humido primogenio saluo.
Calore manente, humidum etiam manet superstes.
In senectâ & calor & humidum interit.
Calor genuinus cui hyeme abundat.
Caloris mutatio in æstate.
Caloris qualitas quomodo per anni tempora mutetur.
Vt anni tempora, sic ætates calorem mutant.
- tes, morte intereunt immatura. *MATHESES*, Qua alia ratione calor iste genuinus commutatur? *GERON*, Ex ætatum, anniq; temporum, & regionum varietate. nam hyeme, copiosa illius est sentia nobis inest: æstate verò ipsa dispergitur. *MATHESES*, Quare per hyemem abundat? *GERON*, Quia frigus aëris nos ambientis, dum corpora attingit, calorem vnà cum sanguine & spiritu, quorum ille comes est, ad interiora repellit, summæq; cutis meatus astringens, caloris essentiam ita cogit, coërcetq; vt nihil, aut
 20 minimum eius possit effluere: atq; sic illa, dum vires intimis partibus infert, multò quàm prius, valentior euadit. E contrario, per æstatem aëris circumflui feruor, spiracula corporis nostri soluit, interioresq; tum spiritus, tum humores foràs adedò elicit, vt plurimum sanè caloris essentia in extrema digeri, & dissipari, parum
 25 autem intus retineri soleat: vere, & autumno, moderato quodammodo habeat. *MATHESES*, Si igitur anni tempora hoc pacto caloris essentiam augent, minuuntq;, quomodo eiusdem qualitatem commutant? *GERON*, Æstas quidem caloris genuini, qui exiguus nobis inest, essentiam torret, efficitq; vt ea quæ antea fuerat temperata, euadat aduentitia, naturæ metas plerunque excedens: hyems verò frigoris sæuitia, eandem nihilo quidem frigidiorē reddit, sed priori in statu relinquit, præsertim in corporibus copioso sanguine, & calore præditis: exanguib; autem, vt frigus tunc magnas adfert iniurias, sic plerunq; natiuum extinguit calorem. imò sicut etiam in hominibus omnes exteriores saltem partes refrigerat, ita vniuersos corpore imbecillos, sensu motuq; priuat, aut prorsus è medio tollit. *MATHESES*, Videntur mihi anni tempora, eandem ferè caloris mutationem adferre, quam ætatum variatio. *GERON*, Non longè à vero abes. siquidem innatus calor extrema hyemis parte, sicut in ætate prima copiosissimus deprehenditur: vere autem eam rationem, quam in pueritia & adolescentia seruat: æstate, quam in ætate florenti:

in autumno, quia æstate valde fuit dispersus, paucos admodum est, minusq̃ acris, quàm in æstate. qua de causa calor in autumno ei respondet, qui in ætate iam inclinante inesse solet. in fine autem autumni, & hyemis initio, modicus in nobis calor adest: qui, cùm corpus nostrum tunc etiam laxum sit & apertum, ex facili refrigerat, eiq̃ propemodum respondet, qui extremam senectutem leuiter sustentat. **MATHETES**, Eodémne modo calor in quauis regione habet? **GERON**, Nequaquam. quò enim magis ad austrum, regionemq̃ torridam homines habitant, eò pauciorum quidem calorem natiuum, sed acriorem obtinent. **E** diuerso, 5
quantò magis regio ad septentrionem vergit, tantò magis calor innatus abundat, beneq̃ temperatus est, nisi fortè in vltimis terrarè locis, vbi vix vllum animal hyeme præ frigoris sæuitia, viuere potest. **MATHETES**, Quì sit, quòd veteres hyeme calorem genuinum copiosorem, quàm in æstate nobis inesse scribant? augeturne tunc ea partium solidarum essentia, quæ olim à semine processit? **GERON**, Non simpliciter sententia hæc intelligi debet. nam cùm corpus nostrum perpetuò essentia sue fluore paulatim digeratur, dissoluaturq̃, eò quòd ingenita senij & interitus necessitas nobis insit. certè aliquid ex ipso calore insito continuè decedit, non solum per maiores etatum decursus, sed etià quibusdam anni temporibus, tum calidis, tum frigidis. **Q**uamuis enim aer nos ambiens, minus hyeme quàm æstate calorem nostrum dissipet, tamen hic non minus etiam tunc alimentum suum depascit, absumentq̃. Adhæc licet insitus calor per hyemem magis concoquat, bonumq̃ succum copiosorem partibus nutriendis subministret, humidiq̃ natiui portionem perpetuo illo fluore amissam reficiat instauretq̃: tamen quicquid accesserit ad recreationem, plurimum ab eius integritate deficit, quòd dissipatū est, aut à semine olim comparatum. aliàs animal non interiret, proinde 30
semper aliquid de calore nostro detrahitur: neq̃ ille hyeme vberior esse, quàm æstate prægressa potest: sicut neq̃ in florente ætate, ex optimis alimentis æqualis ei comparari, quem infantium ætas repræsentabat. Ne autem Hippocratem & veteres perpetuam dixisse putes, dum scribunt: Ventres hyeme & vere natura esse 35
se calidissimos, hoc tibi notandum esse censeo, illos insitum calorem non appellare puram eam essentiam, quam solidæ partes à semine obtinuerunt: sed vel istam, quæ plenioris alimenti commercio impurius iam facta, auctaq̃ fuerit: vel quamlibet moderato mitiq̃ calore præditam, siue ea corporis nostri pars, siue minus extiterit. **H**ac ratione tum sanguis, tum articularum spiritus, ipsaq̃ moles corporis, caloris insiti essentia existunt, sic vt eodem

*Caloris mutatio
pro regionum
varietate.*

*Veterum sententia
de calore
natiui in hyeme.*

*Perpetuus
caloris
essentia
ac
fluxus.*

*Essentia caloris
an hyeme
vberior
quàm æstate.*

*Veteres quid
calorem
natiuum
appellent.*

- dem nature vocabulo interdum nominantur. Sic quoq; puberes & adoleſcentes, plus calidi quàm infantes & pueros obtinere, rectè dicimus. **MATHEſ**, Eſtne calidum hoc purum, de quo ſuprà meministi? **GERON**, Non eſt purum, neq; innatum illud, quod nobis ſemen à prima origine indidit. **MATHEſ**, Bi-
 5 riam igitur natiui caloris eſſentia dicitur? **GERON**, Ita, aut enim purior illa ſolidarum partium, à ſemine profecta: aut ea ipſa, quæ nutritione auctior impurioreq; adultis facta eſt: nec non quælibet liquida materia, mediocri calore prædita, ſiue ea ſanguis, ſiue ſpi-
 10 ritus exiſtat. Hac de cauſa creſcentium ætas, & hyems, plurimum habere caloris innati, vna eademq; nominis ratione dici non poſſunt. **MATHEſ**, Cùm iam ſingulas partes ſimilares, quàm diu animal vixerit, natiuo calore, & proprio ſpiritu præditaſ eſſe, eorumq; auxilio indigere docueris, dicetiam, num omnes vno eodemq; temperamento conſtent? **GERON**, Minimè: ſed os neruo
 15 eſt frigidius, ſicciorq; hic, ſicut & membrana, carne frigidior atq; ſiccior. **MATHEſ**, Eodemne modo partes compolitæ inter ſe habent? **GERON**, Cùm ex ſimplicium, quibus conſtant, permiſtione generentur, in his quoq; diuerſa temperamenti lex atq; ratio exiſtit. Ideo ſpiritus, qui oſi ineſt, ab eo qui in neruo continetur, differt: hic ruruſ ab eo, qui carnis moderator eſt. Sic humidum primogenium, ipſaq; caloris inſiti eſſentia, alia oſi donata eſt, alia neruo, alia carni, ſicut & vnicuiq; parti ſimilari. **MATHEſ**, Vnde in his varietas profecta eſt? **GERON**, Non modò ex eſſentia
 25 tiæ copia, ſed etiam ex primorum elementorum, vnde conſtant, temperatione. Qui partium functiones diligenter aduertit: item quòd neq; os nerui, neq; neruus carnis eſſentiam gignere, aut reſarcire poſſit, neq; è contrario: ſtatim is cauſas illarum effectrices, tota ſpecie, pariq; intervallo diſiunget. **MATHEſ**, Dic obſecro, quæ
 30 nam ſunt iſtæ? **GERON**, Spiritus, & innatus calor, quibus naturæ eſſentia abſoluitur: eoq; tot ſpirituum inſitorum, totq; humorum, calidorum, & naturarum varietates ſtatuuntur, quot partium ſimilarium differentia numero exiſtunt, vt ſua cuiuſq; partiuſ hæc ſint: reliquorum nulli eadem proruſ impertiantur. **MATHEſ**, Hæc mihi paulò obſcuriora ſunt, quàm vt poſſim aſſequi: quare te oro, vt reddaſ clariora. **GERON**, Principes corporis partes, iecur, cor, cerebrum, tum natura, tum ſpiritu efficaci pol-
 35 lent, vt non ſolùm ſe ipſaſ gubernare, ſed etiam alioſ ſpirituſ à ſe, tanquam perenni fonte, propriuſ riuuſ in corpus vniuerſum deducere poſſint. hiſ, inquam, genuini ſingularum partium ſpirituſ aluntur: hiſ vires illarum incitate, firmas perpetuè ſuas actioneſ edunt. **MATHEſ**, Quid audio? aliq;ne ſunt partium ſpirituſ,

*Duplex calor
natiui eſſentia
appellatio.*

*Partes ſimilares
non eodem om-
nes conſtant tem-
peramento.*

*Compoſitarum
partium tempera-
ture etiam in ſe
diuerſæ.*

*Functionum par-
tium cauſæ.*

*Spirituſ.
Calor innatuſ.*

Principes partes.

SPIRITVS
influentes.

Naturalis.

Vitalis.

Animalis.

Spirituum in-
fluentium vsus.

Partium disse-
rentia principis.

Seruula.

Principum facul-
tates, reliquis
partes omnes gu-
bernant.

Tres spiritus in-
fluentes ad quas
partes perueni-
unt.

SPIRITVM
influentium ge-
neratio.

Naturalis.

Vitalis.

quàm genuini, quos firmos, & singulis illis infixos esse dixisti.

GERON, Sunt utiq; tres adhuc, quos errantes, vagos, & in-
fluentes nominant. vnus sanè naturalis, qui ex iecore per venas,
in extimas corporis partes deducitur: alter vitalis, quem cor per
arterias continuè emittit: tertius animalis, qui in cerebri ventri-
culis generatus, per nervos in partes sensus motusq; participes
distribuitur. MATHETES, Ad quid influentes isti spiritus requi-
runtur? GERON, Vt calorem, spiritumq; natium, & vires ab ori-
gine datas retineant. nam omnes isti citra illorum subsidia, breui
conciderent, utpote principalium partium viribus & fauore de-
stituti. Cùm itaq; aliæ corporis partes principes existant, vt cere-
brum, iecur, cor, testesq;: aliæ illarum soboles, & quasi seruulæ, vt
nervi, arteriæ, venæ, vasaq; seminaria, ab harum facultatibus il-
linc influxus, reliquæ omnes partes gubernantur, aliæ manifesti-
us, vt musculus: aliæ obscurius, vt ossa, cartilagine, ligamenta. 15
Quamuis enim neq; vena, neq; arteria hisce partibus inseratur,
tamen in has illas deriuari, assidua earum nutritio satis demon-
strat: imò neq; vita sine caloris spiritusq; naturalis influxu persi-
stere, & durare potest. MATHET. Nulla igitur pars suis ipsius vi-
ribus duntaxat gubernari potest? GERON, Non: nisi fortè per la-
tentes obscurosq; meatus, vt musculi & viscera interiora, regatur. 20
hæc enim, sicut copiosiores spiritus viresq; acceperunt, ita venis,
arterijs, atq; nervis indigent, quibus euident ac manifesta fiat gu-
bernatio. MATHETES, Tres igitur isti spiritus, vitalis, naturalis,
& animalis, ad omnes corporis partes distribuuntur? GERON, 25
Vitalis quidem, & naturalis ad omnes peruenit, etiam vbi neq;
vena, neque arteria existit, vt quarum adminiculo non vbique
opus sit: animalis autem nusquam citra nervos, aut eorum fibras
contineri, aut vires suas exercere potest. vnde natura rectè illo-
rum distributionem instituit: eò quòd singulæ partes, nutrimen-
to & vita, non autem sensu & motu indigant. 30

MATHETES, Cùm multa iam de spiritibus & calore insito
attuleris, ne te pigeat obsecro, mi præceptor, mihi etiam indicare,
vnde, & quomodo ipsi generentur? GERON, Naturalis sanè spiri-
tus à tenuiori sanguinis essentia, vaporis speciem quodammodo 35
referentis, gignitur: reliquo sanguine tantò præstantior, quantò
genuina facultas iecoris, molem eius præcellit. MATHETES, Vn-
de spiritus vitalis provenit? GERON, Cùm naturalis spiritus per
venam cauam, vnà cum sanguine elatus inuectusq; in cor fuerit,
illic denuo caloris efficacia magis elaboratus extenuatusq;, in æ- 40
ris propè speciem transit, atq; ex dextro cordis sinu, in sinistrum
per communes, & eosq; artissimos aditus permeat: vbi hausto per
pul-

- pulmones aëre, materia quædam nascitur, cui calor & facultas vitalis concessa, spiritum illum vitalem gignit, qui per totius corporis arterias distribuitur, propagaturq̃. *MATHESES*, Vnde animalis procreatur? *GERON*, Ex portione vitalis, quæ per ceruicis arterias in cerebri basim peruenit, tertio plexus illius admirabilis anfractu elaborata, in ventriculos illius per alium plexum choroidem dictum, infertur: illic exhausto per nares confectoq̃ aëre, nutrimentum augmentumq̃ recipit, & vi propria spiritus cerebro ingeni, quodammodo conuersa, animalis efficitur, qui ætheris naturam planè imitetur, ad motum sensumq̃ & omnes animæ functiones aptè comparatus. Itaq̃ vapor ille sanguinis in iocino-
 10 re natus, cum vitali animaliq̃ spiritu sese quasi in alimentum exhibeat, merito primum locum sibi vendicat. *MATHESES*, Quomodo spiritus isti inter se differunt? *GERON*, Quando vitalis naturali, tantò animalis vitali tenuior existit, etenim primus vapor, secundus aëri, tertius ætheris essentiæ respondet. Hæc autem spirituum varietas efficit, vt non omnes vnus eiusdemq̃ sint naturæ: quanquam eodem genere, communiq̃ appellatione comprehendantur. *MATHESES*, Quid singularis officij spiritus naturalis præter alios obtinet? *GERON*, Primum se facultati propriæ
 20 vehiculum offert: deinde alimentum ei spiritui alendo præbet, qui singulis partibus simplicibus peculiariter est congenitus. siquidem vniuscuiusq̃ partis similis essentiæ, familiari ac idoneo fouere alimento conuenit. Porro crassior, magisq̃ concreta eius humoris, qui per ora venarum in vacuas partiū regiones, tanquam ros aliquis confluit, portio solidæ essentiæ crassamentum in alimoniam sibi allicit, iungitq̃: tenuior autem, & olei cuiusdam particeps, humidum primogenium fouet, alitq̃. Vapor illinc sublatus vnà cum naturali spiritu, & aëre circumfluo, per arterias
 30 quando attolluntur, transmissio, ingentium partis cuiusque spiritum continet. Reliqua similis partis essentia id sibi in alimentum attrahit, quod in affluenti humore medium inter vaporem, & crassamentum existit: eoq̃ vnus sanguis, toti particulæ similari alendæ sufficere dicitur, sed ita, vt singula suis conuenientia aptaque semper accommodentur.
- MATHESES*, Corpus humanum, & quæ illi insunt, plenè
 40 satis iam mihi indicasti, humanissime præceptor: quid autem natura, quid animus propriè dicatur, nondum ex te audiui. *GERON*, Est illa vis primaria, causaq̃ corporis nostri opifex, & conseruatorix, *DEI OPT. MAX.* vicaria. Quippe ipsa huius obtemperans voluntati & imperio, non modò hominè conformat, sed etiam longissimè gubernat, sua singulis partibus officia & functiones præ-

*Animalis.**Naturalis spiritus primus omnium.**Naturalis spiritus officium.**Crassamentum solidæ essentiæ.**Vapor.**Sanguis.**NATURA.**Natura Dei vicaria.*

*Naturæ essen-
tia.*

*Cui naturæ no-
men imponen-
dum.*

*Propria naturæ
essentia.*

*Veterum opinio
de natura.*

*Crassamentum
solidarum par-
tium.*

scribens. MATHETES, Quæ eius est essentia? GERON, Vis & po-
testas caloris, à qua omnis effectus, & opus provenit. MATHETES,
Qualitasne caloris sola illarum auctor esse poterit? GERON, Ne-
quaquam. neque enim vel intensior facta, integras magis & fir-
mas actiones continuo obire potest, nisi etiam essentia ipsius si-
mul increuerit. Non igitur naturæ nomen moderato cuiq; calo-
ri, qui vel in sanguine, vel in alio quodam humore, vel in spiritu,
vel in corporis essentia situs est, imponi (nisi forsan ambigua, &
lata nimis appellatione) potest, sed in sito spiritui, quicunq; is fue-
rit, aptius conuenit. Atque ideo propriè dicitur naturæ essen-
tia natiuus calor, qualis suprâ est descriptus. is nanque animal
ab initio conformat, auget, & ceu omnium naturalium ope-
rum auctor nutrit. MATHETES, Quæ igitur naturæ vocabu-
lo continentur? GERON, Humidum primogenium, spiritus,
& calor: omnia sanè vnâ eandemq; originem ex semine fortita
prognataq;. Veteres naturam ex spiritu, carnosa specie, & solidis
ipsis simul iunctis, constare affirmarunt: quæ tamen ea potius fu-
it, vnde vires sustinentur, quàm ipsa natura: maximè cum carno-
sa species non sit ex semine procreata. MATHETES, Ex hocne igi-
tur prodijt natura? GERON, Indubiè. non autem carni est ingeni-
ta, sed in hanc ex solida essentia, quæ ei peculiaris est, immittitur,
consistitq; in illius crassamento, tanquam materia. At hæc ipsa
principia, etsi fortè simplicia sensu videantur, cogitatione tamen
ex primis elementis, originem illorum præcedentibus, constant.
Quippe crassamentum solidarum partium ipsis subiectum, ex
densis terrestribusq; elementis magna ex parte conditum est,
non tamen subtilium prorsus expers. ac natura ipsius humido
primogenio, & spiritu, caloreq; natiuo perficitur: quæ etsi æris
& ignis plurimum, tamen etiam terræ & aquæ non nihil, licet mi-
nimum acceperunt. Ideo quoq; natura temperamentum in spiri-
tu & humido primogenio factum, nonnullis dicitur: quod cum
excellens caloris vincit, calidum etiam innatum appellatur.
MATHETES, Quæ præter harum corporis partium notitiam,
medico adhuc necessaria esse putas? GERON, Cum homo non so-
lùm corpore, sed etiam anima constet, non alienum mihi vide-
tur, etiam de hac aliquid commemorari, sed non vltius, quàm
medicinæ ex vsu sit, omnibus abstrusis & occultis philosopho-
rum quæstionibus omisis. MATHETES, Id obnixè te rogo, nam
ab adolescentia vsq; semper spinosas istas disputationes, quæ non
nisi ostentandi gratia fieri solent, odio habui. satis mihi fore puto,
si quid anima sit, quæq; eius essentia: item quot genera & species,
quot partes, & facultates existant, intelligam. GERON, Optime
sentis

sentis, mi Mathetes: eoque rem ipsam aggrediar, & qua potero breuitate absoluam.

Anima est viui corporis principium, & functionum eius auctori: aut si mauis, instrumentarij corporis perfectio. quandiu enim

ANIMA
quid.

5 corpus viuut, tum distribuendo accommodata, sine quibus neque nutriri, neque viuere possit. Quicquid ergo illi alimentum, vitam, actionesque vitales, & rationem intellectumque induxerit, anima censetur. Essentia eius est splendida, ætherea, simplex, incor-

10 pore, & immortalis. MATHETES, Quot animæ sunt genera? GERON, Tria, naturale, sentiens, & intelligens. MATHETES, Quot ipsius species? GERON, Totidem, iisdem nominibus appellatae, naturalis, sentiens, intelligensque. his quoque respondent viuuentium genera, stirps, brutum, & homo. MATHETES, In quo à

*Animæ genero
& species.*
Naturalis.
Sentiens.
Intelligens.

15 generibus differunt? GERON, In eo, quod ipsæ separatim subsistant, & nunquam consociari possint, sed singulae proprium nomen animæ habeant. Stirpium enim naturalis ea est, à qua ille animatae dicuntur, licet non sint animalia. Brutorum propria, sentiens ea est, quæ non tantum animata, sed etiam animalia efficit:

*Sentiens anima
brutorum.*

20 intelligens autem ea, quæ hominis mentem generat. Atque hæc animæ partes sic inuicem sunt disiunctæ, vt intelligens hominis anima, non sit sentiens, neque hæc beluis dicata, sit naturalis, sentiensque anima: vel sentiens & naturalis, eidem simul inesse queat.

*Stirpium natu-
ralis.*
*Intelligens ho-
minis.*

MATHETES, Possuntne tres istæ partes animæ, intelligens, sentiens, & naturalis, in homine quodammodo deprehendi? GERON, Possunt vt partes, non autem vt genera: atque adeo inter se connectæ sunt, vt dissolui nunquam possint, sed omnia cuique animanti simul inhereant, idque non actione, sed potestate duntaxat. atque hæc est animæ partium ratio. MATHETES, Quid vocas in ani-

30 mantibus, appetens, intelligens, & ad locum mouens? GERON, Non genera, neque partes animæ, sed vnius eiusdemque partis facultates, nempe eius quæ sentiens dicitur. hæc verò adeo inter se coniunctæ sunt, vt dissolui nunquam valeant, sed omnes singulis animantibus pariter inhereant. MATHETES, Hoc exponas manifestius.

Facultates.
Appetens.
Intelligens.
Mouens.

35 GERON, Tactus omnium animantium communis est, & quicquid huius compos est, statim etiam voluptatis & doloris particeps est, potestque res noxias à salutaribus secernere, & desiderio quodam has accedere, metu illas vitare. vnde quicquid sensu villo prædicitum est, id etiam appetitu quodam donatum est.

Tactus.

40 Cum autem res salutaris sensu proprio percepta, in communem relata fuerit, tunc voluptatis & summæ delectationis comprehensio orietur: hæc deinde appetitum excitabit. Sic animal com-

Sensile appetit.

*Vna pars animæ
multas facultates
habere potest.*

præhensione & appetitu impulsum, eò trahitur, moueturq; vt optata consequatur obtineatq;. vnde pars animæ sensu prædita, eadem simul, & imaginationis, & appetitionis, & motus facultates habet: id quod non solum perfectiora animantia, sed etiam muscæ, vermes, insecta, & id genus alia testantur. quæ licet vitæ stabili in sede agant, tamen ista punctaq; in sese contorquentur: letorum autem occursum, diffunduntur: quod fieri non posset, nisi tum sensu, tum motu essent prædita. **MATHESES**, Videris noua quædam animi genera constituere, dum appetens, cogitans, & ad locum mouens nominas? **GERON**, Nequaquam, sed cum ea sentienti animæ semper insint, alsideantq; ad hoc ipsum genus pertinent, cuius vires & facultates rectè dici possunt. **MATHESES**, Quare? **GERON**, Quia illæ vires sunt, & potestates, quas anima tanquam è domicilio suo exierit, operibusq; obeundis suppeditat, hinc sæpè vnaquæq; animi pars, facultatis appellatio-
ne describitur. ideo non animæ essentia, sed viribus nomen facultatis attribuendum est. Quanq; autem opera facultatibus accepta communiter referantur: tamen ea primum ab animæ essentia provenire censemus, quæ simul facultates, ad illa obeunda impellit. Nam vna animæ essentia, multis facultatibus viribusq; se effundit, atq; declarat. verbi gratia: Aloë facultatem purgandi, ventrem corroborandi, conglutinandi vulnera, & cicatricis obducendæ vires obtinet. **MATHESES**, Vna igitur animæ essentia complura edit opera? **GERON**, Indubiè, nec non varias istis obeundis facultates accommodat, ita vt sua cuiusq; operis sit facultas, non autem diuersa vnius eiusdemq; facultatis opera. quot autem hæc sunt, tot etiam facultates esse oportet: ac quot illorum differentia, totidem quoq; harum recensentur. Si igitur anima simplici constat essentia, alijs alijsq; motibus varia efficit opera, varias quoq; illis peragendis vires, facultatesq; ceu instrumenta confert: quibus multifariam se exhibens, diuersos effectus edit. **MATHESES**, Facultates istæ, suntne animæ essentia, aut aliqua ipsius pars? **GERON**, Nullo pacto. nam illæ interdum abolentur, pereuntq; integra animæ essentia. quippe facultas & vis augescendi, post vigorem annis confirmatum intercidit, & quæ florente ætate constans fuerat, certum interitus tempus habet, tamen si eadem animæ essentia super sit. **MATHESES**, In quo igitur facultas animæ, à parte eius potissimum differt? **GERON**, Quòd illa ab animæ essentia separari, hæc nulla queat, nisi tota simul anima aboleatur. adhæc facultas licet animæ sit ingenita: tamen accidit, inhæretq; pars autem animæ essentia est, & quædam illius ceu portio. **MATHESES**, Quot nunc singularum animæ partium facultates

Vires & facultates.

*Opera primum
ab animæ essen-
tia proveniunt.*

*Vna animæ essen-
tia multas effun-
dit facultates.*

*Vnius animæ es-
sentia varia ope-
ra, variæq; facul-
tates.*

*Non vnius fa-
cultatis diuersa
opera.
Quot opera, tot
facultates exis-
stunt.*

*Facultates non
sunt essentia.*

*Facultas à parte
animæ quid dif-
ferat.*

- facultates, & quot earum differentiæ sunt? GERON, Singula opera effectione quadam absoluuntur, prodeuntq; in lucem: atq; illa efficientis motus est. Quamobrem efficientem quandam vim, aut fortasse plures, opus præcedere oportet, quarum vna tamen tantumquam primaria, aut princeps causa statuatur. MATHETES, Quænam ea est? GERON, Anima, quæ cum omnibus, quæ nobis insunt, vi & efficacia præstet, proprijs facultatibus, quasi causis auxiliarijs, instrumentisq; tum corporeis, tum incorporeis, ad omnia sua opera obeunda vitur: facultates autem proximæ, & continententes, operum causæ sunt. MATHETES, Quæ omnium animæ partium prima statuitur? GERON, Quæ omnium viuentium communis, natura & pars eius naturalis dicta, solas stirpes regit atq; gubernat. MATHETES, Quot huius naturalis facultates sunt? GERON, Tres, sicut & tria opera, in omni tum stirpium, tum animantium genere, quæ vitiosa ac defecta non sunt, vt procreatio, nutritio, & accretio. MATHETES, Quæ sunt ipsius operum? GERON, Stirps est semine assurgens, aut foetus, qui gestatur utero, fingiturq; stirps, aut animal augescens, salubritas, & vitæ conseruatio. MATHETES, Quot, & quæ illis præsunt facultates effectrices? GERON, Tres, vt procreatrix, altrix, & auctrix. MATHETES, Quo tempore singulæ dominantur? GERON, Cum foemina gestat foetum: quamuis omnes in commune idemq; opus conspiciant, tamen vis illa procreatrix dominatur præcipuè, edito iam partu, ea languescit, statimq; aboletur. vbi dentes infans ediderit, & nulla deinde pars gigni videtur, hæc dentium duntaxat gignendorum gratia manet incolumis: postea accrescendi facultas viget, donec ad statum certumq; magnitudinis modum infantem prouexerit. reliquo vitæ tempore sola altrix vincit: quæ cum vitæ totius sit comes & conseruatrici, primis illa ætatibus aliarum duntaxat seruula & auxiliaria fuerat, sicut in vtero auctrix procreatrici subsidio venerat. Prima igitur feminis natura tribus illis facultatibus, quas inde naturales appellarunt, ab origine sua est instructa. atque variæ hæc vires, quæ proprijs se operibus declarant, ex vna eademq; animæ parte proueniunt. MATHETES, Si foetus in vtero tribus illis continetur: editus autem in lucem, donec adoleuerit, duabus: vnica verò reliquo vitæ spatio: quoniam illæ discidunt: pereuntne, an illic adhuc ignauæ, & quasi feriatae iacent? GERON, Vna sanè facultatum essentia, ad summum vsque vitæ diem persistit, suisq; ipsa viribus integra manet. Nam primo genito editoq; iam animali, procreandi vis perseverat. quia verò prima illa feminis natura, idoneo materiæ cuiusdam & caloris adminiculo, ad vires suas exprimendas indiget, ne quo nihil, vel

Singularum animæ partium facultates quæ.

Causa efficiens opus præcedit.

Prima pars animæ naturalis dicitur.

Naturalis partis animæ facultates.

Procreatio. Nutritio. Accretio.

Animæ naturalis opera.

Facultates quando singulæ dominantur.

Prima feminis natura tribus facultatibus donata.

Facultates animæ in tereant.

minimum efficere potest: tunc certè, cùm corporis integritas aut
 mutilata erit & violata, aut materia ad effectiorem descenderit: illa
 vacabit, sinemq; operi imponet. Exempli gratia: Senio confectus,
 quia effectum iam corpus adeptus est, augescendi, aut partes no-
 uas gignendi facultatem amisisse dicitur, & naturalis animæ pars
 ei inlita, quamuis illæsa forsan statuatur, intercepta tamen est, &
 corporis vitijs impedita. *MATHE T.* Naturales iam facultates asse-
 quor: quænam sunt, & quot earum partes? *GERON*, Procreatri-
 cis sanè duæ, commutatio, & conformatio. Cùm enim quælibet
 materia in alteram degeneret, vt semen in os, aut cartilaginem, aut
 neruum: necesse est, vt propria ipsius essentia immutetur (alio-
 quin eadem maneret) ipsaq; in idoneam & conuenientem naturæ
 suæ figuram conformetur. atq; ita duæ hæ procreandi facultatis
 partes, non species, illam perfectè absoluunt. vna enim membris
 cuiusq; essentiam, qualis apparet, ex semine produxit: altera figu-
 ram illi, compagemq; & situm proprijs vsibus idoneum, contulit.
 Quot igitur similarium particularum essentiæ nobis insunt, toti-
 dem immutatricis illius partis species numerandæ sunt, quæ su-
 am singulæ essentiam, propria quadam immutatione exprimunt.
 quippe alia ossis, alia nerui essentiam absoluit: nec non propria
 quædam facultas suam cuiq; parti essentiam ingenuit, cui nomen
 à partis natura imponere liceat. *MATHE TES*, Quod proprium
 munus procreatrix facultas obtinet? *GERON*, Vt partes singulas,
 ipsumq; adeò fortum perficiat. *MATHE TES*, Facultas quæ in ad-
 ultis semen conficit, & ad fœtus generationem confectum, exhibet,
 procreatrixne dici meretur? *GERON*, Non arbitror. nam si
 hoc fieret, ea vis, quæ vel sanguinem, vel lac generaret, procrea-
 trix quoq; dici posset. ideo neq; is qui semen confert, generator
 propriè nuncupari potest: vt qui fœtus particulas non effingat,
 aut in lucem edat. *MATHE TES*, Quæ facultas hanc sequitur? *GE-
 RON*, Altrix, quæ alimentum adductum, in corporis essentiam
 conuertit, eiq; assimilât. Cùm enim illa alsiduo fluore, varijs ex
 causis continenter diffuat, ac digeratur, neque tamen alimenta
 statim ipsam consumi, & consensescere sinant, proprium certè al-
 tricis facultatis munus est, vt nouæ aliquid essentiæ in disperdi-
 tæ locum restituat: quod sanè vel æquale sit ei quod effluxit, vel
 ipso copiosius, vel angustius. *MATHE TES*, Qua actione id effici-
 tur? *GERON*, Nutritione, qua adiectum alimentum in corporis
 essentiam conuertitur, assimilaturq;. *MATHE TES*, Quotuplex est
 nutritio? *GERON*, Triplex deprehenditur: vna priorem corpo-
 ris habitum cōseruat: altera extenuat: tertia crassiores efficit.
 Oportet enim q̃. odus animal donec vitam agit, quodammodo
 nutri-

*Naturalium fa-
cultatum partes.*

*Procreatricis fa-
cultatis munus.*

Altrix facultas.

*Continuus essen-
tiæ nostræ fluor.*

Nutritio triplex

nutriri, siue fecunda, siue aduersa valetudo ei contigerit. nunquam enimATRIX illa facultas otatur, vt quam planè naturalem esse constet. MATHETES, At ego putabam corpori nihil posse reddi simile, quod non plenè conuersum esset, & immutatum;

5 GERON, Rectè dicis: sed immutatio, nutritio est: eoq; hæc nihil aliud erit, quàm procreatio, in qua portio quædam corporis essentia ex alimento, tanquam materia progignitur. MATHETES, *Auatrix facula* Quæ auatrix facultas est? GERON, Quæ corpus vniuersum *144.* in omnem partem distendit, & dilatat. ipsa autem illius functio

10 corporis est accrementum, quo id vndiq; extenditur, & amplificatur. MATHETES, Dicitur ne etiam incrementum, si pars aliqua in maiorem carnis molem, tumoremq; attollatur? GERON, Non, quia tota incrementi ratio ad solidas tantum partes, præsertim ad ossa spectat. nam si hæc crescunt, totum simul animal augetur,

15 licet id ipsum tunc fortassis macie contabescat. MATHET, Quando autem corpora vndique dilatari dicuntur? GERON, Cum in longitudinem, latitudinemq;, & altitudinem distenduntur: quod solius naturæ est officium. Nulla siquidem ars corpus quamuis tenerum, atq; sequax in omnem partem continuatione integra

20 potest amplificare: sed si longius euadat, necessariò fiet gracilius.

MATHETES, Quid igitur propriè augeri dicitur. GERON, Quod ortum iam est, & integram formæ suæ absolutionem obtinet. Si enim ad hanc quoq; nunc sit progressio, sicut cum domus ex ædificatur, non utiq; accretio, sed quædam est constitutio: at si pristinas species excedat (vt cum aqueus humor rarior effectus, in ærem vertitur) occasus sanè est, & interitus, non accrementum, imò aqua sic fusa, vt suam adhuc speciem retineat, non augeri, sed rarefcere dicitur: quia veterem suam soliditatem non retinet.

Quicquid igitur accrescit, id integra iam specie absolutum est, neq;

30 hanc incremento mutat, sed pristina continuatione & soliditate corporis seruata, in omnem partem distenditur. MATHETES, Iam video quantum accretio ab ortu vel interitu distet: in illone ad nouam essentiam, in hoc ad amplitudinem & molem progressus fieri solet? GERON, Sic existimo. nam id gigni dicitur, quod non-

35 dum est, neq; speciem adhuc acquisiuit: hoc autem augetur, quod formam iam perfectam adeptum est. Si verò id quod augetur, pristinam soliditatem asseruare debeat, hanc alimento exhibito confirmari oportet, vt iam in ampliorem molem auctum, inde sibi robur, & firmitatem conquirat. Sic igitur nutritio accretioni

40 affinis, & coniuncta existit, vt citra eius auxilium compleri nequeat. MATHET, Solèntne augeri, & pinguescere, quod plenius alitur? GERON, Nequaquam, nam pueri & adolentes, dum se-

Accretio quid distet ab ortu & procreatione.

Incrementum dicitur ab ortu & interitu.

Gigni quid dicitur, quid augetur.

Nutritio accretioni affinis.

Non idem plenus alii, & augeri.

Certus modus incrementi corporis.

Altrix et auatrix facultates inter se differunt.

Naturales facultates auxiliares altricis quatuor.

Attratrix.

Expultrix.

bribus morbisq; diuturnis infestantur, plerumq; crescunt, licet valde extenuentur, & gracilescent. Cum autem parcius aluntur, neq; accretio plenior est nutritione, neq; huic illa tanquam comes perpetuo adsidet. Præterea certus & status vniuscuiusq; corporis viui, incrementi modus est, ad quem non nisi paulatim & definitis temporum interuallis peruenitur. Deniq; pleriq; etiam eo sunt statu, vt quamuis plenissime alantur, & augeant, nunquam tamen liberalem illam proceritatem assequuntur: quod argumento esse potest, altricem facultatem ab auatrice non tantum nomine, sed etiam functionibus & operibus editis plurimum distare. nam hæc alimentum solidis corporis partibus apponit: eaque in omnem partem effert atque dilatat: illa, nempe altrix, hisce iam auactis, huc demum incumbit, vt non modo tantum alimenti reponat, affigat, & assimilet, quantum materiæ effluxerit, sed etiã largius, quo laxiores factos sinus cumulatè expleat, & pristinam eorum soliditatem, roburq; conseruet. **MATHESES**, Vniuersasne facultates naturales iam expediuisti? **GERON**, Nondum, sed quatuor adhuc altricis auxiliares & ministræ supersunt, vt attratrix expultrix, contentrix, & concoctrix: quarum beneficio corpus nutritur & sustentatur. Omnes enim corporis particule etiam minimæ, alimento indigent. **MATHESES**, Hoc propriione motu & impetu ad illas peruenit? **GERON**, Neutiquam, sed alieno externoq; eo impellitur attrahiturq;. Nam si id ex ventriculo, aut iocinore per venas in vniuersum corpus excurreret, vtile simul ac inutile permixtè illuc conflueret, neq; suum cuiq; parti familiare & gratum conferretur. **MATHESES**, Quomodo igitur hoc illis adiungi poterit? **GERON**, Sua cuiq; particule vis attractoria inest: quæ quod illi familiare, & idoneum existit, ex sanguine singulari benignitate elicit. Cum enim permagna partium corporis sit diuersitas, ob quam non omnes vno eodemq; alimento delectentur, suam singule vim & facultatem obtinent: quæ quod vnicuiq; idoneum est, & familiare, sibi alliciat, attrahatq;. simili facultate stirpes gratum è terra succum eliciunt: lapis Heraclius ferum: medicamenta purgantia suos quæq; humores peculiare, & corpore ob naturarum essentiarumq; similitudinem, attrahunt. **MATHESES**, Si hæc agit facultas attratrix, quorsum vtilis est expultrix, quam secundo loco superius nominasti? **GERON**, Hæc ideo condita est, vt inutile, & superuacaneum expellat. Quemadmodum enim omnes terris insitæ materiæ, ea quæ familiaria sibi & grata sunt, attrahere sibi, ita noxia & ingrata, odio quodam expellere solent. **MATHESES**, Cur familiaria attrahunt? **GERON**, Vt sibi adiungant, eorumq; suauitate perfruantur, & tandem sibi prorsus

- prorsus assimilent, MATHETES, Qua facultate id efficiunt? GERON, Qua attracta apud se continent, & conseruant: alias eis non fruerentur: vbi verò diutius illa retinent, proprio calore eadem leniunt, immutant, & concoquunt. MATHETES, Ideòne quatuor
- 5 istas facultates non solum animantibus, sed etiam rebus inanimatis necessarias esse dicis? GERON, Si nondum mihi, satis hac in re credis, conabor tibi alia ratione demonstrare. MATHETES, Obsecro, ne te laboris pigeat. GERON, Primum perpendas animo, singula alimenti genera, siue panem, siue carnem, siue fructum, siue vinum, plurimum à corporis nostri natura discrepare, neque
- 10 posse in essentiam nostram conuerti, & in totum ei assimilari, nisi multifariam, variegatè sint immutata: cum autem id vniuersum concoctione fieri nequeat, & quodcunq; gratum & familiare est, vnà partem corpori alendo idoneam, alteram alienam inep-
- 15 tamq; habeat: certè ad hanc tanquam noxiam, & insalubrem excernendam, vis illa, & facultas expultrix, in nobis admodum necessaria esse videtur. quia verò vtilis alimenti portio corpori nutriendo accommoda, ad singulas corporis partes sua sponte non accedit, requiritur etiam facultas, quæ illam alliciat attrahatq;.
- 20 Adhæc cum pars attracta concoqui non possit, nisi aliquandiu retineatur, adhærescatq; (temporis enim spatio & quiete ad id perficiendum opus est) natura retentricem facultatem nobis indidit. MATHETES, Satis demonstrasti, quatuor facultates naturales altricis auxiliarias vnicuiq; parti suas insidere: dic oro, an
- 25 aliæ quædam his adhuc sint addendæ? GERON, Alimentum sanè, cum iam parti influxerit, primum ei apponitur: deinde agglutinatur, & adhærescit: tandem perfectè assimilatur, nullaq; nutritionis absolutio fieri potest, nisi præcesserit agglutinatio, & hanc appositio: quæ variæ sunt functiones, ex proprijs effectis conspici-
- 30 tuæ: quæ non ex alijs, sed ex iam dictis duntaxat facultatibus processerunt. Etenim appositio, finis est attractionis, eoque singulæ partes alimentum alliciunt, vt id sibi adiungant apponantq;. agglutinatio verò cum retentionem, tum concoctionem comitatur: necessèq; est vt dum alimentum concoctione roit, euaditq;
- 35 crassius, retentum id parti simul affigatur, & tunc demum assimiletur. atq; ea functio naturalis reliquarum suprema, & tanquam finis est, concoquendiq; facultate perficitur. Cum autem hæc summa sit, in quam reliquæ contendunt, sola inter ipsas altrix facultas appellari debuit. Ne sis autem sollicitus, quòd nonnulli phi-
- 40 losophi & medici præter iam enumeratas facultates, præterea appetitoriam quandam non solum in animantibus, sed etiam in stirpibus, & his quæ sola natura duce reguntur, constituant. Nam

Contentrix.

Concoctrix.

An quatuor facultates supradictæ esse necessariae.

Necessitas facultatis expultricis.

Facultas attrahitrix.

Retentrix.

Appositio. Agglutinatio. Assimilatio.

Summa est assimilatio.

quæcumq; vis attrahit, eadem etiam familiare, & gratum sibi appetit. Id autem iucundum est, & gratum: quia similitudo amicitiam, hæc appetitum, is ipse attractionem mouet. eadem prope-
modum ratione expultrix facultas noxium pestiferumq; auer-
satur, & respuit, ideo quod inimicum sit, atq; dissimile. *MATHET.* 5
Nę illi curiosi sunt, qui tam friuolas questiones mouent. *GERON.*
Non pauci alij exorti sunt, qui stirpes, sicut & corporis nostri par-
ticulas, naturali quadam cognitione præditas esse arbitrantur,
qua salutaria à mortiferis internoscant. Atq; hanc facultatem,
proprium quendam, & naturalem sensum appellant, quo nutri-
tioni idonea & contraria solum dijudicent: & si familiaria desint,
protinus appetant: quia verò appetunt, eadem attrahere, vt tan-
dem opratis fruantur. Atqui ego discernendi internoscendiq; fa-
cultatem stirpibus corporisq; nostri particulis non esse necessariā
existimo. Nam salutarium idoneorumq; attractrix, solo appetitu 15
naturali, citra vllam illorum cognitionem impellitur. Illum au-
tem non sensus, aut cognitio, sed penuria eius, quod familiare est,
& iucundum, incitat. *MATHETES.* Sūntne omnium corporis par-
tium actiones naturales eiusdem naturæ? *GERON.* Minimè. nam
aliæ vnicuique peculiariter addictæ sunt, vt ofsi, cartilagini, & 20
reliquis omnibus: quia nulla est etiam minima, quæ non seipsam
alat atq; conseruet: aliæ communes omnibus, vt in ventriculo &
iecore, præter proprias consistunt, vniuersi corporis commodi-
tatum gratia. *MATHETES.* Sūntne facultates aliæ in alijs parti-
bus corporis efficaciores? *GERON.* Nimirum, vt in gula alimenti 25
attractrix: in ventriculo & iecore concoctrix: in intestinis expul-
trix quidem validissima inest, concoctrix autem infirma: reliquæ
duæ deficiunt. renibus attractrix excellens, excretrix non imbe-
cilla: reliquæ nullæ illis insident. in vtero vis contentrix validis-
sima, vt qui foetum nouem integris mensibus reconditum gerat: 30
sicut etiam seminis alliciendi, foetusq; exigendi: contractrix au-
tem nulla prorsus. Itaq; partes istæ, sicut & aliæ nonnullæ, quæ
non solum priuato, sed etiam publico munere funguntur, instru-
mentorum speciem acceperunt, & fibrarum genus ijs muneribus,
ad quæ potissimum sunt accommodatiore, proprium sunt 39
adeptæ. *MATHET.* Quot sunt illarum genera? *GERON.* Tria. aliæ
nanq; directæ, quæ in longitudinem porriguntur: alię transuersę,
quæ ad partes rectosq; angulos in illa feruntur: aliæ obliquæ, quæ
ad impares angulos incidunt. Quamuis igitur concoctrix facul-
tas nullum fibrarum genus, sed humidum duntaxat calorem no- 40
bis ingenitum, ad concoctionem accommodet: reliquæ tamen
quæ motu quodam munus suum obeunt, fibris indigent: attra-
ctrix

An particulis
nostris & stirpi-
bus naturalis in-
sit facultas in-
ternosci saluta-
ria à noxijs.

An omnium par-
tium actiones na-
turales eiusdem
naturæ peculia-
res, & commu-
nes.

In alijs partibus
aliæ facultates
valentiores.

Quibus fibris sin-
gule facultates
indigeant.

Concoctrix calo-
re humido indi-
get.

atrix quidem rectis: expultrix transuersis: contentrix obliquis.

Reliquæ facultates fibris.

Quemadmodum enim fibræ musculorum arbitrio nostro contractæ, quasiq; ad originem suam reductæ motum efficiunt, sic & in naturalibus instrumentis, rectæ fibræ solius naturæ instinctu

Attrahitrix rectis. Expultrix transuersis.

Contentrix obliquis.

5 contractæ, breuiorēsq; factæ alimentum attrahunt: transuersæ autem astrictæ, subiectam capacitatem in angustiam adducunt, & quicquid ea comprehenditur, expellunt: obliquæ verò, cum intentæ nec breuiorem, nec angustiore partem reddant, seruata quadam naturali æquabilitate & constantia, omnia planè con-

10 tinent, nihilq; vel attrahunt, vel extrudunt. MATHETES, Cuiusque igitur naturæ instrumento triplex eiusmodi facultas accessit, talene etiam fibrarum genus est attributum? GERON, Omnino, sed aliàs tunica simplici, vt in vtero: aliàs duplici, vt in ventriculo.

15 Quibus verò vnica ex his facultatibus data est, vt intestinis, iis licet gemina præditi tunica, simplex tamen fibrarum genus concessum est. Quare facultatum singulis partibus assidentium numerus, ex functionum varietate cognitus, fibrarum differentias indicat: contra quoque earū diuersitas per confectionem

20 percepta demonstrat, quot cuiusque partis sint facultates, gulæ, ventriculi, intestinorum, arteriarum, venarum, vteri, vtriusq; vesicæ, & aliorum naturæ instrumentorum, si plura his manifesta existant. MATHETES, Communium facultatum fibras explicasti: quæ autem sint illarum partium, quæ sibi duntaxat, priuatisq; commodis inseruiunt, vt ossium, & cartilaginum? GERON,

25 Quamuis illæ omnes naturalium facultatum species obtineant, nullis tamen fibris indigent, sed omnia ingenita vi efficiunt obediuntq;: imò neq; ventriculus, neq; intestina fibras suas proprii alimenti attrahendi retinendiq;, aut excrementum expellendorum gratia exercent. MATHETES, Principes naturæ facultates, & reli-

Ossa, & cartilagine non fibras, sed vi ingenita functiones obediunt.

30 quas quæ eis inseruiunt, omnibus communes descripsisti: quæ verò solis animantibus dicatæ sint, nunc audire cupio. GERON, Duo ipsarum genera prima summaq; existunt. aliæ siquidem sunt rationis participes, aliæ huius expertes, quæ sensus duntaxat impetu feruntur. Ac sentiens anima præter vim illam naturalem,

Animæ vires solis animantibus propriæ.

35 quæ brutis animantibus moderatur, tota essentia simplex est, siueque persimilis, non ex inequalibus, vt corpus, coagmentata: alioquin id, quod ex ea conficeretur, non vnum, eiusdemq; generis esset: quanquam hæc sola efficiat, vt animal cernat, odoretur, audiat, gustet, tangat, atq; tractet, nec non vt moueatur, rerum disceri

Animæ sentiens.

40 mina internoscant, cogitatione fingat, somniet, meminertq;. MATHETES, Suntne hæc vnus eiusdemq; essentiaë mōnera? GERON, Sunt certè, sed non yno similiq; modo ea exequuntur, perficiuntq;.

Sicut enim varia corporis instrumenta ad eorum effectiōnem accommodat, ita alia atq; alia edit opera. Qua de causā cū mūnera horum ita sint discreta, vt singula seorsim atque separatim possint consistere, neq; necesse sit vno quodam edito, alia statim perfici, aut vno pereunte, reliqua omnia simul interire: meritō singula suam instrumenta facultatem quandam obtinent, totidemq; sentiendi sunt vires, quot functionum differentiæ numerantur.

Facultates brutis insita quid agant.

MATHESES, Cū igitur animalium facultatum genera sic distinxeris, vt aliæ rationis, aliæ sensus sint effectrices, quid agunt, quæ brutis animantibus dominantur? GERON, Alię externa sentiunt,

Sensus quinque.

aliæ loco dimouent, aliæ cognoscunt. MATHESES Quot illarum externa sentiunt? GERON, Quinq; vt vis cernendi, odorandi, audiendi, gustandi, atq; tangendi. qua autem animal cernit, eadem non audit, aut odoratur, aut gustat, aut tangit, sicut nec ex aduerso quicquam fieri potest. MATHESES, Quid tantam inter ea dissimilitudinem peperit? GERON, Instrumentorum, & obiectorum quibus incumbunt, varietas. sensus instrumentum, sicut cetera singula corpora ex subiecta materia & specie constituuntur, ita vt illud tanquam materia sit: sensus tanquam forma, & ratio.

Visoria facultas in quo consistat.

MATHESES, In quo visoria facultas consistit, vt ab hac exordiar? GERON, Ratione formæ, in crystallino oculi humore, qui

Humor crystallinus primum visus instrumentum.

pellucidus est, primūque visus instrumentum, humoribus circumfusum, tunicisq; septum: quæ huc conducunt, vt melior perfectiorq; sit visio. Oculus sanè cernit simpliciter, crystallini humoris, integrè autem, verè, ac perfectè, visus instrumenti beneficio. MATHESES. Qui colores sub hunc visorium sensum cadunt? GERON, Hi maxime, qui corporibus per summa insident, ipse nanq; solus præ cæteris eos internoscit, discernitq; singulos. MATHESES. Quod audiendi instrumentum est præcipuum? GERON, Aër

Auditus instrumentum primum aër.

quidem pertenuis auribus ingenitus, membrana obductus, in intimo auriū sinu positus, quo ad nerui auditorij à cerebro ducti extremum pertingit. nam hic insitum illum aërem, atq; spiritum qui primum est auditus instrumentum, quemadmodum visorius oculi neruus crystallinum humorem ambit. atque hac ratione instrumentum in omnibus ædè magnam societatem cum intimo sentiendi principio per spiritum influentem, & neruum obtinet, vt audiendi facultas illi insidens sonum verè percipiat, eiusq; discrimina internoscat. MATHESES, Vbi odoratus instrumentum proprium habetur? GERON, In anteriore cerebro circa ipsius basim, respicientibus quibusq; animantibus contextum, penitusq; in his cerebri extremitatibus, quæ ad nasi summum pertinent, conditum: vnde quinq; hi sensus exteriores appellantur, non quòd foras ex-

Odoratus instrumentum sedes.

ras ex-

rās expositi sint, sed quòd exteriorum rerum cognitionem, proprijs instrumentis capiant. Illic igitur sita odorandi facultas, rerum odores, quæ subiecta eius est materia in qua versari solet, per narium ductus, simul cum spiritu acceptos comprehendit.

5 **MATHESES**, Quia in sede gustandi facultas consistit? **GERON**, In ijs potissimum nervis, qui linguae, palato, faucibusque distribuuntur: ipsa quoque rerum saporibus spongiosae eius carnis, qua lingua praedita est, auxilio internoscit. **MATHESES**, Vbi tandem vis tangendi inuenitur? **GERON**, Nullum peculiare habet instrumentum. cum

Gustandi facultas.

Tangendi vis toto corpore diffusa.

10 autem ad animantis vitam maximè sit necessaria, toto corpore æquabiliter diffusa est: in ijs autem nervis maximè, qui duriores iam facti, intro forasque tendunt: his tactiles omnium corporum qualitates deprehenduntur. verum hæ non vt colores, saporibus, odores, aut soni, vno designari nomine possunt, cum multis contrariorum discordijs dirimantur. Extrema earum sunt, calor & frigus, humor & siccitas, mollitudo & durities, asperitas & læuitas, grauitas & leuitas. **MATHESES**, Quomodo sensus hic à cæteris differt? **GERON**, Quia non omnia subiecta prorsus percipit,

Tactus ab alijs sensibus differt.

20 si verò id non fiat, certè necque sentire poterit. **MATHESES**, Cur reliqui sensus eas qualitates, quæ ipsis subiiciuntur, omnes percipiunt, ab ijsque afficiuntur? **GERON**, Quia omnes sunt dissimiles. **MATHESES**, In quo vniuersi sensus inter se conueniunt? **GERON**, In hoc, quòd singuli tales potestate sint, quale id ipsum est, quod

Contraria non similia afficiunt.

Sensuum communia quæ.

25 percepturi sunt. sin autem sensus, à subiectare afficiatur, similitudinem quandam per motus initia, & dissimilitudinem in fine intercedere oportet. Præterea in illo sensus isti concordant, quòd singuli res sibi subiectas cognoscant, earumque defectus, & immoderatos excessus, idque diuersa ratione. Quamuis igitur in his duobus conueniant, tamen sensuum facultates plurimæ inter se non

In quibus sensus conueniant, aut discordent.

30 solum rei quæ comprehenditur, natura, sed etiam proprijs instrumentis variant. **MATHESES**, Quia de causis? **GERON**, Quia visui instrumentum aqueum & pellucidum inest, nempe multiplex humor perfusum, quod à cerebro omnium partium humidissimo

35 frigidissimoque ducit originem. auditui ærium, odorati igneum donatum est: siquidem etiam exhalatio quædam est fumosa, & ignea: tactui terrenum: gustati etiam tale, quia veluti tactus quidam existit, sed quod humoris etiam nonnihil contineat.

MATHESES, Externam sentientis animæ facultatem intelligo, in quinque sensus tanquam in species distribuam: quænam est interior? **GERON**, Hæc species habet vim discernendi communem, scilicet ricem memoriæ & recordationis: & hæ omnes exi-

FACULTATES animæ sentientes internæ.

stunt vnius animæ facultates. MATHETES, Vbi sentiens cognoscensq; anima sita est? GERON, In cerebro, tanquam in arce & sede propria, vnde neruorum propagines in omnes corporis partes dispersæ sunt, quibus anima vires suas communicat: sicut rursus à sensibus, viæ quædam & foramina patent, per quæ conceptæ rerum imagines in illud confluunt. harum iudex & arbiter princeps ille sensus est, quem communem & intimum appellant. Visus solus nigrum ab albo: tangendi facultas calidum à frigido potest discernere: excellentior autem vis, dulce ab albo, & eorum quæ varijs subiecta sunt sensibus, differentias diiudicat. Nullus enim exterior sensus de dulci & albo iudicium ferre potest: eò quòd illa non vnus idemq; sentiat. Est igitur interior discernendi internoscendiq; facultas, quam primam communis ille sensus & intimus exprimit, qui sentientis animæ essentia est, & principium, vnde vniuersum genus animantium constitutum est, omnesque animantes etiam ex infimo insectorum ordine, sentientes appellantur. MATHETES, Vbi sedem habet communis iste sensus? GERON, In cerebro, è quo tanquam specula, rerum omnium imagines, à ministris nuntijsq; sensibus extrinsecus allatas, & ante se positas contemplatur, omnesque illorum actiones obseruat. Huius beneficio nos videre & audire cognoscimus: nec non imaginum discrimina diiudicamus. Vnde liquet ipsum quinq; sensibus conuenire, & eundem cum illis esse propemodum, omnesq; istos ab eo tanquam fonte riuulos deriuari, & primam illam sentiendi facultatem è cerebro, in sensuum instrumenta se diffundere, eorumq; seruitio vti & ministerio. Quia verò instrumenta illa multifariam se vnius opificis vsibus accommodant, meritò quinq; exteriorum sensuum facultates constituentur, quarum vna eademq; ac principis sensus sit essentia. MATHETES, Quæ sunt principis sensus facultates? GERON, Vna, quæ externarum rerum varietates discernit, internoscit, & diiudicat: altera, quæ sensuum vestigia excipit, retinet, recondit, & res impressas reponit conseruatq;. Cum enim exterior sensus in rem subiectam incumbit, simul quoq; interior & princeps sentiendi illa facultas in illam ipsam fertur, simulq; percipit & sentit: hanc ipsam deinde sensus, ab externis rebus laeßit, vbi simulacra spectraq; ab eis emissa receperint, incitant & impellunt. Eadem rerum formas atq; imagines, quas sensus præbuerunt, retinet, sic vt etiam si res sublata fuerint, imagines tamen earum tanquam insculptas diutius conseruet: eò quòd sensus ille tunc res abstractas cognoscat, percipiatq;, vt cui earum custodia sit concedita. MATHETES, Quæ tertia interiorum est facultas? GERON, Fictrix, siue

Sensus communis.
Visus.
Tactus.

Discernendi facultas interior.

Communis sensus sedes.

Principis sensus facultates.

Fingendi facultas.

- siue imaginationi dicata, quæ obiecta spectra apprehendit, & circa ea veritatur. *MATHESES*, Quæ præter has superest facultas? *GERON*, Memoria, eaq; duplex: prima ex imaginis apprehensione rem ipsam repræsentat: altera imagines cerebro impressas diu *Memoria.*
 5 conseruat: in pueris & senibus infirma: in alijs eam rerum meditatio cogitatioq; siue crebra imaginum repetitio confirmat. in illis sanè, quòd imaginum impressionem seruare, atq; retinere: in his autem quòd admittere & recipere eam nequeant. In brutis autem ea duntaxat meminisse dicuntur, quæ sensum & temporis notitiam habent, visioq; simulacro sentire possunt se rem ipsam aliquando cognouisse. *MATHESES*, Cui sensui hæc omnia insunt? *GERON*, Primario, sicut etiam effectio, & memoria, cæteræq; ipsius functiones in eadem animæ parte consistunt, quicquid illi dicant, qui fingendi facultatem priori cerebri regioni, memoriam posteriori attribuunt. vtraq; enim toti cerebro ascribenda est, vt cui princeps sentiendi anima indita sit. *MATHESES*, Quibus sensibus somnus, & insomnia attribuuntur? *GERON*, Intimo, cuius propriæ functiones sunt: quibus obeundis non aliæ quædam facultates præsunt. *MATHESES*, Quid propriè vigiliam &
 20 somnum esse dicis? *GERON*, Illam quidem incitationem & motum: hunc verò ipsius impedimentum. Quamuis autem illa inter se contraria sint, discrepentq; tamen ambo communi sensui subiiciuntur: quo intercidente, reliquos etiam interciderè necesse est, & tanquam ministros eius affectioni inseruire. *MATHESES*,
 25 Quando somnus accedit? *GERON*, Cùm primum illud sentiendi instrumentum, putà cerebrum, ex lassitudine aut longis vigilijs imbecillum redditur, cæteris membris simul defessis, ac sensus omnes in illo ab actionibus suis feriantur, eò quòd vires illorum durare, & sufficere illis nequeant. qua de causa somnus vniuersis
 30 animalibus, valetudini curandæ, & quieti necessarius est. *MATHESES*, Cuius facultatis animæ est insomnium? *GERON*, Cùm id visum simulacrumq; sit, quod à sensibus ortum, animalibus in somno se offerat & obuersetur, non alterius, quàm cuius somnus esse potest: eoq; etiam eiusdem partis animæ, & instrumenti
 35 existit. nam qua animal dormit, eadem etiam somniat: cùm autem communi & principe sensu dormit, certè eodem etiam somnabit: non vtriq; quatenus sentiens est, sed quatenus cogitatione fingit, & euagantibus simulacris irritatur. Fictrix enim facultas exceptarum imaginum motione & impulsu interpellatur, præsertim noctu, & per somnum.

MATHESES, Quæ alia facultas, præterquam sentiendi cognoscendiq; restat? *GERON*, Appetendi, manifesta & euidenti *Facultas appetitoria.*

Ogula.

functione cerebri. Quippe nullum animantis genus est, quod non aliquando impetu quodam, ac voluntate incitetur, reiꝫ cuiusdam desiderio agitur & æstuet: quæ illius interior impulsio animæꝫ motus, appetitio est, quam Græci *ogulw* vocant. **MATHETES**, Quid hæc commune cum reliquis functionibus exterioribus obtinet? **MATHETES**, Nihil. sed à singulis differt: nempe à discretione, memoria, & effictione: quamvis eas, præsertim autem effictionem naturali quodam instinctu consequatur. quare etiam facultas eius effectrix à cæteris distabit, illasꝫ tanquam socia comitabitur, & summa sentientis animæ facultas erit, quæ cæteris tanquam finis seu princeps insideat. **MATHETES**, Quot sunt appetitionum differentia? **GERON**, Permultæ. nec enim solum hominibus, sed etiam beluis, stirpibus, & inanimatis, sua quædam inest appetitio: imò nihil in rerum natura est, quod non appetitu incitetur: quamvis id vario discrimine fiat. Stirpes alimentum ex terra eliciunt: quælibet inanimata proprio quodam motu aguntur, naturali appetitu incitata. Eodem quoꝫ singulæ corporis particulæ, si quando inanitæ fuerint, familiare sibi alimentum ex venis attrahunt, alliciuntꝫ. **MATHETES**, Vbi huius facultas summa confidet? **GERON**, In iecore, ex quo tanquam fonte, in omne corpus diffusa, singularum partium vires sustinet. **MATHETES**, Vbi alter ille communis appetitus sentiens consistit? **GERON**, In cerebro: seminaria eius in alias quoꝫ partes diffunduntur. Quippe natura maximos ignes & incendia testibus, naturalibus, & orificio ventriculi indidit: illis quidem veneris, huic autem luxuriæ & cupidiarum, sicut cordi fomitem ambitionis & exaridescentiæ. Atꝫ tres hæc officinæ, veneris, luxuriæ, & iræ, quamvis inuicem sint distinctæ, vno tamen eodemꝫ appetitu sentiente & animali reguntur. Quicquid ergo sensu vlllo præditum est, eius rei quam lenferit, comprehensione, in appetitum ducitur: quo tandem illam consequitur, aut ab ea declinat. Complures huius species, ex ortus ipsius modo numerari possunt, vt alius ex iecoris facultate in naturalia, & os ventriculi diffusus, alius ex cordis impetu & feruore, alius putâ sentiens, ab ijs quæ foris occurrunt, stimuletur, exciteturꝫ: omnes quidem animales, sed varijs orti principijs. His accedit tertius appetitus, qui cum ratione aliquid desiderat, mentisꝫ consilio obtemperat, immodicos ferinosꝫ ardores restinguit, ac cohibet: ea est voluntas libera, homini familiaris, omnium princeps & reginâ. **MATHETES**, Quæ solent appetitum animale incitare? **GERON**, Quæcunꝫ bona videntur, quamuis talia fortè non sint: quæ autem verè bona sunt, mentis appetitum duntaxat incendunt, vt qui solo veri boni desiderio capia-

*Appetitionum differentia.**Appetitus stirpium naturalis.**Communis appetitus sentiens.**Seminaria appetitus communis.**Spiritus animalis.**Appetitus rationi consentaneus, siue animalis.*

capiatur afficiaturq̃. MATHETES, Cùm igitur tres sint animæ
 partes, si suum singulæ habent appetitum, quot huius erunt ordi-
 nes? GERON, Tres. primus naturalis, stirpium peculiaris: alter
 beluinus, qui etiam animalis vocatur, brutorum: tertius rationis
 5 particeps, hominum: in quibus ille præcipuè viget: quamquam
 reliqui etiam non desint. MATHETES, Quid autem est beluinus
 appetitus? GERON, Cupiditas veneris, aut cupediarum, aut ex-
 candescencia, aut eorum quæ sensus indicarit, desiderium. De ap-
 petitu iam sat multa audiisti, nunc de mouendi incedendiq̃ fa-
 10 cultate aliquid tibi adferam. Quoduis animal mouetur, inceditq̃
 ut eam rem consecetur, quæ boni iucundiq̃ speciem representat,
 aut eam declinet, quæ ingrata aduersaq̃ iudicatur. MATHETES,
 Mouendi facultas à sentiente rene, & appetitu, variat? GERON, In-
 dubiè. nam alia sensus, alia motus sunt instrumenta, alijq̃ nervi:
 15 vnde fit, ut vel eiusdem cruris, vel brachij motus pereat, tactu sal-
 uo, qui in totam cutem dispersus est: aut è contrario, ut tactus ab-
 oleatur, motu superstitè. MATHETES, Vnde hoc sic habere in-
 telligi potest? GERON, Inde, quòd omnis sensus ex perpessione
 quadam, & affectione fieri soleat: motus autem non nisi conatu
 20 & roboris intensione. MATHETES, Si hoc ita est, ut tibi libenter
 credo, non solum sentiendi, atq̃ mouendi instrumenta, sed etiam
 fingendi rationes, efficientesq̃ facultates plurimum inter se dissi-
 dere mihi videntur: nec non animalem appetitum, qui à sensibus
 & cogitatione ducitur, illaq̃ perpetuò comitatur, ab incedendi
 25 facultate omnino discrepare. GERON, Rectè sententiam meam
 affecurus es: ut autem eam veram esse intelligas, aures ijs quæ
 dicam, aduertas. Animalia imperfecta, quæ solo tactus sensu præ-
 dita, stabilem vitam agunt, ut conchylia, ostrea, conchæ, sensum
 quidem illa doloris atque voluptatis, fingendiq̃ & cogitandi fa-
 30 cultatem licet obscuram, sicut & animalem appetitum accepe-
 runt. quamuis enim compuncta sese contrahant, progredi tamen
 nequeunt, neq̃ motus instrumenta habent. quòd si verò incedere
 nō possunt, neq̃ ad incessum facultatem obtinebunt. Quare vim
 35 mouentem ab appetente, atq̃ sentiente, quæ semper mutuò se co-
 mitantur, iunctæq̃ sunt, nunquam separabiles disfungere con-
 uenit: eò quòd eorum quæ sentiunt, animantium alia mouendi
 facultatem habeant, alia huius sint expertia. adhæc, quòd in ho-
 minibus, nervorum resolutionem expertis, motus pereat, licet in-
 teriores animæ vires, ipsæq̃ appetitus sint incolumes: contra
 40 quòd in furore, aut delirio vexatis, neq̃ mens, neq̃ memoria, ne-
 que appetitus, neq̃ sensus ipsi integrè valeant: in quòd omnes
 interiores animæ functiones sint vitiatæ, incessu autem præfisor

*Appetitus beluinus, seu animæ
lis,*

*Mouendi ince-
dendiq̃ facultas,
& ratio.*

*Mouendi vis vs
de.*

*Fingendi & effi-
ciens facultas ma-
ter se differunt.*

*Animalis appeti-
tus ab incedendi
facultate dissidet*

*Mouendi vis ab
appetente ac sen-
tiente differt.*

Motus & appetitus sedes diuersæ.

plerumq; sit, & firmum musculorum robur. Vnde constat incessum aliunde quàm à facultate appetente institui, gubernariq; atq; hanc ab illa esse diuersam. **MATHESES**, Distinctisne etiam sedibus inclusæ sunt? **GERON**, Profectò. nam mouendi vis in toto cerebro, præsertim posteriore eius parte, quam cerebellum superius appellauimus, consedit: in priore verò cerebri sede, sentiendi & appetendi facultas, quæ neruos sensorios, eosq; molles in sensuum instrumenta distribuit. **MATHESES**, Vt mouendi facultatem loco ac sede à sentiente disiunxisti, itane hanc etiam ab illa essentia ratione dissidere tanquam diuersam putas? **GERON**, Nequaquam, sed totius sentientis animæ vim summam & vltimam facultatem esse, quæ seorsum collocatur, vt visum, vel auditum, arbitror: ea verò, vt omnes exteriores sentiendi vires, appetitus potestati subest, cuius imperio compulsa, statim quanlibet corporis partem promouet. **MATHESES**, Quæ certæ singularum animæ

Animæ sentientis domicilium.

facultatum sedes existunt? **GERON**, Sentientis animæ mollis cerebri essentia, memoriæ dura, & instrumentum recipiendis rerum spectris idoneum: eius temperamentum, quantitas, et figura, insitusq; spiritus facultatibus discernendi, fingendi, meminiscen-

Sensus & motus instrumenta.

di, appetendiq; inferuiunt. At cerebri sinus & ventriculi, quatenus spiritus recipiunt, sensui & motui veluti instrumenta destinati sunt: duo quidem priores sensui: medius autem & postremus motui, cui & nates siue clunes, quæ græcè *γλῆνα* vocauimus, & processus vermicularis auxiliantur. At facultates, quia opera sua foras proferunt, exterioribus quoq; adminiculis ex communi illo cerebri fonte deriuatis indigent. **MATHESES**, Quibusnam visus, auditus, & gustus? **GERON**, Neruis concauis, & mollibus, ex priore cerebri parte prognatis, similibusq; etiam odoratus, quanquam intimus existat. Tangendi autem sensus paulò durioribus, qui ex sexto coniugio ad interiora viscera, extremamq; cutim disper-

Facultates quibus alimentis indigeant.

Nerui sensibus dicati.

guntur, nullius motus auctores. **MATHESES**, Quales sunt motorij? **GERON**, Insigniter duri: atq; hi licet motum voluntarium non efficiant, tamen vim motus effectricem, in musculos veluti propria illius instrumenta deferunt. Posses hinc mirari, cur inter eos neruos, quorum similis est structura, alij motui, alij sensui sint præfecti: adhæc cur illorum, qui in cerebro nati sunt, hi ad motionem, illi ad sensum accommodentur, præsertim cum eadem vtriq; constent origine, spiritu simili ipsis influente, & compositione: item cur duriores qui mouent, & molliores qui sentiunt: nec non cur tactui peculiare, qui ex sexto coniugio in viscera, in cutim, & in corporis extrema porriguntur, multo ijs sint duriores, qui in oculos ex secundo pari tendunt, motus eis præstandi gratia,

Motorij.

gratia, idēq; ab ipsa statim origine, quam hi posteriorem, ac illi acceperint. ob quod varia huius facultatis causa non molliciei, aut duritię ascribi potest, sed compositioni. Nam cerebrum, etsi assiduo motu agitur, nullo tamen tangendi sensu præditū est: membra-
 5 ne autem illius ē contrario, motu licet per se careant, præcipue crassior, tactu tamen validissimo pollent: id quod in morborum euentibus palam apparet. Siquidem nullus plerunq; dolor in delirio, et phrenitide, quę cerebri essentię inflammatio est, multoq; minus in sopore, & veterno, quod alioquin putredinem habet coniunctam, infestare solet. si rursus vel minima humoris, aut etiam vaporis acrioris occasio in membranas illas inciderit, vehementi dolore excruciat: vnde diuersa cerebri & membranarum natura cognoscitur. At spina, & nerui omnes medullam ē cerebro, eamq;
 10 membranis ipsius inuestitam obtinent, qualem ab initio acceperint. atq; hinc colligere licet medullam & neruos, licet illa non vt cerebrum moueatur, vim duntaxat motoriam, membranas autem ipsius sentientem, & tactilem tum suscipere, tum alijs partibus conferre. Si namq; cerebrum sensus est expers, multo magis medulla, quę spine & neruis insidet. Quicunq; igitur nerui tum
 20 mouendi, tum tangendi facultatem obtinent, vtriusq; functionis sunt instrumenta, partibus tamen diuersis. Nerui sentientes, solius quidem tactus, nullius autem motus auctores sunt, vt qui ex sexto coniugio, in viscera interiora, cutemq; extimam dispergantur. Quanquam autem hi non à solis cerebri membranis proueniant, maximam tamen essentię portionem ab illis, minimam à cerebro mutuati sunt. nam statim, vbi ex tenui membrana orti, ad
 25 crassiorē accesserint, multo auctiores & valentiores euadunt. eoq; tactum solum, non item motum efficiunt. qui verò ex spina oriuntur, insignem medullę portionem suo exortu continent. Itaq; sensus ex priore cerebri parte, motus ex posteriore, tactus ex membranis illius trahit originem. Omnes autem simul animales functiones ex cerebro membranis suis inuoluto proueniunt. Nerui copiosa medulla pleni, motus, ex membranis verò cerebri
 30 maiore ex parte nati, tactus sunt instrumenta. MATHETES, Quod tandem proprium motus voluntarij instrumentum est? GERON, Musculus: qui licet ex simplici carne, vena, arteria & neruo sit conditus, vniuersam tamen vim ex neruo assumit, qui aliās principatum obtinet, & præcipuam mouendi functionem sibi vindicat. MATHETES, In quam musculi partem neruus iste inseritur?
 40 GERON, In eius principium, quod caput appellatur, sic autem, vt primum in varias propagines distribuatur: deinde in alias, tandemq; in fibras admodum tenues discindatur, atq; hæc rursus om-

Alia mouentium, alia sentientium compositio.

Cerebrum mouetur: membranę sentiunt.

Mouendi vis à cerebro, sentiendi membranis ipsius.

Nerui motus & tactus.

Motus voluntarij instrumentum.

nes in muscoli sine coeunt, vbi neruum æqualem, vt in principio, referunt, qui aut in tendinem, aut in os, aut in membranam inseritur. **MATHESES**, Si igitur mouendi facultas eandem essentiam, quam sentiens sortita est, atq; hæ partes animæ sunt coniunctæ, cur non omnia, vt rerum comprehensionem quandam, & appetitum habent, sic etiam incedendi vim sunt consecutæ? **GERON**,

*Instrumentis ab-
olitis, functiones
& facultates ada-
esse nequeunt.*

Quia motus instrumenta non receperunt. his enim desinentibus, functiones quoq; & earum facultates deesse oportet. Quamuis autem tactus omnibus insit animantibus, vtpote solus ad salutem illorum, & conseruationem maximè necessarius, vt quo adempto, ipsa tactabilium qualitatū excessus mortiferos effugere nequeant, tamen reliqui sensus, melioris cuiusdam officij auctores, non necessariò omnibus sunt donati. Imò homo interdum eis tum originis, tum morbi vitio destituitur, quando idoneis priuatus est instrumentis. Ceterum alia animantia solo tactu pre-

dicta sunt: alia etiam gustu & sensu simul: plurima internis facultatibus pollent: sed hæc obscurius, illa magis euidenter, & efficaciter, quamuis illæ minorem instrumentorum rationem desiderent. At incedendi facultas in illis tantum viget, quibus spinæ medulla, aut simile quiddam ei accessit. **MATHESES**, Memini me nuper ex anatomicis quibusdam audiuisse, imaginandi, fingendiq; vim prioribus cerebri ventriculis, memoriam autem in posteriore contineri: quid tu ea de re sentis? **GERON**, Auicennæ hæc est doctrina, sed non veritati consentanea, vt superius proposuimus rationes testantur. Memoriam enim, atq; imaginationis facultatem vna eademq; essentia & sedes existit: vt quæ eisdem etiam spectris occupentur, & simili vtantur instrumento corporeo: quanquam ipsarum efficiendi ratio sit diuersa. **MATHESES**, Quare id accidit, vt vna causa efficiens, quæ etiam vno vtatur instrumento, diuersa proferat opera? **GERON**, Eò quòd alio modo illud his accommodet, alio vires exerceat. Quare si tactus hoc præstare potest, quantum magis princeps ille, ac interior sensus? qui et si corporeo insit instrumento, functiones tamen occultas acrimonia potius ingenij, & obseruatione rebus adhibita obit, quam instrumentorum subsidio. Quippe omnes hæ functiones in illius sunt potestate, sic vt quando velit, eas exequatur. **MATHESES**, Itane etiam exteriores facultates habent? **GERON**, Neutiquam. nam cum non sint liberæ, instrumenta necessariò sequuntur: ob quod abditas illas, & interiores vires sedibus & instrumentis separare non est necesse. Hinc fit, quòd veteres medici oblecta memoria, non decipiti soli, sed toti capiti remedia applicanda putent, eò quòd pro certo credant, imaginantem animæ partem si-

Memoria & imaginationis eadem essentia, & sedes.

Ex vna causa, et eodem instrumento diuersa opera.

mul &

mul & recordari, & rerum impressiones conseruare. MATHETES.
Quæ est tertia pars animæ?

GERON, Vitalis, quæ in corde tanquam propria sede, & domicilio conſedit. MATHETES, Differtne à naturali & sentien-

*Vitalis animi
pars ab alijs dis-
ſert.*

5 te, siue animalis? GERON, Quamuis plerique philosophi, præsertim
Aristoteles, naturalem & vitalem eandem esse putent, tamen Pla-
to, & Galenus, ipsaque euidentia rem aliter habere demonstrant.
Si enim singularum sedum, in quibus tres illæ partes animæ con-
sistunt, differentias consideres, facile diuersas ipsas esse deprehen-

Pulsus.

10 des. Quippe cordis & arteriarum, quem pulsus vocant, motio,
perennis & constans est: cuius assiduitate perpetua spiritus pro-
creantur. MATHETES, Quæ uis cordis motionem efficit? GERON,
Calori ipsius insita, à naturali, & sentiente siue animali dissidens.

*Vis pulsus effi-
ciens calori cor-
dis insita quid ef-
ficiat.*

15 Hæc reliquarum duarum partium animæ facultates actionesque
conseruat: minus integras perficit: & tardiores incitat, totique cor-
pori, maxime uero iecinori & cerebro impartitur. Naturalis nu-
tritioni tantum addicta est: animalis omnibus corporis partibus
sensum motumque suppeditat. Tres igitur facultates in nobis sunt,
quarum gubernaculis corporis humani, natura & integritas reti-

Naturalis vis.

20 netur, coheretque. MATHETES, Quare ipsas inuicem differre, & se-
paratas esse dixisti? GERON, Quia si una ex eis lædatur, vel pror-
sus intereat, reliquæ incolumes, & integræ permanere possunt.

*Quare tres ani-
mæ facultates
separate sint.*

25 Verbi gratia, in lethargo sensus omnis & motus, imò tota senti-
endi facultas interit: naturalis & vitalis saluæ permanent: in mar-
core alitrix, violata est: sentiens & vitalis, integra: in pestilentia,
vomitu, & animi defectione, vitalis facultas plurimum infestat-
tur, alijs nihil omnino, aut multò minus offensis. Quinetiam vis
animalis ex morbo in quauis corporis parte aboleri potest, vitali
adhuc superstite. MATHETES, Obsecro te, mi præceptor, hoc mi-

*Quomodo facul-
tates in corpore
aliquo, & toto
animante habeo-
ant.*

30 hi adhuc de facultatibus istis indices, num prorsus etiam, cum in
vno eodemque corpore coierint, tunc inde quasi diuulsæ inuicem,
& separatæ distrahantur, sicut in perfecto animante, essentia, in-
strumentis, & sede, seiunctæ sunt. GERON, Non certè, tanta enim
omnium mutua est conspiratio, annexioque, ut singulæ aliarum
35 subsidio consistent. Fieri autem potest, ut partis alicuius sola fa-
cultas animalis intereat: reliquis duabus saluis: aut, ut naturalis si-
mul cum animali pereat, vitali tantum superstite: sicut interdum
accidit, ut vis spiritus vitalis per arterias in partem aliquam de-
fluat, naturalis autem, & animalis non item. MATHETES, Aliter
40 ergo in toto animali quam in eius partibus accidit? GERON, In-
dubiè. illud enim donec vita fruatur, alimentum ubi suppeditari
postulat, his autem conferri, non semper est necesse. MATHETES,

*Facultates mu-
tuas operas tra-
dunt.*

Quomodo facultates mutuas operas tradunt? GERON, Vitalis cæteras perficit, conuertitq; & hæc rursus ab illis mutuis iuuatur officijs. Naturalis enim alimentum ei suppeditat: animalis autem dum pectus & pulmones mouet, nutrimentum, & refrigerium eidem parat. huic porro reliquæ duæ materiam subministrant: 5
vitalis per arterias illapsa naturalem tuetur, augetq; hæc vicissim animali perpetuò indiget. MATHETES, Si hæc ita sunt, vt dicis, tres istæ facultates indissolubili consensu mutuò sibi opitulân-
tur, nullaq; citra aliarum officia potest consistere, atq; vna pere-
unte, reliquæ etiam pariter intercidunt. GERON, Hæc mea est sen- 10
tentia, vbi in corpore aliquo illæ conuenerint. ac in perfecto ani-
mali, cum variæ, & distinctæ sint earum sedes, quarum vitio spi-
ritus, calorq; & facultatum essentia offenduntur, singulæ violari
possunt, reliquis duabus adhuc integris: quamuis si læsio diutius
perseueret, ad illas quoq; tandem perueniat, fiatq; omnium com- 15
munis. MATHET. Quo ordine solent facultates intercideret? GE-

*Facultates quo
ordine interci-
dunt.*

RON, Quæ maiorem habet cognationem cum afflicta, ea statim
post hanc infestatur: quæ minorem, postremò. Verbi gratia, si
animalis vitiata est, primùm vitalis post illam læditur: deinde na-
turalis afficitur. si vitalis initio noxam conceperit, mox animalis 20
eam experietur, vt cui illa materiam, vitæq; formam ministret:
tandem verò naturalis. si hæc primùm læsa est, statim vitalis, de-
inde animalis offendetur. MATHETES, Intelligo hunc ordinem
facultatum in affectionibus ipsarum à natura obseruari: quis in
actioneprehenditur? GERON, Longè diuersus. nam in origine 25
nostra, principatum tenet alrix: hanc sequitur vitalis: postrema
est animalis. MATHETES, Quæ inter has excellentissima, nobi-

*Facultatum or-
do in origine no-
stra.*

*Nobilissima in-
ter facultates ani-
malis.*

*Vitalis secunda.
Naturalis postre-
ma.*

lissimaq; censetur? GERON, Animalis: huic succedit vitalis: extre-
ma est, & ignobilissima alrix. Nam hæc vilium stirpium quoque
communis est: vitalis animantibus dicata, præstantiorq; illa est, 30
vt cuius actiones promoueat & absoluat: inferior autem, obscu-
riorq; animali: quia ob hanc maximè ipsa condita est. Quod si fi-
nis vitalis, ad quem reliqua tendunt, spectetur, insignis existit.
Iam animales functiones, sensus, motus, ratiocinatio, contempla-
tio, vita sapienter instituta, quia excellentiores dignioresq; sunt, 35
quàm simplex vita, facultatem ipsarum effectricem, omnium sum-
mam & principem esse indicant: & in actione, vitæq; necessitate
omnium prima vitalis statuitur, quod non solum reliquis mate-
riam suggerat, sed illas etiam excitet, perficiat, mutuoq; comple-
xu tueatur, & foueat. Si namq; pars aliqua corporis motus, sen- 40
susq; particeps æri, siue nutriri debeat, necesse erit, vt spiritus, &
facultas vitalis in eam influat. si yero lædatur, mox vtriusq; actio
inter-

interpellabitur, quasi in vtriusq; opus communiter concurrat. MATHETES, Explicatis iam tribus illis animæ partibus, earumq; sedibus & facultatibus, quas stirpibus, brutis, & hominibus inesse docuisti, sub qua tandem mentem nostram comprehendis?

- 5 GERON, Sub ea, quæ rationis & intelligentiæ est particeps, quæ non ex corpore nostro procreata est, sed à summo rerum omnium opifice Deo Opt. Max. eoq; sempiterna & immortalis: vti sentiens, mortalis, & caduca est. MATHETES, Qua de causa? GERON, Quia hæc ex corpore nostro trahit originem, eiq; adeò est immerfa, vt
 10 nunquam ab illo diuelli queat: illa verò corpori non est permixta, sed simplex ipsi tanquam gubernator asistit. MATHETES, Quis fit, vt anima nullius terrene concretionis particeps, è corpore migrare cogitur? GERON, Quia, sicut artifex quispiam in conclauio obscuro, nimisq; angusto inclusus, quamuis idonea ipsi adsint instrumenta, nihil operis exercere potest: ita quoq; illa domicilio suo, hoc est, corpore vitiatò, ne functiones suas obeat, impeditur. Itaq; anima, congruam corporis mediocritatem desiderat: quæ si
 15 non nihil immutetur, minus rectè munij suis fungi poterit: si plurimum violetur, statim ipsa tanquam à domicili sui ruina abhorrens, aliò commigrat, quocunq; DEVS OPT. MAX. per vnicum ipsius filium IESVM CHRISTVM illam ablegauerit. MATHETES, Omnesne iam facultates animæ es persecutus, an aliæ quædam restant?

- GERON, Cùm tres animæ partes suo singulæ appetitu ad
 25 agendum impellantur, appetitiones etiam totidem esse, quæ animi mores indicant, oportet. prima rationis particeps, secunda illius expers. sed hæc rursus bifariam diuiditur: nam altera voluptates sectatur, quæ nobis cupiditas, siue concupiscentia, Græcis *ἡμωδότης* dicitur: altera animum ad indignationem & iram ad-
 30 ducit: vnde *θυμωδότης* græcè, quasi animosa nuncupatur. MATHETES, Quibus actionibus tres illæ facultates discernuntur? GERON, Prima, quæ rationi obtemperat, prudenter aliquid & constanter desiderat, appetitq; reliquæ duæ, multa temerè, & imprudenter concupiscunt: vna ad esculenta, poculenta, venerem, & id genus
 35 alia: altera ad gloriam, honorem, opes, iniuriam, vindictam, supra vel infra modum animos hominum incitat. Rationalis hisce duabus acri pugna obsistit, renititur, contrariaq; suadet. si verò in hoc certamine forsan ab eis euicta succumbat, inuita illas sequitur, quocunq; ipsam abripiant. Interdum accidit, vt cùm rationalis, vitiorum blanditijs & voluptatibus succubuerit, animosam
 40 facultatem in auxilium adducat, quæ tanquam iracunda insurgens, simul cum illa aduersus vitiosas cupiditates decertat, quam-

Intelligentiæ facultates, quibus mens comprehenditur.

Intelligentia corporis gubernatrix. Cur anima è corpore migret.

Anima mediocritatem desiderat.

Appetitiones animæ. Rationalis, Concupiscentia, Animosa.

Actiones facultatum.

Certamen inter facultates.

Cupiditatis partes.

Animosæ facultatis partes.

Rationalis.

Facultates animæ ubi consistant.

uis hæc pro suo furore & impetu rationali resistat. MATHETES, Quæ sunt cupiditatis partes? GERON, In appetitoria facultate, nimius amor, vel odium, seu fastidium veneris, cibi, viniq. horum autem mediocritas, temperantia est, quam ratio consulit: in animosa ira, cupiditasq. vindictæ, & metus mali futuri, nec non gaudium & lætitia cum animus bonis fruitur: dolores, cum mala inciderint, similesq. alię perturbationes. In rationali, equi boniq. & mediocritatis in omnibus observatio. MATHETES, Quo in loco hæ facultates sedes suas habent? GERON, Vbi tres animæ partes: appetitoria in iecore, animosa in corde, rationalis in cerebro. Id autem hîc notari velim, vires istas appetentes non cum alijs supra dictis animæ facultatibus confundi debere, quamvis easdem sedes, eandemq. essentiam habeant. Nam in cerebro appetitus rationalis aliud est, quàm intelligentia: in corde vis iracundiæ, aliud quàm vitalis: cupiditas in iecore aliud quàm alitrix. MATHET. Quæ hætenus de anima eiusq. generibus, partibus, & facultatibus me docuisti, præceptor observande, mirum in modum me delectarunt. si non tibi molestum sit, oro vt etiam singularum facultatum actiones enumeres, hoc est, qua ratione, & ordine illæ singularim spiritibus suis, particulis, temperaturis tanquam instrumentis, operentur.

Naturæ functio summa, nutritio.

Dentes cibo immutando inseruiunt.

Cibi ex ore ad inferiora depulsio quomodo fiat.

GERON, Libenter tibi morem geram, cum certo sciam illa tibi non parum ad nobiliorum partium vsus cognoscendos, profutura. Vt igitur facilius, quæ dicturus sum, assequaris, primùm naturæ, deinde animæ, postremò vitæ functiones percensebo. Summa naturæ functio est nutritio, quæ ab illa ex cibo assumpto perficitur. Nam hic tota naturæ ipsius est materia, ad quam expurgandam, conuertendam, & in omnes deniq. extremas corporis regiones per meatus ductusq. proprios distribuendam, valide incumbit: cui actioni primùm dentes inseruiunt: dum cibum orinditum, si durior est ac solidior, mandunt, attenuant, & veluti molunt. vnde ille adeò immutatur, vix vt priorem formam naturamq. retineat. Ad id autem perficiendum maximè prodest, quòd cibus iste accuratè confractus confectusq., nec non pituita oris perfusus sit: adhæc, quòd huius tepore incaluerit: nouissimè quòd eiusdem tunicam ventriculo continuatam & communem attigerit. MATHETES, Quorsum tandem cibus ita mansus, nutritioniq. præparatus fertur? GERON, Lingua illum motu suo, crebraq. agitatione ad stomachum protrudit: hic ipse eundem rectis suis fibris ab ore attrahit, ac veluti communis viæ excipit: inde ventriculus, rectis interioris suæ tunicæ fibris allicit, sic tamen, vt à stomachi quocq. transuersis exterioris tunicæ fibris adiuuetur.

MATHES.

- MATHESES, Quomodo id accidit? GERON, Sicco, aut humido aliquo ex ore demisso, fibræ transuersæ, quæ ei subsunt, dilatari, quæ superius extant, contrahi adeò arctè solent, vt spiritus, licet tenuis, inter deglutendum haustus, simulq; impulsus, plæruncq;
 5 reduci nequeat. MATHESES, Ergò cibus partim stomacho, deorsum agente, partim ventriculo trahente, ad inferiora tendit? GERON, Ita res habet. MATHESES, Quid ventriculum mouet, vt cibum attrahat? GERON, Appetentia: vnde etiam fit, vt ijs qui supra modum appetunt, ille celerius descendat, inferiusq; pellatur.
 10 Cum enim nimia fames vrget, ventriculus cibos etiam nondum adhuc satis in ore confectos, præter voluntatem inter mandendum sæpe ad se rapit, vt illam expleat. MATHESES, Quid ventriculus deinde agit? GERON, Cibum attractum sinu suo obliquis fibris supra infraq; & omni ex parte adeò arctè includit, continetq; vt prorsus ei adhærescere videatur, nullumq; in eo spatium vacuum relinquatur, modò benè habeat. MATHESES, Cur ventriculus cibo adeò circumdatur, & hic illius lateribus coarctatur? GERON, Quia si huc illuc in tam capaci sinu fluitaret, perfectè concoqui non posset. Ideo etiam imæ ventriculi partes, & supremi intestini iunctura, *πυλωῶς* græcè dicta, admodum arctè clauditur, obsignaturq; ne cibus vllus siue siccus, siue liquidus ante legitimum à natura præscriptum tempus, exire queat, nisi aut magno materiæ pondere, aut acrimonia illum infestet. MATHESES, Quid interea ventriculus molitur, dum cibum in se continet?
 25 GERON, Totum ipsum calore suo, & spiritu genuino, propriaq; & recondita essentia ipsius vi, sine fibrarum adiumento mutat, & conficit: ad quam rem proximæ partes, iecur, lien, cor, septum transuersum, & vena caua ei opitulantur, nec non omentum extrinsecus admotum est, vt calorem reprimat, ne diffletur digeraturq;. MATHESES, Hisce igitur auxiliarijs adiutus ventriculus, in quam formam cibum redigit? GERON, In cremorem, quem Greci *χυλόν*, Latini succum, barbari illos imitantes etiam chylum appellant. atq; hic primum concoctricis facultatis opus est, nō autem vera concoctio, sed potius quædam ad illam præparatio: nec
 35 ventriculus hoc tanquam proximo ipsius alimento nutritur, sed ipso sanguine, vt in fœtu, qui adhuc in vtero gestatur, deprehendi potest, cum tunc nullum adhuc cibum assumat. Si igitur tunc ventriculus, præsertim interior eius tunica, puro & sincero sanguine nutriri solet, quantò magis infante iam in lucem edito, &
 40 in alijs ætatibus, quando plenius liberaliusq; ali desiderat. MATHESES, Hac ratione chylus ventriculo nihil commodi adferre videtur. GERON, Erras. cum enim ventriculus immodicè inna-

Appetentia cibi attrahendi causa.

Fames nimia.

Continendi cibi in ventriculo ratio.

Tempus cibi excernendi à natura præscriptum.

Ventriculi actio, dum cibum continet.

Quæ partes ventriculum extrinsecus iuuent.

Cremor, seu chylus primum concoctricis facultatis opus.

Chylus non verè nutrit, sed sanatur.

nitus, lateraꝫ eius collapsa fuerint, tunc vtiliorem chyli siue cremoris portionem, interiori suæ tunicæ insinuat, & amplectitur: ex qua magna cum voluptate refocillatur: non autem verè alitur. nam vbi ille vacua tunicæ spatia replevit, extenuatur, & euanescit: nec non appetentiam ac famem qualitate potius, quàm essentia saturat. *MATHESES*, Vnde ergo ventriculus vero alimento reficitur? *GERON*, Ex sanguine: qui à portarum venæ ramis ei communicatur. atq; sic duplex ventriculi alimentum, nempe verum, & ascititium statuendum esse iudico, sicut etiam duplicem appetentiam seu famem, videlicet animalem & naturalem. Hanc sola sanguinis essentia per ventriculi compagem diffusa, atq; in naturam eius conuersa explere, illam non tantum sanguis, sed etiam quicquid suauis aliqua & grata qualitate præditum in ventriculum demittitur, potest.

MATHESES, Vbi iam ventriculus meliore cibi parte refocillatus fuerit, quæ deinde facultas eius, functiones suas aggreditur? *GERON*, Excretrix fibris transuersis illum contrahens coarctansq; omnes chyli reliquias tanquam inutiles per os inferius portæ modo iam adaperitum, ad intestina propellit, vi retentricæ interea feriante, & otiosa. *MATHESES*, Num illa etiam cibum, aut cremorem sicut stomachus & ventriculus ad se trahunt? *GERON*, Nequaquam, eoq; fibris rectis carent: sed exceptum vi expultrice, quæ valentissima eis inest, statim extrudunt: quamuis autem id operis transuersæ, & orbiculares vtriusq; tunicæ intestinorum fibræ promoueant, non tamen facile cibum per ista labitur: eo quod varij ipsorum sint orbes, & anfractus: in quibus ille magis elaboratur. Quicquid igitur cremoris probè coctum, & salubre extiterit, id totum in iecur per venas meseraicas transsumitur. si verò quædam illius portio minus elaborata primum intestinorum orbem præterierit, in secundo conficitur: sin hunc quoq; præterlapsa fuerit, secundo, vel tertio, vel alio deinceps, tunicam illorum (ad quam venæ oris hiant) attingit. *MATHESES*, Quid si neq; ex his in venas mesenterij abreptum fuerit? *GERON*, Tunc in crassiora intestina, tanquam inutile, & excrementitium deijcitur, tandemq; vbi illa se tum astrinxerint, tum relaxarint, in aluum depellitur, in qua tanquam receptaculo tamdiu residet, donec foras excernatur: non prius autem id fieri solet, quàm ambiens, stringensq; anum musculus rationis iussu, illud elabi sinat. Itaq; in excernenda aluo musculus ipse iam dictus, voluntate nostrâ resoluitur: intestina naturaliter expellunt: septum transversum, & abdomen interdum eis opitulantur. *MATHESES*, Si rectè sententiam tuam intelligo, deiectio ista alui naturalis omnino

Vnde ventriculus alitur.

Alimentum verum, & ascititium.

Appetentia duplex.

Vbi intestina non elaborant.

Excretrix ventriculi facultas.

Intestina cibum non attrahunt.

Vbi intestina non elaborant.

Vbi intestina non elaborant.

Vbi intestina non elaborant.

Vbi intestina non elaborant.

Vbi intestina non elaborant.

Vbi intestina non elaborant.

- nino est: retentio autem ipsius voluntaria, quam solus constringens musculus efficit. GERON, Rectè intellexisti: sed hoc præterea aduertas velim, cibum qui in ventriculo concoquitur, in aliamq; formam mutatur, etiam in transitu per intestina, magis ad
 5 huc elaborari commutariq; nec non hæc ex illo sibi vtile quippiam, & gratum allicere, quò tandem sicut ventriculus, perfruatur. MATHETES, Vnde intestina verè nutriuntur? GERON, Ex venis meseraicis, quæ sanguinem è iocinore reducunt, sicut eadem vicissim cremorem seu chylum conferunt, sic vt ille ex
 10 noribus ad maiores permeet, donec ad venæ portas peruenierit. ad hanc nanque regionem per multiplices angustasq; admodum vias accedit. MATHETES, Quid venæ istæ meseraicæ efficiunt, præterquàm quòd cremori viam ad iecur deferendo præbeant? GERON, Preparant illum huic, & quasi sanguinis rudimentum
 15 ponunt. Cùm igitur nullæ aliæ viæ, per quas alimentum influxat, vsq; iam ex intestinis in iecur rectè ferantur, rationi videtur consentaneum venas illas meseraicas, non solum ventriculi & intestinorum nutritioni, sed etiam cremoris seu chyli distributioni esse dicatas. MATHETES, Singulæne vtrunq; munus obtinent?
 20 GERON, Vtrq;. nam tum chylum in iecur deferunt, tum sanguinem in intestina refundunt, idq; vna & eadem simul humorum congressione, non temporum quadam & officiorum vicissitudine. MATHETES, Quæ causa est cur chylus & sanguis in eisdem venis permisceantur? GERON, Trahentium sanè partium naturæ
 25 & desideria: quòd aliæ alia alliciant, atq; secernant, vt in alui purgationibus euidenter apparet. Adhæc notandum est, superiores mesenterij venas in ventriculum & tenuia intestina tendentes, minus quàm inferiores, humoribus illis ex iecore educendis esse dicatas. Nam in dysenteria, magisq; in tenasmo rodens & acris humor
 30 crassioribus intestinis incidit, sic vt plerunq; superiora nihil offendantur, alimenta autem concocta retineant, distribuantq;, licet aluus continuè irritata humorem deiciat. Imò etiam fieri potest, vt si quid purgantis medicamenti cibus permisceatur, vno
 35 eodemq; tempore & nutritio, & humoris vitiosi excretio fiat. hic quidem per venas inferiores in aluum propellitur: alimentum verò per superiores in iecur abripitur: sic vt tum illæ, tum iecur per ipsas attrahant. MATHETES, Quamobrem potissimum illud arripiunt? GERON, Ob familiaris cuiusdam facultatis vtriusque communionem. vt autem cremor celerius in iecur perferatur,
 40 vasorum efficit amplitudo: illius tenuitas, impetusq; penetrandi, & attractricis facultatis robur. Hoc pacto, quodlibet sanè vinum promptius quàm aqua ob qualitaris cognationem in corpus di-

Cibus in intestinis magis elaboratur.

Intestina vnde verè nutriuntur.

Meseraicæ venæ quid efficiant.

Chylus & sanguis in eisdem venis permisceantur.

Nutritio & excretio simul fieri potest.

Vinum cur facile distribuatur.

tribuitur: album autem facilius quàm rubrum austerumq; in iecur fertur: eo quòd natura tenue sit, & vim quandam penetrandi habeat. tale enim illud, dum attrahit, expeditius subsequitur. MATHESES, Si distributio per solam attractionem perficitur, quomodo corporis habitus, eiusq; venæ in athleticis, & similibus supra modum impleri possunt? Docuisti enim me, nullam partibus valdè repletis saturisq; appetentiam inesse, quæ trahendi alimentum desiderium inducat, incitetq;: sin autem partes corporis non appetant, certè nec alimentum arripient, quod aliàs fieri dixisti, ut eo perfruantur. Si verò iam illæ hoc abunde potitæ fuerint, aliud non desiderare appetereq; neq; ad se attrahere posse videntur. GERON, Fateor me ista superius dixisse, atq; etiam nunc affirmo. sed hoc quoq; advertere oportet, in temperantibus quidem partes corporis alimentà per vniuersum illius habitum attrahendi facultate distribuere: in luxuriosis autem, & intemperantibus illa ob tenuitatem suam, aut aliam quandam vim ipsis ingenicam interiora corporis penetrare. Si quis igitur omnem tum ventris, tum aliarum partium appetentiam mediocriter, & ad facietatem expleuerit, iterumq; postridie crudus adhuc se cibis ingurgitarit, ñ illarum attractione allicientur, sed propria potius vi se in venas protrudent. Quamuis enim intemperantior aliquis multos cyathos exhauserit, reliquæ tamen cibi, quæ ab illis deiiciuntur, nihilo fiunt liquidiores: quia vinum quantum sorpsit, totum id in venas permantat. quinetiam si vinum tenue & valentius assumptum fuerit, aditusq; ad iecur pateant, non autem obstructions distributionem alimenti impediant, ac remorentur, tale prope modum reddi solet, quale potum fuerit, vix vlla ex parte commutatum. MATHESES, Vbi iam chylus ille, siue cremor, qui nos allet, à reliquijs cibi ex ventriculo & intestinis secretus per venas illas meseraicas, ad amplam illam venam, *πύλας* græcè, nobis portat dictam, peruenerit, quomodo deinceps ad corpus nostrum alendum, magis elaboratur? GERON, Per ramulos venarum ex magna ista propagatos, in totum iecur distribuitur. cum autem tenues illi sint & angusti, succus ille distributionis impetu allatus, non facile, & celeriter per eas penetrare potest: eoq; diutius in iecore morari, & in transitu hæreere cogitur. Quia verò hac ratione carnem iecoris propriamq; eius essentiam proximè accedit, attingitq;, absolutè concoquitur, efficiturq; inde sanguis integrior, quàm si in amplo capaci sinu, uti cordis, aut ventriculi contineretur. ad id non parum etiam confert, quòd venæ iocinoris tenuibus admodum tunicis sint præditæ. MATHESES, Cui obsecro parti iecoris minus illud sanguinis efficiendi est commissum? GERON,

Distributio per quæ fiat.

Athletæ.

Temperantes & intemperantes quomodo in cibi distributione habeant.

Chyli distributio.

- RON, Proprie ipsius carni: quanquam reliquæ eius particule omnes ad id etiam vtilis sint, & commodæ. dum autem caro illa iecoris, quæ concretum sanguinem repræsentat, chylum ex ventre allatum, in propriam ipsius naturam sensim commutare, sibiq̃
- 5 prorsus assimilare conatur, primùm sanè crassiore, & colore rubrum efficit: deinde ubi ad mediocritatem quandam accesserit, verè sanguis euadit, tantò iecoris essentia inferior, quantò ventris chylo superior. MATHETES, Si te rectè intelligo, sanguinis confectio, non caloris beneficio tantum, sed ingenta etiam iocionoris proprietate maximè absoluitur? GERON, In ea persiste sententia, ad huius autem proportionem, illorum etiam quæ in reliquis partibus gignuntur, humorum, vti lactis & seminis concoctionem æstimare oportet, vt hæc nihil sit aliud, quàm inchoata, & imperfecta quædam assimilatio, rei q̃ alicuius rudimentum.
- 15 MATHETES, Quando sanguis iam est genitus, quomodo iecur illius officina ex ipso alitur? GERON, Familiarem quandam, benignamq̃ eius portionem sibi adiungit, apponit, & assimilât, non sicut ventriculus, aut intestina chylum, sed ita, vt illam perfectè in naturam suam conuertat. MATHETES, Quorsum reliquam sanguinis partem redundantem & superuacuum iecur transmittit? GERON, In venam cauam perlabi sinit: à qua in totum corpus per complures illius ramos in vniuersas illius partes tendentes, distribuit dispensatq̃. MATHETES, Antequam de sanguinis distributione differere pergas, explices solusne ille gigni, an alijs humoribus simul cum eo soleant, & quinam, quales, & quot ipsi existant?
- 25 GERON, Chylus seu cremor ex ventre in iecur transfusus, cum liquor quidam humidus existat, musti instar quodammodo inferuecit, & concoquitur, tandemq̃ hinc duo recrementa apparent: quæ primùm sanè confusa, nunc vi concoctionis discernuntur, seceduntq̃. alterum crassius, grauius, & magis terrenum existit, quod in imo subsidens fæci respondet, ac humor melancholicus dicitur: alterum tenuius, leuius, magisq̃ aërium ceu vini florem repræsentat, ac flaua bilis, seu fel vocatur. Quia verò hæc duo tanquam superuacanea, & corpori alendo minus idonea, sanguini puro non permiscuntur, in suam quæq̃ sedem propriam reponuntur. ac vesicula quidem ad iecoris portas sita flauam: lien
- 35 aram, peculiari singula itinere & via attrahunt. MATHETES, Bilis ista flaua alijsne humoribus infecta eò fertur? GERON, Non, sed pura ac sincera, idq̃ duplici de causa. primùm quò ductus & via
- 40 in illam sit angustior, quàm vt crassiore recipere possit: deinde quò eadem ob familiaritatem, & occultam conuenientiam, (quam cum hac obinet) attrahatur. Ideo quoq̃ biliosus iste hu-

*Sanguificatio cuius
partis iecoris
commissa.*

Assimilatio inchoata.

*Iecur quomodo
alatur.*

*An humores si
mul generentur.*

*Excrementa
chyli.*

*Bilis flaua, &
atra.*

mor etsi rodens & acris existat, non tamen vesiculam, ipsius receptaculum offendit, infestatq; , sed ob mutuam cognationem voluptate afficit, oblectatq; . **MATHETES**, Alitne etiam illam? **GERON**, Nequaquam, utpote amarus, & nullius benigni succi particeps. sanguis autem ipsam nutrit. quem per venam manifestam ceruici ipsius insitam, ex portis iecoris excipit. **MATHETES**, Quomodo vesicula iam dicta, ubi nimia bile inturgescit, grauiaturq; , se pondere leuare potest? **GERON**, Id alio itinere ad ieiunum intestinum deponit. **MATHETES**, In quem usum? **GERON**, Ut reliquiae excrementorum celerius desiciantur: quod flauus eorum color, quo illa hæc tingit, testari potest. **MATHETES**, Quaparte lien, atram bilem siue humorem melancholicum exiecore attrahit? **GERON**, Caua, per venam à portis deriuatam, illam ab hoc purgat. **MATHETES**, Qua facultate eandem allicit? **GERON**, Insita, qua ipsi familiaris & gratus est. **MATHETES**, Per quales venas in se recondit? **GERON**, Per exiles. in ijs quoq; illum elaborat, comminuit, extenuat, & quoad licet commutat. idq; tum caloris natiui robore, tum perpetua complurium magnarum arteriarum pulsatione. **MATHETES**, Sanguis qui in lienem allicitur, similisne illo est, qui in iocinore continetur? **GERON**, Lienis crassior est: ubi autem in ipsius venis & arterijs elaboratus fuerit, non totus, neq; crassior eius portio, sed tenuior ipsius sit alimentum, in eiusdemq; carnem influit. Quamuis autem is tenuis sit, nequaquam tamen ruber, sed leuiter niger existit, uti ille qui iecur nutrit, crassior est, & ruber. conuenit enim, ut singula membra familiari & cognato sibi humore nutriantur. **MATHETES**, Quorsum crassior melancholici humoris portio, quæ lienis facultate neq; molli, neque subigi potuit, transfertur? **GERON**, Cum sit ad nutriendum inepta, in os ventriculi proprio meatu tanquam eructando euacuatur. **MATHETES**, Quid ibi habet officij? **GERON**, Cum austera sit, & acerba, ventriculum astringit, coarctatq; , ut inde omnis eius actio firmitior, validiorq; existat. **MATHETES**, Permanetne in ventriculo? **GERON**, Nullo pacto: sed deinde in ventris sinum relabitur: hinc cum cibus in intestina descendit, tandem ut incommoda, & ciborum reliquijs inhærens, simul cum eis foras propellitur. non enim in venas & iecur iterum ex illis traducitur, sicut neq; flaua bilis, quæ iam dudum expulsa, alui excrementa infecit. **MATHETES**, Vtriusq; bilis ortum exposuisti, quomodo pituita procreatur? **GERON**, Sanguini, à quo utraq; iam bilis separata est, crudus quidem adhuc humor inest permixtus, Græcis contra etymologiæ rationem *φλέγμα*, & *φlegμαίνος χυμός*, nobis pituita dicitur: cui natura expurgando nullum peculiare

Sanguis vesiculæ bilis nutrit.

Bilis ad ieiunum intestinum deferitur.

Lien insita facultate humorem atrum ex iecore attrahit.

Quomodo lien atrum humorem conficiat, seu elaboraret.
Iecoris & lienis sanguis differant inter se.

Recrementum melancholici sanguinis quo feratur.

Pituitæ origo.

- liare donauit instrumentum, vt qui segregari excludiꝑ non debeat. Nam semicoctum est alimentum, quod simul cum sanguine in venas rapitur, vt per inedias & famem temporis processu integre concoquatur, atꝑ immutetur, fiatꝑ corpori alendo vtilis, & salutaris. *Pituita semicoctus humor.*
- 5 *MATHETES.* Non igitur pituita ista sicut humor melancholicus, & flaua bilis, quorum supra meministi, superuacanea dici debet? *Pituita non superuacanea.* *GERON.* Nullo modo, cum sit ad nutriendum idonea. Id autem notari debet, ipsam neque muco è naribus mananti, qui Græcis *μύξα* vocatur, neꝑ albo illi crassoꝑ & lento humori, qui
- 10 in ventre & intestinis necessariò gigni dicitur, esse similem. hic nanꝑ ventriculi concoctione destituitur, vt ne succus quidem omnino censerī debeat: illa verò quam modò retulimus, ex bono, & concocto chylo siue cremore, procreata est. *MATHETES.* Vniuersi isti humores vnòne tempore, & ab eodem calore pro-
- 15 gignuntur? *GERON.* Sic arbitror. dum enim cibus commutatus sanguinis formam acquirit, reliqui humores pariter nasci solent. Et si enim calor natius simplex, & eiusdem naturæ fuerit, alimenta tamen variam in se continent materiã, quæ ex quatuor illis rerum primordijs, temperatione quadam mixtis, confata sit, vnde
- 20 chylus ex cibo factus, licet simplex, & vnus naturæ appareat, reuera tamen ex diuersis rebus mutuò permixtis concreuit: quarū alię calidę & tenues: alię frigidę & terrestres: alię frigidę & humidæ: alię calidę & humidæ existunt. Non igitur alienum à ratione est, si vno iecoris calore in tam varium, & multiformem chylum
- 25 agente, diuersos humores procreari dicamus. siquidem complura variaꝑ à simplici causâ efficiente gigni ob materiæ dissimilitudinem posse, naturę interpretes protulerunt. Sicut enim nullū chyli, aut alimenti genus simplex esse potest, ita neꝑ omnes chyli partes vel in grauissimo morbo in vnum simplicem humorem com-
- 30 mutari solent. *MATHETES.* Id mihi clariùs interpreteris. *GERON.* Quamuis enim aliquis natura calidior, & ætate florens, alijs, cæpis, porris, aut melle vescatur, bibatꝑ vinum meracius, non tamen ideo solam bilem ex his, licet eam copiosam, feruidumꝑ sanguinem, sibi comparabit. Iecur enim naturâ temperatum ex chyli
- 35 portione temperata, & mediocri, sanguinem: ex calida & tenui, bilem flauam: ex frigida & humida pituitam: ex frigida & terrestri, humorem melancholicum progignit, sic vt omnia generis sui mediocritatem quandam nanciscantur. Si verò alimentum, vel iecur, vel vtrunꝑ calidum extiterit, bilis quidem abundan-
- 40 tior, eaꝑ calidior gignetur, sicut etiam sanguis, pituita, & melancholia minus erunt frigidæ. nam singuli humores cetera temperamenti latitudine circumscribuntur, per quam à limari possunt.

Omnes humores eodem tempore progignuntur.

Complura à simplici causâ gignantur.

Iecur temperatum quem humor rem gignat.

Alimentum & iecur calidum.

Alimenti & iecoris eadem temperamenta, sui finilia pariunt.

Ex melle non tantum copiosior bilis, sed etiam calidior, quam ex lactucis procreatur. item iecore calido præditus plus bilis, eiusque calidioris ex simili alimento, quam frigidior natura colligit.

MATHESES, Estne igitur sanguis alius alio calidior aut frigidior: bilis hæc illa calidior: pituita, & melancholia hæc, frigidior, quam alia? GERON, Indubiè. neque enim suus cuique gradus ad amulsim est definitus: unde constat, non omnes alimenti partes, bili generandæ efficaces, in vniuersis corporibus æquè in illam conuerti: nec omnes pituitæ gignendæ idoneas, semper in pituitam degenerare, sed caloris vim, & alimenti materiam varietatis plurimum adferre. atque iusta horum comparatio qualis humor

Caloris vis, & alimenti materia varietatem humorum parit.

futurus sit, definit. MATHESES, Solus ne immoderatus calor omnem bilem progignere potest? GERON, Nec is duntaxat, sed etiam temperatus: nec non imbecillus aliam. Qua de causa nemo

Iecur temperatum aut frigidum etiam bilis alia quæ creat.

rerum naturalium peritus dicit iecur temperatum, aut frigidum nihil omnino bilis in se continere, nec alimenta frigidiuscula quicquam illius generare. MATHESES, Verumne est, quod à plerisque dici solet, bilem duntaxat, à natura, ætate, regione, & alimento calidiore fieri? GERON, Non in totum veritati est consentaneum: quia ab alijs quoque causis provenire solet. hoc autem negari

Bilis non solum à natura, ætate, regione, & alimento calidiore, sed etiam ex alijs causis.

non potest, bilem plus æquo copiosam ab illis fieri. quemadmodum pituitam abundantiorē à iecore, & alimento frigidiorē nasci, à temperato sanguinem: melancholiam verò à temperato calore, & alimento simili crassoque & terrestri redundantiorē provenire. MATHESES, Non igitur necessario singuli humores simpliciter à similibus tantum causis oriuntur? GERON, Non, quia ex eodem omnes chylo, solius caloris iecorisque beneficio progignuntur. Quamvis autem hic vndique in totum chylum duntaxat, pari vi, & calore incumbat, non tamen vniuersæ illius partes, æqualiter immutantur, eò quod neque similis ipsarum sit constitutio. unde fit, ut diuersi humores ex his eodem tempore enascantur prodeantque: ex frigida quidem & cruda chyli portione, pituita: ex calida autem & tenui, bilis: ex mediocri, sanguis, ex frigida & terrestri, melancholia. MATHESES, At ego ex alijs quibusdam nuper audiui, sanguinem ex pituita frigidiorē & crudiorē, ubi perfectius concocta fuerit, generari: ex illo tandem, caloris vi, & excessu, bilem: ac singula prius leuiter potius quam integrè concoqui, & paulatim ipsa absolui. GERON, Næ illi aberrant. Quamvis enim sanguis leuiter concoctus, aut eius initium & rudimentum quoddam, pituita vocetur, non tamen quilibet parum concoctus sic appellari, aut ex illa provenisse dici debet, quasi antea pituitæ, quam sanguinis speciem acceperit. Sic enim quodlibet alimentum

Omnes humores ex vno chylo.

Opinio quorundam, quod omnes humores, ex pituita paulatim fiunt.

40
tum

- tum, siue cibus, siue totus Chylus, pituita dici deberet, eò quòd nondum absolutè concocta foret, præterea, si totus sanguis ex pituita gigneretur, deinde ex illo bilis flaua, postea ex hac atra, non plures in nobis humores, quàm vnus duntaxat esset: adhæc, quia
 5 omnis humor concoctione crassescit, flaua bilis crassior quàm sanguis euaderet, nullaq; naturalis esset melancholia, si ex bilis ardore creari deberet, & nulla humorum discretio haberi possit.
- MATHETES, Vnde igitur tu humorum generationes, eorumq; differentias æstimandas censēs? GERON, Non ex solius caloris vi
 10 & gradu, nec ex qualitatibus duntaxat, sed etiam ex propria familiariq; illorum materia. Quippe alia sanguini, alia flauæ bili, alia atræ est subiecta. vnde bilis non ex syncero sanguine prodire potest, sed omnes humores ex congrua aptaq; chyli portione, eodem simul tempore, & vnus eiudemq; caloris efficacia: sicut iam
 15 dudum audiisti. MATHETES, In quam partem postea chylus iste in incurallatus, ibiq; confectus, & à recrementis suis expurgatus, defertur? GERON, In venam cauam ruber iam & syncerus, nisi quòd aquoso & tenui humore sit perfusus, quo tanquam vehiculo facilius in exiles, & angustas valdè tum mesenterij, tum iecoris venas penetret. Quia verò corpori alendo minimè est idoneus, vehendi munere iam defunctus, è caua iecoris parte secer-
 20 nitur, & in renes attrahitur, vnde statim in vesicam defluit, nam iecorenes mox sub iocinore siti, vtrinq; cauæ venæ assident, vt id muneris promptius peragant. MATHETES, Totumne humor istum renes alliciunt? GERON, Nullo modo, quia non nihil illius retineri oportet, quo reliquus sanguis per venas in totum corpus propagatas distribuatur. MATHETES, Per quos meatus renes vrinam attrahunt? GERON, Per venas quas vulgò emulgentes vocant, idq; mutua quadam & communi familiaritate
 25 quam inter se obtinent. MATHETES, Syncerane illa ac pura per amplos istos laxosq; meatus trahitur? GERON, Neutiquam, sed cum ea etiam non parum tum flauæ bilis, tum humidi tenuiorisq; sanguinis. MATHETES, Possuntne tres isti recrementitij humores per eandem vias in vesicam destillare? GERON, Vrina quidem, & tenuior bilis ei iuncta, per exiles transitus, qui tunica interiorē renum sinus succingenti insunt, in vesicam illabi possunt: sanguis autem illis crassior illic conseruatur: deinde roris modo fusus renibus primum apponitur, deinde agglutinatur, tandem assimilatur, & in eorum naturam transit. MATHETES, Cum vrina
 30 è renibus per longos & validos meatus in vesicam depulsa fuerit, potestne per eosdem remeare? GERON, Nullo pacto, nam oblique illi vesicæ sunt inserti. MATHETES, Quare vrina illic tan-

Humor concoctione crassescit.

Vnde humores propriè generantur.

Chylus expurgatus, quo defertur.

Tenuis & aquosus humor sanguinis vehiculum.

Vrina vnde.

Vrina cum bile extenuiore sanguine excernitur.

Sanguis non in vesicam defluit.

Aut vrina in renes posita remeare.

Cur vrina in vesica contineatur.

Quomodo vrina excernatur.

Sanguinis puri distributio.

Spatia inter venas quo alimento nutrantur.

Sanguis quomodo ex amplioribus venis in exiles proneniat.

Primus humor ex secundarijs.

quam in proprio receptaculo colligitur, & continetur. GERON, Ne eam perpetuo & intempestiuius reddere cogamur. MATHE-
 TES, Quando vesica illam excernit. GERON, Cum vel in fluxu
 istius iam inturgescit, vel acrimonia irritatur, sic vt fibræ quas in
 se continet, transuersæ contrahantur, & musculus rotundus cer-
 uicem eius ambiens (qui tanquam custos inhibet, ne vrina sua
 sponte profluat) voluntate nostra relaxetur. ad hanc quoq; ex-
 cretionem musculi abdominis imum ventrem constringendo
 auxiliantur. at reliquias vrinæ, quæ in ceruice vesicæ habentur,
 præsertim aut acres, aut arenis molestas, rotundus ille musculus
 ceruicis nuper dictus expellit, cum se comprimit atq; coarctat.
 MATHESES, Vnde vesica alitur. GERON, Non ex vrina, sed ex eo
 sanguine, qui per venas proprias vtrinq; in ceruicem illius desi-
 nantes influit, sicut etiam tum vterus, tum vesicula fellis nutri-
 tur. MATHESES, Sanguis à recrementis iam purus, quomodo,
 & in quem usum per totum corpus distribuitur. GERON, Iecoris
 sanè vi expellitur, & à vicinis venarum partibus attrahitur. hæc
 deinde in alias propinquas illum extrudit: atque eo modo is, dum
 priores pellunt, sequentes autem attrahunt, commodè in extre-
 mas corporis partes distribuitur. Huc singularum partium vires
 non parum auxilij afferunt: siquidem naturali appetitu incitatae
 eam portionem sanguinis præterfluentis alliciunt, quæ tota na-
 tura sibi familiaris sit & iucunda, idq; meatu ad ipsas pertinente.
 MATHESES, Quo alimento media inter venas spatia, quæ nullos
 micrus ad se vergentes habent, nutrirî possunt. GERON, Eodem
 ipso sanguine: eoq; satis pleno, qui halitus modo per tenues abdi-
 tosq; propinquarum venarum transitus elabitur, trahiturq;. Nam
 alimentum non ex solis vasorum sinibus & osculis, sed etiam ex
 angustis venarum foraminibus affluit, carniq;, & alijs particulis
 incidit, non autem antea sanguis distribui definit, quàm alimenti
 qualitas in omnes corporis particulas sit dispensata. At venæ ma-
 iores cum nunquam ferientur, sanguinem, quem in se continent,
 interea temporis multò accuratius elaborant, conficiuntq;. id au-
 tem aut vi insita, aut ea, quam à iecore acceperunt. MATHESES,
 Quomodo tandem sanguis ex maioribus venis in exiliores sin-
 gulis partibus à natura datas, peruenit. GERON, Vbi attractus,
 quasi deriuatione quadam ex illis in has exciderit, tota particulæ
 circumdatæ qualitate & proprietate imbuatur: atq; hac commu-
 tatione in illius naturam transiens, primus ex quatuor secundarijs
 humoribus efficitur: deinde per oscula, aut abdita venarum exi-
 lium foramina, & multifariam roris instar, in vniuersam cuiuscq; par-
 tis naturam influit, nec non in omnia spatia ipsius assumitur: ve-
 req;

reꝓ tunc apponitur, deinde afsiduo partium calore mutatur, con-
coctioneꝓ crascescit: postea concretus illis agglutinatur, adhære-
scitꝓ. MATHETES, Quotus humor hic est inter secundarios?

GERON, Tertius, qui partium tum qualitatem, tum temperamen-
tum, non autem perfectam essentiam attigit. postremò naturæ vi
sic concresecit, mutaturꝓ, vt parti tandem perfectè, & vndicꝓ afsi-
miletur, quædamꝓ eius essentia fiat carnosa, quæ inter humores
secundarios quarto loco est posita. atque istud naturæ opus vera

nutritio nuncupari debet. MATHETES, Metuo ne hæc quæ de *Vera nutritio*
sanguinis distributione docuisti, non satis intelligam. Dicis ne il- *quid.*

lum, vbi in exiguas venas allatus fuerit, sensim in partium natu-
ram & temperamentum mutari, donec perfectè eis afsimiletur?
GERON, Rem ipsam intelligis. tantum enim præstat nutritio, quæ
concoctionis finis est, & summa functionis naturalis absolutio.

15 Quare sanguis, qui ossa, cartilagines, ligamenta, membranas, &
neruos nutriturus est, in exilium venarum extremis quodam-
modo iam albescit. vbi verò inter partium istarum fibras, & in
media spatia incidit, magis commutatur, & similitudinem quan-
dam ipsarum repræsentat. Sic medulla ossium, quæ in cauernulis
20 ipsorum insidet, proximumꝓ est alimentum, euidenter iam in eo-
rum naturam degenerat: mucos quiddam simile, in cartilagineis:
humor lentus circumdatus, in ligamenta, membranas, & neruos.

MATHETES, Quale proximum cuiusꝓ partis alimentum existit?

*Alimentum cuius
iusꝓ partis pro-
ximum.*

GERON, Quod appositum quidem ei iam est, perfectius autem
25 calore elaboratum concretumꝓ, agglutinatur, & adhæret, tan-
demꝓ in eius naturam transit. MATHETES, Qua & cuius vi seu
facultate? GERON, Propria partis: quæ peculiariter afsimilat, &
altrix appellatur. MATHETES, Estne eadem in omnibus? GERON,

*Altrix facultas
in singulis partibus
propria.*

Nullo pacto, sed alia in osse, alia in neruo, alia denicꝓ in alijs: hoc
30 est, in singulis sua ac peculiaris inest. Simili modo, & totidem mu-
tationibus interpositis, caro tum musculorum, tum iecoris, tum
aliorum viscerum, nutritur. Cum enim sanguis è venarum oscu-
lis in carnem influens ei apponitur, caloris vi mutatus, eandem
quam pars habet, naturam acquirit, intereaꝓ dum mutatur, cras-
sior effectus illi apponitur, & adhærescit. MATHETES, In qua

35 corporis parte celerior fit mutatio? GERON, In carne: sic autem
vt vix villo sensu percipi possit. Nam sanguis proximè illam natu-
ra accedit, vt qui leuiter mutatus illam nutrire possit, non sic in
ossibus, cartilaginibus, ligamentis, & membranis habet, vt à qui-

*Mutatio caloris
in qua parte.*

40 bus sanguinis essentia longius recesserit. MATHETES, Vnde ve-
næ ipsæ & arteriæ nutriuntur? GERON, Quamquam proximum
sanguinem in se contineant, quo aluntur, hunc tamen facile in su-

*Venæ & arteriæ
vnde nutriuntur.*

am naturam redigere nequeunt: quæ autem ipsius portio tunc illarum proximè assistit, primum commutatur, albescitq; & statim tanquam ros in angusta earundem foramina abripitur, ipsis apponitur, crassiorq; facta agglutinatur, & postremo assimilatur. MATHESES, Cùm iam nutritionem omnium naturalium functionum principem, ac summam esse statueris: quænam cæteræ inferiores existunt? GERON, Concoctio multiplex, ex qua varij humores, diuersaq; recrementa gignuntur. Nam alimentum sumptum, licet vbiq; mutetur, non tamen ibidem concoqui dicces, non enim quævis vel tenuissima alimenti mutatio, qua id attenuatur, aut mollescit, aut odorem saporemq; immutat, sed perfecta alimenti conuersio, à nativo calore facta, concoctio existit. ea verò non exiguo, breuiq; tempore, sed processu illius paulatim absolvitur, MATHESES, In quot & quibus locis? GERON, In tribus, ob quod etiam triplex concoctio dici potest: prima in ventriculo, altera in iocinore, tertia in singulis partibus. Verum sua quancq; præcedit præparatio: hanc comitatur sua cuiusq; absolutio, suumq; alimentum tanq; materia subiecta: deniq; suus cuiusq; genuinus humor, eiusq; excrementum. MATHESES, Quæ prima est concoctio? GERON, Chylosis, in qua ventriculus multiplex variumq; alimentum nativo suo calore, in vnam quandam essentiam, eamq; candidam, & pitisanæ cremori similem, conuertit, quomodo autem in ore præparetur, supra exposuimus: in intestinis absolvitur: quæ ipsa quoq; modicam concoquendi vim, uti ventriculus, obtinet: quamvis nihil prorsus è ventriculo valente & sano excidat, quod non integrè concoctum fuerit, modò ad id idoneum fuerit. Quia verò nativus partium calor, nunquam otiosus conquiescit, quæcunq; intestinis incidunt, exactius ea quodammodo concoqui est necesse. MATHESES, Quæ secunda est concoctio? GERON, Quæ in iocinore celebratur, Grecis *διάρωσις* dicitur. hæc chylum è ventre transsumptum, propria iecoris vi naturæ ipsius insidente, in veram sanguinis speciem conuertit, quæ non solum calore, sed etiam tota essentia, à chylò planè dissidet. In mesenterij quidem venis, ille antea delineamentum quoddam accepit, in quibus iam ruber apparet: in caua autem & alijs maioribus, in quas è iecore delatus confluit, magis elaboratur ac conficitur. Illæ siquidem non modò continendi, distribuendiq; sanguinis, sed etiam concoquendi vires obtinent, easq; à iocinore originis suæ primordio, & quasi fonte, sicut intestina à ventriculo mutantur. MATHESES, Vbi tertiam statuis concoctionem? GERON, In singulis partibus: qua sanguis illis appositus iam à priore natura degenerans, in idoneam ipsis essentiam conuertitur.

hæc

Concoctio perfecta quid.

Concoctio triplex in suo quæ loco efficitur.

Prima concoctio in ventriculo, chylosis.

Intestina modicam concoquendi vim habent.

Concoctio secunda hæmatosis, quasi sanguinis effectio.

Sanguis rudimentum quoddam in mesentericis venis accipit.

Concoctio tertia.

hæc sanè rudimentum quoddam & initium in venis exilibus sumit, in quibus sanguinem à partis natura & calore mutari, antea diximus: absolutio autem huius, perfecta assimilatio, nutritioq; omnium concoctionum finis est. *MATHESES*, In nullâne re tres
 5 istæ concoctionum species inter se differunt? *GERON*, Vtique. cum in alia, tum in hac. priores due toti corpori communes sunt, vsumq; præstant: tertia peculiaris est, quæ singulis partibus priuatim confert, non autem hec illam moluntur, vt alijs quibusdam, sed vt sibi tantum commodè prositq;. Talis fit in mammis, & il-
 10 larum glandibus, cum sanguis in eas allatus tractusque fuerit, quem in suam naturam conuertunt, & continuatione functionis lac generant. Sic testes sanguine per vasa seminaria adducto, commutatoq; se nutriunt: in adultis benè robustis semen efficiunt, ex quo deinde liberi procreantur, & genus humanum conseruatur,
 15 sicut etiam in brutis accidit.

*Concoctionum
trium discrimi-
na.*

*Mammæ lac, tes-
tes semen gene-
rati.*

MATHESES, Dic nunc, quis singularum concoctionum humor, quodq; earum sit excrementum. *GERON*, Primæ humor est, quem paulò ante chylum nominaui, ad nutriendum idoneus, primumq; in corpore alimentum in ventriculo genitum. *MATHESES*, Quodnam est excrementum? *GERON*, Stercus, quod
 20 Græci σκατὸν & σποχίαννα appellant. Id primum in ventriculo cum vtili materia confusum est: vbi verò tenuior chyli portio, ex ventriculo & superioribus tenuibusq; intestinis in iecur translata fuerit, reliqua crassior impurioreq; in crassa intestina, cæcum, vel colon, tandemq; in rectum protrusa, fex dici solet. Secundæ concoctionis humor est sanguis, non is quidem solum purus ac syn-
 25 cerus, sed etiam alij, qui cum illo gignuntur, naturales, & nutritioni vtilis. Excrementum ipsius est, vrina, quæ ex iecore & renibus in renes elicitur, & vesicæ committitur. Similiter etiam humor melancholicus, quem lien ad se trahit, ex crassa terrenaque
 30 chyli portione generatus: qui naturæ concoctionem subterfugit, neq; iecoris facultate maturari potuit. *MATHESES*, Estne aliud adhuc secundæ concoctionis excrementum? *GERON*, Certè flaua bilis, quæ in fellis vesiculam reconditur, ex tenuissima calidissimaq; chyli portione assa & torrida, flammæ propemodum acrimoniæ particeps, eoq; recrementicia planè superuacanea, & corpori alendo inepta. Reliquus humor ab excrementis hisce iam re-
 35 purgatus, purus ac mediocris est, secundumq; alimentum, quod in omnes corporis partes distribuitur. *MATHESES*, Quem tertiæ concoctionis humorem & excrementum esse dicis? *GERON*, Vtilis succus est, qui in quatuor illorum humorum genere, quos secundarios nuper appellauimus, primum locum occupat, & exilibus
 40

*Excrementum
primæ conco-
ctionis.*

*Fex, & excre-
mentum aliud.*

*Excrementa se-
cundæ concoctio-
nis.*

Vrina.

*Humor melan-
cholicus.*

Flaua bilis.

*Vera flaua bilis
in vesicula.*

*Sanguis purus se-
cundum alimen-
tum.*

*Tertiæ conco-
ctionis humor
& excrementum.*

*Primus humor
inter secundarios
exilibus partium
venis insidet.*

*Secundus parti-
bus roris modo in-
fluit & apponit-
ur.*

*Tertius ipsis as-
sigitur.*

*Quartus assimi-
latur.*

Excrementa.

*Excrementa pro-
pria, pili & un-
gues, & quæ vr-
rinis inherant.*

*Ori ventriculi
insusum.*

Sputum.

*Quod per palat-
um & nares ef-
fluit.*

*Pituita in solo ie-
core generatur.*

*Sanguis purus
non potest sim-
plex dici.*

partium venis insidet, sicut secundus roris modo partibus influit, eisq; apponitur, & tertius ipsis affigitur: quartus autem in earundem naturam degenerat, ipsisq; assimilatur. Excrementa verò huius concoctionis sunt diuersa: prima quæ vaporis instar sine sensu, per latentes cutis meatus ac spiracula exhalant: item quæ paulò crassiora veluti sordes ac strigmenta cuti extrinsecus adhe- rescunt: nec non sudores, qui tanquam reliquæ serosi humoris illius educti, tenuiçq; bile perfusi, in corpore raro, & cute minus densa, sæpius modicè effluunt, idq; sponte sua, & naturaliter. Qui verò immoderatiùs per se erumpunt, ab humore quodā inutili, ac alieno excitantur. neq; naturalibus excrementis annumerari pos- sunt, sic vt nec puris, nec saniei, nec tuberculorum eruptio. At qui ab euidentibus causis, vt à balneis, immodica purgatione, & estu oriuntur, non solum hoc excrementi genus, sed etiam probi humoris, interdum tenuioris quoque sanguinis quippiam proliciunt, dissipantq;. Hæc sanè communia sunt excrementa, & quæ ex omnibus indifferenter partibus, præsertim à musculis & alijs circumdati effluunt. Præter hæc alia quedā singulis partibus propria conspectui se offerunt, veluti pili, & ungues, solidarum partium superflua: quæ cum vrinis redduntur, renum & vesicæ: lienis id, quod in os ventriculi refunditur: pulmonum, sputum quotidianum: quod per palatum & nares defluit, ac emungitur, cerebri: quod ex eius nutritione tanquam inutile relictum, frigidam humidamq; naturā retinens, id cū ex toto cerebro in amplos eius sinus abundantius collectum fuerit, per palatum & nares educitur. MATHE T. Idemne excrementum pituitæ verg, temperamento responder? GERON, Nullo modo. hæc enim in solo iecore generatur: numeroq; vt ilium succorum ascribitur: illa cerebri prorsus excrementum est: rursus quæ in iecore est, in sanguinem per concoctionem immutari, hæc nunquam potest, sed caloris vi siccescit, & in tophaceam duritiem concrefcit: huius specimen refert ea, quæ in ventriculo & intestinis procreari solet. non enim est pituita, imò ne succus quidem, sed primæ concoctionis imperfectio ac cruditas, quæ euinci non potuit: vel ex crassa & glutinosa cibimateria, vel ex ventriculi, intestinorumq; imbecillitate concreta. Sunt autem propria istorum excrementa alba, frigida, viscosaq;: quod essentia ipsorum exanguis, membranosaq; existat. MATHE TES, Enarratis iam trium illarum concoctionum & humoribus, & excrementis: declares obsecro, sanguisne ex iecore in venas irrumpens, omnisq; superflui expers, purus, & simplex omninò dicendus sit? GERON, Non. quod enim ex varijs constet essentijs, tum originis nostræ ratio, tum partium alendarum necessitas

- fitas demonstrat. nam alia calidior, alia frigidior: hæc mollior, illa durior percipitur: quæ vt non omnes ex eadem similiq; essentia procreari, ita nec eadem materia nutriri sustentariq; possunt. Semen ex quo originem trahimus, non prorsus simplicibus, sed diuersis constat partibus: quarum crassior portio solidis, humida mollibus, calida & frigida sui similibus adhibetur. de quibus postea copiosius agam, si me admonueris. Cum itaq; omnes corporis partes deinceps ex sanguine alantur, incrementq; (vnaquæq; autem ex idonea & sui simili materia) certè ille non simplex, sed mixtus etiam in ætate prouectis esse potest. Sic neq; semina in terram proiecta, neque stirpes, vno alimento sustententur, sed alia dulci è terra succo, alia salso, alia amaro. Quid verbis opus est. singula id quod familiare sibi & gratum est, in alimentum attrahunt, quo, si quandocq; destituantur, mox contabescunt & emoriuntur.
- 15 MATHETES, Quid ergo propriè sanguinem esse dicis, si simplex in venis non continetur? GERON, Quicquid in corporis partium naturam migrare solet, in eo autem ab alijs differt humoribus, quòd ipse, si è venis siue foràs, siue in ventrem, siue in vesicam, siue in vterum, siue in intestina, siue in thoracis spatia, siue in aliud deniq; sinum excidat, grumi instar concreascit: illi verò nunquam. MATHETES, Ob quam causam? GERON, Ob fibras quasdam filorum modo tenues, quibus ille est intertextus. Nam si his careret, neq; corpus nutriri, neq; in solidiorem essentiam conuer-
 20 ti posset. MATHETES, Separantur ne fibræ à sanguine? GERON, Facile, nempe si hic vel calens tepidusue per linteum coletur, vel crebra agitatione rudicula, siue manu concutiat, donec refrigerit, quemadmodum laniones suillum præparare solent, vt esui esse possit. Idem in sanguine ex incisa tali vena misso, tepentique aquæ in peluum profuso, obseruatur. Nam statim vbi refrigerit, paulumq; constiterit, tota ista subtiliore illius parte tingitur: fibræ autem inter se prorsus coherentes, & albidæ ad fundum delabuntur: quibus pleriq; decipiuntur, pituitæ assimilatæ speciem esse putantes. MATHETES, Vnde fibræ illæ contrahuntur? GERON, Ex ventriculo, qui natura neruosus, dum concoquit ferè
 30 totus, naturam suam ei quodammodo communicat. Si enim ille minus rectè valet, totum corpus plerumq; alimentum non sentit, sed contabescit, sanguine fibris destituto. ob quod complures macie conficiuntur, quamuis copioso, eoq; temperato sanguine præditi: alij ob esum corporis habitum consequuntur, sanguinis licet calidioris participes. Itaq; singularis facultas sanguini & venis insita efficit, vt ille nunquam concreascit, nisi scilicet ex rara quadam abditaq; morbi causa. ob quam olim quidam post diutur-

*Semen bunae
num non omnino
simplex.*

*Sanguis mixtus
etiam in proue-
ctis.*

*Quid propriè san-
guis dicatur, &
quomodo ab alijs
humoribus diffe-
rat.*

*Cur sanguis po-
tius, quam alij
humores concre-
scat.*

*Fibræ sanguinis
quomodo ab eo
separentur.*

*Sanguinis fibræ
albidæ ex aqua
factas. pituitam
quidam esse pu-
tant.*

*Vnde fibræ con-
trahantur.*

*Sanguis ob familiarem vim con-
crescit.*

*Sanguinis per-
missio vbiq.*

*Omniū liqui-
darum materia-
rum nomencla-
turæ veræ.
Communis humo-
ris appellatio.*

Propria.

*Succi primarij.
Succi secundarij.*

Primarij succi.

Succus naturalis.

*Succus non natu-
ralis.*

*Excrementa suc-
corum.*

Naturale.

Non naturale.

*Bilis alimenta-
ria.*

num languorem è viuis excessit, cui totus in venis sanguis coie-
rat. MATHETES, Hoc igitur in memoria retinebo, sanguinem ne-
que ob frigus, neq; ob teporem, sed ob familiarem inlitamq; vim
concrelescere. GERON, Rectè facies. nam si propter illa fieret, certè
sanguis in mortuorum venis semper concretus, in viuorum au-
tem intestina, aut ventriculū, aut vesicam illapsus, liquidus cer-
neretur. MATHETES, Cū igitur sanguis ita ab alijs omnibus hu-
moribus, vt dixisti, sit distinctus, potestne solus aliqua in parte ci-
tra fibras consistere? GERON, Non credo. sed illius vbiq; permi-
ssio inuenitur, sicut etiam variæ corporis partes existunt, quæ su-
um singulæ alimentum appetunt, nam quæ humidæ & calidæ,
vt caro: item quæ temperatæ, vt cutis, puriore sanguine nutriri,
aliæ minus syncero postulant. MATHETES, Quomodo liquidæ
istæ materiæ, quas in ventre, intestinis, iecore, liene, venis, capite,
pectore, vesica, & alijs locis contineri superius dixisti, verè appel-
lari debent? GERON, Communi quidem humoris nomine, quod
Græcis *ὕγρον*, siue *ὕγρον* sonat. siue id chylus ac cremor sit, siue mu-
cus, siue sputum, siue vrina, siue sudor, siue sordes, siue sanguis, si-
ue pituita, siue bilis tum flaua, tum atra: propriè autem, succi, vel
excrementa, illi namq; ad corpus sustentandum alendumq; ido-
nei existunt: hæc natura prorsus superuacanea. MATHETES, Quo-
modo rectè vocantur, quæ corpus alunt? GERON, Nobis cre-
mor, & succus, Græcis *χυλός*, & *χυμός*. Ille quidem in ventriculo, hic
in iecore præparatus. Porro inter succos, alijs primarij sunt, qui
præcedunt: alijs secundarij, qui subsequuntur: quorum ratio in su-
perioribus breuiter est explicata. MATHETES, Quot sunt primi
succis? GERON, Quatuor, vt sanguis, pituita, & vtraq; bilis. MA-
THETES, Ad quid isti sunt destinati? GERON, Vt corpus alant:
quanquam id interdum non præstent, neq; præscriptum finem
assequantur. Itaq; ex his succis alijs est naturalis, & corpori om-
nino vilis: alius naturæ contrarius, qui non satis probè nutrire
potest. MATHETES, Qualia sunt istorum excrementa? GERON,
Hoc naturale, quod in corpore optimè sano legibus naturæ pro-
uenit: illud contra naturam oritur, adhæc naturale aliud vtile,
quod vsum quandam confert, vt bilis in vesicula iecori appensa,
& melancholia in liene: aliud naturæ aduersum, vt quod citra hu-
ius legem ac præscriptum à causis eidem contrarijs gigni soleat.
Hæc ratione pituita, & bilis tum flaua tum atra, triplex inuenitur.
prima nutritioni dicata: altera superuacanea: tertia innaturalis,
vel naturæ inimica. MATHETES, Quid est bilis alimentaria? GERON,
Tenuissima sanq; uinis portio, quæ per venas distribuitur, tum
vt particulas naturæ suæ affines nutriat, tum vt reliquum sangui-
nem

nem crassiore promoueat, quò faciliùs venas penetret: tum vt si quid minus vtile reliquum fuerit, id simul cum sudoribus foràs erumpat. *MATHESES*, Quid est superuacanea? *GERON*, Tan-

Bilis supernacanea.

quàm sanguinis excrementum, quod in vesiculam iecoris relegatur: deinde proprio meatu intestinis incidens, tum ea ad deiectionem fecum stimulat: (vnde hæ rufo colore tinctæ apparent) tum lentam adhærentemq; illis pituitam detergit expellitq;: quæ aliàs immoderatus aucta, grauissima incommoda induceret: flauo ferè colore, essentia caloreq; mediocri quodammodo prædita.

Lutea deiectionem alui stimulat.

ex quâ tenui quodam humore permisto, altera pallidiuscula, & subtilior progignitur. quamuis autem superuacanea sit, tamen naturæ seruit, & eius legibus in nobis continetur. Quæ verò ex intemperie, tum partium in quibus continetur, tum ex morbis graui-
10 uissimis, tum ex vitiosis alimentis gignitur, eas postea singulatim

Pallida bilis.

15 enumerabo. *MATHESES*. Quid peculiariter melancholiam vocas?

Melancholia peculiariter dicta.

GERON, Id quod veteres Græci μέλαινα χυμὸν, hoc est, atrum humorem, aliàs melancholicum succum, aut sanguinem. hic autem duplex existit: primus, qui cum sanguine in venas transiens, alendo corpori est idoneus; alter superuacaneus, quem lien illum
20 expurgans è iecore prolicit, & in se recondit. Iste ergo sanguinis, non corporis est excrementum: vt qui tum lieni, tum ventriculo plurimum conducatur: eoq; naturalis est, nondum autem atra bi-

Ater humor, siue sanguis melancholicus.

Duplex sanguis melancholicus.

Primus alimentarius.

Alter supernacaneus.

lis, sed ater humor nuncupari debet. Nam quantum ex huius vel adustione, vel caloris à natura alieni vi putrescens, acidam aut

25 acerbam qualitatem, aut acrimoniam contraxit, id tanquam in cinerem conuersum, atra bilis rectè appellatur: quæ omnino naturæ est aduersaria, & triplici distincta specie. Prima enim ex melancholico succo, aut putrido, aut ardentem calorem experto, in cinerem reductus oritur, hæc calida est, acris, & rodens, sic à su-

Atra bilis quæ sit.

Triplex.

Prima.

30 peruacanea naturali differens, vt sex vsta à non vsta, altera ex bile, quæ lutum ex oui colore repræsentat: tertia ex pituita salsa, & vehementius torrefacta. *MATHESES*, Quis succus propriè pituita dici meretur?

Alter.

Tertia.

GERON, Crudior totius sanguinis portio, aut sanguis ex di-
35 midio coctus. Diffluit hæc in venas, tum vt partes frigidas & humidas, sicut cerebrum nutriat quodammodo, tum vt si quando inopia sanguinis fuerit in eum conuersa, reliquis etiam partibus alimentum præbeat. Atq; hæc quidem alimentaria dulcis existit.

Pituita propriè quid.

Pituita dulcis.

MATHESES, Sûntne pituitæ species naturæ aduersantes? *GERON*,
40 Sunt utiq; duæ. vna est acida summè quidem cruda, quæ præter primam ventriculi concoctionem nullam, aut ceptè minimam in iecore & venis experta est: modicus ei calor inest, qui facillimè

Pituita naturæ contraria prima.

dissipatur, & euanesceat, eoq; necessariò illa acescit. eadem nanque ratio in ipsa, quæ in plerisq; fructuum succis accidit. Si enim non multo calore natiuo præditi fuerint, vbi sponte sua effervescent, breui statim tempore coalescent. qui autem valentiore donati sunt, ij instar vini generosi diutius integri permanent. MATHE T. 5

Altera.

Quæ est altera pituitæ non naturalis species? GERON, Salsa ex dulci nata, quippe cum nonnullæ ipsius portiones putredinis vi assæ alijs permixtæ fuerint, salsum saporem contrahunt. MATHE T.

Pituitæ sedes.

Vbi tres hæ species pituitæ consistunt? GERON, In venis: prima sanè naturalis, reliquæ à natura alienæ: materia omnium ex se to- 10

*Pituita superna-
canea quo in loco
existat.*

re orta est: qualitas ex causis nature aduersarijs. MATHE TES, Vbi superuacanea pituita continetur? GERON, Extra venas, eaq; quadru-plex: prima tenuis & aquosa, qualis sæpe ex naribus aquæ instar stillat, aut ex cerebro in plurimas corporis partes illabitur. altera muco similis est, quam corporis calor ob exiguum eius len- 15

Vitrea.

torem ex tenui illa ad eiusmodi spissitudinem coëgit, vt partibus adhærere queat: ac vitrea tunc nominatur. vbi verò sic concre- uit, vt lapidis, aut gypli duritiam repræsentet, tum gypsea dici so- let: qualis sæpe in pulmonibus & digitorum articulis deprehen- ditur. MATHE TES, Sinas me, optime Geron, quædam adhuc ex 20

Gypsea.

te interrogare, antequam de humoribus disserere cesses. GERON, Quid nunc libenter sinam, etiamsi de hoc & alijs iam dicta repetere debeam. MATHE TES, Habeo gratiam honorate præceptor, video te nihil, quod studia mea promouere queat, celare, vtinam ego vicissim meum erga te animum gratum aliquando re ipsa de- 25

*Sanguinis natu-
ra.*

GERON, Mediocris & temperata: imò etiam Galeno tem- peratissima, quòd nullum ex ijs, quæ inter se contraria sunt, in ipso magnopere dominetur: neque calidum frigido, neq; frigidum calido, neq; humidum sicco, neq; siccum humido. Quoniam igitur sanguis ipse, quatuor qualitates modò recitatas requirit, cla- 30

*Sanguis tempe-
ratissimus etiam
aliorum humo-
rum particeps.*

rum est, ipsum etiam aliorum mistura opus habiturum: vnde fit, vt temperatissimus quoq; sanguis, nonnihil & pituitæ, & bilis vtriusq; participet. MATHE TES, Cur sanguis temperatus potius quàm calidus & humidus, vt semper ab alijs audiui, dicatur, non 35

*Sanguis tempe-
ratus cur dicatur*

facis intelligo. GERON, Primum id sensu licet experiri, eò quòd dulcis existat (dulcedo enim in quouis corpore à moderato sit calore): præterea quòd ipse sit humor optimus, maximæq; natu- ræ nostræ proprius, & familiaris: qualis dici non posset, nisi esset temperatus. Deinde ratio ipsa, non esse humidum & calidum de- 40

omni-

- omnium maximè sint temperata, certè sanguis etiam inter reli-
quos humores membra nutrientes, necessariò erit temperatissi-
mus. Calidum autem & humidum temperamentum omnium pes-
simum existit, vt quod putredini maximè sit obnoxium. Hinc eti-
am Hippocrates in opere de morbis publicè grassantibus dixit:
Cum annus calidus & humidus fuerit, magna illum comitari pe-
stilentia solet. MATHETES, Cur ergo optimi quique auctores
sanguinem nunc temperatum, nunc calidum & humidum esse
prodiderunt? GERON, Quia duplici modo ipsum dijudicant, per
se, hoc est, sua ipsius natura, & collatum ad alios: ac primò tempe-
ratum esse produnt, quia nullus insignis primarum qualitatum,
vel plurium, vel vnius excessus in eoprehenditur: secundò,
quòd hæc duo calidum & humidum, simul in ipso solo non in alijs
humoribus nec partibus, nisi sanguineis appareant. MATHETES,
Quem Galenus interim calidissimum sanguinem, & cur ita ap-
pellat? GERON, Eum, qui à corde veluti foco quodam ignis, ca-
lorem suum recipit. nam venis adeoq; ipsi iecori tepidus quidam
inest calor: ideo qui sanguineis animalibus sine cordis beneficio
insidet, illi persimilis est, qui æstatis tempore in domibus percipi-
tur. sed vt hæc igne in eis accenso, calidiores euadunt, ita quoque
corpus animalium ex corde maiorem calorem, quàm qui venis,
iecori, & nimirum etiam sanguini insitus est, acquirit. MATHET.
Nunquid hoc pacto Galenus, dum sanguinem nunc tempera-
tum, nunc calidum & humidum, nunc calidissimum statuit, ipse
secum dissentire videtur? GERON, Videtur vtiq; verum si rectè
verba eius passim intelligas, per omnia sibi constare deprehen-
des. Nam iecur & venæ, prima sanguinis generandi sunt instru-
menta: ac is in iecore ortus, maiorem quendam calorem à corde
consequitur: idq; vt vel magis conficiatur, vel vt conseruetur, vel
vt in vltimas corporis partes delatus, calorem suum retineat,
quem forsan citra cordis auxilium retinere non posset: vel vt hæc
omnia modò recitata simul eueniant. MATHETES, Ergò trifari-
am sanguis æstimari debet? GERON, Ita est. nam quatenus in
iecore perfectè absoluitur, & per se æstimatur, temperatus est:
quatenus autem in corde calidior euadit, & cum eo qui in iecore
& venis meseraicis inest, confertur, non temperatus, sed calidissi-
mus dicitur, quippe sanguis in illis contentus paulò frigidior, pi-
tuitosior, & temperatura inferior existit, modò animal rectè ha-
beat: in corde autem perfectus, calidissimus efficitur: hoc est, cum
in iecore & venis meseraicis frigidior paulò & pituitosior existat,
à corde vtpote caloris officina, temperatam naturam consequi-
tur. Quemadmodum rursus qui in iecore generatur, si ex natura

Temperamen-
tum calidum &
humidum.

Dissentio autem
rum de sanguinis
temperamento.

Sanguis calidissi-
mus quis.

Ex corde magis
incalascimus.

Galenus de sangui-
ne temperato aut
calido concilia-
tio.

Sanguinis instru-
menta, iecur, &
venæ.

Cur sanguis in ie-
core ortus, eo qui
in corde est, indigeat.

Sanguis trifari-
am æstimari de-
bet.

*Sanguis Hippo-
crati calefcere di-
citur.*

*Iecur eo cor fan-
guinis principia
qua ratione.*

*Sanguinis sedes
precipua.*

Venarum vsus.

*Galenus explica-
tio.*

*Cur sanguis pu-
rus appareat.*

*Quod sanguis
mixtus fit, de-
monftratio.*

*Pituita dulcis in
sanguinem mu-
tatur.*

*Humorum corpo-
ris humani non
eadem eft portio.*

*Suum fingule
partes alimen-
tum trahunt.*

sua æstimetur, temperatus censetur. ita in corde absolutus, si cum eo conferatur qui in meseraicis & iecore inest, calidissimus videbitur, licet natura sua temperatus existat: sin autem cum reliquis humoribus comparatur, calidus & humidus censabitur. Hippocrati natura calidus non esse, etsi multis talis videatur, sed calefcere dicitur. **MATHESES**, Vtrum ergo viscus, iecur, an cor sanguinis ortus principium erit? **GERON**, Vtrumque: sed alia atq; alia ratione. nam iecur, quatenus sanguis in eo gignitur, origo eius nominatur: cor autem, quatenus est officina caloris, quem iecur, dum chylum in sanguinem conuertit, ab illo mutuatur. nisi enim calor à corde in vniuersas partes diffunderetur, nullas actiones ipse propter frigus obire possent. **MATHESES**, Qua in corporis parte potissimum sanguis residet, & moratur? **GERON**, In venis. nam si ex his in aliam partem effluerit, statim concrefcit. Præterea vsus is venarum est, non solum vt sanguinem generent, & in omnes corporis partes distribuunt, sed etiam vt ipsum continent, conseruentq;. **MATHESES**, Cur Galenus sanguinem nunc purum, à sero, pituita & bile vtraque secretum, nunc hisce humoribus permixtum scribit? **GERON**, Arbitror illum intelligere, cum humores omnes valentiore aliquo medicamento educti fuerint, tunc postremo sanguinem ab alijs segregatum excerni: alias permixtus semper in corpore permanere solet, & cogitatione magis, quam reuera syncerus inuenitur. Quia verò etiam oculis nihil illud habere admixtum deprehendimus, purum eum esse iudicamus: quamuis semper aliquid alterius humoris cum eo sit confusum: adhæc, quod admixti parua adeo portio existat, vt sensum fugiat, purus censetur. Quod autem cæteris humoribus mixtus sit, tum vena incisa, tum arteria, tum ex quacunque eius eductione cernitur: qualis etiam in grauidis existit, vnde foetus alimentum recipit. Itaque sanguinem nunc biliosum, nunc pituitosum, nunc melancholicum sæpe euacuatum esse dicimus. nam in tali pituita dulcis & semicocta inest, quæ temporis spatio concoctionem experta, in sanguinem transit, sicut bilis vtriusque, sed naturalis & benignæ portio in sanguine reperitur. Imò nullus humor purus ac verus in venis qualis in receptaculis suis, præsertim per sanitatem vel ratione, vel sensu deprehendi potest. **MATHESES**, Sanguinis ne & reliquorum humorum permixtorum eadem est portio? **GERON**, Nequaquam, sed illius amplissima: pituitæ autem & humoris melancholici longè minor, bilis minima. Ex hoc igitur corporis partes aliter vntum familiare, aliæ sanguine magis, aliæ pituitosius, aliæ biliosius, aliæ melancholicum, & terrestre magis attrahunt. **MATHESES**, Quomodo melancholicus humor in nobis

- nobis copiosior, quàm bilis esse cognoscitur. GERON, Ex sanguinis missione. nam si is referuetur, plus crassamenti nigrioris in fundo, quàm biliosi per summa, innatat. MATHETES, Quis sanguis optimus iudicatur? GERON, Multum ruber, præsertim in
- 5 venis. nam ex arterijs flauior, calidiorq̃ fluit, minus quàm in venis temperatus: item dulcis, interq̃ crassum & tenuem medius. MATHETES, Qualis vitiosus apparet? GERON, Nunc flauior biliosiorq̃, nunc ater magis & melancholicus: aliàs aquoso tenuiq̃ humore mistus, qui vbi ille ex vena missus concretusq̃ fuerit, in superiore vasculi regione supernatat: aliàs pituitoso humore infectus vel crassior, nigriorq̃ pici liquidæ similis, cernitur. Iam humor quidam crasso nigroq̃ similis vomitu sæpe rejicitur, acidus & acerbus, interdum autem inspidus, qualis etiàm non raro per aluum descendit, nunquam concrementum, quamuis diu in aëre ver
- 10 setur, præterea falsus interdum, vt pituita falsa percipitur: interdum amarus, vel alio sapore, quàm dulci præditus. MATHETES, Quæ nunc inter has sanguinis species naturæ familiaris siue naturalis, quæ rursus illi contraria, siue non naturalis dici debet? GERON, Prima, essentia mediocri; & colore rubro prædita, aut
- 20 magis flaua, tenuisq̃ essentia, aut crassior atq̃ nigrior, aut liquidior & albiior: altera à pristina natura degenerat, vitiosaq̃ est, & limites illius excedit, idq̃ bifariam. aliàs enim ob exiguam intemperiem paululum mutatur, non tamen in aliud genus humoris conuertitur: aliàs multum, vel proprio vitio corrumpitur, vel alieno humore inficitur. atq̃ hæc non simplex, sed cum alijs varijs permixta est. MATHETES, Quem locum sanguis inter alios humores sibi vendicat? GERON, Medium inter crudos, qui à natura nondum concocti sunt, & biliosos: illi quidem ex sanguine imperfecto: hi verò ex concocto nimium proueniunt, prout natura
- 30 vtrunq̃ magis, aut minus elaborarit. Nam antequam alimentum in accuratum sanguinem transierit, humores primum crudi, & concoctionis prorsus expertes, mox semicocti: deinde sanguinis formam adepti: postremò veluti vltimam sanguificationis (vt ita dicam) partem consecuti videntur. At eorū qui excessu caloris proueniunt, alij paululum, alij plus, alij plurimum à sanguine ad flauam bilem recesserunt. MATHE. Quot modis humores concoqui dicuntur? GERON, Tribus: mediocriter, parum, & nimium. Primus à natura præscriptus est, quem etiam naturalis bilis attingit: secundus, qui infra iustum terminum concoctionis subsistit, crudus dicitur: tertius, qui illum excedit, bilem a iustam reddit.
- 40 Ita sanguis, cum moderatam concoctionem expertus est, concoctus vocatur: cum imperfectam, crudus: cum nimiam, adustus. si

Sanguinis optimi nota.

Vitiosæ venæ emissæ signa.

Humor crassus, niger, acidus, acerbus vomitu rejicitur, & per aluum: item falsus & amarus.

Sanguis medium locum inter bues mores obtinet.

Alimentum quomodo in sanguinem conuertitur.

Humores qui concoctionis metas egressi sunt.

Humores concoctur trifariam.

Humores calidiores & sicciores etiam non concocti dicuntur.

Concoctio à modo derivato calore fit.

Sanguis in alium humorem mutari potest.

Sanguis in bilem flavam,

In atram,

In pituitam quomodo transit.

Lac non est temperatum.

Sanguis quomodo recrudescit.

Sanguinis boni auctor.

militer de alijs humoribus dicendū est, MATHE. Cum igitur iusto calidiores & sicciores fiunt, etiāne frustrari concoctione dicuntur. GERON, Maximè: quia concoctio fit à moderato calore, ut unicuique humori convenit: cum autem ille æquo minor, vel maior existit, iam non amplius concoquere dicitur. MATHE T. Mutaturne aliquando in alium humorem verus sanguis, caloris vel effcacia, vel imbecillitate? GERON, Quid nīc? nam omne corpus mixtum, calidum & humidum, qualis sanguis actione caloris degenerate potest. Nam subtilior eius pars & pinguior, cum vltra nature modum torretur, in flavam bilem, & crassior in atram, convertitur: nempe cum maximus in corpore calor excitatus, sanguinem ipsum legitimum comburit, & consumendo tenuiores partes, crassiores ipsas & ardentes relinquit. In summa, ex sanguine plus quam par est calefacto, flava bilis: ex eodem verò assato, adustoq, atq, etiam ex crasso, atra generatur. MATHE TES, In quem alium præterea humorem sanguis commutari solet? GERON, In pituitam, MATHE TES, Quomodo id fieri possit audire cupio. GERON, In mammis glandulæ quædam extant, eius quod ad ipsas influit, commutandi facultate præditæ. Cum itaq, exangues sint & albæ, proprium generant humorem lacti similem, quando plus alimentum quod sanguis est, ad ipsas defertur. Quanto enim ipsæ iccoris carne sunt frigidiores, tantò lac sanguine, ideo id etiam non est temperatum, in temperato licet animante: quia sanguis in mammarum glandibus veluti recrudescit, & lac inter sanguinem & pituitam fit medium, sanguini tamen, quàm pituitæ propinquius. Cum itaq, lac ex sanguine fiat, & illud ad pituitam inclinet, certe hæc ex sanguine fieri poterit, quanquam naturæ lege pituita adeò accurata ex illo fieri nequeat, tamen si glandulæ istæ mammarum, magno frigore contra naturam afficiantur, sanguis ad exquisitam perducitur pituitam videtur. MATHE TES, Quis boni probiq, sanguinis auctor est, & opifex? GERON, In situs, ac genuinus ventriculi, intestinorum, venarum meseraicarum, & iccoris calor moderatus, primò cremorem temperatum, deinde ex hoc sanguinem efficit: sicut idem imbecillior pituitam & humorem melancholicum, immoderatus autem bilem: id quod animalium temperamenta, vel totius corporis, vel certè iccoris, & cordis ostendunt. Ea siquidem mediocria, vel calida temperata & humida, concoctioni obeundæ aptissima, sanguini generando conveniunt: quemadmodum etiam si eadem iam dicta viscera, & alię partes in quibus sanguis fieri incipit & perficitur, recrementis vacent: alioqui pro horum natura, vel bilem, vel pituitam, vel humorem melancholicum, sanguinis loco generant. MATHE T. Quę alia

alia præter calorem natium, sanguinis probi generationem promouent. GERON, Inter ætates, adoleſcentia potiſſimum, & ex anni temporibus, ver, quod illi temperamento prorsus reſpondet. MATHETES, Cum iam ſanguinis differentias copioſius explicari, repetas etiam quot pituitæ ſpecies exiſtant: ſuprà, ſi bene memini, quatuor ſtatuisti.

*Sanguini gene-
rando apta.
Adoleſcentia.*

GERON, Si tum naturales, tum naturæ aduerſarias, ſiue vtilles & ſuperuacaneas omnes conferam, ſeptem propemodum inueniri poterunt. MATHETES, Quæ eſt naturalis? GERON, Saporis, odorisq; expers, quæ Galeno græcè *ἀμιον*, quaſi careat qualitate, nobis inſipida vocatur, non quod omni prorsus ſapore careat, ſed parum adeo ſapida ſit, vix vt percipiatur, ſicut aquoſa ferè omnia: quanquam dulcis etiam nominari ſoleat. MATHETES, Quæ naturæ aduerſantur? GERON, Acida & falſa. MATHETES, Cur hæ

Pituita naturalis inſipida.

non ſunt naturales? GERON, Quia putredinem ſunt expertæ: prior omnino cruda eſt, non ea concoctione, quæ fit in ventriculo, ſed illa, quæ in venis conficitur, frustrata: ſine qua ne humor quidem eſſe poſſit. quæ enim pituita in ventriculo creatur, inter humores recenſeri non debet: quæ verò in inteſtinis & venis continetur, dulcis genita, in ſanguinem tandem mutatur. MATHETES,

Pituita due non naturales.

Quæ reliquæ ſunt ſpecies? GERON, Quæ ab eſſentia & cruditate potiſſimum ſumuntur, numero ſunt quatuor: vna eſt tenuis & aquoſa, quæ ſæpius è naribus deſtillat, aut è cerebro in plurimas corporis partes inſluit, altera eſt craſſa, mucò ſimilis, quam corporis extenui illa ob exiguum lentorem inhæreſcentem ad ſpiſſitudinem coëgit. hanc ſequitur tertiã, quæ guſtu quidem acidę reſpondet, verum frigidiôr & craſſior: vitri liquati ſimilitudine græcis *υαλωδης* quaſi vitrea nominatur: humor ſanè crudus eſt pituita craſſior, ſed minus flatulentur: qualis in vrinis eorum maxime ſubſidet, qui copioſum ob voracitatem ſedimentum fabis elixis ſimile reddunt. atq; talis etiam ſæpe illis cumulatè per aluum deiicitur, qui ab exercitijs abſtinuerunt, cibis autem liberaliſſime, & balneis ſecundum illos uſi ſunt. ſi is diutius in nobis hæreſcat, lentius foetidusq; redditur, quando pus adeo repræſentat, vt

Acida in venis cruda eſt.

Dulcis pituita in inteſtinis & venis.

Pituita tenuis et aquoſa.

Craſſa, mucosa;

in deiectionibus, vrinisq; & auribus purulentis vix ab illo ſeparari queat: at tunc etiam merito pus appellari poteſt: aliàs neque grauiter olet, neq; vitioſus eſt perpetuo. Quarta eſt pituitæ ſpecies, quæ lenta ac viſcoſa calore adeo concreuit, induruitq; vt quaſi in tophum ac calculum degeneret, ſicut in pulmonibus & digitorum articulis cernitur: nec non in renibus, quando in anguſtis illorum meatibus diu inhæſit: vnde nonnulli gypſea vocatur.

Vitrea.

MATHETES, Quid propriè aquea pituita eſt? GERON, Seroſum

Pituita aquea quid.

Serofum excrementum.

excrementum dici potest: quod per vrinās sudoresq̃ euacuari solet, & emissio per venæ incisionem sanguini supernatat. quamuis autem vera pituita non sit, tamen cū id quod in venis continetur, aut humor aliquis sit, aut excrementum ipsius, certè ad nihil aliud quàm ad pituitam referenda videtur: sicut etiam humidum illud, quod in capite colligi solet, ac inde ad nares destillari: quæ etiam superuacanea potius, quàm vera pituita existit. *MATHE T.*

Seri species.

Estne simplex serum, an plures eius sunt species? *GERON*, Totidem quot humores. nam aliud est sanguinis, idq̃ mitissimum: aliud atræ bilis, quod molestissimum: aliud flauæ, quod minus mo-

Naturalis pituitæ notæ & vires.

lestum: aliud pituitæ, quod mitius existit. *MATHE T.* Quomodo istæ iam relatæ inter se distinguuntur? *GERON*, Naturalis, inspidâ, humidâ, frigida, alba, pura, & argentea colore existit. Vitrea, quæ barbaris albuginea vocatur, longè frigidior est, maximè hu-

Acidæ vires & notæ.

mida, cruda, lenta, crassâ, sed minus quàm humor crudus propriè dictus. Acidâ & dulcis, frigida sunt, ac plurimū humidâ, crudâq̃, non autem crassâ propter copiosum humorem, & spiritum flatulentum: dulcis tamen minus frigida, minusq̃ cruda quàm acidâ existit. Crudus humor, frigidus quidem & humidus, sed minus quàm pituita, acidâ, & dulcis, lentoris etiam expers est, crassusq̃, sed magis quàm pituita vitrea. *MATHE TES*, Vbi pituita dulcis siue alimentaria, quæ saporis expers est, generatur? *GERON*, In venis tum in mesenterio, tum in caua iecoris regione sitis, nec non in ipso ventriculo, quâ ille quasi fouetur: deinde etiam in alijs venis, idq̃ à calore, qui non longè à temperato est, minimū frigida. Aquosa quoq̃ ex naturali, aut aliâ in humidam materiam resoluta in venis gignitur, sicut reliqui succi. Superuacanea extra illas oritur, vt in ventriculo, & cerebro natura frigido.

Sedes pituitæ dulcis.

MATHE TES, Inueniturne pituita sycitica vspiam in corpore? *GERON*, Indubiè: verū non in vniuerso, sed in ventriculo potissimum. nam quæ in iecore & venis est, sanguinem coniunctum habet. *MATHE TES*, Cur in ventriculo magis deprehenditur? *GERON*, Quia is nec calorem admodum acrem & vehementem habet, qui bilem procreare possit, nec sanguinis officina est: ideoq̃ ventriculi pituita à sanguine remota est: nisi vas aliquod venosum vel ruptum, vel erosum fuerit. *MATHE TES*, Estne etiam pituita ventriculi ab humore nigro libera? *GERON*, Maximè, dum hic in venoso genere contineatur, nisi natura fortè imperum in eum faciat, & ad ventriculum vt vomitione expurgeretur, vel ad intestina vt deiciatur, emittat. *MATHE TES*, In nulla alia parte quàm ventriculi pura inueniri potest? *GERON*, Circa neruos, & alias omnes pituitosas partes, quæ simili nutriri alimento desiderant:

Aquosa sedes.

Superuacanea.

Pituita sycitica.

MATHE TES, Inueniturne pituita sycitica vspiam in corpore? *GERON*, Indubiè: verū non in vniuerso, sed in ventriculo potissimum. nam quæ in iecore & venis est, sanguinem coniunctum habet. *MATHE TES*, Cur in ventriculo magis deprehenditur? *GERON*, Quia is nec calorem admodum acrem & vehementem habet, qui bilem procreare possit, nec sanguinis officina est: ideoq̃ ventriculi pituita à sanguine remota est: nisi vas aliquod venosum vel ruptum, vel erosum fuerit. *MATHE TES*, Estne etiam pituita ventriculi ab humore nigro libera? *GERON*, Maximè, dum hic in venoso genere contineatur, nisi natura fortè imperum in eum faciat, & ad ventriculum vt vomitione expurgeretur, vel ad intestina vt deiciatur, emittat. *MATHE TES*, In nulla alia parte quàm ventriculi pura inueniri potest? *GERON*, Circa neruos, & alias omnes pituitosas partes, quæ simili nutriri alimento desiderant:

- rant: nisi fortè mukum potius quàm pituitam eam nominare velis. ita quoq; excrementum cerebri, si pituita dicendum est, purum & syncerum in nonnullis videre licet. *MATHESES*, Quis pituitæ auctor est & causa? *GERON*, Nuper tibi semel atq; iterum *Pituitæ auctor.*
- 5 dixi, calorem natiuum iusto frigidiorum factum, tum in ventriculo & intestinis, tum in venis meseraicis & alijs. Nam inde ille chylum, minus æquo coctum, aut semicoctum, iecori, & cordi, præsertim ex alimentis natura, vel præparatione, vel alia ratione frigidis & humidis suppeditat. *MATHESES*, Hoc non assequor:
- 10 si in ventriculo cruditas fuerit, etiãne in iecore erit? *GERON*, Maxime, quia primæ concoctionis errorem secunda, huius autem tertia non corrigit. Vitrea admodum frigida in ventriculo *Vitrea.*
- ex cibis, aut multis, aut pituitosis, aut vtriusq;, & calore nativo inualido generatur. acida eodem modo, nisi quòd minus & frigida *Acida.*
- 15 & humida. acorem habet à calore, qui multum abest à temperato. falsa ex putredine, vel ex salis serosisq; humoris, vnde vrina & *Salæ.*
- sudor prouenit, mistura. Arabum medicorum princeps ex bile & pituita mistis gigni illam falso docet. Humor crudus ex pituitosis *Humoris crudi.*
- 20 cibis, eisq; vel alijs nimium copiosis in ventriculo gignitur, calore admodum debilitato. *MATHESES*, Pituita ne etiam vt sanguis, in alterius humoris naturam transire solet? *GERON*, In sanguinem. nam frigidum humidumq; calidum fieri potest, eodem humido remanente, vt in aqua ebulliente vsu venit. *MATHESES*, *Pituita an in alium humorem degeneret.*
- Quoniam modo hoc accidit? *GERON*, Calor innatus non solum
- 25 calidam efficit pituitam, sed etiam sanguinis formam ei introducit, quod Galenus pulchrè indicat: Sanguis inquiens, à moderato fit calore: bilis ab immodico: sicut pituita ab imbecilli. alibi rur-
- sus pituita processu temporis coquitur, sanguisq; efficitur. *MATHESES*, Potestne illa etiam in bilem flauam mutari? *GERON*, *Pituita in sanguinem quomodo transeat.*
- 30 Potest, idq; nullius interuentu: hoc est, ita vt non necesse sit ipsam prius in sanguinem conuerti. nemo siquidem dubitat, quin pituita in sanguinem antea versa, flaua tandem bilis fieri queat. *MATHESES*, Obscuro qua ratione? *GERON*, Talis in corpore calor excitari potest, nempe acris & rodens, prorsusq; à natura alienus, qui ad sanguinem procreandum non sit idoneus, quicq; pituitam tum frigida tum humida qualitate exuere, calorem aut siccitatem & colorem flauam in illam naturam frigidam & humidam, inducere poterit. quod enim album est, actione caloris flauum euadit. Quapropter si quid siccum & calidum, flauumq; ex pituita
- 40 gigni potest, siq; talis est bilis flaua, certè hæc ex illa generabitur. *MATHESES*, Solèrne etiam pituita in atrum humorem degenerare? *GERON*, Quid nunc? imò etiam in bilem atram aliquando *Pituita in atrum humorem.*

transit. Nam cum pituita frigida & humida sit, tanta in corpore
 siccitas contra naturam excitari potest, quæ omne eius humi-
 dum absumat, reddatq; siccum, ut illa non quidem pituita perma-
 neat, sed in alium humorem nempe frigidum & siccum, qui natu-
 ralis est, conuertatur. At si calor pituitæ frigus aboleat, & siccitas
 eiusdem humorem absumat, ita tamen ut color niger sit, bilis atra
 contra naturam, quæ calida & sicca est, sicut flaua bilis generabi-
 tur. In vniuersum pituita simplex calore extraneo in flauam bilem
 verti solet, salsa autem cum partim bilis sit, in atram transit, liqui-
 diore eius portione consumpta, & frigidiore magis exusta. ex tali
 verò adustione, & putredine subnigrescit, & quartanum febrim
 non absolutæ naturam induit: pituitæ autem accidentibus subij-
 citur. Pituita igitur à calore puro, hoc est, febris experte tota qui-
 dem colliquatur, sed non in atram bilem transit, nec etiam con-
 crescit, cogiturq; ut in sputis rotundis: in cerebro autem à frigo-
 re congelatur; quod extrema quidem parte, etiam aëre æstatis fer-
 uentissimo calidius: interiore verò adeo frigidum est, ut conge-
 lare possit: quod in pituitosis excrementis, quæ ex palato & nari-
 bus descendunt, videre licet. MATHE T. Fitne pituitosus iste hu-
 mor, sic congelatus, atra bilis? GERON, Non, sed ob siccitatem ei si-
 millimus euadit, qualis etiam est pituita, quam superius ex Aui-
 cenna gypseam nominauimus. MATHE T. Quæ igitur pituita
 in atrum sanguinem transit? GERON, Quæ in sanguine contine-
 tur: quoniam ipsa in verumq; humorem degenerare potest, nec
 alio adiumento indiget, nisi ut paululum denigretur. Quippe
 eiusmodi humores rubidi, sicut etiam dulces vniuersi, si naturali-
 ter habuerint, ilicò in atrum transeunt: ob quod etiam quotidiana
 febris in quartanam degenerare solet, maximè in plerisq; pue-
 rulis & iuuenibus, rarius autem in adolescentibus & pueris. MA-
 THE T. Hæc ergo sententia tua est, pituitam puram non ex fri-
 gore nec calore simplici, sed quacumq; in parte adustam, in veram
 atræ bilis naturam statim commutari? GERON, Ita sentio, quod
 etiam in sputo nigro experimur, nam id in pectore febris magno
 incendio, prius glutinosum redditur: mox rotundum & crassum:
 deinde subnigrum: postea nigrum: & tunc demum ad atræ bilis
 naturam accedit. quod cum ab ægro nequit expelli, spiritus iter
 intercludit, mortemq; proximam indicat. MATHE. Post pituitam
 bilem quoq; clariùs exponas, quid sit, & quot constet differentijs.

*Cerebrum extra
 calidissimum, in-
 tus frigidissi-
 mum.*

*Pituita in atrum
 sanguinem tran-
 sient.*

*Febris quotidia-
 na quomodo in
 quartanam de-
 generet.*

*Sputum nigrum
 in febris ardore
 ad atræ bilis na-
 turam accedit.*

Bilis differentie.

GERON. Tenuior est sanguinis portio, & ut iam dudum
 audiisti, veluti silius flos, siue spuma: Græci *χολη*, Latini bilem,
 barbari choleram vocant. Cum autem simpliciter nomen hoc
 pro-

- profertur, flaua bilis intelligitur, quæ calida & sicca esse potest, aliâs natura tenuis, flauo colore, sapore amaro prædita. Ea quando adhuc in sanguine generando tenuis, humida, & fluida existit, familiaris naturæ: quando autem ad summum excocta, ignea, &
- 5 luteis ouorum colore & crassitie similis apparet, inimica naturæ censetur: eoq; seorsim ad vesiculam iecori appensam separatur, summatim humor hic à pituita diuersus est, semper amarus, vt vomentibus percipitur, non tamen semper flauus sed interdum alio colore tinctus. MATHETES, Quæ ergo sunt calidi huius, sic-
- 10 ciq; humoris differentie? GERON, Alia naturalis, alia naturæ contraria est. MATHETES, Quotuplex est naturalis? GERON, Simplex, quæ generis vocabulo Græcis ξανθὴ, nobis flaua dicitur, quòd flauo colore infecta sit, rebusq; flauis similis. Hæc etiam Galeno alia græca voce appellatur ποικιλωδὴς, hoc est, elementaris, quòd re-
- 15 lique bilis species ex hac tanquam elemento proueniant. MATHETES, Quot sunt bilis naturæ aduersantis species? GERON, Sex, quæ vel essentia, vel colore à naturali differunt: ac prima pallida nobis dicitur, Græcis ὤχρæα: quia colore pallidis rebus respondet. MATHETES, Cur hæc non est naturalis? GERON, Quia tenuis ille
- 20 humor, vnde vrina sudoresq; proueniunt, ipsi admixtus est: non autem ex calidissima simul & dulcissima chyli portione constat. MATHETES, Quæ est secunda? GERON, Lutea, siue vitellina, quòd oui crudi luteo similis tum colore, tum essentia existat. MATHETES, Quomodo vocatur tertia? GERON, Porracea, Græcis πρᾶσιμος, quòd porrorum colorem referat, qui viridis est, ex me-
- 25 raciore nigro compositus, vel vt Galenus ait, magis colore brassicæ fuscus. MATHETES, Quo nomine quarta appellatur? GERON, Æruginosa, Græcis ἰσιδὴς, quòd æruginis colorem, vires, & essentiam repræsentet. MATHETES, Quod nomen habet quinta? GERON, Glastea nobis, Græcis ἰσχυρὴ δὴς à glasto satiuo dicitur, quòd plantaginis foliorum colorem imitatur, nisi paulò esset nigrius. MATHETES, Quomodo sexta & vltima nuncupatur? GERON, Rubra, græcè ἑρυθρὰ, eò quòd sanguini tenui similis existat, non autem ipsa sanguis sit: quia extra vasa non concrescit, vt verus san-
- 30 guis consuevit. MATHETES, Vnde bilis flaua generatur? GERON, Iam dudum indicaui, ex ampliore, acrioreq; ventriculi, intestino-
- 35 rum, venarum meseraicarum, iecoris, lienis, cordis, & totius deniq; corporis calore. MATHETES, Quomodo autem id accidit? GERON, Quando calidissima dulcissimaq; chyli pars ad iecur sanguinis generandi causa fertur, & largius ibi assat, torreturq; flaua bilis fieri incipit: in vesica autem iecori appensa absoluitur, & naturæ commoditatibus seruit: tenuis vt dixi, humida & flui-

Bilis naturalis
quotuplex.Bilis, contraria
naturæ.

Bilis origo.

da, non qualis ad extremum percocta: flaua, ignea, & crassa, vitellis ouorum similis. *MATHESES*, Vnde reliquæ bilis flauæ species gignuntur? *GERON*, Omnes præter rubram ex flaua, idque vel ob ipsius putredinem, vel ob maturam assationem, vel ob aliarum mixturam: quare etiam elementaris dicitur. *MATHESES*, Quomodo hoc accidit? *GERON*, Pallida fit ex flauæ bilis & serosæ vt dixi materiæ mistura. Lutea cum tenuis, fluidaque flauæ bilis materia caloris actione impensius digesta, discussaque ipsa crassescit. Porracea etiam ex flaua vitellinaque fit, si hæc ita putrescant, vt porrorem colorem consequantur, aut certe si calor in animantis corpore adeo malè sit affectus, vt colorem illum in bilem, tum flauam, tum vitellinam introducere possit: quanquam etiam ex betæ, cæpæ, brassica, & similibus proueniat. Æruginosa autem tum oritur, cum hæc magis concoquitur, ac inde colorem æruginis acquirit. nam æruginosa magis cocta est, quàm vitellina, sed minus quàm glastea: sicut hæc ipsa ex æruginosa magis adusta gignitur: nam atræ bili colore, essentia & viribus respondet. Habes iam septem bilis differentias: quæ autem vocatur Galeno *μυρρὴ*, id est ruffa: non alia est quàm rubra. nam ruffum idem est quod rubescens aut fuluum. Cærulea, quam Galenus *κυανὴ* vocat, & glastea, non multum inter se differunt. nam color cæruleus & glaucus, ex viridi & albo vterque temperatur: in hoc autem fortè differunt, quòd glaucus color velut ignis, penitus flagret, fulgeatque. atque ideo bilis glastea colore glauco prædita, à cærulea non nihil discrepare Galeno videtur: quanquam omnes hæc bilis differentiarum, cærulea, glastea, æruginosa, & porracea, sub viridi comprehendantur. *MATHESES*, Ego semper putavi cæruleum & glaucum, quem Latini vocant cæsiū colorem, idem esse. *GERON*, Etsi non multum differant, tamen apud veteres Latinos discrimen quoddam habere videntur. Glauci coloris nomen latius, quàm cæsi patet, vt quod non tantum oculis, sed etiam alijs rebus, vt vlnæ herbæ palustri, glasto, salici arbori, castaneæ nucis tunicæ, & optimæ aquæ speciei, tribuatur. *MATHESES*, Cur bilem croceam reliquis non annuerasti? *GERON*, Quia Galenus per hanc flauam nimirum intelligit, sed paulò magis à calore tinctam, vt etiam vitellinam aliquando croco similem colore esse dicat: etsi illa concretus sit humor: crocea verò dilutior. *MATHESES*, Quomodo hæc bilis species viribus inter se differunt? *GERON*, Pallida omnium moderatissima, & minimum calida, amara, acrisque est: glastea a verò contra calidissima & acerrima est. *MATHESES*, Quæ mediæ huiusmodi existunt? *GERON*, Quæ magis pallidam accedunt, minus sunt vehementes: quæ autem glasteæ propinquiores

*Bilis specierum
vires.*

Bilis sedes.

res sunt, hæ sæuiiores & maligniores dicuntur. MATHESES, Quo
 in loco singulæ hæ bilis species, eodémne an in diuersis gignun-
 tur? GERON, Ipsa quidem flaua in iecore inchoatâ, in vesica illi ap-
 pendula absoluitur, modò homo sit temperatus. nam si malè fue-
 5 rit affectus, tunc in iecore etiam & venis creatur. Pallida verò
 tum in venis, tum in iecore: quia in his serofus humor, ex cuius ad-
 missione vnâ cum flaua in iisdem hærente, illam prouenire dixi-
 mus. Vitellina in venis & vesica fellis iecori appensa. in hac enim
 oriri potest, cum flaua diutius ibidem immorata, colorem & essen-
 10 tiam lutei ouorum similem nanciscatur. Porracea in ventriculo,
 simul & in venis, quemadmodum crocea, idq; in his, qui contra
 naturam sunt affecti, nascitur. in ventriculo sanè ex esculentorum
 aut olerum quorundam cruditate procreatur, qualis est beta, cæ-
 pa, & brassica: in venis autem ex morbo aliquò per adustionem
 15 conflatur: à quibus postea in ventriculum & intestina deponi-
 tur. Æruginosa etiam in ventriculo: interdum in alijs corporis
 vasis nasci solet, vbi flaua eo vsq; aduritur, donec æruginis colo-
 rem accipiat. Similiter glastea in ventriculo tum in venis, tum in
 vesica iecori appensa, vt æruginosa generatur. Flaua nanq; bilis,
 20 eum posse colorem accipere videtur, vt glasto satiuo planè simi-
 lis appareat. De rubra superius dixi, quòd in venis tanquam san-
 guinis serum gignatur. Notandum autem Arabes eam bilem vi-
 tellinam vocare, quam Galenus pallidam solet: rursus illos citri-
 nam, hunc pallidam nuncupare. præterea quam quotidie excre-
 25 mentis, citra omne periculum excerni videmus, illos vitellinam
 appellare, ex pituita crassiore putrefacta nasci eam existimantes.
 MATHESES, In quem humorem bilis degenerare solet? GERON,
 In atrum melancholicumq; humorem, & atram bilem propriè di-
 ctam, de qua posteriùs agetur. MATHESES, Quæ bilis flauæ lar-
 30 gioris causæ referuntur? GERON, Calidum & siccum totius cor-
 poris temperamentum. MATHESES, Omnia quæ de bile flaua
 dici possunt, assequi videor: quartum humorem simili modo re-
 petas obsecro.

GERON, Iste generali nomine apud veteres Græcos atra
 35 bilis nominatur, quamuis species quædam sit calida & sicca. MA-
 THESES, Quot sunt ipsius differentiæ? GERON, Variæ sunt enim
 aliæ naturales, aliæ contra naturam: quædam propriæ, quædam
 impropriæ: quædam esse possunt, nonnullæ reuera esse dicuntur.
 MATHESES, Quæ prima ipsius species existit? GERON, Humor
 40 crassus & ater, aliorum omnium velut fex subsider, quæ impro-
 priè etiam atra bilis ab Hippocrate & alijs sæpiùs appellatur. nam
 chylus ad iecur delatus, vt antea docui, in quatuor humores con-

*Melancholici hu-
moris differentia*

uertitur: pars eius subtilior magis cocta, in bilem: mediocris essentia, in sanguinem: crassa & minus cocta, quam sanguis & bilis, in pituitam: crassior adhuc & fœculenta, in atrum humorem. hunc cum à iocinore confici nequeat, natura frigidum & siccum, lien ad se attrahit, vt accuratius elaboret, reliquias eius cum alijs excrementis alui expulsiurus. Hippocrates neutro genere græcè μέλαινα, & multitudinis numero μέλαινα, hoc est, nigrum, & nigra appellat. *MATHESES*, Quid de eo humore nigro dicis, qui cum sanguine per totum corpus fertur, nec lentus est: & extra vasa per venę incisionem emissus concrevit, in ima sanguinis regione subsidens, nullius acidæ qualitatıs particeps? *GERON*, Non multum à sanguine uariat, nisi quod maiorem crassitiem, & colorem nigriorem à calore naturali consecutus sit, modicè calidus & humidus, potestq; dici sanguis crassus & melancholicus, quem non pauce animalis partes in alimoniam, sicut & fibras eius postulant. *MATHESES*, Quę est secunda atrę bilis species naturalis? *GERON*, Quę ex flaua bile in iuuentute, & magno calore assata, generatur, quam deinde subsequens ætas, quę Græcis σιγημαλική, nobis consistens dicitur, excipit. verum huius ætatis atra bilis, quamuis à flaua, in iuuentute plurimum adusta, prouenerit, non tamen est absoluta & exquisita, hoc est, non tam sæua & immanis, qualis ea, quę contra naturam est: alioqui declinantes ætate, nulla frui sanitatem possent. *MATHESES*, Qualis ipsa temperamento est? *GERON*, Quanto bilis flaua sanguine calidior est, tanto atra frigidior, quàm flaua existit. siccior autem, quod magis adusta sit: summam pituita & atro humore calidior: omnium autem siccissima. *MATHESES*, Vnde bilis atrę species non naturales fiunt. *GERON*, Prima ex sanguinis crassi adusti feruore: secunda ex incendio & putredine atrı humoris: tertia ex bilis flauę: quarta ex pituitę generantur. omnis autem calida & sicca: interdum tenuior etiam quàm flaua censetur. In summa quicquid nigri succi in corpore continetur, quod nondum veluti ebullitionem, fermentationemq; terrę efficit, naturale est: quod autem adustum est, fermentatq; id iam naturę aduersarium est, quia ex caloris non naturalis incendio acrimoniam contraxit. *MATHESES*, Quę est inter has deterrima? *GERON*, Quę ex flaua bile efficitur, quanto enim hæc deterior humore atro, tanto bilis nigra ex flaua orta, malignior ea est, quę ex humore nigro, & pituita gignitur. *MATHESES*, In qua corporis parte, tot bilis nigrę species generantur? *GERON*, Ater humor in eadem quandam, & impolitam formam in iecore, meatibusq; illius, procedentibus acquirit: in liene autem absoluitur, quę verò atra bilis ex flaua in iuuentute adusta prouenit, tum in ve-

Humor niger.

Atra bilis contra naturam vnde.

Atra bilis quę deterrima.

Sedes atrę bilis.

- in vesica iecori appensa, tum in venis procreatur: reliquæ autem non naturales, tum in iecore, tum in eius vesicula, tum in venis, tum in liene oriuntur. *MATHESES*, At si ex chylo quatuor humores in iecore nascantur, vt me docuisti, cur non etiam niger ille
- 5 potius in eodem iecore quàm in liene generatur? *GERON*, Incipit quidem oriri in iecore, verùm in liene absoluitur: qui solus hanc vim & facultatem à natura obtinuit, vt veram humoris nigri formam, & veras qualitates introducat. *MATHESES*, Cur humor ater aliquando in totum corpus dispergitur, si non in iecore
- 10 omnino est generatus? *GERON*, Quia à liene malè affecto, ad iecur remittitur. sin autem meatus, quibus ad ipsum redit, adeò fuerint interdum obstructi, vt ille per eos remitti nequeat, corpus autem nihilominus atrum colorem representet, tunc nimirum ille in iecore diutius inhæsit, vt propemodum absolutus euaserit:
- 15 vel iecur temperamento forsàn lieni respondet. Quòd si homo benè temperatus sit, & nullo vitio laboret, tum humor iste in liene perficitur. *MATHESES*, In quibus locis potissimum atra bilis continetur? *GERON*, Crassus humor in meatibus, qui à iecore ad lienem tendunt, & in ipsomet liene: reliquæ autem species, illic
- 20 etiam subsistunt, vbi generantur. *MATHESES*, In quem alium humorem ater ille degenerare potest? *GERON*, In atram bilem verè dictam. *MATHESES*, In quem autem hæc transit? *GERON*, In nulum alium caloris actione conueri potest, cum & calidissimus & naturæ contrarius existat. *MATHESES*, Cùm itaq; atræ bilis
- 25 species variam habeant originem, quomodo à natura & per quas partes corporis euacuantur? *GERON*, Per alium semper, ac præsertim id quòd in liene confici nequit, & transmutari. Hinc etiam Hippocrates dixit: μέλανα & λευκώρηματ', vel μέλανα & ποικιλήματ', seu λευκώρηματ' καλὸν ἐστ', quod est nigræ deiectiones salubres sunt. Quippe hunc, tum alij tum adolescentes in difficultate intestino-
- 30 rum, sepe sine noxa deijciunt. In pestilentia die septimo, aut nono aut vndecimo eiusmodi nigra per aluum excreta plurimos periculo subtraxerunt. Per vim autem naturæ factam, non rarò talia etiam vomitu reijciuntur, quæ nullius interdum qualitatis sensum, interdum acidæ simul & acerbæ, verùm multò obscuriorem quàm ipsa atra bilis, exhibent. Eodem conatu natura etiam ad eum humorem hunc tempore crisis per febres expellit, & pustulas, quas Græci ἐξανθήματα vocant, purpureas excitant: quales etiam sine febre plurimis oboriuntur. nonnulli has sanguini crasso &
- 40 melancholico, qui aliàs per totum corpus fertur, ascribunt: nec ego valde illis refragor. *MATHESES*, Cur humoris colore & gustu inter se differunt, cùm tamen omnes ex eisdem cibis proueni-

Cur humor ater
per totum corpus
dispergatur.

color atræ

Atra bilis in quibus
locis continetur.

Humor atræ bilis
quomodo euacuatur & per
quas partes.

Nigra per vomitum
quando.

Pustule purpureæ.

Humorum color
cur varius.

ant. GERON, Quia singulae particulae huc quasi spectare videntur, ut id quod immutant, sibi afsimulent. MATHESES, Quo illud modo fit, & ordine? GERON, Ventriculus albus, ex cibis ingestis chylum album, alias magis, alias minus, pro illorum ratione procreat. Huius iam pars temperata ad iecur per venas meseraicas delata, ab illo natura etiam rubro, paulatim crassior, & rubicundior euadit. altera incipit flauescere, utpote calidior: in vesica autem fellis magis flaua efficitur. tertia, quae est crassissima, & maxime terrestres, nigrescit: in liene autem perficitur. quarta denique adhuc albicat, aquae naturam aliquantulum imitans, quae cum non possit à iecore vinci, candida permanet. MATHE. In iecore ergo, & venis albus aliquis humor vna cum sanguine inest? GERON, Indubie, isque ad partes pituitosas alendas. MATHE. Nullane pituitae species alium quam album colorem acquirere potest? GERON, Temperatio progressu temporis in sanguinem naturae beneficio conuertitur: alias ad flauum, alias ad liuidum, alias ad viridem colorem quodammodo accedit. verum illa non est simpliciter pituita dicenda. nam sincera, quae per se estimatur, alba est: quae vero alijs admista est humoribus, varios colores induere potest: quanquam etiam pura, & simplex diuersis duplici modo imbui possit: vno, quatenus naturalis: altero, quatenus contra naturam est. Naturalis enim alba est: quae autem contra naturam varios colores assumere consuevit. MATHE. Quae causae singulis pituitae speciebus sapores inducunt? GERON, Inspidat, genuinus partium in quibus oritur calor parum efficax: acidat vero calor temperato longe minor: dulcis cum sit minimè frigida, calor temperato proximis: salis putredo, vel serosi humoris, ex quo sudor & lorium prouenit, mistura. MATHESES, Cum haec docueris, quot & quid sint humores singuli, quibusque ex causis proueniant, & augeantur: adhuc qui in quos mutare soleant, cupio nunc ex te audire: an etiam interdum inuicem misceantur.

Pituitae color.

Causae saporum pituitae.

Mistura humorum.

Misti humores unde gignantur.

GERON, Aliquando bilis cum pituita mista, aut pituita cum bile apparet: ut in vomitibus & deiectionibus: mucosa vero in narium excrementis. Eodem modo tum pituitosus, tum mucosus in aqua inter cutem, & malo habitu conspicitur. MATHESES, Vnde misti isti humores gignantur? GERON, Non vna ex causa, sed varijs. Si enim cibis partim sanguini generando, partim humori melancholico, partim pituitoso, partim bilioso, idoneis usus fueris, non vnus aliquis humor, vel sanguis solus, vel pituita, vel bilis flaua, vel atra proueniet, sed omnium horum miscella. MATHESES, Quid omnes vnus humoris (verbi gratia) bilis causae effectrices concurrant, solane illa gignetur? GERON, Hoc si fieri posset,

- posset, homo vno constaret humore. verum non possunt omnes simul humoris alicuius causæ conuenire, alijs relictis. etsi id quoque fieri posset, non tamen vnus duntaxat humor gigneretur: quia biliosa quoque alimenta, vel pituitosa, vel melancholica, vel sanguinea per se assumpta, non nihil etiam aliorum simul humorum, licet vnus plus, alterius minus, producant. In ijs enim quos aqua inter cutem malè habet, etsi nihil aut sanguinis aut bilis vtriusque, sed solus pituitosus, aquosusque humor appareat, nihilominus tamen aliorum quoque humorum portio quædam ipsis inest, licet
- 10 tam exigua, vt à pituitoso aquosusque penitus obscuretur. MATHE-
TES, Sanitas ergo ex humorum & qualitate & mediocritate, constat. GERON, Ita iudico: si ea sit humorum singulorum quantitas, vt inde vnaquæque pars talem actionem exerceat, quæ naturæ sit accommodata, non vt omnes illi mole & quantitate sint equales.
- 15 Quemadmodum autem humorum moderatio, secundam valetudinem præsentem tuetur, & amissam recuperat: ita immoderatio morbos parit fouetque. MATHE-
TES, In quibusnam potissimum immoderatio consistit? GERON, In exuperantia & defectu. MATHE-
TET. Quot modis humores exuperant, aut deficiunt? GERON,
- 20 Quinque, vt quantitate, qualitate, locorum mutatione, connexu inordinato, & putredine. MATHE-
TES, Quando exuperant quantitate, vel deficiunt? GERON, Cum omnium aut solius sanguinis, aut pituitæ, aut bilis flauæ, aut atræ maior est copia quam requiritur: vel contrà, vbi minus ex illis adest, quam animali conueni-
- 25 at. MATHE-
TES, Quomodo excedunt qualitate? GERON, Si aut calidiores, aut frigidiores, aut humidiores, aut sicciores, vel si calidiores simul & humidiores, vel calidiores vnà & sicciores, vel frigidiores & humidiores, vel frigidiores & sicciores extiterint. deficiunt autem, vbi minus quam par est, tales fuerint. MATHE-
TES, Quando locorum mutatione superant, aut deficiunt? GERON, Vbi cibus è loco vno in alterum citius quam conuenit, transit: vt si chylus, qui in ventriculo horis duabus, vt elaboretur, manere debuit, antea egrediatur: sicut fit exercitatione statim à cibo obita, aliæque de causâ: aut contra, si humores tardius alibi im-
- 30 morentur, quam ex usu sit. MATHE-
TES, Quando humores connexu ac coniunctione inordinata abundant, aut deficiunt? GERON, Cum ordo quidam naturalis, in partis alicuius constitutione illis inesse debeat, vt sanguis sit primus, pituita secundus, atra bilis tertius, flaua quartus: nunc autem sic mutetur, vt primum
- 40 locum obtineat pituita, secundum sanguis, tertium flaua bilis, quartum atra. Huiusmodi verò inordinata coniunctio latè patet: ac alia deterior est, quam alia. sed de his postea, vbi de causis mor-

Solus humor ex proprio alimento generari nequit.

Sanitas ex quibus constat.

Immoderatio.

Humorum copia excessus.

Defectus.

Qualitatis immoderatio.

Locorum mutationis excessus.

Humorum coniunctio.

borum agendum erit. MATHETES. Sūntne alij adhuc humores præter quatuor istos iam commemoratos, eorumq; differentias, qui ipsis adiungi hic possint? GERON, Nulli, qui propriè humores dici debeant, sed reliquiæ, vel excrementa sanguinis adhuc restant explicanda, nempe semen & sanguis menstruus. MATHET. 5
De his nihil aut parum hætenus audiui: ob quod te oro, vt eorum quoq; mentionem facias, quantū ad medicinam requiritur.

SEMEN.

GERON, Semen est verum, & proximum ortus nostri principium, ex purissima totius corporis alimenti portione reliqua profectum: quod tamen non solum opificis eorum quæ secundum naturam generantur, sed etiam materiæ rationem obtinet. 10
Quamuis autem excrementum alimenti à nonnullis philosophis appelletur, tamen pro reliquijs illius purissimi vtilissimiq; accipiendum est, à quo singula membra nutriuntur & sustentantur.

Semen quale in morbo sis.

MATHETES, Estne semen in ætate vel morbo imbecillis æquale essentia & efficacia ei, quod validis & sanis inest? GERON, In illis sanè plurimum inutilis excrementi, seminis autem nihil, vel certè minimum: & quamuis interdum aliquid ipsius è vasis seminarijs emittatur, id tamen omne infœcundum erit, nec quicquam efficere poterit. MATHETES, Vbi semen fit ex sanguine? GERON, 20

Semen vbi fiat.

In testibus præcipuè, qui singulari illius conficiendi facultate præditi sunt: quæ inde ad vasorum seminalium implexum procedens, in ipsis simul elaborare incipit: sicut in corporum incisionibus manifestò apparet, dum semen cruentum, aut sanguinem albescentem in vasis iam dictis inuenimus: nec non in ijs, qui rei veneræ nimium indulgent. nam primum quidem semen proprio suo colore, hoc est albo præditum excernunt: postea verò cruentum, vtpote nondum testium facultate absolutum: postremò sanguis ipse, à cuius effluxu plerūq; mors sequitur: vnde constat, 25

Semen ex principalibus visceribus descendit.

semen ex tribus principalibus corporis partibus, cerebro, corde, & iecore, potissimum autem cerebro, secerni. Nam si quis in aliquo horum grauius offensus fuerit, infœcundus redditur: si leuior noxa infestet, prolem valetudinariam procreabit. vnde venis, & arterijs, quæ circa aures sitæ sunt, præsectis, aut exustis, fœcunditas adimitur. Quod autem nonnulli dicunt, seminis materiam ex toto corpore conferri, sic intelligendum est, quod ex ipsius principijs & dignioribus partibus necessariò profluat. Alij dicunt illam non modo ex principijs, sed etiam ex omnibus similaribus partibus secerni, non quidem ex quolibet osse vel neruo, sed ex aliquo osse, vel neruo, vel membrana, vel cartilagine, quiddam 35
ad eius materiam conferri, hoc notatione dignum est, quod testiculi non tantum seminis materiam ex toto corpore alliceant, sed 40

Interpretatio eorum. qui semen ex toto corpore conferri dicunt.

- fed etiam quòd magnas ei vires communicent, & semen absolutè *Testiculi magnas vires semini communicant.*
- perficiant. **MATHESES,** Quomodo igitur illi habent, quibus hi execti sunt? **GERON,** Neq; veneris appetitu mouentur, neq; villa eius voluptate afficiuntur, neq; generare possunt: præterea neq; *Execti testes.*
- 5 animum virilem & masculum, neq; robur amplius retinent. Temperamentum illorum frigidius euadit: sanguis vitiatur: facies minus speciosa ac colorata apparet: arteriæ paruum imbecillemq; vt in senibus, pulsum edunt: corpus albescit: graueq; & pigrum, obæsum, minusq; hirsutum redditur: in summa effœctum, molle,
- 10 & effœminatum fieri solet. In animalibus brutis castratio tantum mutationis affert, vt carnes eorum gratiores suauioresq; reddat, quæ ante illam fuerant tum odore viroso, tum sapore ingrato præditæ. E contrario testiculi si adsint, multum subsidij corpori nostro præbent, vt perfectiorem salubrioremq; vitam agamus. adhuc ad generis conseruationem adeò sunt necessarij, vt
- 15 meritò in principum partium numerum referri possint. **MATHESES,** Si igitur testes primi sunt auctores seminis, & vasa, quæ hoc ad ipsos deferunt, ac idem quodammodo præparant: quæ verò ei aculantur, id perficiunt, dic amabo, quomodo in illis elaboretur. *Semen quomodo elaboretur in testibus.*
- 20 **GERON,** Quemadmodum spiritus in arterijs, quæ ambitu quodam testibus substratæ sunt, quasi coërcitus subsistit, ac retinetur: sic materia seminis, quam testiculi à singulis partibus paulatim magna vi traxerunt, in flexuosis vasorum anfractibus, longo itineris tractu hæret diutius, immoraturq;. **MATHESES,**
- 25 Quid vtraq; vasa dilatione ista & mora efficere conantur? **GERON,** Vt quicquid continent, ceu alimentum in similem sibi formam pedetentim conuertant: & sicut colorem illius, ita quoq; totam essentiam paulatim commutent. **MATHESES,** Quid sit postea, vbi humor hoc pacto præparatus, in postremos illos orbes, qui
- 30 testiculos inuoluunt ambiuntq;, attractus delatusq; fuerit? **GERON,** Concoquitur, aptusq; ad animalis procreationem redditur, tum vasorum quæ testes circumeunt, robore & calore, tum vi horum ingenita. quia enim glandulosi sunt & spongi modo rari, complures ex vasis in eos fistulæ seminis repletæ propagantur, per quas susceptum humorem propria facultate conficiunt.
- 35 **MATHESES,** Quæ illa facultas est? **GERON,** Quæ summam spiritus & caloris vim obtinet. **MATHESES,** Vnde id intelligam? **GERON,** Ex insectis, quæ seminis sunt expertia. nam illorum femina, vbi cum mare coit, particulam quandam corporis sui in hanc im-
- 40 mittit, & quasi materiam opifici affert: ipse postea vitalem vim ac facultatem vapore suo in illam conijcit. tam imbecilla autem his animalibus procreandi vis inest, vt diu coire cogantur, an-

*Semen facultate
& spiritu donatum
ad procrea-
tionem requiritur.
Opifex atberens
et spiritu plenus.*

tequam aliquid concipiant, & si quid veluti medium intercedat, nihil quicquam efficere possit, sed ipsa per se animal progignat, & propria cuiusque membri natura, sine vllius seminis aut instrumenti adiumento, aliud sibi simile effingit. In perfectioribus verò animantibus, masculus non modò semen, sed etiam vim quandam cum eo in fecundam adeò valenter inijcit, vt statim concipiat, gignatque prolem. MATHETES, Si rectè sententiam tuam intelligo, non simplex semen, quamuis vtile & fecundum foetum procreare potest. GERON, Non, sed etiam facultate quadam procreatrice & spiritu donatum, vt ipsum quidem ex postremi alimenti excremento conflatum materia sit: facultas autem ipsius opifex totus æthereus, & spiritu plenus. MATHETES, Estne hæc vis materig insita? GERON, Neutiquam. nulla enim in eo (vt vocant) inest semine, quod in gonorrhæa contra voluntatem effluere solet. Quippe id prorsus excrementum est, procreationis munerinequaquam accommodatum. salubre autem illi suppeditat materiam, & à propria quadam vi & efficacia, quam obtinet, incitatum, per se mouet agitque. MATHETES, Non igitur semen, foetus auctor primarius & insitus existit? GERON, Non, sed vis in illius materia residens. hæc enim vitam impartit, partesque conformat, quæ non ex mole, sed potestate æstimari debet. MATHETES, Cum igitur semen ex duobus, nempe materia & facultate constet, ab omnibusne partibus ambo secernuntur? GERON, Illa quidem non ab omnibus, sed tamen à quibusdam necessario detrahitur. hæc autem, quæ prorsus opificis munus agit, ab vniuersis etiam minimis decedit: vnde id quod nonnulli dicunt, semen à toto corpore defluere, non molis, sed virium ratione intelligendum est. MATHETES, In testibusne procreandi facultas consistit, an aliunde prouenit? GERON, Quamuis vasa quæ semen ad testes deferunt, ipsique illud adeò accuratè concoquant, vt crassius albiusque euadat, non tamen ipsum inde fecundum fieri potest, nisi spiritus copiosi ei influant, penitusque confundantur: ob quod necesse est, vt naturalis per venas à iecore, vitalis per arterias à corde, animalis per neruos à cerebro & spinæ medulla, in testes elaboratur. MATHE, Quid à cæteris particulis, ex vniuerso corpore ad testiculos defertur? GERON, Non nihil spiritus & facultatis, idque subitò per validam corporis agitationem, quæ ipsa sit coitione, quia tunc vehemens, titillatio corpus totum eximia voluptate afficit. MATHETES, Ergo testes non exhibent semini vim procreandi? GERON, Non, sed facultates, quæ ex spiritibus ex vniuerso corpore, præsertim ex principibus eius partibus confluunt. MATHETES, Cur testiculi inter principales partes referuntur: quidque ipsi semini

Procreandi facultas ex facultatibus.

- femini præstant, si non materiam, vt dixisti, eò quòd illa ex corpo-
 ris alimento subministretur, si neq; vires illas & facultates, quòd
 à toto corpore cum spiritu deriuentur? GERON, Id sanè efficacia
 sua materiæ seminis conferunt, qua quod illam concoquant, ac in
 5 aliam speciem conuertant, formamq; sicut mammæ lacti, peculia-
 rem ei inducant: vnde nomen est sortitum, nec nō quòd spiritus,
 quos ex corpore acceperunt, materiæ calore suo, accuratè commis-
 ceant, viresq; ac facultates semini inferant, & vnum ex omnium
 10 temperatione efficiant. vnde semen omnibus numeris absolutum
 perficitur. MATHETES, Multa de origine seminis, & elaboratio-
 ne dixisti: quæ est eius natura? GERON, Vbi probè coctum est,
 colore album, & essentia crassum euadit, naturamq; vasorum eius
 & testium sequitur. MATHETES, Qua ratione crassescit? GERON,
 15 Ingenito & interiore vasorum ac testium calore: cum autem aëri-
 um sit, aut potius ethereum, non potest, vt lac, ouum, aut alia qua-
 cuncq; terrestri essentia copiosiore prædita coquendo in crassari.
 in his enim crassior portio, humore per calorem dissipato rema-
 net. MATHETES, Quo igitur singulari modo cogitur, albescitq;
 GERON, Quo aqua oleo mista, aut albumen oui diutius agitatum,
 20 à flatu impedito, in magnum spumæ densæ albæq; tumorem at-
 tollitur. nam dum testium calor spiritum vitalem, & reliquos ceu
 concoctione exagitat, semini eos vndiq; permiscet. cum autem
 id satis lentum sit, & cohærens, facilè ab immixto spiritu in spu-
 mam densissimam intumescit, cum tamen bullæ eius vix appa-
 25 reant. Hac de causa, semen licet æthereum sit, copioso calidoq;
 spiritu plenum, calore tamen in spumam conuersum cogitur &
 albescit: vnde ipsum rectè natura calidum humidumq; dici po-
 test. Quid multis moror, semen, alimenti, quod solidis partibus
 apponitur, vtilis ac sincera portio ab illis secreta est. hanc testi-
 30 culi ac vasa ipsorum calore suo elaborant, conficiuntq;, vt fecun-
 da esse possit, si vitalis spiritus copiosus ex toto corpore ad eam
 confluat, probeq; ipsi commisceatur. MATHETES, Vnde essen-
 tia & crassities seminis constat? GERON, Ex elementorum tem-
 peramento, & calore quodam diuino cœlestiq;, non ignis aut al-
 35 terius elementi particeps: in quo tota vita & vires animæ, tum
 vitalis, tum altricis, tum sentiendi, mouendi, appetendiq; consi-
 stunt, & permanent. Cum autem ille effluens, abditæ faculta-
 tes in actionem erumpunt, & sese exerunt. MATHETES Vnde se-
 men hæc facultates acquisiuit? GERON, A parentis corpore, in
 40 quo reuera consistunt, non ab elementorum permissione. MA-
 THETES, Ergo homo qui emisso in feminam semine generat,
 omnes quoq; corporis facultates simul producit? GERON, Vtiq;.

*Testes quid semi-
ni præsent.*

Seminis natura.

*Semen quomodo
albescat, cogat-
urq;.*

*Seminis essentia,
& crassities.*

*Seminis vires in
quibus consistant.*

Animus vnde.

nam corporis essentiam comitantur. At animus siue mens, cum à corporis natura sit diuersa, & elementorum experts, aliunde, hoc est, à Deo Opt. Max. homini communicatur. sed hæc melius à Theologis veris, & pijs docentur, eoq; ad medica me rursus conuertam. MATHETES, Dic ergo, an fœminæ etiam fœcundum se-

Semen mulieris.

men habeant? GERON, Æquè ac masculi, sed tenuius, aquosiusq; sicut in anatome illarum manifestò apparet. Nam in illarum que diutius à concubitu abstinerunt vasis, copiosum albidumq; vt in maribus reperitur. imò per insomnia quoq; illæ, & naturalium contactu frequentius simili voluptate ac in coitu emittunt. 5

Morbosa fœmina morbosam prolem gignit.

MATHETES, Estne etiam fœminarum semen fœcundum? GERON, Quid ni? cum non aliam in ipsis originem quàm in masculis ex testibus & uasis accipiat: adhæc quòd mulier morbo comitali, arthritidi, aut podagrico obnoxia, sobolem, eorundem vitiorum hæredem procreet: item quòd partus matriplærunq; similis appareat: quorum omnium non sanguis maternus, sed emissum ex ipsa semen auctor existit. Quod igitur semen à similaribus fœminæ partibus decessit, vim quandam ad similes effingendas conformandasq; obtinet, quamuis infirmiolem quàm à viri semine conferatur. Id quod testantur etiam oua subuentanea, & mole rudiores, quas mulieres interdum suo ipsarum semine citra viri coitionem concipiunt, quamuis neq; masculinum semen absq; fœminino quicquam possit efficere. MATHETES, De semine hoc tempore nihil amplius desidero: de menstruo sanguine, quid sit, vndèque proueniat, & quem vsum habeat, deinceps addiscere ex te cupio. 10

MENSTRUUM quid.

GERON, Vt semen vltimi alimenti, ita menstrui, sanguinis portio existit, vel sanguinis excrementum. Ideo mulieribus quandiu eo laborant, non hæmorrhoides, non sanguis è naribus profluit, non varices, aut tale quippiam superuenire solet. si verò quid ex illis acciderit, minus probè menstrua fit purgatio, eò quòd huius materia aliò delata, dissipetur. MATHETES, Cur fœmina potius quàm masculus menstruum sanguinem sortita est? GERON, Quia hic plurimo calore pollet, quo totum id quod assumpsit, alimentum optimè elaborat & concoquit. sin autem quippiam etiam ex ipso redundet, id validè discutit, digeritque. illa verò cum minus efficaci calore valeat, id quod superfluum est, non potest euincere, nec dissipare. Idè copiosiore etiam abundat, quæ gulæ ventriq; plenius indulget, otiosamq; vitam agit. sin autem calor huius imminuatur, sæpè minimum effluit. MATHETES, Solus ergo sanguis superfluus in viris vt dixisti feminis, in mulieribus autem menstrui prima sit materia? GERON, 15

Maxi-

- Maximè. nam magna corporis vniuersi mutatio, tum masculis, *Mutationes ho-*
 tum fœminis in pubertate accidit: calor natiuus increfcit, vege- *minis in puber-*
 tiorq; euadit: pubes erumpit: mammulæ turgescunt: corpus ad li- *tate.*
 bidinem incitatur: sanguis exuberans calore tanquam attenua-
 tus, diffunditur: & cum in receptaculis suis vix retineri queat, exi-
 tus sibi quærit, quò erumpat. vnde fit, vt ille in masculis è nari-
 bus profluat: menstrua in puellis emanent, quandoquidem venæ
 ad nares sitæ adolefcentibus: vtero eiusq; ceruici insertæ puellis
 tunc facilius adaperiuntur. MATHETES, Vbi menstruus ille san- *Menstruus san-*
 guis colligitur? GERON, In caua vena. quando autem in ea redun- *guis vbi collige-*
 dat, ad vteri venas defluit, easq; copia & calore distendens, rese- *tur.*
 rat, vt ab earum osculis in naturalia decidens, forâs destillet. Post-
 quam satis effluxerit, venæ, quæ ex caua per totum corpus disper-
 sæ sunt, reliquum ipsis necessarium retinent, quæ autem ad vte-
 rum pertinent, vtrò clauduntur, stringunturq;. mense vno exa-
 cto tantum rursus colligitur, accrescitq;, quantum antea profluxe-
 rat. ac rursus id simili modo per vterum naturæ impulsu deponi-
 tur excerniturq;. MATHETES, Cur per circuitum menstruum ex-
 purgatur? GERON, Vel quia natura sic confluxit, vt quæ aliâs *Cur menstruus*
 omnia certis legibus exequatur: aut quia luna perpetuus, & im- *sanguis per cir-*
 mutabilibus suis cursibus in hoc, vt in alijs rebus vim suam exer- *cuitum expurge-*
 cet. Cum enim tum crescens, tum decrescens, mensem luninum
 varietate demetiat, cur non hominum, vt reliquorum omni-
 um humores firma ordinis constantia regat, ac moderetur? Quod
 autem nonnulli hanc periodicam menstrui purgationem sangui-
 nis abundantia attribuant, verum esse non potest. nam ille quo-
 que mulieres, quæ paululum sanguinis colligere solent, statim
 tempore menstruum licet parcius, excernunt. MATHETES, Men-
 struum igitur non idem est, quòd sanguis vtilior exuperans, qui-
 que in venisimenti vicem gerit? GERON, Nequaquam, sed ali-
 ud genus eius viciatum, quòd naturæ beneficio à puriore sangui-
 ne, præsertim luna decrescēte, aut silente, abducitur segregaturq;. *Menses retenti*
 non tamen adeò perniciosum, vt Aristoteles, & eius sectatores de *que incommoda*
 eo scriptum reliquerunt: quanquam suppressum, retentumq;, gra- *adferant.*
 uissima afferat incommoda, vt viscerum obstructions, tabem,
 cancerum, morbum comitalem: quæ tamen non malignitati ipsi-
 us, sed copiae potius ascribenda puto. MATHETES, Sentisne ad-
 huc, vt in anatomicis dixisti, fœtum in vtero sanguine purissimo
 suauissimoq;, non autem menstruo, nutriri? GERON, Ea adhuc
 mea est sententia. nam quicumq; vitiosus est, nec fœtum nec vte-
 rum ipsum nutriri potest. MATHETES, Si nihilimenti impu-
 rus ille sanguis præstare potest, quorsum in gravidis tendit? GE-

RON, Modica eius portio vteri venis inhæret: maxima puriori sanguini reliquo permiscetur. vnde multa vitia grauidis mulieribus obueniunt, vt corporis grauitas, scædus faciei color, intemperies, varices, mollicies, quæ Græcis *κίττα* dicitur. imò prægnantes hoc retento magis ad omne morbi genus procliuēs sunt, quàm 5 quæ vterum non gestant. MATHETES, Quomodo mulier habet, cum menstrua, siue lunaris, vt Galenus vocat, impuri istius sanguinis purgatio, adest. GERON, Si moderata, meliusculè: si immoderata, deterius, & magnam membrorum debilitatem experitur, sed non longè post, iterum conualescit. MATHETES, Quando mulier optimè potest concipere? GERON, Quando menses fluere incipiunt, aut desinunt. MATHETES, Qua de causa? GERON, Quia tunc vaforum vteri oscula, quæ intra ipsum perueniunt, & per quæ menses purgantur aperta sunt, illi neq; copiosi, neq; cumulatim effunduntur, sed moderatè & paulatim, veluti exudantes 15 emanant. Si enim vterus ex nimio mensium fluore humidus esset, semen in illo manere non posset, vt quod copia sanguinis affluentis elueretur. MATHETES, Potestne conceptus ante menstruum fieri? GERON, Nullo modo. quia tunc semen alimento est destitutum, vterusq; ob vasa clausa læuis: cuius gratia semen defluit, cum non habeat à quo hædere, tunicaq; aduniri possit. asperum enim ad concretionem magis quàm leue est idoneum. MATHETES, Quòd mulier menstruis incipientibus, aut cessantibus, non autem in iusto eorum profluuiò concipiat, apertè superius edocuiſti: addas adhuc, si placet, quomodo conceptus fieri soleat. 25 GERON, Quanquam te hoc scire non multum referat: tamen aliquid de hac re etiam modestè, sicut ætati tuæ conuenit, disseram. Cum mas & fœmina mutuo se amore prosequuntur, & concumbere desiderant, suum vterq; semen in vterum immittunt: deinde huius os interius adeò occluditur, & obſignatur, vt nihil vel mi 30 nimum ingredi, aut excidere possit. Si verò conceptio futura est, mulier vterum voluptate quadam gestire præsentit, ardentiq; seminis virilis desiderio totum ad naturalia prouolui, vt ei obuius quasi occurrat, ipsumq; arripiat. vbi iam attraxerit, continet auidissimè, ac in sinus suos recondit, adeoq; ipsum comprehendit, vt 35 nullum intus spatium vacuum relinquat. At si vterus fuerit imbecillior, quòd ex affectibus accidere potest, aut si quæ minus appetat virile semen, vt grauidæ, aut si cui libidinis ardor deferbuît, aut si quæ venere iam exhausta sit, his semen viri in vteri ceruice aliquantisper confidens, non longe post foràs elabitur. Fœcunda 40 mulier facillè id deprehendit retinetq;, modò integra sit valetudine, pauloq; antè expurgata menstruis. deniq; si vnà cum viro, aut paulò

Quomodo mulier habet, cum menstruo laborat.

Conceptio quando fieri solet.

Conceptus ante menstruum an fieri possit.

- paulò post semen emiserit. Sic enim cùm illa eodem, quo vir impetu semen edit, aut cùm paulò ante libidinis ardor incensus est, vterus magna cum voluptate semen allicit, & in se reponit. E contrario, si vir longè post, aut antequam mulier semen emittat, sic
- 5 vt libidinis impetus in muliere, vel nondum efferbuerit, vel iam cessarit, vterus semen aut non appetit, aut verè non continet: neq; si contineret, fœcundum id fieret, eò quòd nimia mora fœmineo destitueretur, totusq; spiritus euanescat. *MATHE.* Quid ergo propriè est conceptio? *GERON.* Peculiaris vteri actio, qua seminis
- 10 vis excitatur, & munus sibi insitum verè exequitur: non autem seminis attractio, neq; retentio sola est. Sæpe enim appetens vterus semen attraxit, quod diu retinere nō potuit, sed biduo aut triduo elabi permisit. Nonnunquam id perperam retinet, vt fit in illius affectu, qui græcè *μύλη*, nobis mola dicitur. huius namq; vt carnis
- 15 informis mole grauetur, laboratq;. cùm igitur vera est conceptio, tunc ipse vterus non agitatione corporis venerea (vt quidam opinantur) seminis vim ad actionem excitat. *MATHE.* Vterusne primùm semen attrahit, attractum continet, & contentum concipit? *GERON.* Simili modo quo ventriculus cibum
- 20 attractum, contentumq; conficit. quippe sicut ventriculi concoctio, sic conceptio vteri peculiaris actio existit. *MATHE.* Quenam vt hæc rectè fiat requiruntur? *GERON.* Initio, vt semen fœcundum sit, quod mas rectè copioseq; in vterum immiserit, non tenue, neq; serosum, aut aquosum, neq; nimis exiguum, sed omnis
- 25 immoderationis expers, quale à temperatis prouenire solet: deinde vt vterus à menstruis repurgatus semen appetit, idq; à ceruice, auidè attrahat, sicut Galenus mulieres prudentiores percipere posse affirmat. postea vt vterus semen quod attraxit comprehendat amplectaturq;, & contineat, sic vt osculum eius ex toto con-
- 30 niueat: nouissimè vt vterus sit fœcundus, qui semen faciliè concipiat. *MATHE.* Qualis is esse solet? *GERON.* Nulla magna intemperie infectus, hoc est, qui neq; insigni frigore densior factus, viri semen refrigeret, oraq; vaforum obstruat, nec humore nimio
- 35 tanquam terra palustris, fœcunditatem seminis suffocet: neq; calore immoderato ipsum exiccet: neq; iusto siccior, alimenti rorem consumat. At si mas & fœmina modicè intemperati cum alijs intemperatis concumbant, optimè gignunt: nam ita sese contemperant, & certa ratione moderantur. similes autem cum similibus commixti, nihil possunt ex se progignere. imò neq; si vnum
- 40 ex his desideretur, conceptio perficitur. Vbi verò maris ac fœminæ fœcunda semina commodè conuenerint, mox occultæ illorum vires excitatæ, materiam ipsorum ad fetus conformationem

Conceptio quid propriè.

Conceptio vera.

Vterus qualis esse conueniat.

*Intemperati cum intemperatis con-
gressi gignunt.*

variè distrahunt, vt in confectione corporis indicauimus. MATHESES, Percepi sanè ex illis non pauca obseruatione digna: quia verò pleræque abdite sunt naturæ functiones in fœtu formando, optarem, vt nonnulla adhuc superioribus adijceres: nempe quæ partes ex semine, quæ verò ex sanguine, & quo tempore formantur. GERON, Quamquam ea quæ nuper audiuiſti, ſatis ad medicinam cognoscendam eſſe poſſint: tamen vt etiam philoſophis reſpondere queas, obſcuriora quædam hîc tibi explicabo.

Membræ fœtus vnde.

Semine igitur tum maris, tum fœminæ in vtero commixto, primùm ſtatim tenuiores illius partes. (non enim vnum quippiam eſt, nec vndiq; ſibi conſimile) calidioresq; , & ſpiritus magis participes, medium ipſius locum obtinent: craſſæ verò & terreſtres, illas extrinſecus ambiunt. atq; ex his durioribus, ex calore & vteri contactu factis coactisq; , membranæ, quibus fœtus includitur, proueniunt. Tenuior ſeminis portio intus incluſa, in ſpiritum conuertitur: qui tanquam caloris & facultatum omnium moderator, auctorq; procreationis, in medium illius ſe colligit, in eoq; perſiſtit, omnium partium opifex, & conformator: qui poſtea aſiſtens, vitam diu conſeruat. MATHESES, Quid primùm ſpiritus ille præſtat? GERON, Non ſolùm vim procreandi, ſed etiam naturales facultates, quibus nutrimur, augemurq; , omnes ſuſtinet & comprehendit. MATHESES, Quomodo ſingulæ partes formantur? GERON, Omnes initio conformationis ſuæ adumbrationem & rudimentum repræſentant: ſed alię poſt alias perſciuntur. Principio tres quaſi bullæ in ſemine apparent, quæ iecoris, cordis, & cerebri ſunt rudimenta. craſſiores ſeminis partes in oſſa paulatim mutantur: tenues in neruos, venas, & membranas tranſeunt. deinde viſcera prædicta peculiâres ſedes acquirunt, figuramq; & ſpeciem induunt: nec non membranę ſimul quæ fœtum inuoluunt, validiores euadunt. non longè poſt venæ, arteriæq; omnes in fœtus vmbilicum efformantur, quarum oſcula vteri acetabulis cohærent. Eo tempore etiam vena portarum, & caua è iecore in pulmonis ramulos diſcinduntur. arteria è corde, ſpinæ medulla è cerebro, trunci modo: nerui autem araneorum filamentorum inſtar tenues, ex illa emergunt. poſtea ventriculus, 35

Spiritus feminis quid præſtet.

Partes quomodo formantur.

Hominis partes.

inteftina, veſica, cordis inuolucrum, membrana coſtas ambiens, peritonæum, cerebri tunicæ, & cutis, omnia tegeps, enaſcuntur. ex eodem ſemine concreſcunt: ex eodem concreto oſſa duritiæ acquirunt: ex his ligamenta, tendines, & membrana oſibus obducenda. atq; omnes hæ partes vigefimo ſeptimo die conformatę apparent: perſectę autem in maribus trigefimo: in fœminis trigefimo ſexto. MATHESES, Quę partes ex ſanguine materno in vtero for-

- ro formantur? GERON, Iecur, lien, pulmo, muscoli, & quæuis alia *Partes ex sanguine materno quæ.*
 caro. aliæ autem citius, aliæ tardius pro ipforum dignitate promouentur. nam ea primùm gignitur, quæ dignior est, & motus initium in se obtinet: post hanc cæteræ quæ ei sunt viles, & propter ipsam creantur. ita superiores inferioribus, interiores exterioribus, seminariæ sanguineis prius generantur. atq; inter has præstantiores cæteris priorem originem habent: quamuis sæpe tardius absoluantur. Eodem modo principales partes, iecur, cor, & cerebrum, prius quàm vmbilicus, aut quæuis alia oriuntur: licet
 10 ille primus perfectè absoluator. MATHETES, Quid post fœtus formationem in vtero fingi putas? GERON, Membram, nerui, & cutis, vnguesq; in exterioribus digitis vi caloris sicciores, firmioresq; redduntur: pili radices agunt: à die trigesimo sexto sensus facultate fœtus donatur: tertio autem mense ossibus iam formatis,
 15 & paulò durioribus effectis, moueri incipit ac calcitrare. Siue autem masculum, siue fœmellam gestent vtero grauidæ, aliæ semper quinta septimana, aliæ tertio mense, aliæ non nisi medio prægnationis tempore, fœtum loco dimoueri sentiunt: præterea hæc secundo & quadragesimo die, illæ quarto mense primos motum
 20 insultum, veluti volitantis muscæ exculsionem, vel titillationem percipiunt. MATHETES, Cur non eodem omnes tempore sentiunt? GERON, Quia vel prægnans, vel fœtus bono constat habitu. MATHETES, Tuncne singulæ partes sunt firmæ & absolutæ? GERON, Nondum, sed ad nonum vsq; mensem, quo in lucem prodire solet, perficiuntur, aluntur, & crescunt. MATHET.
 25 Qua de causa fœtus nono mense exitum petit? GERON, Quia tunc adeò increuit, easq; vires nactus est, vt quasi alimentum per os assumptum conficere possit, idq; copiosius quàm antea exposulet, sicut etiam aërem ampliorem, qui calorem natiuum auctiorem effectum inspiratu refrigeret. MATHETES, Quomodo se ad exitum præparat? GERON, In quinto Dialogo hæc & alia quædam de situ ipsius exposui, eoq; non opus est hic eadem repetere. ne autem
 30 me putes laborem subterfugere, paucis ipsa persequar. Diebus aliquot ante partum, interdum mense vno, fœtus sese conuoluit, sic vt caput declinans naturalibus offerat, crura ac reliquos artus in sublime attollat, eleuetq;. MATHETES, Quando ita se inuertit, nihilne abruptit? GERON, Nihil, eò quòd vmbilicus tunc sit laxior, duos plerumq; cubitos longus, multis nodis & inuolucris infantem præcingens. Instante iam partu, crebra ille manuum
 40 pedumque impulsione, & calcitratu membranam, quam græcè *αμνιον* vocauit, disrumpit: atq; tunc vrina sudori commiscetur. deinde fœtus iterum maiore se impetu commouens, pleraq; ex ace-

Fœtus quo tempore natus in vtero.

Quomodo fœtus ad exitum se præparat.

tabulis resoluit, quando pariens ventris torsiones sentit, sanguis-
 que in vteri sinum diffluit. postea secunde ab acetabulis euellun-
 tur, & reliquæ membranæ discerpuntur: ob quod aquæ tunc ex
 vtero profluunt. tandem foetus vndiq; liber, nusquam adhuc ad-
 hærens, forâs elabitur. **MATHE TES**, Quomodo tam facile egredi
 potest, cum os vteri toto gestationis tempore adeò arctum fue-
 rit, vt vix acicula penetrare id possit? **GERON**, Vterus eo tempo-
 re paulatim os suum aperit, ac deducit, vt obstetrices minimum
 in id digitum immittere possint: deinde amplius, vt ille tunicam
 allantoidem, & aquas, vt vocant, eis obuias percipiat. vbi verò ab
 his vteri os foetui educendo satis patuerit, totus vteri fundus ad
 os se contrahit, & infantem forâs propellit, vicinarum partium,
 ipsiusq; grauidæ subsidio, dum musculos abdominis contrahit
 intenditq;. Cum iam foetus in vteri os delapsus fuerit, capite vi-
 am corpori parat, & se per ceruicem humore effluente madidam
 lubricamq; emittit, vt supra ostendi: quanquam ea interdum sic-
 cior appareat, vnde partus fit difficilior: interdum vterus tanto
 impetu infantem excutit, vt simul forâs excidat. **MATHE TES**,
 Qua situs forma infantes per vterum exeunt? **GERON**, Omnes
 facie coccygem matris versus respiciunt: nonnulli scribunt ma-
 sculos tantum versus podicem, foemellas versus naturalia facie
 conuersos prodire, quod in vtero quoq; diuersum situm habeant.
 Quàm primùm iam infans editus fuerit, eiulando vociferatur, ac
 lac è mammis (si eis admouetur) fugit. **MATHE TES**, Vnde lac in il-
 las est reconditum? **GERON**, Ex sanguine, qui in venis maioribus
 non in vtero ipso subsistit, vt qui illic in grumum concreveret.
 Diuidunt quidam sanguinem mulieris trifariam, sic vt vna pars
 sit (quam foetus per acetabula vi sua in alimentum trahat) purissi-
 ma, optimaq; altera etiam sincera, nullo infecta vitio, quæ ad ma-
 millas fertur, vbi infans moueri inceperit, vt naturæ viribus in
 lac conuersa, nutrimentum familiare & idoneum illi recens na-
 to suppeditet: tertia, quæ in ipso partu, & longè post eum largiter
 è venis in vterum tendentibus emanat: atq; hæc verum est men-
 struum nutritioni ineptum. quæ mulier hoc non commodè à
 partu liberatur expurgaturq;, ea de vita periclitari solet. Sunt au-
 tem, qui memoriæ prodiderint, infantem menstruis profluen-
 tibus conceptum, elephantiasin obnoxium, sicut eum quem mulier
 paulò antè illa conceperit, diu valetudinarium morbosumq;
 futurum. **MATHE TES**, Vnde similitudo infantium & parentum,
 tum sexu, tum specie, tum effigie siue forma accidit? **GERON**, Si
 vtriusq; semen calore & siccitate plurimum excellat, mas: si verò
 frigida & humida qualitas in eo vincat, foemina procreatur. Di-
 scrimen

*Infantes qua for-
 ma produnt.*

*Sanguis mater-
 nis triplex.*

*Infans tempore
 mensium conce-
 ptus.*

*Infantium & pa-
 rentum forma &
 similitudo vnde.*

- scrimen autem sexus, non solum ex naturalibus partibus, sed etiam ex alijs quibusdam, vt barba, membrorum amplitudine, & voce, spectatur. Itaq; parentes robusti & calidi, si temperato concubitu fruantur, marem ferè gignunt: idè ex dextri testiculi semine, & in dextro vteri sinu: contrà ex sinistri, foeminam. Effigies robori, facultatis conformatricis ceu opificis, fertur accepta, dum vehementi grauidarum comprehensione, & firma cogitatione gubernatur. hæc enim tantum valet, vt vim suam concepto semini conferat, quemadmodum sæpe cogitantis corpus immutat;
- 10 id quod exemplis quotidie experimur. Quum enim grauidæ vinum, aut aliud quippiam in partem aliquam contra eius voluntatem infunditur, atq; id indignabunda vehementiore animo apprehendit, infanti ibi nota imprimitur. similiter, vbi grauida re aliqua cuius desiderio flagrat, non potitur, infans signum illius in corpore representat. Galenus commemorat in libro ad Pisonem, Æthiopem quendam ipsum consuluisse, quomodo posset formosum infantem procreare: se autem eum iussisse, vt tabulam, in qua puer elegans esset depictus, ad parietem iuxta pedes appendendam curaret, iuberetq; foeminæ cum qua concubiturus esset, vt
- 20 illam oculis defixis inspiceret: & ex eo consilio accidisse, vt mulier pulcherrimum infantem non patri similem pepererit. Sic aliàs accidit, vt mulier alba nigram prolem genuerit, nam vtriuslibet parentis hausta imago, cogitatioq; subita, sub ipso conceptu similitudinem effingere potest: vnde alijs infantes auis, alijs patribus
- 25 similes nasci videmus. In animalibus brutis idem accidere deprehendimus: exempli gratia, gallina, quæ oua varijs tincta coloribus fouet, pullos quoq; diuersè coloratos edit. Eodem modo pauo, si albis linteis contactus ouis incumbat, albos quoq; foetus non sui coloris profert. Attamen plures in homine quàm in cæ-
- 30 teris animalibus, differentia similitudinum accidere consueverunt. MATHETES, Qua de causa? GERON, Quia in illo cogitationes animiq; celeres, & ingenia varia, multiformes notas imprimunt: in his sunt immobiles, similesq; omnibus, & singula in suo cuiq; genere. MATHETES, Vnde similitudo speciei contrahitur?
- 35 GERON, Ex subiecta potissimum materia. hinc est quod foetus ex diuerso genere conceptus, ad foeminæ propius, quàm ad maris speciem accedat. Ovis namq; ex oue, & hircò gignitur, duris longisq; pilis confita: ex capra autem & ariete, fit capra pilis mollioribus prædita. eadem ratio est, si canis & vulpes, vel asinus & equa,
- 40 coeant. Hoc autem ideo accidit, quod foemina copiosorem foetui materiam, quàm mas conferat. cum autem mas nihil præter semen suppeditet, rationi consentaneum est, illud quoq; in vicem

Effigies parentum in pueris.

Galenus historia de similitudine infantum & parentum.

Similitudinum differentia plures in homine, quàm in brutis accidunt.

Similitudo speciei.

*Gemelli vnde.**Monstra**Mola,**Superfetatio.**Partes similes
cur aliquando
ampliores in in-
fantibus.**Animales fun-
ctioes.*

materiæ foetus subiici: aliàs ipse matrem prorsus exprimeret, specieq̃ referret. MATHE T. De foetu abundè mihi satis fecisti: quomodo autem gemelli concipiantur, aut plures, nondum hactenus intellexi. GERON, Quamuis vnicus vteri sinus existat, tamen plures in eo foetus concipi possunt (vt antea dixi) si materia illis adsit idonea: ea verò est semen. porrò dum foetus delineantur, suis singuli membranis distinguuntur. si hoc non fiat, simul cohærent, & monstra hominum sese contingentium generantur. Hippocrates docet, si viri semen vtero immissum, æqualiter in eius sinum subeat, & in ipso conclusum foueatur, sic vt fœminæ semen tunc affluat, gemellos procreari: si verò inæqualis eius fiat partitio, molam cum foetu gigni. MATHE TES, Ex pluribusne coitionibus gemelli, aut plures foetus concipiuntur? GERON, Non, sed ex vna tantum. si nanque semen ex altero post primum concubitum vtero concipiatur, quod rarissimè mulieri, canibus autem & alijs id genus animalibus sæpius accidit, gemelli non fiunt, sed quæ superfætatio dicitur: non enim vno tempore, sed interpositis diebus ij foetus eduntur. sicut igitur illi diuerso concipiuntur tempore, sic quoq̃ in lucem prodeunt. MATHE TES, Habentne gemelli in vtero situm inter se consimilem? GERON, Vnius quidem sexus, eisdem licet secundis inuoluantur, simpliciq̃ membrana disungantur: suum tamen quisq̃ vrachum (vulgo cordam dictum) vrinæ receptaculum propriasq̃ venas & arterias obtinet. diuersi autem sexus, varijs quoq̃ secundis continentur, eisq̃ prorsus distinctis. MATHE, Quis sit vt infantes, vbi alijs corpore grandiores existunt, partes similes ampliores procerioresq̃ habeant? GERON, Quia hi meliore alimento, & materno sanguine copiosiore quàm alij nutriti sunt: vel quòd ex paterno semine vberiore naturaq̃ valentior nati sint. hæc enim artus plerumq̃ adiustam, paremque magnitudinem perducit. MATHE TES, Possuntne vir & mulier diuersæ molis infantes progignere? GERON, Hæc quidem ex pusillo viro, pusillum: ex procero, procerum. ille autem rarò ex diuersis mulieribus dissimilem magnitudine procreare potest. MATHE TES, Facultatum naturalium functiones, humorumq̃ seminis & menstrui naturas, differentias & vires satis iam inrelligo: nunc animales etiam actiones explicandas, vt promissi, aggrediaris. vtinam eas tam facilè, quàm naturales assequi possem. GERON, Bono sis animo, diligentia tua omnem difficultatem superabis.

Sentientis anima in cerebro ipso, tanquam natiuo instrumento residet, vniversas facultates in se complexa, quas proprijs quibusdam actionibus & munijs testatur, ac varia ipsi obeundis instrumentis.

- strumenta accommodat. MATHETES, Quodnam omnium isto
 rum primum existit? GERON, Spiritus animalis, qui ex vitali (si-
 cut in anatome didicisti) vi cerebri ingenita conficitur, probeq; *Instrumentum
primum animas
lium actionum.
Spiritus.*
 elaboratus, ad omnes animæ illius functiones se adaptat, interio-
 5 ribusq; cerebri sinibus copiosus insidet. Ex his tanquam largis
 fontibus per neruorum canales, tum sensuum instrumentis, tum
 musculis motoribus influit. vbi cum iam insinuatus est, aliam
 quandam speciem ex partis natura acquirit, qua peculiariter ei *Varij sensuum
spiritus.*
 addicta est, prorsusq; inseruit. Qua de causa non vnus, idemq; spi-
 10 ritus esse poterit, videndi, audiendi, odorandi, gustandi, tangen-
 di, & multò minus mouendi. MATHETES, Quod secundum ani-
 mæ sentientis instrumentum est? GERON, Crassius, terrenumq; *Secundum ani-
mæ sentientis
instrumentum.*
 magis, vt in quo spiritus ille animalis, rerumq; exteriorum imagi-
 nes conceptæ, seruari debeant. MATHETES, Qua id præditum est
 15 essentia? GERON, Non vbiq; vna, eademq; sed multiplici & varia.
 MATHETES, Exponas hoc planius. GERON, Cerebrum interio-
 rum motionum instrumentum est, quod multifariam conforma-
 tum, ad omnes animi functiones se accommodat (verbi gratia)
 oculus eiusq; nerui, aspectui: auris, auditui: nares & cerebri papil-
 20 læ, odoratui: lingua, gustui: neruorum tactilium soboles, tactui:
 duriores nerui musculis inserti, motui. Quemadmodum igitur *Facultates vim
agendi à spiritui-
bus accipiunt.*
 in varijs hisce instrumentis, diuersi quoq; spiritus & inæquales
 habentur: sic etiam facultates non parum dissimiles insunt, quæ
 omnem agendi vim ab illis acceperunt, neque quicquam sine il-
 25 lorum subsidio præstare possunt, licet vna eademq; omnes con-
 stent essentia. Quæ igitur instrumenta, familiarem quendam spi-
 ritum in subiecta idoneaq; materia, nec non facultatem in illa ob-
 tinent, ea sanè actionibus obeundis apta, accommodaq; fiunt.
 MATHETES, Qua ratione, & modo hæ perficiuntur? GERON, *Quomodo actio-
nes perficiuntur.*
 30 Alię contrectando vti tactus & gustus, quibus ea tantum quæ
 nobis sunt coniuncta, percipimus: alię medijs cuiusdam interiectu
 mouentur, vt aspectus, auditus, & odoratus. MATHETES, Quid
 vocas medium interiectum? GERON, Aut aërem, aut aquam, vt *Quæ siant intera-
iectu medijs.*
 ex Aristotele de anima plenius intelligere licet. nam quæcunq;
 35 animantes terrestres gradiuntur, aut serpunt, colores sonosq; per
 aërem, aquatiles per aquam percipiunt. Cum itaq; res duræ & so-
 lidæ in aëre, aut aqua inuicem colliduntur, sonus editur: in hac
 quidem obscurus, in illo autem manifestus: præsertim si illæ sint
 leues, solide, & caue: in quibus celeris fit ictus conflictusq;. Sonus *Sonus.*
 40 autē re ipsa tum elicitur semper, cum alicuius ex alio q; alio ictus
 elicitur. itaq; sonus non ex vna re fieri potest, alij enim est quod
 pellit, aliud quod pellitur. MATHET. Quo pacto fit odoratus? GE- *Ictus.
Odoratus.*

Aspectus.

RON, Sic, vt odor sensim tanquam vapor, aëris inspiratione in cerebrum, per apertos narium meatus illiusq; membranas efferatur, permeetq;. MATHE. Qua ratione fit aspectus? GERON, Simili prope modum qua odor iam dictus. nam color aërem intermedium, aut aquam, aut vitrum, aut cornu, aut aliud simile perlustrans, oculum ad videndi sensum mouet, sic vt rei aspectabilis imago, humore crystallino per pupillam excipiat: vnde tandem spiritus auxilio in cerebrum, & commune sentiendi principium, per neruos visorios perducitur. MATHETES, Aspectusne conuenit cum alijs duabus iam commemoratis functionibus, an ab eis aliquantum differt? GERON, Proculdubio. nam in his sensus non subito, sed paulatim ob interiecta quædam mouetur. aspectus autem non temporis processu, sed statim aëre intermedio mutato, efficitur. MATHETES, Quibus interiectis gustus, & tactus fieri solent? GERON, Nullis, sed coniunctione & contactu quodam, sicut aspectus: tum deniq; efficitur, cum res quædam oculos mouet atq; impellit. Nam si vel sapor in neruum gustandi, vel calor stylusq; pungens in eum neruum qui tactui præest, nudum inciderit, insignis acrisq; sensus mouetur, etiamsi nulla caro media intercedat. nihil enim saporis sensum mouet sine humore: hoc autem imbutum, si linguæ admoueat, statim eum mouet, speciesq; & imago eius, primario sensui infertur. Tactus autem fit, cum quælibet tactiles qualitates, aut carnis, aut etiam nullius corporis interiectu, protinus ad tangendi neruum accedunt. Sed quid longius hic moror, cum ista in scholis ex Aristotele didiceris. Tempestiuum nunc est, vt ad interiores animæ sentientis actiones pergam. MATHETES, Quænam illæ sunt?

Sentientis animæ actiones.

GERON, Rerum perceptio atq; cognitio, cogitatio, discretio, imaginatio, memoria, somnus, insomnium, appetitio. MATHETES, Quomodo hæ fieri solent? GERON, Sic, vt formæ speciesq; rerum instrumentis acceptæ, mox per neruorum ductus in cerebrum spiritus auxilio permeent. Cum enim exterior sensus rerum, quæ sunt foris, occursum feratur, moueaturq;, simulacra illarum interiore quocq; impellunt, excitantq;. Principales illarum tres sunt: prima imaginatio, siue potius visum aut visio Latinis dicitur, Græcis *φαντασία*, qua res ab exterioribus sensibus oblata apprehenduntur, non autem discernuntur, dijudicanturq;, num veræ sint an falsæ. altera ratiocinatio, græcè *λογισμός*, quæ concepta sub iudicium reuocat, qualiaq; sint, discernit. tertia est memoria, Græcis dicta *μνήμων*, qua sensa conseruantur, cerebro tanquam sigillo impressa infixaq;. has actiones sensus interior primariusq;, inter vigilias per facultates suas exercet. MATHETES, Quando, & quo-

*Imaginatio.**Ratiocinatio.**Memoria.*

& quomodo somnus fieri solet: GERON, Cum spiritus animales *Somnus.*
vigilijs ad eò dissipati exhaustiq; sunt, vt moueri amplius neque-

ant, recreari autem, refocillariq; & conuiescere desiderant. Simi-
liter etiam somnus obrepere consuevit, cum multum vaporis, ex
cibus & vino per calorem in principem sensum exhalat: id quod
in pueris & temulentis manifestò cernitur: item cum larga frigi-
di excrementicijq; humoris copia, ad cerebrum, vt in veterno ela-
ta, primarium sensum veluti laqueis quibusdam sic impediunt, vt
nullo se modo expedire possit, vnde non solum exteriores sensus,

sed etiam interiores facultates consopitæ iacent. vt quæ neq; dis-
cernere, neq; fingere, neq; comminisci quicquam sicut neq; visio-
nibus commoueri possint. MATHE T. Quo pacto fit insomnium? *Insomnium.*

GERON, Si leniter quis obdormit, & nulla vaporis, humorisq;
abundantia, discernendi meminscendiq; vires obtundit, impe-
ditq;. non autem verum statim insomnium esse dicitur, cum mul-
ta forsan ante sensum visa, multaq; motiones obuersantur: sicut
neq; is somnus verè est, qui pauxillum à vigilia distat. Cum enim
discernendi facultas eo tempore salua sit, & libera, omnes visio-
nes quæ tunc fingendi vim exagitant, internoscit, manifestasq;
reddit, neque in illis errat, sed vbi nocturnæ visiones occurrunt,
tum dormire se, tum somnia ea esse quæ videntur, agnoscit: non
autem tanquam veris, assentitur. Sic afficiuntur, qui leui somno
indulgentes, aut canum latratus, aut gallorum cantus excipiunt,
de quibus tunc quoq; somnia sibi fingunt. Tum autem verum

insomnium esse dicitur, cum placidus moderatusq; somnus, ex
medioeribus causis homini obrepit, vt discernendi quidem facul-
tatem obtusio rem, fingendi autem vim impedimentis liberam
obtineat: nec non vt visiones plurimas ex rebus, quas per vigili-
as gessit, sentiat, cogitet, & in somno obuersantes habeat, easq;
tanquam res veras, dormiens intueatur, aspiciatq;. breuiter som-
nium propriè est visum, quod dormienti occurrit, tanquam ve-
rum existimatum. eadem est ratio illorum, quæ delirantibus per
morbos apparent. MATHE T. Qua ex causa tam magna variaq;
visorum copia prouenire solet? *Visorum copia.*

GERON, Ex multiplici corporis, *vnde.*
humorumq; affectione, & perturbatione. Nam hæc quidem cum
ex spiritibus & humoribus corporis proueniat, omnino efficit, vt
visiones vehementius agitatae appareant: non quales veræ sunt,
sed distortæ, præposteræ, monstrosæq;, sicut in temulentis, & ijs,
qui febri iactantur euenire solet. affectio verò, statusq; corporis,
alijs horrenda plenaq; terroris: alijs lites furiosas: ijs amicitias
& voluptates iucundas, in somnijs & delirijs insunt. At ijs di-
stincta, digestaq; somnia ad veri similitudinem expressa succur-

*Affectio & status
corporis qualia
somnia pariunt.*

Appetitoria facultatis functio. Triplex species functionum appetitronis.

Rationalis.

Cupiditatis actio

Animosa.

Cupiditates in morbos & agrotationes degenerant.

Tactus & incessus.

Spiritus animæ instrumentum.

Nervi & musculi secundaria instrumenta.

Vitalis spiritus quomodo in animum mutetur.

runt, quibus omnia quieta, tranquillæq; insunt, rerumq; visiones non fluctuantes neq; immoderatiùs agitatae, sed solidæ, & integræ obuersantur. **MATHESES**, Quæ est appetitoria facultatis functio? **GERON**, Motus, & interior quædam agitatio, quæ Grecis ὁρεξις dicitur, cuius triplex est species. alia nanque ad rationem pertinet, alia irarum ardori seruit, alia voluptate alitur. **MATHESES**. Quomodo prima fieri solet? **GERON**, Cum ea quæ boni malivæ specie nobis occurrunt, ex rationis præscripto imitatur, aut fugimus. **MATHESES**, Quo pacto reliquæ duæ obeunt? **GERON**, Cum vehementiùs contra illam incitatur, & delectationi magis quàm menti obsequimur. **MATHESES**, Id distinctiùs exponas. **GERON**, Nunc ardore veneris, stimuloq; libidinis in naturalibus ex semine orto impellimur, aut exinanitione ventriculi, hoc est fame, cibum appetimus, sicut ex immodica siti potum desideramus: nunc ex sanguine bilivæ in cordis sinibus effervescente, ad iram, odium, aut inimicitiam impellimur. **MATHESES**, Sûntne appetitoria istæ functiones perpetuæ? **GERON**, Non omnes, sed ea quæ voluptatis est, vniuersis rebus ita semper insidet, vt nunquam ab eis separari queat. vbi verò alia duæ tanquam in venis medullisq; diutiùs inhæserint, tunc in morbos & agrotationes, vt actio in habitum, degenerant. atq; horum omnium fons, & ueluti genus est intemperantia: vti apud philosophos copiosius de hac & alijs functionibus est tractatum. **MATHESES**, Si interioris sensus functiones, per essentiam illam animæ in cerebro sitam obeunt, per quæ tactum incessumq; fieri existimas? **GERON**, Per spiritum, qui in omnes sensus exteriores, omnesq; corporis partes extra cerebri regionem sitas, dispergitur. quocirca etiam primum animæ instrumentum, quod ad exteriores functiones accommodatur, censeretur: mox nervi, deinde sensuum organa, & musculi. **MATHESES**, Quomodo potest diu perseverare, cum assiduè in motibus sensibusq; dissipetur? **GERON**, Materia ei reficiendo idonea, continuò ex corde per arterias carotides supeditatur, & primum in admirabili illo contextu, deinde in plexu choroide, cerebri ambientis facultate sic præparatur, vt in spiritum animale conuertatur, prioresq; eius sinus prorsus impleat. vbi verò sic immutatus fuerit, novam speciem, viresq; novas à cerebro & inuolucris ipsius acquirit. has deinde tanquam actionum opifices, nervis sentientibus, tangentibus, & mouentibus dispensat, atq; semper præsens eis adest, eò quòd perpetua illa cerebri agitatio, de qua meminimus, nunquam non ipsum partibus corporis distribuatur. **MATHESES**, Quomodo potest spiritus in tenuissimos nervos influere, cum non sint caui, sicut grandiores?

GERON,

GERON, Quamuis illi non manifestos, habeant meatus ac canales, tamen spiritus, qui subtilissimus est sensum illabens, ipsos irrigare potest. Cum enim alimentum, crassius & lentius humor, oleumq; instillatum eosdem penitus subeat, certè etiam subtilis ille spiritus animalis, totam ipsorum essentiam ingreditur; alioqui vires ac facultates animæ in subiectas partes, distribui non possint. MATHETES, Ergo etiam ille semper motum efficere potest? GERON, Non. sed neruorum & musculorum robur, firmitatemq; duntaxat tueri & conseruare. MATHETES, Hoc non satis intelligo: si non molestum tibi, planius explices? GERON, Instrumenta sensuum, omnesq; tum nerui, tum musculi, spiritibus, viribusq; animalibus aspirati firmantur, & ad munia obeunda simul stabiliuntur, præparanturq;. Nam vbi viæ & canales eorum intercipiuntur, obstruunturq;, vt in resolutione, quæ græcè *μαδάωσις* vocatur, accidere solet, non tantum sentiendi, aut mouendi facultas tollitur, sed illæ toto prorsus robore soluto languescunt: vbi verò omnino vires suas ex spiritu acceperint, tunc actionibus probè, integreq; funguntur, sed non eodem modo. MATHETES, Quamobrem? GERON, Quia sensus exterior perpersione quadam percipitur, cum incidentibus rerum subiectarum qualitatibus mutatur, motus autem actione perficitur, cum nulla res extrinsecus incidit. Quamprimum enim appetitus, aut voluntas facultati motorix, cum spiritu per neruos & musculos diffusæ imperauerit, hæc statim concita, quocumq; illa tenderit, motum affert, & obtemperat. MATHETES, Quale hoc est voluntatis imperium? GERON, Promptum & euident; sed plerumq; adeò obscurum ac tenue, vt nos omnino fugiat, quemadmodum in oculorum & palpebrarum motu, in compluribus, tum capitis, tum manuum gestibus, nec non in dormientium respirationibus, corporisq; agitationibus, ad quas nihil, aut minimum intenti videmur. in resolutione, cum nerui spiritu & facultate sint destituti, nulla vel efficacissima voluntas motum efficere potest. MATHETES, Quæ ergo præcipua motus causa existit? GERON, Spiritus & facultas potius quàm appetitio ac voluntas: nisi enim huic animi quoque intentio & conatus quidam accesserit, quæ facultatem alioquin torpidam languidamq; in particula ad agendum incitet, imperium illius parum erit efficax, siue oculos in diuersa contorquere, aut omnes simul partes commouere, aut sensibus vniuersis simul & perfectè quippiam percipere volueris, etiamsi instrumenta salua & integra extiterint. MATHETES, Quot igitur motus causæ sunt? GERON, Facultas cum spiritu, voluntas siue appetitio, & animi intentio. MATHETES, Quo pacto facultas animalis motum

Spiritus neruos irrigat.

An motum semper spiritus efficiat.

Quid spiritus in instrumentis sensuum, neruis & musculis præstet.

Sensus exterior affectione percipitur.

Motus actione perficitur.

Voluntatis imperium.

Motus causa præcipua.

Motus causæ quot.

Facultatis animalis motus qui fiat.

affert. GERON, Dum voluntatis imperio, & animi conatu incitatur, illa quoque neruum primum ac musculum intendit, firmitusque in se contrahit, & ea simul partem adducit, in quam inseritur, siue id os siue membrana sit. quoties enim facultas musculum intendit, & contrahit, simul & os cui insinuat, & totum membrum, cui id subiectum est, mouet. ac propria musculi actio, est contentio, & contractio: extensio autem & relaxatio, ceu quaedam remissio. MATHETES, Quis status musculi est laboriosus, quisque naturalis? GERON, Cum nimium aut contrahitur, aut extenditur, cumque membrum circa laborem & defatigationem diu multumque extendi aut contrahi nequit. MATHETES, Quis lassitudinis & doloris expertus? GERON, Medius inter extremos, in quo musculi omnes remissi sunt. si vero hoc musculi immobiles continentur, sic ut quies non adsit, sed motus dolorque, is graece *τροχιδος*, quasi tenforius appellatur. MATHETES, Quae mentis & intelligentiae sunt functiones?

Mentis functiones nullo instructo obueantur.

GERON, Ex facultatibus ipsius quas modo exposui, discere poteris. omnes intus adeo sunt abditae, ut nunquam foras prodeant, neque mens ad has exequendas villo siue interiore, siue exteriori instrumento indigeat. In his rerum simulacris versantur,

Mens formarum omnium praestantissima.

quae in principe sensu conseruantur, veraeque sunt illorum notiones, sensibus perceptae: ob quod etiam omnium formarum summa, & praestantissima recte vocatur, quod vna reliquas omnes cernat percipiatque: non autem in singulis subsistit, sed ex his generalius quiddam colligit. Ea porro est notionum simplicium, tum

Notiones ad quid menti seruiant.
Compositio.

singularum, tum generalium ratio, in quibus veritas, aut falsitas nulla versetur. MATHETES, Ad quid notiones istae menti seruiunt? GERON, Ad hoc, ut si ipsa illis componendi facultatem adhibeat, temporis coniunctione interposita plurima, quibus veritas aut falsitas inest, recte possit componere: atque postea de compositis planam ferre sententiam, hoc bonum esse asseuerans, illud honestum esse, negans. Hec mentis functio, discretio, ac iudicium appellari potest, quod nunc verum nunc falsum ferri solet. MATHETES, Quomodo fit ratiocinationis facultatis actio? GERON,

Iudicium.

Ratiocinandi munus.
Scientia.
Opinio.

Cum mens excitata ex notionibus rerum plurima colligit, aut inductione, aut argumentatione, de quibus vel scientia, vel opinio habetur. illa quidem fit, cum argumentum ex principiis, ac Theorematis necessariis, haec autem ex probabilibus concluditur. MATHETES, Quae contemplandi functio est? GERON, Mentis, & intelligentiae nostrae ad res generales, necessarias, & aeternas cognoscendas intentio, quid in illis verum, aut falsum sit, prospiciens. Quod studium si perseueret, sapientia dici potest. sin autem

Contemplatio.

Sapientia.

ad res

- ad res caducas declinet, non tamen in totum eas sectetur, sed ad hominum commoda & vsus referatur, intelligentia nominatur, *Prudentia.* quę in actione consistit. cū autem hominum bona inter se differant, meliora deligendi studium, prudentia est. Quoniam autem
- 5 dubia sunt & incerta, mens de illis consilium caprat, consultat, & deliberat: cū autem id accuratius peragit, solertia, ac sagacitas *Sagacitas.* appellanda est, ars autem, si intellectus actioni addictus, Theore- *Ar.* mata concepta, notaque, bono consilio, rectaq; ratione ad opus quoddam perducit. eiusdem quoque voluntas appetens illorum *Voluntas.*
- 10 est, quę rationis iudicio, deliberatione, & iudicio semel recepta, & probata sunt. Ideo intelligentia vocatur appetitio: nam vt cupiditates sensui, ita voluntas intellectui coniuncta est. vbi verò bonum & vtile opus quoddam faciundum statuerint, tum appetitum rationis participem mouet. Id tandem, quicquid bonum
- 15 iudicatum elegit, non pura quidem voluntate, sed bono consilio & deliberatione confirmatur. Omnes iam mentis functiones habes explicatas, si memoriam adhuc adiunxero. MATHESES, Quo pacto ipsa fieri solet? GERON, Generales notiones rerum & for- *Notiones rerum.* mę, semper intelligentiam mouent & impellunt, quę in sola illi- *Simulacra.* us intentione consistunt: simulacra verò, omni animi conatu, actioneq; sedula, & animo prorsus conquiescente, seruantur. atq; sic mens atq; intelligentia meminisse dicuntur. At vbi generales istę notiones aliquando euauerint, singulorum simulacra, ex quibus illę conceptę fuerunt, quęq; sensus communis retinet,
- 25 rursus intellectum incitant, impelluntq; vnde illa similes ac olim notiones generum, eliciet. Quando mens has se prius nouisse sentit, intelligentię memoria vocatur. Ideo mens & intelligentia non per se & primariò meminit, sed principis sensus adminiculo, in quo memoria primariò, non autem in mente residet. MATHET.
- 30 Estne idem recordatio, quod memoria? GERON, Non profectò, *Recordatio.* sed collapsę memorię reuocatio. Nam quandiu constans & dilucidum externę rei simulachrum fuerit, id mentem ē sensu principe impellens, memoriam rei à qua ductum est, excitare poterit. sin id vniuersum non retineatur, sed pars eius vel temporis lon-
- 35 gitudine, vel morbo, vel alia quauis iniuria delata fuerit, pars autem reliqua tam exigua sit, vt neq; animum incitare, neq; rem exteriorem integram repręsentare queat, tunc certē memoriam periisse dicemus. At si exigua illa pars ceu origo & seminarium quoddam, animum poterit vel minimum excitare, hæc statim
- 40 consecutione quadam & serie, in proximum & affine aliquid, mox in tertium, deinde in aliud migrabit, quousq; admirabili rerum continuatione & ordine pristinam cognitionem recipiat. *Memorię intelligentiæ.*

Recordatio.

hoc pacto mens reminiscitur, eiusque actio recordatio existit. Non institueram in his mentis actionibus enarrandis tam prolixus esse, cum Aristoteles de ipsis copiose tractauerit. ob quod etiam Galenus & alij veteres medici, nullam ferè mentionem fecerunt.

Facultates non simul omnes offenduntur.

MATHESES, Quamuis satis iam de animæ tum facultatibus, tum functionibus ex te audiuerim: tamen adhuc in dubitationem adducor, an verum sit, quòd cum vna aliqua inter tres iam enumeratas mentis facultates, per morbos offenditur, reliquæ saluæ & incolumes permaneant? GERON, Quid ni? sæpè enim fingendi vis læsa cernitur, ratione ac iudicio constante: quo visa, falsa esse ac mendacia agnoscit: sicut etiam dormientes, ea quæ in somnis vident, non vera, sed illorum commenta esse iudicant, in quibus fingendi imaginandiq; facultas violata est, ratiocinatio autem & memoria integra deprehenditur. alij quamuis in delirio perperam iudicent, & ratiocinentur, tamen familiares, & quæcunq; occurrunt, agnoscunt, & præteritorum retinent memoriam. MATHESES, Credo tibi, & in hisce, & in alijs plurimis casibus sæpius versato. sed causam libenter ex te audirem. mihi enim videtur, nisi singulæ proprias sedes ac discretas habeant, non posse fieri, vt aliæ lædantur, aliæ maneant integre. GERON, Ita quidam sentiunt, qui similem & eandem animæ essentiam, omnibus inesse putant: non autem præstantiorem in his quàm in illis inueniri. si verò diligentius rem expenderent, indubiè illam quamuis simplicem, facultates in alijs absolutiores exhibere, functionesq; nunc expeditius, nunc tardius exequi, deprehenderent. quotidiè enim experimur, alios natura, ingenio, & cogitandi facultate valere, qui memoriam & ratiocinationem habeant infirmam: alios contra memoria pollere, quibus nihil, aut minimum rationis, ac iudicij insit: alios acri ac sincero iudicio valere, qui non expedita cogitatione, ac firma abundant memoria. MATHESES, Quid ergò varias hæc facultates efficit? GERON, Diuersa corporis & instrumentorum ipsius constitutio, ex temperamento & conformatione profecta, horum namq; statum animi facultates & mores, (vt Galenus in libello quodam docuit) sequitur. MATHESES, Insistane sola ac ingenua nobis constitutio corporis, an etiam acquisita illas mutat? GERON, Non, sed vtraq; corpus sordibus liberum purumq; vegetam mentem, moresq; bonos parit: sordidum impurumq; torpidas animi vires, & mores corruptos generat. Atq; si hæc in secunda valetudine animaduertuntur, quid mirum erit, si corpus morbo grauiore conflictetur, cerebro impedito, animi vires etiam vehementer, aut erroribus implicari aut perturbari (verbi gratia) quando corpus ac spiritus per febris ardores vche-

vehementius iactatur, mens quoque constare non potest, sed turbulentius concitata mouetur, viresque eius elanguescunt, ut conuellantur, non quidem protinus omnes, sed ita ut aliquæ etiam maneant incolumes. hæ causis incidentibus minus resistunt, sed
 5 facilius offenduntur: validæ autem magis obsistunt iniurijs. Cui igitur comprehensio infirma obtrigit, is in ea sola delirabit, si lenius delirium inciderit, multaque aliena cogitatione finget. cui autem iudicium minus firmum donatum est, is perperam tantum iudicabit, & ratiocinabitur. At si magnum delirium superuenerit, om-
 10 nes pariter animi facultates principes perturbantur, modo equali, modo inæquali iactura: eodem modo in reliquis facultatibus accidit. cum enim aduersarium quippiam in eas æqualiter irrum-
 pit, ea sanè quæ imbecillior fuerit, opprimetur. quæ autem valentior, irruenti iniuriæ obsistit etiam, si eadem in sede resideant. Sed
 15 quid multis te moror, vsu tandem & exercitatione artis, ipse rem ita habere comperies. nunc ad vitales actiones me conferam. MATHETES, Quot & quales sunt?

Delirium.

GERON, Multæ, quæ à vitali seu animali facultate proueniunt, ut læticia, spes, desperatio, confidentia, metus, amor, misericordia, inuidencia, exandescencia, quæ Græcè *θύμωσις* dicitur, iracundia, ira, odium, inimicitia, discordia, furor, verecundia, pudor, modestia, cunctatio, præcipitatio, & reliqui alij cordis motus, qui ex philosophis potius quam ex medicis cognoscuntur.
 20 MATHETES, Qui verò ex medicis?

Vitales functiones.

GERON, Pulsus, & respiratio. MATHETES, Quid ambo
 25 propriè existunt? GERON, Pulsus sanè, qui Græcis à *σφίγμῳ* dicitur, peculiaris est mouendi, primum cordis, deinde arteriarum ratio, à vitali facultate proueniens: eaque duplex. prima cor, arteriasque in omnem partem distendit, vnde græcè *συστολή* vocatur: altera vndique summittit: ob quod Græcis *συστολή* nominatur.
 30 MATHETES, Quid est respiratio? GERON, Sepri transuersi & thoracis musculorum motus, qui ex voluntate instituitur, ac græcis *ἀναπνοή* appellatur. Duæ huius quoque partes sunt: quarum vna inspiratio nobis, græcè *εἰσπνοή*, altera latine expiratio, græcè *ἐκπνοή* dicitur. MATHETES, In quem usum respirationem & pulsum natura
 35 condidit? GERON, In eundem, nempe ad vitæ conseruationem, quamuis diuerso modo fiat. MATHETES, Id quaeso breuiter mihi explices. GERON, Faciam pro mea virili. Galenus multos de vtraque functione libros conscripsit, sed tam prolixas, ut quis longo
 40 tempore ad eos legendos, ne dicam intelligendos, indigeat. artificiosa quidem via & ratione, quam methodum vocant, ipsos composuit, an autem vsu & exercitatione, ea quæ à illis tradidit ex-

PULSUS.

RESPIRATIO.

Vtus pulsus & respirationis.

Galenus artificiose conscripsit libros de functione animali & vitali.

pertus fuerit, non audeo affirmare. Quare hîc malo esse breuior, & illa tantum indicare, quæ ego annis iam quadraginta amplius, cum in ægris, tum in sanis obseruauî, sic tamen vt nihil, ex ijs quæ adolefcenti medico futuro cognitu necessaria videntur, omittam.

MATHESES, Nondum satis intellexi, quæ ratione pulsus & respiratio vitam nostram conseruent. GERON, Audiuiſti ſuperius, calorem nostrum genuinum, ærem frigidum continuè deſiderare, quamuis ipſe ſit æthereus, ſin autem eo deſtituatur, extingui: id quod trifariam. primum, quod non refrigeretur: ſecundò, quod idoneo careat alimento: tertio, quod nullus ær ſit offuſus, in quem fumofa caloris excrementa erumpant. Exempli gratia, in balneis, caldarijs, & æſtu vehementi, calor inſitus ideo contabefcit, quod nullo refrigerio recreetur. Si enim æſtus ambiens, immoderatioꝝ fuerit, illum vt lucernæ flammam, foràs euocat, diſpergitque adeò, vt vel nihil, vel certè paruulum eius reliquum maneat, ob quæ debilitamur, inſirmamur, extabefcimus, & tandem emorimur. E contrario, ſicut frigus moderatum & æquabile, calorem natium ſimiliter vt flammam extrinſecus conſeruat, tueturque, ne diſſipetur, ita immoderatum, ſi diu perſeueret, illum intrò reuocat, perinde vt calor aduerſarius vitam tollit. Porro hoc tibi etiam animaduertendum erit, circumfluum nobis calorem non modo inde eſſe noxium, quod natium noſtrum digerat, diſſipetque. ſed hinc etiam, quod cor ipſum, viſceraque magis ac magis inflammet, non autem vilo modo refrigeret: vnde propria ipſorum eſſentia conſumitur interitque. Id calidus ſeruiduſque ær diutius inſpiratus, euidenter magis efficit. ſimili modo in exiguo eodemque aëre continuo verſati, ſuffocamur, vt in aqua modica piſces.

MATHESES, Huius rationem exponas. GERON, Quia paucus ær ſpiritu reddito, facile incaleſcit adeo, vt poſtea refrigerij opem præſtare nequeat. Simili ratione vehementior corporis motio exercitatioque, ſicut æſtus aut balnea, innatum calorem diſſipat aboletque: moderata eum conſeruat, & excitat. otium ignauum reddit, ſicut mediocris ventilatio flammam auget, nimia diſſoluit. Contrà in balneis & ſolis ardore, calor natius extinguitur, quod refrigerij inopia non recreetur. Quemadmodum iam per pulſum, ita quoque per reſpirationem, calor natius refrigerium alimentumque conſequitur. quanto autem magis reſpiratione, quam per ſpiratu, ad calorem natium refrigerandum indigemus: tanto etiam frigidior ær reſpiratione hauſtus, commodior, quam per latentes cutis meatus attrahitur, exiſtit. Cuius rei indicium eſt, quod qui calidum ærem ſpiritu attrahunt, extrinſecus licet frigido circumfundantur, celerius extinguntur intereuntque, quam qui in hypo cauſto

Calor natius
quomodo conſer-
uetur.

Quot modis ex-
tinguatur.

In balneis, calda-
rijs, & æſtu.

Frigus immode-
ratum vitam tol-
lit.

Calor ambiens
cur nobis ſit no-
xius.

Calor inſpiratus.

Cur in exiguo aë-
re verſati ſuffo-
centur.

Motio corporis
nimia calorem
natium diſſi-
pat.
Otium.

Pulſus & reſpi-
ratio calorem na-
ſtrum refrigerant

Reſpiratio magis
quam pulſus re-
frigerat.

9

10

15

20

25

30

35

40

- causto frigidum inspirant. MATHETES, Quomodo calor nati- *Calor alimenti*
 uus alimenti idonei penuria extinguitur? GERON, Cum os, & na- *penuria extinguitur.*
 res, aut fauces ita præcluduntur, vt nihil æris hauriri possint. Qui-
 cunq; enim in aquam demergitur, statim suffocatur & emoritur,
 5 nisi æris refrigerio refocilletur: non quòd refrigeratione, sed
 quòd idoneo calorìs & spiritus alimento, sit destitutus. MATHET.
 Quæ tertia causa est, cur natiuus calor extinguatur? GERON, Fu- *Excrementa sua*
 mosorum calorìs & spiritus recrementorum retentio. nam vt *lignosa calorem*
 flamma à crasso multoq; fumo, sic cor ab illis immodicè conge- *natiuum extingunt.*
 10 opprimitur, suffocaturq; sic fieri solet, cum quis copiosum aërem
 eumq; frigidum attraxerit, & totum pulmonibus ita comprehen-
 derit, vt nihil illius deinceps expiret. Atq; hæc sunt tres istæ cau-
 sæ, quibus calorìs natiui interitus ascribitur, vt eius conseruatio,
 solius aëris nos ambientis, qualitatis & essentia moderatiori, fer-
 15 tur accepta. MATHETES, Ergo vis illa, quam cor perpetuis agita- *Vis cordis agitans*
 re motibus dixisti, ex aëre idoneo arrepto, refrigerium, alimen- *quid præstet.*
 tumq; ipsi suppeditat, & fuliginosa excrementa foras expellit? GE-
 RON, Ita, eadem etiam ex corde in arterias perueniens, has quoq;
 attollit submittitq; vt partes quibus dispensatæ sint, refrigerio
 20 aëris recreet, earumq; excrementa extrudat. Quandiu autem in-
 situs omnium illarum partium calor, moderatus, exiguusq; fue-
 rit, arteriarum pulsus, satis ipsum tueri ac conseruare poterit, nam
 vis illa cordi insita, ex ipso in arteriarum tunicas influit, eodemq;
 modo & tempore ipsas, quo illud attollit, submittitq;. MATHET.
 25 Cur arteriæ etiam eleuantur? GERON, Vt sese suaq; ipsarum spi- *Arteriarum ele-*
 racula aperiant, calorìs natiui refrigerandi ventilandiq; gratia, & *uationis usus.*
 aërem nos ambientem vndiq; ad spiritus generandos tenuemq;
 sanguinis portionem ad se trahant. quippe communes per tuni- *Transitus com-*
 carum ipsarum spiramenta, & oscula transitus, partim in cutem, *munes per arte-*
 30 partim in viscera & intestina, partim in venas obtinent. MATHE. *riarum tunicas*
in alias partes.
 Vnde hoc cognoscam? GERON, Inde, quòd vniuersus animantis
 sanguis, arteria magna vulnerata profundatur. MATHE. Cur arte- *Submissionis ar-*
 riæ submittuntur? GERON, Vt fuliginosa halituosaq; recrementa, *teriarum usus.*
 ex humorum spirituūq; vstione generata, in cutē aliasq; partes
 35 expellant. MATHETES, Potestne arteriarum pulsatio, tanto cor- *Respirationis ne-*
 dis calorì equalē refrigerium adferre, vt ipse conseruetur? GERON, *cessitas.*
 Non sanè potest, sed maiore quodam auxiliario indiget, nempe
 pulmone, præsertim in ijs animantibus, quæ copioso sanguine
 & calore sunt prædita: sicut in piscibus bronchia. Quando enim
 40 cor ardoris incendio flagrat, nec satis pulsatione agitationeq; sua
 refrigerari potest, tunc pulmones, sentiendiq; facultatem vrget,
 incitatq; mouēdi autem vis, necessariò, septum transuersum, tho

*Pulmones vt res-
pirationi inser-
uiant.*

racem & pulmones huic annexos, frequenter attollit, & submit-
tit. MATHETES, Cur pulmones attolli oportet? GERON, Quia
tunc spiritus in eos tanquam in follem introducit: cū autem
submittitur, ille rursus emittitur. sic frigidus aër inspiratione hau-
stus, omnia interanea celerrimè penetrat, eaq̃ refrigerio refocil- 5
lat. At sicut arteriarum pulsus reliquarum partium calorem, ita
inspiratio cordis ardorem temperat, expiratio autem illud fumo-
sis recrementis expurgat. MATHETES, Hac ratione, cordis arte-
riarumq̃ eleuatio inspirationi, submissio expirationi respondere
videtur. GERON, Sic habet. nam ambo ipsa, tum respiratio, tum 10
pulsus, ob vnum eundemq̃ vsum animantibus donata sunt. MATHETES,
Qua in re discrepant? GERON, Quòd hic à facultate vi-
tali, illa ab animali proueniat: item quòd hic sine interuallo, sineq̃
voluntate nostra continuetur, illa plerumq̃ interrumpatur, libe-
ra quidem, sed arbitrio nostro subiecta. possumus enim cū vo- 15
lumus respirare, idq̃ frequentius, aut rarius, tardius aut celerius:
aut è contrario, intermittere cum libet, & cohibere. At pulsus cor-
dis & arteriarum motiones excitare, nec suppressere, imò neque
mutare aliter possumus, etiamsi velimus. MATHETES, In nostra
igitur voluntate situm est, respirationem prorsus sedare, contine- 20
re, & prohibere? GERON, Exiguo quidem tempore, aut certa pro-
portione, perpetuò autem & in totum, non item. ideò respiratio
non æquè libera est, nostriq̃ arbitrij, vt locutio, aut ambulatio,
sed vrgente affectu incitatur. sunt enim inter motus voluntarios
alij prorsus liberi, quos quandocunq̃ & quantumlibet efficere 25
possumus, nulla nos ad eum vrgente necessitate: alij liberi qui-
dem, sed ab affectibus quibusdam corporis incitati, vt respiratio,
vrinæ & alui excrementorum retentio. MATHETES, Et si iam au-
dierim ex te, qua ratione pulsus & respiratio fiat, tamen oro te, vt
eadem iterum repetes, ne quid cognitione dignum mihi excidat. 30
GERON, Quemadmodum cordis & arteriarum pulsus calorem
nostrum natium fouet, sic etiam respiratio, ad quam perficien-
dam pulmones à natura sunt conditi. MATHETES, Quis huius
auctor est? GERON, Motus voluntarius, cui septum transversum
& thorax, varijs musculis agitatus, tum interioribus tum exterio- 35
ribus intercostalibus, nec non ijs qui in abdomine habentur, in-
seruiunt, sicut etiam aspera arteria respirandi via, pulmoq̃ aëris
receptaculum, quem & per os, & per nares attrahimus. Quan-
do igitur ob nimium calorem respirare cogimur, eorum muscu-
lorum ope indigemus, qui thoracem & consequenter pulmones, 40
attollunt. quum autem hi rari leuesq̃ existant, facile obtempe-
rant, quocunq̃ ducantur. si ergo modica est respirandi neces-
sitas,

*Motus voluntarij
duplices.*

*Idem opus & v-
sus pulsus respira-
tionisq̃.*

*Respirationis au-
ctor.*

*Quibus muscu-
lis ad respiratio-
nem indigemus*

- fitas, solius septi transuersi eleuatio satis illi fecerit: si maior præter septum, thorax quoque modicè attollitur, idque interiorum musculorum intercostalium subsidio. At si maxima requiratur inspiratio, musculi thoracem ambientes extrinsecus, & qui ab humeris ad superiorem eius regionem descendunt, opem suam ferunt, sic ut omnes simul illum attollant. Quod si expirationis vehementis usus fuerit, quæ efflatio dicitur, intercostales exteriores musculi valdè thoracem submittunt, & alij, qui huius inferiora extrinsecus tegunt. *MATHETES*, Quomodo aer inspiratus per os naresque præparatur, ut ex eo spiritus vitalis generetur? *GERON*, In asperam arteriam, eiusque ramos per pulmonem dispersos delatus, primum in illo elaboratur, & vi carnis illius natura tenuis, mollis, & aëreæ, concoquitur, absoluiturque. Non enim rudis ille aer exterior, frigidus & impurus, ilico idoneum spiritus interioris pabulum fieri potest, sed antea ipsum qualitatem quandam innato spiritui, familiarem induere oportet. Hac iam præditus elaboratusque, una cum sanguinis vapore ex dextro cordis sinu egreffo, in sinistrum deferitur, & insita illius vi, magnoque caloris incendio in vitalem commutatur, & tandem per arterias diffusus, calorem toti corpori impertit. porro ex hac aëris inspirati concoctione, complures fuliginosi vapores nascuntur, ac foras rursus tum coram, & arteriarum pulsatione, tum pulmonis expiratione depelluntur, ut iam antea recitauimus. *MATHETES*, Excidit mihi ferè, quomodo aer spiritus & sanguis per pulmones distribuuntur, quare ne te pigeat eadem rursus mihi in memoriam reuocare. *GERON*, Quando thorax attollitur, asperæ pulmonis arteriæ, per inspirationem aëre, læues autem pariter fumoso excremento replentur, atque id ex sinistro cordis sinu extruditur, ne ipsum vitiositate sua suffocet, ex dextro autem sinu, sanguis per venam arteriosam ad pulmones fertur, ibique attenuatur: deinde simul cum aëre per venalem arteriam ad sinistrum cordis ventriculum, deferitur, atque inde pulmoni nutriendo transmittitur. Cæterum fumosum excrementum per asperas arterias expiratur, quando pulmones submisso thorace in se collabuntur, idque omnibus illis vasibus quodammodo coarctatis, aer autem elaboratus, quasi que concoctus in pulmone, in sinistrum cordis sinum per læues arterias, (quas venosas appellauimus) immittitur. tenuis vero sanguis qui in venis illis continetur, non amplius, cum pulmo submittitur, in dextrum cordis sinum reuertitur, sed à singulis illius partibus, familiaritate quadam arreptus, in eius carnem alimen- loco impel-
litur. *MATHETES*, Possuntne etiam venæ istæ ar-
teriosæ expiran-
do submitti? *GERON*, Admodum parum, sicut neque attolli inspi-
rante.

Respiratio modica, aut maior quibus partibus auxiliarijs absoluitur.

Inspiratio maxima quibus musculis fiat.

Expiratio, quibus perficiatur.

Spiritus vitalis quomodo ex aëre inspirato fiat.

Aëris elaboratio.

Quomodo aer spiritus, & sanguis per pulmones distribuuntur.

Venæ arteriosæ an submittantur in expiratione.

ratione, vt quæ duplici constant tunica. verum hos motus illæ potissimum arteriæ edunt, quæ propria spiritus sunt instrumenta. **MATHETES**, Quo situs ordine tria ista vasa collocata sunt? **GERON**, Aspera sanè arteria vndiq; media est, nempe inter leuem arteriam, atque venam arteriosam posita. **MATHETES**, Sûntne illa extremis suis inuicem coniuncta? **GERON**, Non sunt, neq; ær qui asperæ arteriæ inest protinus in leuem traducitur, sed vbi extremæ omnium fibræ, in totam pulmonis carnem distributæ fuerint, quicquid in eis collectum est, id omne in illam illabitur, perque eandem (cùm sit mollis & valdè rara) ær, & fuliginosum excrementum transit, expirationeq; in idonea vasa relabitur. Atqui sanguis, vbi è venis in carnem influxerit, in ipsammet degenerat, nec potest nisi per vlcus in tabe in asperas arterias redire: quamuis recrementa, quæ ex pulmonis nutritione quotidie proueniunt, per eas simul cum sputis reddantur. **MATHETES**, Vnde sit, quòd singulæ istæ materiæ sic distribuuntur? **GERON**, Ex pulmonis respiratione, cui etiam cordis motus ac pulsatio, admodum validè opitulatur. **MATHETES**, Quo pacto? **GERON**, Quia vbi cor attollitur, ærem præparatum in sinistrum eius sinum per læues arterias assumit, & sanguinem ex caua vena in dextrum arripit, membranis seu valuis horum vasorum adaptatis. vbi verò submittitur, sanguis ex dextro sinu per arteriam venosam in pulmonem effunditur: spiritus autem iam vitalis effectus, in magnam arteriam (quam aortam vocau) pariterq; in minores emittitur: quando omnes illas dilatarì oportet. **MATHETES**, Cordisne & arteriarum motus, siue pulsus, ex toto inter se conueniunt? **GERON**, Similitudine quidem aliqua magnitudinis, velocitatis, & frequentię, sibi inuicem respondent, adeò vt ex illarum contactu, cordis motum deprehendere liceat: verum vbi cor submittitur, illæ attolluntur: vbi verò hoc attollitur, illæ submittuntur. Nam quando cor submissum, spiritum illis immittit, ipsæ attolluntur: non solo autem spiritu & sanguine vaporis instar attenuato repletæ, sed etiam pulsandi facultate donatæ sunt: aliàs non possent omnes eodem temporis momento, pulsus edere: eò quòd spiritus per arterias statim in corporis extrema, peruadere nequeat. Quum igitur vniuersæ simul pulsare deprehendantur, rationi consentaneum est, eandem illam vim attollendi, submittendiq; motus effectricem, vt cordi, sic arteriarum tunicis inesse: quamquam origo eius illi tantum accepta referri debeat. **MATHETES**, Estne eadem pulsus, quæ vitæ facultas? **GERON**, Nullo modo. hæc enim tum spiritus, tum caloris efficax est, atq; in solo corde sita: illa verò arterijs & cordi simul communis est.

Aspera arteria media inter læuam arteriam, & venam sita.

Pulmonis respirationi pulsus cordis opitulatur.

Cordis & arteriarum motus quare differant.

Vitæ facultas non est pulsus.

Quibus

Quibus vitalis ista distribuitur? GERON, Ossibus, cartilaginibus, carni, & deniq; vniuersis corporis partibus, quibus vitam & calorem salutarem largitur, ac nullum membrum illius beneficio & fauore destitutum, manet incolume & superstes. Nullum eti-

Vitalis vis quibus distribuitur.

5 am præter cor & arterias extat, quod pulsandi motu agitur.

MATHESES, Inferior igitur pulsus vis est, quàm vitalis? GERON,

Procul dubio. hæc enim illius veluti formula est, quæ tum spiritum eius tum calorem distribuit, tum modum quendam innato

Pulsus inferior, quàm vitalis sanctus.

calori adhibet, & certa ratione gubernat. MATHESES, Magnam

10 pulsuum necessitatem & vsum explicasti, num verò vna eorum sit species, an plures, ignoro.

GERON, Complures inueniuntur, nempe aliæ simplices, aliæ compositæ, aliæ quæ ad alias referuntur. Simples quinque

Pulsuum differentie.

constant generibus. in primo arteriæ vel multum, vel mediocri-

Simplices.

15 ter, vel parum attolluntur: vnde pulsus magnus, aut mediocris,

aut paruus dicitur. in altero idem ex qualitate motus, celer, vel

mediocris, vel tardus appellatur. in tertio ex tempore quietis cre-

ber vel mediocris, vel tardus vocatur. in quarto ex virium ratio-

ne alius vehemens, alius mediocris, alius languidus censetur. in

20 quinto & postremo ex arteriæ quam attingimus tunicæ statu du-

rus, aut mollis, aut mediocris percipitur. Atq; hi simplices pulsus

existunt, qui nusquam seorsum, sed in compositis reperiuntur.

MATHESES, Qui sunt compositi? GERON, Qui ex quinque simplici-

Pulsus compositi.

cium generibus constant, suntq; numero septendecim. primus

25 est magnus, celer, creber, vehemens, mollis. secundus est in omni-

bus simplicium generibus mediocris. tertius est paruus, tardus,

rarus, languidus, durus. quartus in primo simplicium genere

magnus, in reliquis mediocris. quintus magnus, tardus, rarus, im-

becillis, durus, sextus in omnibus simplicium generibus medio-

30 cris. septimus mediocris, celer, creber, vehemens, mollis. octauus

mediocris, tardus, rarus, languidus, durus. nonus paruus, celer,

frequens, vehemens mollis. decimus paruus, & in reliquis gene-

ribus mediocris. vndecimus magnus, celer, & in alijs generibus

mediocris. duodecimus magnus, celer, rarus, languidus, durus.

35 decimus tertius in magnitudine & celeritate mediocris, frequens,

vehemens, mollis. decimus quartus magnitudine, & celeritate

mediocris, aliàs rarus, languidus, & durus. decimus quintus paru-

us, tardus, frequens, vehemens, mollis. decimus sextus paruus,

tardus, in reliquis generibus mediocris. decimus septimus lan-

40 guidus, durus, & in alijs mediocris. Præter has compositarum

species, adduntur pulsus ordinati, & inordinati, proportionem

seruantes, vel eius expertes, equales & inequales. Notandum au-

*Qui pulsus con-
iungi nequeant.*

tem plures tum simplicium, tum compositorum pulsuum esse dif-
ferentias. quia verò non admodum medicis sunt necessarij & vti-
les, consultò hìc prætermisi. MATHETES, Possuntne omnes sim-
plicium species quibusbet coniungi? GERON, Nequaquam.
quædam enim consistere inuicem nequeunt, vt magnus & du- 5

*Pulsus laudatissi-
mus quis.*

rus, eòq; rarissimè connectuntur: maximus & durissimus nun-
quam. quum enim arteriæ duæ in omnem partem attolli neque-
unt, certè nec magnus pulsus fieri potest: multò minus maximus,
vt postea audies. MATHETES, Quis inter compositos istos pul-
sus omnium est laudatissimus? GERON, Sextus numero, is nanq; 10

Pulsus æqualis.

omnium aliorum ceu regula existit, & nullo in corpore quàm in
temperatissimo, & optimè habito, quod vocant quadratum, in-
ueniri solet. MATHETES, Quos pulsus æquales & inæquales ap-
pellasti? GERON, Primos voco, qui pristinam magnitudinem, ce-
leritatem, frequentiam, vehementiam, & mollitiem retinent. al- 15
teros, in quibus omnia iam dicta genera immutata sunt, inæqua-
les. In quibus autem non omnia simul, sed vnum aliquod, vel
duo, vel tria, variantur magnitudine, aut celeritate, aut alio gene-
re, inæquales dicuntur. MATHETES, Quis pulsus est ordinatus?

Inæqualis.

GERON, Qui diuersitatem suam in multis ictibus seruat, vt si octo 20
sint continuè vehementes, nonus autem languidus: deinde si ite-
rum octo vehementes sequantur, & nonus rursus languidus, &
sic deinceps alij. is quidem pulsus vehementia licet inæqualis, ta-
men ordinatus appellatur: quoniam eandem diuersitatem reti-
net: eòq; post octo pulsus validos, nonus imbecillus continuò se- 25

Pulsus ordinatus

quitur. at si diuersitas illa immutetur, ordoq; perturbetur, tunc
fortitudinis seu vehementiæ ratione & inæqualis, & inordinatus
erit. Pari modo, si vndecim pulsus magni fuerint, duodecimus au-
tem paruus: iterumq; vndecim magni, duodecimus item paruus:
actertio vndecim magni, duodecimus paruus, is magnitudine 30
quidem collectitia, quæ Græcis *συνεκτατική* dicitur, erit inæqualis,
sed ordinatus. Sin autem iste pulsuum processus interturbetur, sic
vt quidam sint magni, quidam parui: nunc octauus, nunc sextus,
nunc quartus: ea pulsandi ratio tum inæqualis, tum inordinata

*Inordinati & in-
æquales pulsus.*

existit. Eadem ratione in reliquis omnibus differentijs simul 35
inæqualis, ita vt eadem diuersitas in processu non continuè refer-
ueatur, is pulsus absolutè inordinatus, sicut etiam simpliciter inæ-
qualis erit. Obseruandum autem inter contrarios omnium gene-
rum pulsus, medios siue mediocres quosdam existere. inter equa-
lem verò & inæqualem, ordinatum & inordinatum nullos, nisi 40
fortè is etiam dicatur medius, qui circuitibus ordinem seruat.
verbi gratia, quando quatuor pulsus magnitudine continuè im-

pares

pares sunt, & alij rursus totidem proportionem paruos illos sequantur, idq; earatione, vt quintus primo, sextus secundo, septimus tertio, octauus quarto respondeat. tales enim pulsus, si ordinem continuum amittunt, inordinati sunt: si verò circuitus similes seruant, hisce inordinati vocantur, qui inter ordinatos & inordinatos medijs quodammodo existunt. **MATHETES**, Quæ sunt aliæ pulsuum differentiarum?

GERON, Quæ ex qualitatibus proportionibus sumuntur, cum celeritas & tarditas, submisionis & eleuationis arteriarum
 10 inuicem conferuntur, hoc est, quando obseruamus, tum arteriæ æquali tempore, tum eleuentur, tum submittantur: an inæquali vel mediocriter, quæ ratio Græcis *ῥυθμὸς* vocatur: unde pulsus qui pari eleuatione & submisione constat, *ῥυθμικός* qui impari, *ἁρρυθμὸς* dicitur. atq; alius rhythmus æqualis, alius inæqualis existit.
 15 Æqualis tum in eleuatione, tum in submisione triplicem habet speciem, nempe vt in vtraque sit vel celeris, vel immoderata, vel tarda qualitas. inæqualis sex constat differentijs, vt submissio sit prima celeris: secunda iterum celeris: tertia moderata. aut initio moderata: deinde tarda: postea iterum tarda. **MATHETES**, Quid
 20 indicant nouem istæ rhythmorum differentiarum? **GERON**, Morborum motiones bonas, malæque illorum solutiones, quas Græci *ῥυθμὸς* nominant. Galenus curiosè multa de his tradidit. quia verò ad philosophos magis quàm ad medicos pertinere videntur, non opus est diu hic illis immorari. **MATHETES**, Quotuplex est inæqualis? **GERON**, Duplex: vna in multorum pulsuum congerie re-
 25 peritur, quam *συνπληρὴς*, quasi collectitiā Græci appellant. altera in vno tantum pulsu deprehenditur, ac singularis dici potest. Systimatica rursus duplex est. alij nanque pulsus æqualiter inæquales sunt, alij inæqualiter. **MATHETES**, Declara quomodo in-
 30 æqualiter fiant?

GERON, Si pulsus secundus paulò minor sit primo, tantoq; tertius secundo, & quartus tantò etiam tertio, & pari modo reliqui, donec ad plures veniatur, is pulsus Græcis à cauda muris *μυρῶς*, eò quòd paulatim decrescit, & illius modo extenuatur, la-
 35 tinobarbaris decurtatus vocatur. **MATHETES**, Simplexne est pulsus iste myurus? **GERON**, Non, sed duplex. hic enim non cessat imminui, donec deficiat: atque is myurus deficiens appellatur: alter imminui ante defectionem desinit, priusquam arteria moueri cesset. Hi duo rursus bifariam diuiduntur. alius nanq; non cessat im-
 40 minui, donec deficiat: atq; is deficiens myurus nominatur. alius cessat imminui antequam defecerit, hoc est, priusquam arteria moueri desistat. Illi rursus bifariam diuiduntur. alij nanq; in ea-

*Rhythmicus pul-
sus, aut para-
rhythmus.*

*Pulsus inæquan-
les quot.*

Myurus pulsus.

dem paruitate perseverant, ad quam gradatim deciderunt. alij non item, sed rursus augentur, & reciproci myuri nuncupantur, redeuntq; ad primam magnitudinem, aut ad maiorem, aut ad minorem. qui verò pulsus non sensim, nec æquali inuicem distantia feruntur, ægrotis sæpissimè superueniunt. **MATHETES**, Quis pulsus intermittens dicitur? **GERON**, Inæqualis ob raritatem: quia pulsatio vna, vel duæ, vel tres desunt. **MATHETES**, Quis dicitur intercurrentes? **GERON**, Inæqualis frequentia, nam inter duas pulsationes, tertia veluti superuacua interuenit. **MATHETES**, Quis est deficiens? **GERON**, In quo arteria motu destituitur, sicut etiam in myuris deficientibus accidit. is si intus agitari incipiat, reciprocus deficiens appellatur, intermittenti affinis, nisi quòd post longius fiat interuallum, quo arteria permanet immobilis. ac intermittens, vno, vel duobus, vel tribus, summum quatuor, rarè quin que pulsibus omisisis, alios repetit. atq; hæc systimaticè collectio-
Pulsus intermittens. nis est diuisio. **MATHETES**, Quæ est singularis inæqualitas? **GERON**, Quæ in vno fit pulsu, ac duas in celeritate & tarditate differentias obtinet. primam in vna arteriæ parte, alteram in pluribus, qua plures digiti attingunt. quæ in vna parte, sub vno est digito, tres habet species: prima est, cum motus sit interruptus, quiete interpellante, vnde fiunt pulsus vna pulsatione intermittentes. secunda, in qua motus est continuus, nulla quiete intercisis, à celeritate in tarditatem transiens, aut contrà qui nobis inæqualis citatus, græcè *ἀνισόρρυθς* vocatur. tertia est, quæ motu retrocedente, & redeunte, pulsus facit bis pulsantes, quos Græci *διπρότους* appellant. **MATHETES**, Quæ est inæqualitas vnus pulsus? **GERON**, Quæ in diuersis fit arteriæ partibus, quas plures digiti contingunt, nempe duo, vel tres, vel quatuor. **MATHETES**, Quot reliquæ sunt inæqualitates? **GERON**, Quot in qualitate motus fiunt, tot etiam in genere qualitatis virium existunt, vt alius sit vehemens, alius mediocris, alius imbecillis. nam vnā partem aut plures occupat. vnā sanè trifariā, nempe aut motu continuo, aut interciso, aut dicrото. Atque hinc totidem fiunt, quot in genere celeritatis, aut tarditatis existunt. totidem inæqualitatis species habet etiam qualitas arteriæ, præterquā quòd in vna arteriæ parte, huius generis inæqualitas esse non possit, sicut nec illa simul & mollis, & dura. in diuersis autem arteriæ partibus inæqualitas in vno pulsu sæpius percipitur. non potest enim inæqualitas in qualitate eleuationis arteriæ, vna in parte consistere: quia neque magnus & paruius pulsus in eadem parte fieri potest: in diuersis autem partibus, arteriæ tot sunt differentiæ inæqualitatis secundum magnitudinem, quot in genere celeritatis & tarditatis
Pulsus vnus inæqualitas. sunt

sunt inuentæ. nam tum interrupto, tum continuo motu æqualiter & inæqualiter sunt: quales vocantur myuri in vno pulsu, & qui dicuntur prominuli. Si namq; pulsus sub primo digito sit magnus, sub secundo minor: item sub tertio adhuc minor, qui est ad ægroti pollicem, æqua proportionem imminutus, myurus in vno pulsu, seu decurtatus nuncupatur. si verò media pars arteriæ magna sit, vtrinq; verò parua, tales prominuli vocantur. Præter has inæqualitates, vltimum pulsum genus ex tempore quietis sumitur, quod pulsus frequentes, mediocres & raros efficit. In hoc etiam apparet inæqualitas collectitia, quæ in multorum pulsum congerie sita est, dum quietis intervalla partim maiora sunt, partim minora & singularia, non vno quidem in pulsu, sed in diuersis arteriæ locis, dum videlicet non omnes simul mouentur, nec simul quiescunt: sed alij prius, alij posterius moueri incipiunt, aut finiunt. Præter iam dictas inæqualitates, accedit etiam alia quædam multis morbis communis, ex situ arteriæ prognata, in qua partes illius aliàs trahi sursum, aliàs deorsum, prorsum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum solet: pulsus qui in his fiunt, nobis tenſi grecis *τείνοντες* vocantur. MATHETES, Quæ aliæ extant præter simplices illas inæqualitates?

GERON, Complexæ, siue ex simplicibus compositiæ, quarum magnus est in re medica vsus. MATHETES, Quomodo conneſcuntur? GERON, Collectitia iungitur singulari, non in diuersis tantum partibus, sed etiam in singulis simul, nec vnus generis, sed duorum quoq; trium, quatuor, & deniq; omnium quinque, quæ absoluta inæqualitas est dicta, exempli gratia: cum pulsus sunt inæquales, tum in magnitudine, tum in celeritate, tum in frequentia, tum in vehementia, tum in mollicie, idq; vno in pulsu & in multorum congerie. At raro vnica in pulsu inæqualitas reperitur, quin alias sibi asciscat, interdum omnes: qualis Antipatro medico accidisse apud Galenum de locis affectis legitur. MATHETES, Quæ propria habent nomina tales pulsum connexiones? GERON, Nulla, sicut neq; febrium, præter hæmitriteos. Veteres autem medici appellant vndosum, vermiculatum, formicalem, caprizantem, ferrantem, spumosum, vibratum, tremulum, palpitantem, hæcticum, strepentem. MATHETES, Quis est vndosus, qui Galeno vocatur *κυμαώδης*?

GERON, Quem duæ potissimum inæqualitates simul coniunctæ efficiunt, sic vt diuersæ tum magnitudo eleuationis articularum in diuersis partibus, tum frequentia comiſceantur: ob quas non omnes simul partes mouentur, sed in vno prima, hinc secunda, deinde tertia, postea quarta, idq; motu non interrupto, sed

*Inæqualitas in
remissione viri-
um.*

continuo: cui altitudo partium quarundam accedit. aliarum sub-
missio ac humilitas, vndarum sese attollentium modo, sic vt alte-
ra priorem semper excipiat: superius proficiscens, vsq; ad arteriæ
finem versus ægri pollicem, vnde pulsus ille vndosi nomen acce-
pit. MATHETES, Quid aliud huc accedit? GERON, Inæqualitas
etiam in remissione virium, nam aliæ partes validius, aliæ debi-
lius manum tangentis feriunt, nec celeritatis æqualis est progres-
sus, sed aliæ partes celerius, aliæ tardius cientur: præcipua tamen
duo illa, magnitudo & frequentia diuersa, huic pulsui nomen pe-
culiare dederunt. MATHETES, Quis est vermicularis? 10

*Pulsus vermicu-
laris quis.*

GERON, Cum vndosus totus in paruitatem & tarditatem
delabatur, sic vocatus, quod vermis incessui sit asimilis, vnde eti-
am Grecis σκαληνίζων dicitur, nam vermes illi quos lumbricos ter-
ræ nominamus, vndarum modo progrediuntur, rependo, non
currendo. MATHETES, Qua in re differt vndosus à vermiculari? 15
GERON, Eleuationis arteriæ imminutione & tarditate: quamvis
quibusdam suis partibus frequens sit, tamen etiam alijs rarus. hæ-
nanque partes longius quiescunt, illæ breuius. MATHETES, Quis
vocatur formicans pulsus?

*Pulsus formi-
cans.*

GERON, Qui eisdem constat inæqualitatibus, quibus ver- 20
micularis, quamvis tardus appareat, quod admodum sit exilis seu
paruus, imbecillisq; adeo vt imperiti homines sæpe affirmant æ-
gros pulsum non habere, in quibus modicè frequentem depre-
hendunt. MATHETES, Vnde formicans dicitur? GERON, Quod
tardum & minutum formicæ motum repræsentet, vnde etiam 25
Græci illum μυρμηκίζοντα nominant, est enim omnium minimus,
tardissimus, languidissimus: nonnulli falso celerem esse arbitran-
tur. quemadmodum enim formica frequenter pedes mouet, sed
parum promouet, eoq; spatium exile vix iusto tempore transcur-
rit: ita pulsus formicans exiguum motum difficulter, licet fre- 30
quenter, conficit, falsam celeritatis speciem referens. potest motus
ille tremori manuum conferri. Nam vt in hoc vis imbecilla bre-
uissimo spatio manum valdè frequenter effert, ita in pulsu, formi-
cante ob paruitatem & frequentiam, nulla quies sensibilis inter
contrarios motus percipitur. Non raro hi duo pulsus, formicans 35
& vermicularis in se mutuo conuertuntur. huius enim extremi
in paruitatem delapsus, formicantem parit: illius primi ad magni-
tudinem incrementum, vermicularem gignit. non tamen neces-
sariò formicans semper vermicularem præcedit: aut vermicularis
formicantem sequitur. MATHETES, Quis caprizans & quare 40
sic dicitur?

*Pulsus capri-
zans.*

GERON, Ex duabus constat inæqualitatibus diuersis à su-
perio-

perioribus. annumeratur generi vno in pulsu intermittentium, quos intercedit quies. non potest autem sola celeritatis inæqualitas caprizantem efficere, nisi etiam secundi motus vehementia priore maior, accedat. **MATHESES**, Cur sic appellatus est pulsus?

5 **GERON**, Quia arteria instar capræ, gemino motu salire videtur. cum enim hæc aliam aggreditur, primò se effert: priusquam verò impetum absoluat quem incepit, paulùm se retinet: vbi verò à motu desinere videtur, statim altero longè celeriore & fortiore irruit. **MATHESES**, Quem vocas græcè *ἐμπερισταλόν*, latinè ferratilem?

Pulsus ferratilis dictus.

10 **GERON**, Qui inæqualitatem in vno pulsu, præsertim in diuersis arteriæ partibus, motu interciso sortitur: ac quatuor eius sunt differentiæ. vel enim primus digitus & tertius motum sentiunt. secundus non item, nec quartus: aut primus, secundus, & quartus, non autem tertius: aut primus & quartus, non autem se-

15 cundus & tertius. præterea alteram quoque habet in tunica inæqualitatem: est enim inæqualiter durus. Insuper tertiam quoque inæqualitatem ex situ mutato habet: quoniam est tensus. **MATHESES**. Quò tenditur?

GERON, Sursum & deorsum, hoc est, à pollice ægri, & ad illum. necesse autem est in his omnibus simul coniunctis, vt is qui pulsum eiusmodi tangit, imaginem rei cuiuspiam quæ pulsum secat, serræ instar comprehendat. sic enim & serræ secant, dum tenduntur. Galenus hunc pulsum inter differentias omnium, omisit. **MATHE**. Quis est spasmodes, siue conuulsorius?

25 **GERON**, Qui duplicem ex mutato situ arteriæ inæqualitatem obtinet. nam sursum & deorsum, hoc est, à pollice ægri, & ad pollicem tenditur. Adhæc effertur, seu flectitur in altum, sicut tendines & nerui, in conuulsione manuum vel pedum efferri, siue eminere dicuntur. atque hæc duæ situs mutationes ipsis sunt peculiare: accedit interdum etiam tertia dextrorsum, vel sinistrorsum flexio. **MATHESES**, Perge obsecro reliquos absolvere.

Pulsus spasmodes, siue conuulsorius.

GERON, Qui vulgo vibratus, aut turbulentus, aut ramosus, aut arcuatus, Græcis *κλονωδής* dicitur, easdem habet situs arteriæ variationes, quas etiam conuulsorius: sed maior est in conuulsorio tensio sursum & deorsum, quàm in vibrato: rursus in hoc maior est eminentia in altum, quàm in conuulsorio. **MATHESES**,

Pulsus vibratus, siue turbulentus, ramosus aut arcuatus.

35 Quid sursum & deorsum intelligis? **GERON**, A pollice ad ægri pollicem: cum autem in altum pono, eminentiam quæ cutim versus est, intelligo. Sunt aliæ quoque inæqualitates compositæ in vibrato, præter duas priores iam dictas: nam alia pars vehementius, alia remissiùs, alia celerius, alia tardiùs pulsatur: propriè autem partes quædam in altum tendunt, quædam vno eodemque tem-

præ exilit, nempe ad cutim, quam etiam secum ex sede effert, atq̃ iterum retrò trahitur, quòd nec continuò seruet, nec per interval la, sed vno eodemq̃ momento. altera eius pars suprà ad cutim fertur, velut eiiculata: alia intrò ferri videtur, veluti à quopiam retracta: atq̃ vna validius ferit, alia remissius, alia tardius, alia cele- 5
rius. Conuulsorius pulsus cùm distenditur, lineis immutatis medijs vtrinq̃ tensis, vt in hac figura ——— apparet. Vibratus autem lineis multùm inflexis in altum, & acuminatis, ——— vt Struthius annotauit. Aliquando vna arteriæ vibratio, vel duæ, vt in ijs qui subito expergiscuntur à somno videtur. aliàs plures: vnam 10
in diuersis arteriæ partibus, quarum non est constans eleuatio & contractio, sed aliæ partes exiliunt, aliæ eodem modo dissiliunt. MATHETES, Quid de tremulo & palpitante pulsu dicis?

Pulsus tremulus

GERON, Cor arteriæq̃, eleuatione & summissione, ex quibus pulsus constat, non alio motu agitantur: in ægris autem cor 15
& arteriæ sæpius tremunt & palpitant. ascribimus autem tremulum & palpitantem pulsum inæqualibus compositis: quia tremor & palpitatio inæquales variationes, magnitudinis, vehementiæ, & frequentię efficiunt. Plæruncq̃ accidit, vt corde palpitante & tremante, arteriæ nec tremant, nec palpitent: & contrà, 20
arterijs palpitantibus aut tremantibus, cor nihil tale percipiat.

Pulsus hecticus.

Hecticus pulsus est, qui perpetuò idem mouet: febris hec- 25
tica semper sui similis, neq̃ nouas per intervalla mutationes, neq̃ accessiones excitat. nam continua & perseuerans arteriarum est agitatio, cuiuscũq̃ speciei sit. Sunt autem tres compositorum pulsum differentię, quæ sæpius in ægris quibusdam hecticæ, hoc est, perseuerantes eadem, & semper sui similes fieri solent. MATHETES, Quem vocas strepentem pulsum?

Pulsus strepens.

GERON, Galenus scribit eum nunc in contusione arteriæ, nunc sine illa fieri, non tamen absq̃ duritie: maior & vehemētior, 30
cum quodam veluti strepitu sub digitis percipitur. MATHE. Quid per strepitum intelligis? GERON, Idem ferè quod sonos: & quamuis diuersus sit à motu, tamen motui superuenit. MATHETES, Sũntne aliæ adhuc pulsum differentię? GERON, Sunt quidem à Galeno plures excogitatæ, sed parum ad medicinam vtilis, sicut Iosephus Struthius in Sphygmico suo opere descripsit. MATHETES, Rogo igitur te, vt quomodo differentias illius dignoscere possim, breuiter me edoceas. 35

Pulsuum differentię quomodo dignoscendæ.

GERON, Non admodum facile est omnium pulsum notat habere perfectas, nisi ex longo vsu & exercitatione. tibi ad- 40
huc veluti in rudimentis medicinæ versanti, pauca sufficiunt, quę viam tantum & rationem ad maiora consequenda, indicent. Pri-
mum

mum igitur temperati hominis, tanquam aliorum normæ & regulæ, pulsus cognoscere oportet, si de alijs iudicium proferre volet, ad quod Hippocratis docendi methodus, quam ὁμοιον πρὸς ὁμοιον vocat, adducitur. non obiter autem, sed diligenter explorari debet: idq̃ dum arteriæ proprium suum motum à nulla causa exteriorē immutatum seruant. MATHETES, Quale corpus esse oportet? GERON, Quod nec diu antè in otio vixerit, nec recens exercitatum sit, nec diu à cibo abstinuerit, nec iam cibum sumpserit: in aëre temperato versetur: liber ab animi affectibus, mente
10 quæta, ætate iuuenili. MATHETES, Qualis huius erit pulsus? GERON, Inter omnia genera medius, siue mediocris. si huic aliorum hominum pulsus comparaueris, magni vel parui, celeres vel tardi, frequentes vel rari, molles vel duri, imbecilles vel vehementiores esse videntur. quare moderatum pulsus semper in me-
15 moria habere, frequenter explorare siue attingere conuenit. Quamuis autem raro corpora ad amussim temperata nascuntur, tamen etiam quæ parum ab illis differunt, sapius examinanda sunt. MATHETES, Quid præterea agendum erit? GERON, Aliorum quoq̃ tum sanorum, tum ægrorum pulsus, frequenti manu-
20 um tactu experieris, vt quantū à moderato distent, cognoscas. At satius est naturalem ac proprium ægri pulsus antea cognouisse, quam in morbum inciderit. nam arteriæ alijs aliter moueri solent. MATHETES, Quomodo quis proprium naturalem cuiuslibet hominis pulsus accuratè nosse poterit? GERON, Si per
25 sanitatem integram in quiete crebrò pulsus attingat. MATHET. Id mihi fieri non posse videtur, cum medicus non omnium pulsus ante ægritudinem experiri possit. nam pleriq̃ ægri medicos sæpè desiderant, cum quibus dum essent sani, nullam haberent notitiam. GERON, Rectè dicis. sed quia medicus non omnes no-
30 uit, à quibus consulitur, communium arteriarum notitiam habere oportet, quas communitates appellant: quarum quantò quis peritior fuerit, tantò plus alijs præstabit. MATHET. Eius rei exemplum referas. GERON, Communis est natura virorū: communis item fœminarum: adhæc communis calidiorum: communis frigidiorum temperamento: nec non communis crassorum, communisq̃
35 gracilium: ac rarum est in singulis communitatibus, quod non priuatim insit hominibus. Qua de causa qui commune pernouerit, rariùs in priuato errabit, nisi forsitan in monstrosis. Quidam enim à natura aliquid singulare habent, ob quod tamen commu-
40 nitates minus verè dici non debent. MATHETES, Non satis assequor, quem pulsus magnum aut paruum propriè dixeris? GERON, Is propriè magnus vel parvus est, quem non ex mole arte-

riarum, sed motus quantitate metimur. atq; ille quidem sic dicens est, cum arteriæ sic in omnem partem attolluntur, siue extenduntur, ut nulla partium laxitas in eis deprehendatur. hic autem, nempe paruus, vocari debet, quando partes laxæ in arteria adhuc adsunt, quæ attolli possint. In senibus igitur quando arteriæ parum eleuantur, paruus pulsus existit: in pueris quando arteriæ plurimum attolluntur, pulsus magnus esse dicitur: etsi illi multò maiores arterias obtineant. Porro ut verè & propriè, magnos vel paruos pulsus tactu cognoscas, variè manus adhibenda est, nunc ut comprimatur, nunc ut suspensa sit, nunc ut medio modo habeat. Longitudo autem pulsus, suspensa manu faciliùs percipitur. nam si ad eam explorandam comprimentes digitos applies, in validis quidem parum aut nihil deprehendes: in imbecillis verò, arteriæ motus magna ex parte interit, interdum totus aboletur. Sin autem medio modo adhibeas, nihil nocebis: imbecilles verò suppresses & obscurabis. Suspensa itaq; manus ad longitudinem percipiendam, omnium est aptissima, quòd nullum in ea pondus arteriæ incumbat, nec vlla vis ei inferatur. MATHE T. Quo manus applicandæ habitu, altitudo ac latitudo pulsus inuestigatur? GERON, Faciliùs medio & comprimente, nisi obscuritas pulsus obsteret, quæ pressionem non admittit. At non solum manus applicandæ ratio, sed etiam figura, qualis in eo esse debeat, cuius pulsus attingimus cognoscenda est. nam prona meliùs longitudinem & latitudinem indicat: supina verò altitudinem. quia ex hac cutis superiùs incumbit, & densior reddita, in arteriam delabitur: atq; ita cutis in sese collecta, illam grauat, eleuationiq; obstitit, sicut in prona ab arteria recedit, laxiorq; euadit: ob quod eleuationem arteriæ non impedit. At si arteria in prona figura edendo motui, & perficiendo, magis oportuna fuerit, altitudo non tam accuratè, ut longitudo & latitudo in ea percipitur. quia dum istæ augentur, altitudo celatur. ut autem eam percipias, opus erit, ut digitis arteriam premas, vel medio modo attingas: ad quod nihil adfert auxilij si cutis recedat. nam cum ea premitur, rursus ad arteriam astringitur. Itaque pulsus quem attingis, si moderatum quantitate excedat, magnus erit: si verò moderatus illum superet, paruus existet. hæc sanè pulsuum collatio cum moderato facta, in sanis locum habet. quæ verò cum naturali sit pulsus, per integram valetudinem consueto in ægris, & qualitatum mutationem expertis, est accommodatior. MATHE TES, Quem ergò vocas magnum, aut paruum ægri pulsus? GERON, Illum qui naturalē ipsius eleuatione arteriæ superat: hunc qui à naturali vincitur. Quòd si arteria ob carnem copiosorem, vel adipem, vel humo-

Manus in cognoscendis pulsibus magnis & parvis quomodo adhibenda. Pulsus longitudo qua manu percipitur.

Pulsus altitudo & latitudo.

Manus figura.

Prona.

Supina.

Magnus pulsus.

Pulsus magnus & parvus in ægris qui dicatur.

humores locum illius obfidentes, attolli prohibeatur, non facile pulsus aliquis deprehendi potest. *MATHE T.* Quomodo celer & tardus pulsus dignosci possunt, quos secundo generi attribuisti?

Pulsus celer & tardus quomodo dignoscantur.

- GERON.* Si in sanis moderato conferas: si in ægris, naturali, per locorum arteriæ immutationes, sic vt manus suspensa adhibeatur, si pulsus est imbecillis: comprimens autem, si validior. vbi enim ex tactu senseris arteriam non multum in locis suis immorari, dum attollitur, sed velocius à superficie vna in alteram impetu ferri, quam in pulsu temperato vel naturali, is celer dicendus est: si vero tardius superficiem mutat, diutius in locis cunctando, is tardus vocabitur. Sunt qui hos pulsus non ex locorum commutatione, sed ex tempore duntaxat metiantur, id quod Galenus non approbat. Ne autem mireris, quod Galenus non vno in loco celerem pulsus esse dicat, in quo arteria vnico tempore eleuetur: tardum, in quo multo: moderatum, in quo mediocri. Nam paucum, vel multum tempus non simpliciter intelligendum est, sed ita vt spatij per quod motus fit, ratio habeatur: hoc est, vt cum celer motus fit, paucum tempus magni spatio comparetur: cum autem tardus sit motus, vt longum tempus cum exiguo spatio conferatur. *MATHE TES.* Quo pacto tertij generis pulsus, vt frequens, rarus, & inter hos moderatus, cognosci poterunt?

Celer pulsus quia.

Tardus.

Pulsus frequens, rarus & moderatus quomodo cognoscatur.

- GERON.* Facile, si quietem quæ motus est priuatio tactu perceperis. duplex autem est illa, vt antea dixi, nempe exterior & interior: eorû raritas & frequentia similiter gemina est: vna quæ exteriorem, altera quæ interiorem quietem respicit. Si igitur tunica arteriæ in vltimo loco (quem eleuatione ingressa est, antequam submitti incipiat) diutius moretur, quam pulsus moderatus, aut naturalis, rarus pulsus secundum exteriorem quietem dicitur: si breuius moretur, frequens erit. *MATHE TES.* Qua manus applicandæ ratione explorari debet? *GERON.* Suspensa. hæc enim ad quietem exteriorem cognoscendam tam in languidis, quam in validis pulsibus est aptissima: vt quæ nullam motus partem impediat. *MATHE TES.* Cur non in hisce pulsibus arteriam digitis comprimis? *GERON.* Ne motus illius arceatur, impediaturque, quod minus totus perficiatur, neque aliquando in totum aboleatur. *MATHE TES.* Quando motus arteriæ supprimitur? *GERON.* Cum ipsa digitorum onus non tolerat, atque tunc falsa quies necessario apparet, qui motus aboletur. *MATHE TES.* Quousque arteria quiescere solet? *GERON.* Quandiu in loco moratur. diutius autem moratur: quia dum illam digitis comprimimus, violentia prohibetur ne ascendat. *MATHE T.* Arteriæne cutim motu suo digitosque medici reijcit, ac eo usque se attollit, donec motum suum finiat, ac

Rarus pulsus. Frequens.

Arteriæ motus quando supprimitur.

tunc primum in digitis conquietescit, vbi motum suum absoluerit? GERON, Minimè, nisi arteria vehementi motu sit prædita, nam in pulsu imbecillo non solum non digitus medicantis, sed ne cutis quidem manus ægroti attolli potest, eò quòd arteria pro virum robore grauiora vel leuiora onera sustinet, attollitq̃. Si verò folium aliquod, vel membranam, vel linteolum, aut aliud simile quippiam arterijs extrinsecus apposueris, id ipsum vnà cum illis moueri attolliq̃ videbis. Si rursus tandiu priori apposueris, iam motus amborum multò obscurior erit: si tertium addas, adhuc multò erit languidior: nouissimè tandem motum abolitum cernes, ita si motus vehementior fuerit, arteria plurimum corporum gravitatem sustinebit: sin minus vehemens, paucorum: si nequaquam vehemens, nullum onus ferre poterit: si languidus fuerit, ne ipsam quidem cutim loco mouere, tantum abest, vt pon-
Exterior quies suspensam manu percipitur. dus cuti foris impositum eleuare possit. Bona igitur ratione manu suspensa, quietem exteriorem cognoscere licebit: quanquam etiam comprimenti in validis pulsibus vti possis, si caueas ne motui obsis, hoc est, ne exterior motus pars sensum ob pressionem fugiat. Contrario modo interior, raritas & frequentia comprimente manu melius percipitur: suspensa nequaquam. id notes etiam, interiorem quietem nunquam synceram deprehendi, sed vnà cum partibus eleuationis & submisionis, quæ sentiri nequeunt. MATHETES, Non satis intelligo, quid sit raritatem & frequentiam inferiorem manu comprimente dignoscere. GERON, Si tantum arteriam comprimas, quantum per pulsus vehemenciam præsentem licebit, tactuq̃ prosequaris submisionem quousque possis, vt scias, vbi ille deseratur. Nam si tactus diutius quam in moderatis aut naturalibus pulsibus deseratur, rarus: si verò breuius, frequens pulsus esse, inferæ scilicet quietis ratione dicitur. MATHETES, Quæ vera quies inferior existit? GERON, Quæ inter eleuationis principium & submisionis finem intercedit: ac media est, quæ neq̃ in imbecillis, neque in vehementibus pulsibus sincera vnquam percipi potest. MATHETES, Quomodo validus seu vehemens pulsus, languidusq̃ seu imbecillis, aut debilis dignosci poterunt?

Pulsus validus, debilis, & medius quomodo dignoscendi.

Corpus temperatissimum.

GERON, Si pulsus digitis comprimentibus tactum nostrum euerit, vehemens dici debet: si verò à tactu sic applicatis digitis eueritur, languidus: si pulsus neq̃ tactum euerit, neq̃ ab eo eueritur, medius vocabitur. non autem hic est ille, qui in corpore temperatissimo reperiri solet, quale valida opera efficit, fortisque pulsus edit, medius autem imbecilles vires habet. quamuis enim eo valentior sit, qui à tactu eueritur: tamen illo qui tactum euer-

- euertit, est imbecillior. **MATHESES**, Quis ergo in hoc genere virium qualitate medius, siue moderatus erit? **GERON**, Qui in optimo corporis statu est: in quo omnes magnæ commotiones desunt, vehemens reuera est: sicutamen vt non excedat naturam.
- 5 Proinde pulsus temperatissimi hominis, alia ratione est medius, alia extremus. quâ enim alij hoc sunt validiores (quales in iratis, exercitatis, vini potioribus, & crises morborum experiuntibus deprehenduntur) alij rursus illo minus sunt validi, hâc existit medius. **MATHESES**, Quot sunt qualitatis virium differentiæ? **GERON**, Tres, vt vehemens, inualidus, & vtrinq; medius. **MATHESES**, Quis ergo temperatissimi hominis pulsus medius? **GERON**, Qui non ex media, sed extrema differentia sumitur. **MATHESES**, Exemplum eius adferas. **GERON**, Pulsuum qui ex virium qualitate estimantur, alius est vehemens, tactum medici euertens: alius medius, qui nec euertit, nec euertitur: alius imbecillus, siue inualidus.
- 15 At vehemens rursus trifariam distinctus est, primus magis validus: alter medius, seu temperatus, qui in corpore temperatissimo deprehenditur: tertius minus validus est, & in hominibus multum variare solet. **MATHESES**, Quis in hoc genere naturalis censetur? **GERON**, Galeni testimonio medius, in altera extrema differentia, cura autem vt diligenter vehementem, seu validum pulsus examines: aliâs facile errabis. **MATHESES**, Qua de causa? **GERON**, Quia magnum pro vehementi saepe accipies, nam ille quoque, sicut etiam velox, & altus, durus, vibratus, conuulsoriusq; tactum euertit. **MATHESES**, Non ergo vehemens pulsus ex eo quod tactum euertit, cognoscitur? **GERON**, Non adeo quàm ex eo quod tactui resistat, & renitatur, licet euertere illum & resistere ei debeat. **MATHESES**, Cur alij pulsus quos etiam tactum euertere manu suspensa dixisti, non vehementes dici possunt? **GERON**, Quia
- 25 tactu non renitantur manui comprimenti (quod soli vehementi proprium est) sed aboleantur deicianturq;. Magnus in omnem partem arteriam eleuat: celeres velocitate tactum impellunt: alti subeunt intrantq;: tensorij difficulter cedunt: duri premunt tenduntq;: vibrati & conuulsorij, tensionis & duritiei gratia hoc idem efficiunt: non tamen in qualibet manus explicatione, sed suspensa, vel media: comprimente autem nunquam: & si in hac quoque idem efficiunt, id vt vehementes, vbi virium robur adest, præstabunt. **MATHESES**, Quomodo quinti generis pulsus, durus, mollis, & medius dignoscuntur?
- 40 **GERON**, Ex tunicæ arteriæ qualitatis, cùm tactu per se occurrunt. vel enim dura, vel mollis, vel moderata digitis applicatis deprehenditur. **MATHESES**, Quibus signis qualitates istæ præbentur.

Pulsus moderatus.

Temperatissimi hominis pulsus.

Virium qualitatis differentia.

Medius naturalis.

Vehemens pulsus quomodo cognoscitur.

Pulsus durus, mollis, & medius quo pacto deprehenduntur.

*Mollitiei nota.**Duritiei nota.**Pulsus durus & vehemens quomodo dignoscantur.**Vehementis & duri discretio.**Pulsuum compositorum differentie.*

cognoscuntur. GERON, Mollities quidem, cum locus in quo pulsus exploratur, humidus & carnosus percipitur, nec non tangenti cedit. Duritia verò, cum idem locus corij instar siccus & macilentus apparet, & tactu renititur, siue digitos premit. MATHESES, Dixisti superius, durum pulsum cum vehementi magnam habere communionem: quomodo igitur alter ab altero dignosci poterunt? GERON, Proprio affectu. vehemens enim digitos comprimentes tolerat, in eoq; tactum euertit: durus autem premit tactum: vehemens non premit, nisi duritiam simul habeat coniunctam. atque hæc duo etiam in rebus exterioribus experimur. Nam fluuiorū quoq; decursus, flatusq; ventorum vehementes sunt, vt non facile eis resistere possimus, sed ipsi nos attollunt euertuntq;. lapides autem, ferrum, & æs, dura sunt: quæ digitos eis admotos premunt, & post se vestigium pressiois relinquunt: partem corporis nostri, quam attingunt, magis cauam, & interdum liuidam reddunt. venti autem aut fluuij tanquam molles ex facili, circa corpus diffunduntur, circumfluuntq;: nos autem sæpè detrudunt, euertuntq;: sic tamen, vt nullum vestigium relinquunt, nec partem attractam magis cauam reddant, quod expressione fieri solet. MATHESES, Alio modo præter hunc, vehemens pulsus & durus inter se discernuntur. GERON, Vtique. nam vehemens simul etiam magnus, aut certè altus esse: durus, non item potest. Habes iam rationes, quibus singula pulsum genera dignoscere poteris: vt autem vniuscuiusq; naturam accuratè addiscas, eum quem attingis, cum temperato conferas: & si duriores illo inuenieris, eum durum esse censebis: si verò molliorem, mollem esse iudicabis. suspensi autem vel mediij digiti erunt, quos pulsui applicabis. quòd si pulsus tum durus, tum vehemens fuerit, etiam pulsum comprimere digitis licebit. MATHESES, Suntne aliæ adhuc pulsum differentie, præter eas quæ in quinque generibus prædictis continentur? GERON, Nullæ. nam quæ ab Auicenna & aliis numerantur, vt plenus, vacuus: crassus, tenuis: grauis, leuis: calidus & frigidus, nullius sunt ad medicinam momenti, ob quod non opus erit, vt tempus in illis diutius teramus. satius est nunc ad compositorum pulsum differentias accedere. MATHESES, Quotnam illorum sunt?

GERON, Superius ex numero simplicium satis intellexisti, quia verò ex quinque generibus commisti sunt, primi compositi dicuntur, magnus, celer, frequens, validus, mollis: secundi, modè rati per omnia: terij, parui, tardi, rari, languidi, duri. at non solum hi inuicem coniunguntur, vt in simplicibus apparet, sed etiam excessus, defectusq; eorum cognosci debet, non enim tantum magnus,

gnus, moderatus, & paruus existit, verum etiam maior & maximus, minor & minimus deprehenditur. Similiter in altero genere, non solum celer, mediocris, & tardus existit, sed etiam celerior & celerrimus, tardior & tardissimus. eodem modo in reliquis

5 generibus inuenitur frequentior & frequentissimus, languidior & languidissimus, durior & durissimus, mollior & mollissimus. MATHESES, Quid sibi volunt isti excellentiores aut inferiores pulsus? GERON, Moderatum vel excedunt, vel eo inferiores sunt.

10 nam maior, magnus, & maximus, moderatum magnitudine excedunt & superant: minor autem, paruus, moderato inferiores sunt, ut maximus & minimus, extremitates dici possint, vel superæ, vel inferæ. harum autem proprii sunt pulsus minimus, tardissimus, rarissimus, languidissimus, durissimus: illarum maximus, celerrimus, creberrimus, vehementissimus, mollissimus. MATHE.

15 Quid de rhythmis cognoscendis habes? GERON, Nihil ferè præterquam quod ipsi non cognosci possint, nisi integra tempora eleuationis & submisionis arteriarum percipiantur. Galenus rhythmos ex celeritate & tarditate temporum, in eleuatione & submissione cognoscere docet. MATHESES, Quomodo pulsus

Rhythmi quatenus cognoscantur.

20 inæquales discernuntur?

GERON, Ut totum motum sensibilem consequi possis, & tactum pro pulsus magnitudine & vehementia variè adaptare, interdum primus digitus subleuari debet, ut num post eius subleuationem similis pulsus sub secundo & tertio perseveret, explo-

Pulsus inæquales quomodo cognoscantur.

25 remus: an verò maior, vel vehementior deprehendatur. nonnulli enim pulsus facilius duobus quàm tribus digitis: alij vno commodius inueniuntur. Porro systematica siue collecticia inæqualitas, duplici ratione cognoscitur. prima omnes interdum digiti submoueri: deinde exigui temporis spatio interposito iterum

Inæqualitas systematica.

30 admoueri debent, idque aliquoties agendum erit. altera pars, quam cuncti tangimus, ita componenda est, ut digiti nostri arteriæ sub sint, manus autem ægri prona. sic enim arteria quàm minimum digitis & cute grauatur, cui non modò digiti nostri sæpius, verum etiam cutis ipsa onerosa esse solet. MATHESES, Quo pacto

35 myurus cognosci potest?

GERON, Si pulsus digitis arteriæ superiniectis, leuissimè durescere videtur, si verò rursus crescunt, & ad priorem statum reuertantur, myuri reciproci vocantur. sin autem in eadem paruitate persistant, myuri sunt, nominis expertes. porro si nec ad

Myurus.

Myuri reciproci.

Myuri anonymi.

40 priorem statum redeant, nec in paruitate perseverent, sed deficient omnino, & aboleantur, myuri desinentes. Quod si digitis remotis, & deinde rursus admotis, nullum pulsum deprehendas,

Myuri desinentes.

Pulsuum abolitio, & defectus.

priuatio pulsus existit. MATHETES, Quid differt abolitio à defectu pulsuum? GERON, In hoc quidem ipsi desinunt, & digitis grauati abolentur: sed ijs rursus amotis, iterumq; applicatis, redeunt ac percipiuntur. in illa neq; digitis amotis, neque iterum applicatis, neq; in supino, neque in prono manus habitu, pulsus sentitur: quia eius defectus est constans & perseverans. MATHETES, Quæ notæ sunt pulsuum intermittentium?

Pulsuum intermittentium notæ.

Intercedens.

Pulsus systematici inæquales qui.

GERON, Quòd post vnum, duos, paulòue plures motus, in vna eademq; manus applicatione deficiant, ac iterum tactui occurrant. contrarij his sunt, cùm medius aliquis intercurrents tactui insperato obijcitur: qui etiam intercedens dictus est. MATHETES, In quo deficientes reciproci, ab intermittentibus differunt? GERON, In eo, quòd non, dum digiti admoti sunt continuè: sed vbi amoti fuerint, & deinde rursus applicantur, ad priorem statum redeunt. MATHETES, Qui sunt inæquales systematici pulsus?

GERON, Varij. nunquam enim solam & singularem vnus generis inæqualitatem, vel in toto corpore, vel in vna tantum parte gignunt: sed præter vnus generis inæqualitatem, alia similia genera immutantur: quæ etiam sunt inæqualia. Nam (exempli gratia) inæqualitati vehementiæ & debilitatis, accedunt etiam inæqualitates magnitudinis & paruitatis: celeritatis & tarditatis: frequentia & raritatis. At compositi inæquales, vt vndosus, vermicularis, formicans, & alij eodem modo quo simplices, cognoscuntur. MATHETES, Quot pulsuum differentia extant, & quibus modis dignosci inter se possunt, iam ex te audiui: quæ autem eorum causæ sint efficientes, deinceps me edoceas.

Pulsuum causæ quæ existant.

Continentes, siue primariæ.

Secundariæ.

GERON, Pulsuum causæ aliæ sunt principes, ac continentes, quas Græci vocant *αἰσθητικαί*: aliæ secundariæ. illæ sanè vires validæ, aut imbecillæ: nec non arteria mollis, vel mediocris, vel dura: adhæc vsus magnus, vel mediocris, vel exiguus. MATHETES, Quæ sunt causæ secundariæ? GERON, Quæ ex natura sumuntur, & quæ non ex hac, sed aliundè proueniunt: adhæc quæ naturæ aduersantur. Sub naturalibus continentur temperamenta, sexus, ætates. sub ijs quæ non ex natura prodeunt, comprehenduntur aër, somnus, vigilia, exercitatio, cibus, potus, animi affectus, excretiones, regionesq; & anni tempora. naturæ aduersantes causæ sunt, morbi causa, morbus ipse, & symptoma, hoc est, quod morbo superuenit. MATHETES, Quos pulsus causæ primariæ, siue continentes edunt? GERON, Aliæ proprios, & inseparabiles, nec non familiares: aliæ familiares tantum & proprijs carent. MATHETES, Quid vocas proprios, qui separari nequeunt? GERON, Qui ab vna eademq; causa continente proueniunt. MATHETES, Quos fami-

Causæ primariæ quos edunt pulsus.

Pulsus proprii ac inseparabiles qui dicantur.

- familiares? GERON, Qui à pluribus causis continentibus, duabus aut tribus proficiscuntur. quamuis autem ab vna quandocūq; oriuntur, non tamen ab eadem perpetuò sunt. MATHETES, Qualem pulsum facultas seu vis cordis edit? GERON, Robusta quidem proprium, vehementem: familiares autem præter hunc magnum, celerem, & rarum, imbecilla verò proprium, languidum: cum hoc autem alios familiares, paruum, tardum, frequentem. MATHETES, Quem pulsum arteria mollis gignit? GERON, Proprium, mollem: deinde etiam cum hoc familiares, magnum, celerem, rarum: sicut dura proprium quidem durum, familiares autem paruum, tardum, & frequentem. MATHETES, Qualem vsus, siue calor increfcens, vel spirituum penuria? GERON, Nullum quidem proprium, sed familiarem tamen magnum: nunc magnum & velocem, nunc magnum, velocem simul & frequentem. sicut vsus seu calor decrefcens etiam nullum habet proprium, sed familiarem ei paruum, vel paruum simul & tardum: vel paruum, tardum simul & rarum. MATHETES, Quomodo hoc intelligam? GERON, Cū vsus augefcit, primū pulsum magnitudo gignitur, si hæc non facit satis, accedit etiam velocitas: si neq; hæc cum magnitudine necessitati respondet, ob nimium calorem incrementumq; adiungitur etiam frequentia. E contrario, cū vsus siue calor imminuitur, primū frequentia, deinde velocitas, postremo magnitudo recedit. quippe pulsum familiarium recessus, aduentui est contrarius. Primū itaq; raritas apparebit: deinde si maior adhuc vsus fuerit, succedit etiam tarditas: si maius adhuc frigoris incrementum fiat, paruitas quoq; subsequitur. MATHETES, Hæc semperne ita habent? GERON, Non, sed quousq; pulsus ob solum vsum auctum, aut decrefcentem immutatur, sic vt nulla alia continens causa à natura degeneret. vbi enim non solum vsus, sed etiam aliæ causæ mutantur, & à mediocritate recedunt, alio modo habet. MATHETES, Qui pulsus apparent, si facultas & vsus à mediocritate recedant? GERON, Si illa sit valida, & calor augefcit, pulsus erunt magni, celeres, crebri, & vehementes: si plurimū calor increuerit, nascuntur maximi, celerrimi, & frequentissimi: quoniam celeres, & crebri cum magnis necessitati non satisfaciunt. At si facultas sit inualida & vsus imminutus, pulsus parui, tardi, frequentes, & languidi edentur. si valde languefcit facultas, minimi pulsus intermittentes & deficientes percipiuntur. Rursus si facultas valida quidem sit, vsus autem siue calor decreuerit, pulsus erunt moderati magnitudine, tardiores, & euidenter rari. si frigus excellat, vehementes. nam magnitudo moderata cum vsui respondeat, efficit, vt arteriæ cū quiescant, non

Pulsus familiaris.

Facultates robustæ pulsus.

Arteria mollis.

Caloris augefcens pulsus.

Decrefcens caloris pulsum edo.

Facultatis validioris, & caloris aucti pulsus.

Pulsus contrarij superioribus.

autem celeriter moueantur, quamuis non tardè. **MATHETES**, Cur magnitudo in his moderata est? **GERON**, Quia valida facultas naturalem motus mensuram seruat, licet vsus ea non indigeat. nam vt pulsus manifestò minor euadat, vsus valdè dissolutum esse oportet, sic vt frigus modum excedat. Quòd si vsus seu calor increuerit, vis autem imbecilla euaserit, supra naturæ modum, pulsus eduntur parui, tardi, creberrimi, & imbecilles. in modico autem naturæ excessu, moderati magnitudine, & celeritate crebri languidiq̃. **MATHETES**, Cur superius pulsus magnos, celeres, frequentes, ac vehementes proposuisti, cùm facultas robusta sit, & vsus increuit, non autem maximos nec vehementissimos? **GERON**, Quia si facultas vsusq̃ ita haberet, & arteria sit mollis, præsertim cùm habitus corporis non multum à natura recessit, non maximis nec vehementissimis pulsibus opus erit, sicut etiam Galenus existimat. **MATHETES**, Qui pulsus eduntur cùm vsus increuerit, & instrumentum molle fuerit? **GERON**, Magni, celeres, frequentia moderati, molles. quando multum à mediocritate recessum est, frequentes quoq̃, cùm indubiè calor nimium increuit, & magnitudo ac celeritas non satis ei respondere possunt. tunc enim frequentia id explet, quod magnitudo & celeritas præstare non potuit. Contrà, vbi necessitas minor euaserit, & instrumentum durum, minores pulsus, tardiores, & frequentiores apparent (præsertim si durities arteriæ nimium excedat) frequentia autem moderati, si & instrumenti durities, & vsus imminutio æqualiter à natura recedant: quippe fit, vt etiam rari existant, cùm frigus præpollet. At si vsus incrementum, & durities arteriæ parum à natura recedant, pulsus magnitudine moderati, celeres, & crebri prodeunt. si vtrunq̃ multum à mediocritate declinarit, minores, celerrimi, frequentissimi. quòd si etiam facultas infirma sit, minimi quoque apparebunt. Adhæc si vsus nimium à naturali statu exceßerit, durities autem minus, pulsus maiores, celerrimi, & frequentissimi prouenient. cæterum si calor decreuerit, & arteria mollis sit, pulsus magnitudine moderati, tardi & rari erunt. **MATHETES**, Qua de causa moderati? **GERON**, Quia quantum mollities instrumenti, familiarem sibi pulsum ad magnitudinem promouet, tantum refrigeratio ad paruitatem. ac cùm vtriusque causæ vis sit æqualis, effectus quoque communis vtriq̃ respondebit. non enim pulsus magnus erit, quem mollities postulat, neq̃ paruus, quem calor imminutus desiderat: sed medius, cum neutra causa alteram in eo, quo recedit à natura, antecellat: aliàs, si mollities præcellat, maiores fierent: si frigus, minores. **MATHETES**, Cur in tali causarum recessu à natura moderatos fieri

*Pulsus in calore
aucto, & arteria
molle.*

fieri dicis? GERON, Bona ratione. hi enim non semper à natura sunt comparati, sed reuera tum à causis naturalibus, tum à non naturalibus, tum à contrarijs naturæ fieri possunt: quando nimirum duæ causæ continentes, quæ in contrarias partes distrahunt, æqualem vim obtinent. MATHETES, Vniuersæ tres causæ sicut duæ vt modò retulisti, inuicem conspirant? GERON, Omnino, idq; octo modis. In primo facultas valida, calorq; auctus, & arteria intollis, pulsus magnos, veloces, & frequentia mediocres. quamuis autem neq; vehementes, neq; molles apponantur, notandum tamen illos à facultate robusta, hos ab arteria molli prodire: & si vsus cæteris causis valdè prepolleat, fieri etiam frequentes pulsus. In secundo facultas robusta, calor auctus, instrumentum modicè durum, pulsus maiores, celeriores, & frequentiores generantur. sin autem vtraq; causa, nempe facultas & vsus, æquali intervallo, eoque modicè à natura declinârît, fiunt magnitudine moderati, siue naturales: cæteri velociores & frequentiores. In tertio facultas imbecilla, calor decrescens, arteria mollis, pulsus minores, tardiores, & frequentia moderatos gignit, at si facultas plurimum sit debilitata, & magis quàm reliquæ, paruos, tardiores, & frequentiores efficit. In quarto facultas inualida, calor decrescens, arteria dura, pulsus paruos, tardos, & frequentes reddit, MATHETES, Sûntne semper æqualiter parui, aut tardi, aut frequentes? GERON, Nequaquam, sed pro vario vnius causæ, vel duarum, vel trium excessu diuersis modis immutati, intensi, vel remissi. si nanque duæ, vel tres causæ plurimum à natura degenerent, & facultas sit languida, calor remissus, instrumentum durum, pulsus vtiq; erunt minimi, tardissimi, frequentissimi. Notatu autem dignum est, quòd ijdem pulsus ex vna causâ, longissimè à natura aberrante, & reliquis duabus saluis noscantur. si enim facultas sola maximè offendatur, pulsus etiam erunt minimi, tardissimi, & frequentissimi. contrà si facultas imbecilla, vsus immixtus, arteria dura sit, non autem omnia excellenter, sed extremè talia, minimum fieri pulsum in hoc casu non est necesse. MATHET, Quid de extremitatibus pulsum sentis, de quibus suprà mentionem fecisti?

GERON, Id quod aliquæ ipsarum non generentur, nisi omnibus tribus causis inter se conspirantibus. maximus enim pulsus non à sola facultate robustissima, citra reliquarum causarum opem fieri potest. aliquæ interdum ab vna sola causâ, valdè læsa nascuntur: interdum ab omnibus. nam minimus pulsus nunc ob solam imbecillitatem, nunc ob duarum, aut trium causarum extremum à natura excessum, prouenit. In quinto facultas, calor de-

Pulsum extremitates quomodo habeat.

crescens, arteria mollis, pulsus magnitudine moderatos, tardiores, rariores efficiunt, vsus autem nimium imminutus, minores, tardos, raros producit. In sexto facultas valida, vsus decrescens, arteria dura, pulsus minores, velocitate & frequentia moderatos gignit. sin autem valde vsus & instrumentum à natura discesserit, minores, tardiores, & rariores eduntur. si verò durities instrumenti, magnum vsus à natura recessum superet, parui erunt pulsus, tardiores, frequentes: idcirco autem frequentes, quòd paruitas necessitati non respondeat. In septimo facultas infirma, vsus augescens, arteria mollis, sic vt illa alias duas causas præcedat, pulsus erunt maiores, celeriores, frequentiores. si mollities alias duas causas antecedit, sunt moderati magnitudine, celeritate, frequentia. vbi verò facultas cæteras causas præcedat, parui pulsus erunt, tardiores, frequentes. In octauo facultas inualida, vsus increscens, instrumentum durum, pulsus paruos, tardos, & crebros parit. omnes tres causæ insigniter læsæ, minimos, tardos, creberrimos: tardos quidem ob infirmam facultatem, minimos ob eandem quoque causam, vt arteriæ duritiem: creberrimos autem, quia vrget necessitas. quæ etiam si non vrgeret, tamen facultatis ipsius imbecillitates, duritiesque instrumenti minimos & creberrimos pulsus efficere possent. quòd si vsus alias duas causas præcedat parum aberrantes, pulsus erunt maiores, aut magnitudine moderati, velociores, crebri. **MATHESES**, Cur dicis maiores & non magnos esse? **GERON**, Quia durities instrumenti, magnitudini multum resistit: celeriores, quia licet facultas valde imbecilla celeritatem non gignat, tamen paulò infirmior, motus celeriores, quomodocumque potest, non tamen celeres efficit. **MATHESES**, Cur crebros pulsus addidisti? **GERON**, Vt necessitati faciant satis. quantò verò maiorem vsum illa requirit, facultas autem labascit, tantò magis frequentia expetitur. at paruitas hoc est insignior, quò instrumentum durius, facultasque inualidior. atque hæ sunt primariæ omnium pulsuum tum simplicium, tum compositorum causæ. **MATHESES**, Restantne aliæ? **GERON**, Simples quidem pulsus, alias quasdam peculiare præter tres illas continentes sortiti sunt, vt qui ex eleuationis arteriæ quantitate sumuntur, vt altus, humilis, latus, angustus, longus, brevis, gracilis, turgidus. quarum causarum notitia, medico tum ad res præsentis, tum ad futuras cognoscendas est commodissima. **MATHESES**, Quæ singulorum horum pulsuum causæ existunt? **GERON**, Vnius, vel duarum causarum continentium recessus: quibus additæ sunt quædam adiuuantes, quas Græci *συνδυνα* nominant. **MATHESES**, Quas vocas adiuuantes?

GERON,

- GERON, Sine quibus nihil fieri potest. quamuis ipsæ nulum effectum præstare queant. MATHETES, Quónam sunt tales causæ in pulsibus hisce generandis? GERON, Quinq; vt crassities corporis, gracilitas, locus arteriæ, grauitas eorum quæ arteriæ incumbunt, & formæ proprietas. MATHETES, Id clariùs exemplis reddas. GERON, Alti pulsus causa est facultas robusta, vsus auge-scentis; adiuuans autem, mediocris corporis crassities, locus circa arteriam arctus. At si facultas valida, vsus auctus, locus autem circa arteriam amplius appareat, non altus, sed magnus pulsus nosce-tur, quo arteria in altum, longum, & latum liberè distenditur: id quod in macilentis cernere licet, quando irascuntur, & alia de causa incallescunt, commouenturq;. MATHETES, Quæ causa continens est pulsus humilis? GERON, Facultas imbecillis, adiuuans causa, corporis crassities, nam adeps & caro profundius arteriam, quæ imbecilliter se attollit, deprimunt. MATHETES, Firne etiam aliunde pulsus humilis? GERON, Sepiùs quoq; ex naturali formatione tum in crassis, tum in macilentis corporibus: eò quòd natura arteriam profundius inseruit, vt extrema eius pars vix attingatur; obliqua nequaquam. MATHETES, Quæ lati pulsus causa existit? GERON, Facultas non nimis languida; adiuuans causa, locus amplus, & onus partium incumbentium: humor autem plus iusto copiosus, pulsum latitudinis causa (vt quidam opinantur) non est. plenitudo enim vasis magnum potius, vel altum efficit. MATHETES, Quæ gracilem pulsum gignunt? GERON, Facultas infirma, arteriæ durities, adiuuans autem causa, corporis gracilitas, cutisq; tenuis & sicca. hæc enim si omnia simul concurrant, pulsum tribus, interdum quatuor etiam digitis occurrentem efficiunt, nempe longum, piliq; extensi modo angustum ac subtilem. languida nanque facultas arteriam duram in latum & altum attollere nequit. Itaq; humilis & angustus pulsus fiet, cuius longitudinem macilentus corporis habitus, & cutis tenuis manifestat, quam tactus eò magis percipit, quòd arteria est durior. MATHETES, Quis propriè pulsus longus appellatur? GERON, Ille, qui ipsa longitudine excellit, sic vt aliæ duæ dimensiones nihil à moderato recedant. gignitur autem, vel ex corporis gracilitate, vel à facultate formatrice, si talis ab initio conformatus fuerit. MATHETES, Quæ turgidum pulsum generant? GERON, Vfus auctus, crassus corporis habitus, & gibba arteriæ figura. sæpe enim natura parua arteriæ partem, sola cute contegit: vtrinque verò partes eius profundius in carnem & adipem deflectunt. parua igitur pars illa sublimis sola, motum edit: reliquæ, cum penitiùs sint immerse, occultant. MATHETES, Quis propriè breuis pulsus

*Pulsus gracilis.**Pulsus longus.**Pulsus turgidus.**Pulsus brevis.*

est GERON, Ille, qui ipsa gracilitate sola à moderato recedit, sic vt latitudo nihil augeatur. talis magna ex parte à natura formatur, vel crassities corporis eius longitudini nonnihil adimit, MATHE-
TES, Quæ causæ rhythmorum esse poterunt?

*Rhythmorum
causæ.*

GERON, Continentes, quæ secundum naturam habent, atq; optimè sunt commoderatæ: proferunt autem æquales, moderatos in optimo corporis statu, seu quadrato: & qui proximè hunc accedit. qualis est arteriæ eleuatio, talis etiam submissio existit. MATHESES, Qualis est in huiusmodi corpore eleuatio? GERON, Moderata tum celeritate, tum tarditate. in eo autem corpore continentis pulsuum causæ immutantur, quod à moderata illa temperie deflectit: vnde rhythmus non moderatus, sed æqualis tamen efficitur. MATHESES, Quot rhythmus æqualis species numerantur? GERON, Tres. nam vsu aucto vtriusq; motus, eleuationis submisionisq; rhythmus æqualis celer nascetur: immi-
nuto autem vtriusq; motus vsu, tardus, æqualis fiet. MATHESES, Post rhythmos inæqualitatis causas etiam rogo exponas.

*Rhythmus æqualis
species.*

GERON, Systematicæ inæqualitatis causæ continentis hæ sunt, instrumentum vitiatum, aut facultas inualida, aut vtrunq; vsus autem immutatio nunquam causa eius existit. nam fieri non potest, vt tam subitò pulsus necessitas varietur, quàm inæqualitas pulsuum tactu percipiat, idq; siue crescat calor, siue decre-
scat, siue spiritus animalis augeatur, siue imminuatur: nunquam tamen prior pulsus idèò magnus, celer, vel vehemens fuerit: alter verò statim paruus, tardus, & languidus. Quod si, dum vsus pul-
suum immutatur, inter plurimos, posteriores, qui nunc sunt, con-
feras cum ijs, qui paulò antè præcesserunt, videbuntur tibi poste-
riores impares esse prioribus, vt reuera accidit in balneis, exerci-
tijs, viniq; potu, quibus pulsus pro caloris incremento ad magni-
tudinem, celeritatem, & frequentiam conuertuntur. MATHESES, Quot modis instrumentum vitiatum, & vsui inutile redditur?

*Instrumentum
vitiatum.*

GERON, Varijs. primò cùm humores diffusi ea loca occuparunt, in quibus arteriæ mouentur, illosq; molestos facultas vehemen-
tibus, magnis, ac celeribus motibus conatur propellere è loco vno in alterum: è parte nobiliore ad ignobiliorem: vel ex hac ad
illam: si facultas illis non dominetur, paruis, tardis, languidis
motibus priorum vice vitur: idq; nunc his, nunc illis, donec aut
meatum aliquem reperiant, per quem fortè effluent, aut spatio
temporis attenuabuntur digerenturq; in halitum, aut hominem
interiment frustate oppressa. secundo, cùm inflammatio, absces-
sus, scirrhus, membræ arterijs plena obsident, maioribus tamen
interuallis & lentis circuitibus, tunc inæquales pulsus æqualibus
succe-

- succedunt: quia hi quoque tumores tardius immutantur. MATHE.
 Quānam alia ratione instrumentum sit idoneum? GERON, Qua
 crassi viscosique humores arterijs incidunt, magisque insignibus eo-
 rum oris quæ illic habentur, vbi diuersi rami ex magnis arterijs
 5 propagantur, præsertim verò prope cor, aut in ipso. tunc enim
 spiritus per meatus suos liberè transire nequeunt, eoq; variam in-
 æqualitatem nasci oportet. MATHETES, Vnde canales isti replen-
 tur? GERON, Ex copia sanguinis in venis, aut arterijs contenti. *Canalium reple-
tio.*
 enim in venis comprehenditur, arteriæ quæ illis vbiq; adiacent,
 10 necessariò comprimuntur. non minùs enim venæ distentæ pre-
 munt, quàm tumores. MATHETES, Quid si in arterijs sanguis su-
 perfluus contineatur? GERON, Tunc certè ille spiritibus liberum
 transitum impedit, sic vt etiam obstruat. MATHETES, Cur facul-
 tatem inualidam etiam inæqualitatis collectitiæ causam esse di-
 15 xisti? GERON, Quia illa vel nimio onere grauatur, quamuis ex se
 satis sit robusta: vel quia est imbecilla, ob temperamentum resolutio-
 nem: vel quia est distracta: grauata autem, pulsus efficit inæqua-
 les: imbecilla debiles, paruos, tardos, & quædam inæqualitatis
 20 genera. distracta etiam inæquales generat. robusta nanq; & inte-
 gra, integras quoque actiones perficit. cùm autem robusta quidem
 est, sed onere impeditur, corruptas & inæquales, sicut infirma mi-
 nus perfectas edit. MATHETES, Quo pacto facultas distrahitur?
 GERON, Duplici cordis intemperie, vel alijs diuersis affectibus,
 qui illam molestant. interdum enim aliæ cordis, vel aliorum
 25 membrorum partes calidiores, alię frigidiores existunt: illæ ma-
 gnos pulsus, celeres, vehementes, raros: hæc contrà paruos, tardos,
 frequentes, languidos requirunt. MATHETES, Vnde facultas
 elanguescit? GERON, Ex temperamenti cordis, vel membri, cuius
 30 pulsus attingis dissolutione, cuius multi ordines seu gradus esse
 possunt: & quò superiores, tantò deteriores existunt. ex modica
 siquidem intemperie pulsus fiunt parui, tardi, frequentes, langui-
 di: in maiore, myuri reciproci: in maxima, myuri non reciproci.
 vltra quam si adhuc recedatur, intermittentes prodibunt: si lon-
 35 ginquius recesserit intemperies, deficientes: nouissimè pulsum
 abolitio, siue priuatio accidit. atq; hæc duplici modo fit. Primò,
 cùm motus arteriarum verè perit, idq; per totum animal, vt nul-
 la vsquam arteria moueatur, quod in nullum corpus viuum cadit,
 cùm ipse sit interitus. secundo, cùm arteriæ motus nusquam sanè
 tactui nostro occurrit: sed totus in omnibus membris celatur. in
 40 hoc autem sicut in reliquis, pulsus & respiratio proportionem sibi
 respondent: quippe neutrum saluo & superstite animali funditus
 aboleri potest: quanquam propter paruitatem interire videan-

tur. Atq; hæ sunt systematicæ inæqualitatis causæ simplices, quæ alios pulsus edunt inæquales, sibi proprios, hoc est, qui ex vna & eadem causa semper proueniunt: alios familiares, qui non ab eadem semper causa oriuntur. **MATHETES**, Qui sunt imbecillæ facultati proprii? **GERON**, Myuri deficientes & motu destituti: intermittens autem familiaris ei non proprius est. nam iste fieri potest vel ab inualida facultate, vel à magna instrumentorum obstructione, vel astrictione. At intercurrentes seu intercedens, robustæ facultati proprius est, quæ vel copia humorum, vel instrumentorum obstructione grauatur. cum enim facultas valida non sibi nititur expellere, non solum magnos, celeres, & vehementes motus adhibet, sed etiam plures. atq; eiusmodi pulsus alti, fiunt excretionum futurarum in crisi indices. **MATHETES**, Quæ compositæ causæ inæqualitatis collectitiæ dicuntur? **GERON**, Quæ ex simplicibus constat. nam siue arteriæ comprimantur, siue obstruantur, pulsus inæqualitas gignitur, etiam si facultas salua sit, quod si & copia grauetur, & ex intemperie languescat, varioq; malo distrahatur, omnigena certè pulsum inæqualitas inde proueniet. **MATHETES**, Quænam sunt intermittentiū pulsum singularium causæ?

GERON, Duplici continentur differentia. prior in vna parte arteriæ, altera in pluribus fieri solet. in vna sanè, quam vnus attingit digitus, tres pulsum species apparent, nempe intermittens in vno pulsu, impar citatus, & dicrotus. principalis est dum prior eleuationis pars velox existit: posterior secundum quietem interfecantem tarda, altera est, dum vtraq; eleuationis pars velox est. tertiā, velox moderata. **MATHETES**, Quæ omnium sunt causæ? **GERON**, Eadem genere quæ & inæqualium systematicorum, sed multò efficaciores & deteriores. nam si quæ compressiones, obstructions, grauitates, variæ intemperies, infirmitatesq; illis adsunt, has maiores & insigniores esse oportet. **MATHE T**. Quamobrem? **GERON**, Quia hæ non sinunt ne partes quidem pulsum integras confici, tantum abest vt integros pulsus, quales inter systematicos intermittentes cernuntur, absoluant: quia eleuationes eorum quietibus admixtis interfecantur. At licet omnes intermittentes singulares prauī existant, alius tamen alio minùs magnisue tales censetur. quorum nanque motus vterq; ante quietem, & post illam celeres fiunt, optimi sunt: qui tardi, pessimi: qui moderati, medij bonitate. Porro qui inter medios & extremos utroque intercedunt, tantum bonitate, aut vitio excellunt, quantum cum ijs participant. posterior nanq; pars motus si tarda fuerit, prior autem velox, facultatem humorum copia, si hæc eius causa fuerit,

Pulsus proprij.

Pulsus familiares.

Myuri pulsus deficientes.

Intermittentes.

Intercurrentes.

Inæqualitatis collectitiæ causæ compositæ quæ.

Pulsum intermittentium singularium causæ.

Pulsum intermittentium inæqualitas.

Facultatis humorum copia grauitas indicium.

fuerit, plus aggruari ostendet, quàm si vterq; motus celer fuerit: vt qui facultatem humorum copiae reniti, ac sese aduersus eam attollere testetur: quippe celeritas facultati robustæ, cui præsens adesse solet, amica existit. tarditas è contrario imbecillæ se associare
 5 consuevit. Maius autem facultatis bonum indicatur, si pulsus non solum fuerint celeres, sed etiam magni & vehementes: adhæc si quies quæ eos interstinguit exigua fuerit, vt quæ facultatem strenuè cum morbo eiusq; causis contendere declaret. prauitatem autem causæ auget pulsus paruus, debilis, quies longa eos
 10 interfecans. nam si hæc vni pulsui intermittenti adfuerint, facultatem ab humorum copia grauari: si hi inæqualitatis auctores fuerint, vel insignem obstructionem prope cor infestare, vel plurimas easq; maximas arterias comprimi significant. semper autem comitatur, intermittentes singulares vrgens pulsum necessitas.
 15 Nisi enim calor augescens facultatem compelleret, ipsa nunquam humorum copia ingrauescens, aut obstructione impedita, aut compressa, aut ex resolutione languida, secundum motum, post interfecantem quietem aggredi tentaret, sed quamprimum esset prohibita, tunc eleuari desineret, paruumq; pulsum qui partis eleuationis loco esset, ante quietem interfecantem efficeret. MATHE-
 20 TES, Quos pulsus impares citatos vocas?

Facultatis bonitas quando indicetur.

Præiudicis causæ quibus augeatur.

GERON, Qui inæquales sunt singulares in vna arteriæ parte, absq; quiete interfecante: vbi scilicet priores motus partes fuerint celeriores, posteriores autem tardiores: vel contra, vbi priores tardiores, & posteriores celeriores extiterint, motu continenter perseuerante, non per intermediam quietem intersecto, ac binæ eorum genera. nam alij inæqualitatem suam æqualiter faciunt, quorum sex sunt differentiae: alij inæqualiter, quorum species multò sunt plures. MATHESES, Quæ eorum sunt causæ?
 30 GERON, Eædem, quas intermittentes singulares habent, sed pauciores minusq; sæuæ & insignes, vt quæ ex obstructionibus, vel compressionibus, sed multò leuioribus quàm intermittentes oriuntur: nec non à facultate grauata: quanquam minus quàm intermittentes. MATHESES, Qualis est imparium citatorum inæqualitas? GERON, Leuior quidem, quàm intermittencium singularium: peior autem quàm systematica. Porro inter impares citatos, alij quoq; prauī, alij deteriores, alij pessimi: nonnulli optimi sunt, quorum easdem causas esse, sed non tam multas quot intermittencium, diximus. MATHESES, Cur? GERON, Quia facultatis imbecillitas sæpè causa est intermittencium: imparium autem citatorum nunquam. nam si debilitas facultatis, pulsus facit inæquales, paruos eos esse oportet (paruitas enim debilitatem sequitur)
 40

Pulsus impares citati qui.

Pulsuum citatorum imparium genera & differentia.

Pulsuum imparium citatorum inæqualitas.

Pulsuum intermittencium, & imparium citatorum causæ diuersæ.

inæquales autem citati omnes sunt magni, eò quòd eleuatio ipsorum in duas, tres, aut quatuor interdum partes diuerfas, distinguì possit: quod paruis nullo modo conuenit. MATHETES, Cùm ex imparibus citatis quosdam esse dixeris, qui eleuationis motum subito in contrarium mutant, nempe cùm prior pars motus cele- 5
ris fuerit, secunda tarda: vel contra prior tarda, posterior celeris: simplicè sine causas inæqualitatis habent. GERON, Nequaquam, sed compositas: hoc est, non solum facultatem grauata illas efficere, sed adesse etiam simul obstructionem, vel instrumentorum astrictionem, non quidem firmam, sed quæ facillè permuetur. 10
non enim tam magna & subita mutatio, ex solo facultatis onere fieri potest, quod exiguo tempore deponi nequit. MATHETES, Quæ dicrotorum pulsuum causa est?

Pulsus impares citati an simplices æqualitatis causas habeant.

Pulsuum dicrotorum cause.

Eleuationis & submissionis diuersi modi.

GERON, Inæqualis cordis intemperies, vel arteriarum: non tamen simplex, sed varia. Nam quædam corporis partes calidæ 15
multum & puræ sunt: quædam multis fumosis vaporibus repletæ: vnde contrarij motus prouocantur. calidæ enim partes cordis ac purg, refrigerationis indigunt, attolli: aliæ nempe impurg, eodem tempore submitti desiderant, vt sese expurgent. MATHET. Ergo eleuatio & submitisio cordis & arteriarum, diuersis modis 20
fiunt. GERON, Indubiè, pro diuersa alterutrarum partium victoria. nam dum calidæ partes puræ superant, eleuatio conficitur: nihilominus modica etiam submitisio in puris partibus conceditur. MATHETES, Quando partes vincere dicuntur? GERON, Cùm vel plures sunt, vel multò intemperatiores. submitisio autem 25
tem retrahit distentam arteriæ tunicam, vel antequàm perfectè eleuetur, vel, vbi iam eleuata est, vel toto eleuationis tempore aliæ cordis partes variè affectæ sese eleuant, aliæ eodem tempore se submittunt, arteriarumq; tunicas eleuari & summitti cogunt, prout refrigeratione, vel expurgatione indigent. MATHE- 30
TES, Cur magnam esse inæqualis intemperaturæ cordis varietatem dicis? GERON, Quia præter calidam, puram, & impuram dicrotorum causam, alia non simplex, sed duplex reperitur. nam dum cordis partes aliæ sunt calidæ, aliæ frigidæ, hæ paruos, tardos, & raros pulsus: illæ maiores, celeres, & crebros edunt. Qua- 35
re plures & multò validiores, totum cor & arterias pro sua ratione moueri cogunt. at si frigidæ ipsæ fuerint, semper paruos, tardos, raros motus excitabunt: sin autem calidæ, plures & valentiores extiterint, motus ampliores, celeres, & crebros nunquam non efficient. MATHETES, Ecquid si non multò efficaciores aliæ al-

Dicrotorum causa.

40
ijs fuerint, sed hæc illas modicè excedant superentq; GERON, Tunc mutua contentione vicissim alig alias vincunt, & vincuntur, fietq; inde

- inde inæqualitas pulsuum, nominis expers, quæ Græcis ἀνόρυστος
dicitur, tam singularis, quàm collectitia siue systematica: ob quam
ideo pulsus fient nunc maiores, celeres, & frequentes: nunc parui,
tardi, & rari. MATHETES, Estne alia adhuc inæqualis tempera-
turæ cordis causa? GERON, Est sanè, quæ tertia numero dici po-
test, duplici distincta specie: vna nempe cùm essentia cordis est ca-
lida, materiaverò in eius sinibus contenta, frigida: vel è contrario,
essentia cordis frigida, contenta autem calida. atq; hoc genus in-
temperaturæ cordis inæquale, modò pulsus inæquales systema-
ticos, & singulares: modò per omnia gênera moderatos produ-
cit, cùm enim cordis essentia tanto calore prædita est, quanto con-
tenta frigore: vel è contrario, quando cor tanto frigore dona-
tum, quanto calore contenta, pulsus magnitudine, celeritate, &
frequentia moderatus generabitur. Si verò intemperies cordis,
& eorum quæ in eo sunt contenta, non æquales contrariorum
qualitatum gradus habeant, sed vel cor exuperet modicè, vel ea
quæ in ipso continentur, pulsus inæquales systematici, & singu-
lares fient, sin autem supra modum exuperet, pulsus continuus
pro eius quod vincit ratione, progignetur. Porro quæ de mate-
ria in corde contenta dixi, etiam de illis quæ ei vicina sunt, intel-
ligi debent: qualis est tunica pericardios, pulmo, arteriæ, & mem-
branæ prope cor in thorace consistentes. si namq; hæc omnia, vel
nonnulla ex eis in aliquam intemperiem inciderint, eisdem pulsus
quos & materia cordi indita, vt sanguis, spiritus, & humores pro-
creabunt. MATHETES, Dicrotorum pulsuum causam, nempe in-
æqualem, cordis, vel arteriarum intemperiem explicasti: non-
dum autem ex te audiui, continentésne illa sit, an secundaria etiam
nominari debeat? GERON, Dico igitur inæqualem istam intem-
periem continentem esse, siue coniunctam causam dicrotorum.
nulla enim alia inter hanc & effectum intercedit, quæ continen-
tis causæ est natura. MATHETES, Quænam continens est ex tri-
bus commemoratis? GERON, Inæqualis intemperies, modò est fa-
cultas imbecillis, modò calor immutatus, modò vtrunq;. MATHE-
TES, Quod reliquum singularis inæqualitatis genus superest?
GERON, Id quod nimirum in vno quidem pulsu, sed diuersis ar-
teriæ partibus consistit, idq; duplex. Fiunt enim quidam huius-
modi pulsus motu continuo, quidam interrupto. causæ eorum
sunt aut imbecilla facultas, aut humorum copia, aut extrema in-
strumentorum mollities. MATHETES, Cur facultatem inualidam
singularis inæqualitatis diuersis in partibus arteriæ causam esse
statuisti? GERON, Quia vis pulsandi, quæ ex corde imbecillo in
arterias deriuatur, vt lumen à sole in hunc inferiorem orbem,

*Inæqualitatis
causæ.*

*Pulsus moderatus
unde.*

Dicrotorum causa.

*Inæqualitas in
vno pulsu.*

*Causa inæquali-
tatis in diuersis
arterijs.*

non potest totum vas æquali robore attollere, sed viciniorem cordi, seu fonti scaturienti partem magis eleuat, citiusq; & vehementius: remotiorem autem tardiùs, minùs & imbecilliùs: quousque vis quæ in priore parte erat, etiam ad posteriorem veniat. quæ robustior facta, motû maiorem pro minore, celeriore pro 5
tardiore, fortiorem pro debiliore acquirit. Si namq; vis pulsatrix illa, æquali semper incremento ad arterias influeret, vt in sanis fit hominibus, partes arteriarum eodem tempore simul eleuarentur: vel certè propinquiore amplius, remotiores minùs. In ægris autem hoc non ita sæpè accidit: in quibus cordis temperamen- 10
tum continuè sanè vasis ei annatis, sed inæqualiter, aliàs liberaliter, aliàs parciùs communicatur. At cùm vis illa copiosius in arterias influit, priores quidem partes valentiorum motum acquirunt: vbi autem minùs, posteriores, idq; breui tempore. quandiu scilicet eum virium tenorem retinent, quem à prioribus fuerant 15
consecuti. MATHETES, Impeditur ne aliquando arteriarum facultatis motus? GERON, Quid nì. humores enim sæpè motum non sinunt esse æqualem. ob id in nonnullis partibus maior, celerior, & vehementior: in nonnullis minor, tardior, languidior: in nonnullis etiam minimus, qui sensu percipi nequeat, ac quiete 20
veluti interruptus, apparet. MATHETES, Quæ causa præter dictas alia pulsus tales efficit? GERON, Interdum quoq; nimis molle instrumentum. vbi enim arteriarum tunica multò humore fuerint imbutæ, non possunt æqualiter, vt omnes partes eleuari, eò quòd corpora flaccida ad æqualem motum minùs sint accommodata, 25
vt quorum partes principio mouenti proxime eleuentur, alię verò interim flectantur, non autem eleuentur. MATHETES, Quæ tandem myurorum singularium, eminulorum & prominulorum causæ existunt?

*Pulsuum myu-
rum, eminulo-
rum, & promi-
nulorum causæ.*

GERON, Facultas inualida, quæ partibus à corde remotio- 30
ribus parciùs influit, magis propinquis largiùs. qua de causa partes cordi viciniores magis eleuantur, distantiores, minùs: & quò illæ à principio longiùs absunt, eò minores motus parient. at hæc quidem continens seu coniuncta eorum causa est: adiuuans autem dicta, corporis est gracilitas, quæ in longum arteriam dete- 35
git, ad caudæ muris similitudinem. MATHETES, Quid eminulos, seu prominulos efficit? GERON, Aliquando inæqualis partium arteriæ intemperies. nam facultas à corde seu principio in tunicas arteriarum infusa, temperatis sanè partibus meliùs expediti-
usq; ad motum vititur: intemperatis autem peius. nam pars arte- 40
riæ temperata, quæ congruum & calorem, & humorem obtinet, ab eadem & æquali facultate faciliùs magisq; mouetur: sicca verò
nimium

*Eminulos promi-
nulose pulsus
quid pariat.*

nimiū vel humida, vel calida, vel frigida difficilius minusq̃.
Cū igitur media inter digitos tangentes arteriæ pars melius
temperata fuerit, vtrinq̃ verò sitæ intemperatæ: illa magis ele-

15 lorum pulsuum causa, quæ in ægris sepius quàm prior inuenitur,
nempe facultas inualida, & membrorum vicinorum macies. Vbi
igitur admodum tenuis lenisq̃ est, ibi pulsus magis conspicuus
apparet: vbi verò non sola cutis, sed caro quoq̃, licet marcida sub-

10 TES, Cur myurorum singularium, & eminulorum pulsuum eadē
esse causas retulisti, cū adeò sint inuicem diuersi? GERON,
Quia multi & varij imbecillitatis sunt excessus, diuersos quoque
pulsus efficiunt. adhæc omnia myurorum singularium & emi-

*Myurorum emi-
nulorumq̃ pulsa-
um cur eadem
causæ.*

15 alias arteriæ partes profundius collocat, ob quod parui pulsus ap-
parent: quasdam elatius effert, quarum conspici & maiores mo-
tus esse solent. MATHETES, Quæ inæqualitatis in arteriæ situ
boni & mali ordinis causæ existunt?

GERON, Arteriæ. cū non solum tunicæ ipsarum, sed eti-
20 am partes eis vicinæ, ab omnibus naturæ contrarijs inflamma-
tionibus, scyrrhis, abscessibus, tuberculis crudis, *Quasdam* Græci
vocat, nec non sicca duritie, frigore immodico, conuulsioneq̃,
& calida siccaq̃ intemperie trahuntur. quemadmodum autem
æqualitas semper adiunctum sibi ordinem, sic inæqualitas nunc
25 ordinem, nunc eius priuationem sibi assumit. MATHETES, Quæ
res pulsus vndosos, vermiculantes, formicantesq̃ pariunt?

*Inæqualitatis
causæ in situ ar-
teriæ boni & ma-
li ordinis.*

GERON, Vel infirma facultas, vel humorum copia, vel sum-
ma instrumentorum mollities, eaq̃ vel omnia, vel quædam ex
eis. vndosum, copia humorum: vermiculantem, facultatis imbe-

*Pulsus vndo-
sum, vermiculan-
tem formican-
temq̃, quid pa-
riat.*

30 cillitas gignit, quæ arteriam vno eodemq̃ tempore totam nequit
attollere, sed partes eius paulatim. fit interdum vt vndosum fa-
cultas, quæ prius erat in eo grauata, nunc autem & grauata, & dis-
soluta in vermiculantem transmutet, id tamen non semper. at
vermiculans in formicantem degenerat, cū facultas hoc ma-

*Vndosus quando
in vermiculan-
tem mutetur.*

35 gis dissoluta est, quando formicans minor vermiculante est, &
tardior. Summatim eadem formicantis quæ vermicularis causa
est, sed huius efficacior. MATHETES, Similesne sunt inter se ver-
miculantes? GERON, Non: sed alij magis tardi, alij minùs: qui eti-
am non ita mali sunt. non semper autem formicans ex vermicu-

*Vermiculans in
formicantem de-
generat.*

40 lante generatur. Nam in acutis & malignis febribus, formicantes
sæpissimè nascuntur, etiamsi vermiculares non præcedant. & è
contrariò, in cholera, alui profluuijs, alijsq̃ magnis euacuationi-

*Pulsus vermi-
culantium disse-
rentia.*

bus, & menſtruis ſuperfluis, vermiculares in eos qui intermit-
tunt & deficiunt, non in formicantes deſinunt ac immutantur.

*Pulſus vermicu-
lans in febribus
acutis non inue-
nitur.*

Imò rationi contrarium eſt, vermiculantem pulſum, qui om-
ninò tardus eſt, & aliqua ex parte frequens, aliqua rarus exiſtit, in
acutis febribus & malignis inueniri. nam immodicus calor febriliſ
& ſpirituum defectus, rarus non admittit. ideo neceſſarium
non eſt, vt vermicularis ſemper formicantem præcedat, aut for-
micans vermicularem perpetuò ſequatur. MATHETES, Quæ tan-
dem eius pulſus, qui capræ modo bis ferire dicitur, cauſa exiſtit?

*Pulſum capri-
zantem quid eſ-
ficiat.*

GERON, Robuſta facultas, quæ aut humorum copia, aut ar-
teriarum compreſſione, aut obſtructione impeditur, quò minùs
continuum motum edere poſſit. cogitur enim paululum remo-
rari, ac in ipſo motu conſiſtere: recollectis autem viribus dum im-
pedimentum ipſius conatur ſuperare ac expellere, vehementio-
rem motum ſecundum quàm priorem adhibet, edere vrgetur, 15
idèq; ſæpiùs. Nam ſi alterum ſaltum adhibeat debiliorem, pulſus
hic deterior caprizante erit. hic etiam inæqualem caloris intem-
periem, quæ eleuationem impedit, interdum comitatur. MATHETES, Quid de pulſu ſerram imitante ſentis?

*Pulſus ſerrantis
cauſe.*

GERON, Cauſæ eius ſunt facultas grauata, inſtrumentum 20
durum, calorq; increſcens. nam ſi facultas non grauaretur, neque
ipſa inæqualitas ſingularis, quæ in pulſu ſerram imitante reper-
itur, adeſſe poſſet. MATHETES, Vnde inſtrumentum in eo durum
eſt? GERON, Ex tenſione, non ex arteriæ ſiccitate: quippe eam in
hoc pulſu ob inflammationem neruoſarum partium tendi oportet. 25
habent autem hæc magnam arterijs ob fibras, quæ ex neruis ad
illas propagantur, communionem. At quia aliæ arteriarum par-
tes ſecundum rectitudinem magis ſunt inflammationi addictæ,
aliæ minùs: hæc etiam plus, illæ minùs tenduntur. cùm autem ca-
lor augeſcens arteriam multum attolli cogat, id verò ob duritiem 30
fieri nequeat (nam dura ægrè attolluntur) partim etiam ob facul-
tatem affectam fieri ſolet. quia verò vniuerſe eodem tempore ten-
duntur, imago illa tactus ſerrati apparet, nonnunquam & vibra-
tio. MATHETES, Quid pulſum conuulſorium generat?

*Pulſum conuul-
ſorium quid ge-
neret.*

GERON, Neruorum contractio. dum enim hæc ſit, arteriæ 35
quoque contrahuntur. nam magna inter has & illos eſt ſocietas,
non modò quòd arteriæ fibras à neruis accipiant, ſed etiam quòd
ſingulæ amborum propagines inuicem ſint coniunctæ. nulla enim
ferè arteria extat, cui non etiam neruus ſuperiùs, aut inferiùs, vel
ad latus, vel circa hoc adhæreat. Qua de cauſa nerui affectionem 40
ſuam arterijs facile communicant: id quod in morbi comitialis
acceſſionum initio videre licet. in hac enim pulſus conuulſorij

palam

palam deprehenduntur, eò quòd totius corporis contractio im-
mineat. MATHETES, Quot causæ vibratum pulsuum gignunt?

*Pulsus vibrati
causæ.*

GERON, Tres simul coniunctæ, vt facultas robusta, arteria
dura, calor ingens, vel spiritus animalis exhaustus. cùm enim al-
terum horum adfuerit, vel vtrunq, maxima arteriarum eleuatio-
ne opus est: vbi verò nihil aliud obstat, quòd minùs arteria valdè
eleuetur, quàm ipsius durities, necesse est, vt in altum ipsa flecta-
tur. MATHETES, Quam causam tremulo & palpitanti pulsui tribuis?

*Pulsus tremu-
lus quid faciat.*

GERON, Flatum in membro inclusum, qui aliàs exitum
quærit, & membra ipsum continentia secum tandiu agit, donec
vel dissipetur, vel explosus violenter in cognatum sibi aërem ex-
piret. Frequenter autem cuti & subiectis ipsi musculis, nec non
ventriculo, vesicæ, vtero, intestinis, iocinori, lien, septo trans-
uerso, & breuiter omnibus quæ distingui possunt, vt arterijs,
cordi& ipsi, & vniuerso interdum corpori accidit. MATHETES,

*Pulsus palpi-
tantes quid effi-
ciat.*

Quid momentanea palpitationis celeritas, dum vel exoritur, vel
dissoluitur, indicat? GERON, Aëream essentiam, hoc est, vaporem
crassiores & copiosum, quæ arterias & cor à seipsis distinguit.
nam & statim gignitur, & citò conquiescit, quod in nullum hu-
morem cadit. MATHETES, Quomodo cordis sit palpitation? GE-

*Palpitationis cordis
quomodo fiat.*

RON, Pulsibus arteriarum sæpè nihil mutatis, ac contrà, cùm illæ
sæpè palpitant corde conquiescente, nempe cùm vapores, partes,
in quibus ipsi occluduntur, instant attolluntq, ita vt causa pulsus
palpitantis nihil aliud sit, quàm flatuosa instrumenti repletio. at
tremor motus est compositus, nempe ex naturali, quem facultas
innata efficit, & altero naturæ contrario, qui à membri grauitate
gignitur, quæ deorsum magis vergit, ita vt vtracq; inter se pugnet.
facultas nanque membrum erigere conatur: grauitas autem resi-
stit. MATHETES, Cur membrum graue redditur? GERON, Quia

*Membrum quomodo
graue reddatur.*

facultati infirmæ oneri est. quemadmodum enim senes, & ij qui
ex morbo conualescunt, facili ex causa tremunt, eò quòd ob vires
imbecillas sub proprio corpore quasi onere grauentur: ita cor &
arteriæ debilitatæ, ob quemlibet morbum vires instantem faci-
le contremiscunt. interdum tremor etiam musculis cubitum mo-
uentibus superuenit, vt ex pulsu ægrorum qui periculose labo-
rant, experimur. Quòd si ille ante morbum non accidat, mortem
in propinquo esse denunciat: quamuis in pulsu nullus interim
motus tremulus contingat. MATHETES, Idemne palpitationem
& tremorem esse existimas? GERON, Nequaquam. qui enim hoc

*Tremor ante
morbum.*

sentiunt, valdè errant. nam illa, motus est admodum breuis: tre-
mor verò diutius affligit, vt qui ex causis plurimùm diuersis,
quæ facultatem violare solent, exoriatur. palpitationis autem

*Palpitationis &
tremoris differe-
rentia.*

vna tantummodò causa inuenitur, nempe flatuum materia: quam quam etiam arteriæ mollities adiungi posset. dura namq; corpora idè non palpitant, quòd ipsa difficulter inuicem separari per flatum queant. hinc ossa & cartilaginee nunquam palpitare cernuntur. **MATHESES**, Quid trementem pulsum efficit?

*Pulsum tremen-
tem quid efficiat.*

GERON, Facultatis imbecillitas: nec non gracilis corporis habitus, veluti causa adiuuans. **MATHESES**, Quales in tremen-

Tremoris pulsus.

tibus pulsus apparent? **GERON**, Languidi necessariò, & parui: eoq; in crasis deprehendi nequeunt. quòd si cor tremat, inæquales sunt magnitudine, celeritate, frequentia, & vehementia. sin autem arteriæ tremant, quod rarò accidit, cordis motum immutari non est necesse, nisi id vitij penitiùs feratur inualescatq;. Sed facile erit dignoscere, corne an aliæ partes tremant, si manum thoraci adhibeas. **MATHESES**, Quis hectici, & strepentis pulsus auctor tandem existat, explices?

*Pulsus hectici
causa.
Pulsus strepen-
tem quid faciat.*

GERON, Affectus solidis partibus infixus, qualis est marcor, tabes, siue pulmonis vlcus, puris collectio in pectore, & febris hectica. Pulsus strepentis causa est arteriæ durities eiusq; inanitio, & facultas robusta. eum autem adiuuat spatium, in quo arteria mouetur, aëre refertum, non humore. Porro arteriæ spiritibus, aëre & sanguine tenuissimo (quamuis aliæ magis, aliæ minus) repletæ sunt. quòd si parum sanguinis in se contineant, spiritus aërq; internus amplum habebunt spatium. At facultas valida, quæ pulsum vehementem, aut certè non languidum edit, dum aërem & spiritum concurrit, strepitum excitat. Hactenus primarias, seu continentes pulsum causas, nec non eorum, quæ has iuant consensus, explicauimus: post hæc secundarias tibi cognoscendas esse puto. **MATHESES**, Tu ergo ordine omnia pergas recensere, quæ tibi necessaria ad illorum notitiam esse videntur. **GERON**, Faciam, sed ita, vt à singulorum temperamentorum pulsibus exordiar: deinde reliqua, quanta potero breuitate, persequar. **MATHESES**, Dic igitur quos pulsus temperamenta calida edant.

*Pulsus tempera-
menti calidi qua-
les.*

GERON, Multò maiores, velociores, frequentiores, non autem vehementiores. Hoc autem aduertendum est, non in quolibet corpore natura calido, necessariò tales pulsus fieri. **MATHESES**, Qua de causa? **GERON**, Quia corpora quæ calore à temperato modicè declinant, maiores pulsus habent: quæ longius ab illo recedunt, maiores, & celeriores: quæ autem longissimè, multò maiores, velociores, & frequentiores. quia dum calor augefcit, magnitudo pulsus requiritur: & si hæc sufficere vsui nequit, etiam velocitas desideratur: si neque hæc duo coniuncta necessitati respondere, accitit quoq; frequentia. **MATHESES**, Cur eiusmodi tempe-

- temperamento non attribuis etiam vehementiorem? GERON, Quia is à robusta facultate efficitur, eiq̃ proprius est, & perpetuò adhæret, nulli aliàs continenti causæ familiaris. Quòd autem Galenus non multò vehementiorem calidis attribuat, in rudiorum
- 5 gratiam facit, qui illum pro magno & veloci pulsu accipiunt. MATHETES, Quibus pulsibus sicci natura donati sunt? GERON, Sicciiores, siue graciliores maiore, multoq̃ rariore, paulò vehementiore, & duro. cùm autem gracilitas vel naturalis, vel ascititia ex victu, aut morbo existat, nihil refert, si vtrancq̃ hîc intelligas. MATHETES, Cur ob solam gracilitatem pulsus fiunt multò maiores? GERON, Partim propter spatia, in quibus arteriæ mouentur, multò ampliora purioraq̃: partim quòd sola cutis arteriam superiori parte contegat. quia verò in crasis adeps & caro, multiq̃ humores illas obducunt celantq̃, minores. ob eandem rationem etiam
- 15 paulò vehementiores pulsus gracilibus ascripsi: non quòd ipsi propter gracilitatem sint robustiores, sed quia in ijs arteria, quæ sub cute celatur, magis tactum euertat ac illa, quam caro, adeps, & humores contegunt, ita vt ne tactum propè feriant, eumq̃ subintrent. Gracilium igitur pulsus plus vehementiæ repræsentat,
- 20 quàm obtinet. MATHET. Quid roboris ex gracilitate pulsui accedit? GERON, Nihil, sed ea permittit, vt medicorum digiti proximè arteriam attingant, atq̃ hi idèò altiùs euertantur, quòd crassities non concedit. MATHETES, Cur rariore multò illos esse dixisti? GERON, Quia cùm magnitudo sola vsui satisfaciât, frequentia opus non est, nec celeritate. si verò etiam multò maiores fuerint, calor autem nihilò auctior, tantò erit rarior, quantò maior extat. Nam cùm magnitudo augetur, raritas quoq̃ increfcit: si calor non augeatur. At in ijs qui natura graciles sunt, etiam largior est calor, eoq̃ venæ & arteriæ ample, ossaq̃ magna existunt:
- 30 in crasis autem natura, contraria cernuntur. MATHETES, Quia igitur vasa ampla sunt, calorem naturalem copiosum esse colligis? GERON, Maximè, vt qui illa extendere & dilatare soleat: vnde graciles natura, pulsus multò maiores, non solum ob causam nuper dictam, sed etiam ob auctum eorum calorem habebunt. MATHETES, Quid si corpus temperamento simul calido & sicco præditum sit? GERON, Tunc vtrancq̃ ob causam pulsus multò maiores obtinebit: si verò sicco tantum, in qualitatibus autem efficientibus moderatum, aut frigidum fuerit, tunc pulsus inde solum magnus euadet, eò quòd arteria nullis tegumentis carnis aut adipis contegatur, sed nuda appareat, amplumq̃ in ijs habeat spatium. At qui graciles ex morbo sunt, in ijs facultas, vsus, & instrumentum alio modo concurrunt, & singulæ hæ causæ pro sua ra-

*Sicci & graciles
qualem habeant
pulsus.*

*Graciles cur ampli-
ora vasa, &
maiores pulsus
habeant.*

*Temperamenti
calidi & sicci pul-
sus.*

Graciles ex morbo.

tione pulsum in eis immutant. MATHETES, Habētne etiam sexus uterq; diuerfos inter se pulsus?

*Pulsus in utroq;
sexu quales, &
quæ eius causa.*

GERON, Indubiè: masculus magna ex parte multò maiores vehementioresq;: fœmina autem tardiores, & rariores. MATHET.

Quot, & quæ eius sunt causæ? GERON, Quatuor potissimum. 5
prima temperamentum calidius & siccius, ob quod in illo calor auctus est; in hac imminutus. aucto autem calori magnus pulsus, imminuto paruus familiaris est. Secunda causa est facultas validi-
or in viro, quàm in muliere. atque illius propius pulsus est ve-
hemens, familiaris autem magnus. Tertia, quòd in viris ampla 10
sint arteriarum spatia, in quibus ipsæ eleuantur: in mulieribus angusta, propter adipem & humores pituitosos, qui ea obsident. spatium verò siue locus amplior, non primaria magnorum pul-
sum causa est, sed auxiliaria: angustum autem paruorum. Quar-
ta, quòd masculi laboribus & exercitijs robur vitale augeant, & 15
corpora calfaciant. atq; ea principalissima causa est, cur pulsus in viris non solum maiores & vehementiores adsint, sed etiam mul-
tò maiores & vehementiores. Quòd si mas effœminatus sit, vi-
uatq; in otio, & delitijs, pulsus non multò maiores habebit: adeò
potest exercitatio tempestiua calorem natuum, roburq; vitale 20
augere. MATHETES, Cur maxima ex parte addidisti? GERON,
Quia viri maiore ex parte robustiores calidioresq; fœminis: hæ
verò calidiores illis rarissimè existunt. MATHETES, Quid igitur
iudicas, si fœmina gracilis, nigra, & hirsuta occurrat, mas autem
crassus, albus, & glaber? GERON, Profectò illa mea sententia ca- 25
lidior, & biliosa: hic autem frigidior, & pituitosus censebitur. at-
que eadem meritò pulsus maiores & vehementiores, præsertim
si laboribus exercitata fuerit, quàm mas otio deditus, habebit:
quanuis id rarò accadat. MATHETES, Cur mulieribus pulsus pau-
lò tardiores & rariores, quàm viris ascribis? GERON, In viris pul- 30
sus magnitudo necessitati respondet, eoq; velocitate & frequen-
tia non indigent: mulieres quoq; tardiores & rariores pulsus fri-
gidæ naturæ gratia haberent, nisi id impediret, quòd multò mi-
norem pulsus magnitudinem, retineant. Qua de causa id quod
propter tam insignem eleuationis paruitatem vsui deest, veloci-
tas & frequentia compensat. MATHETES, Sexus, & temperamen-
torum pulsus intelligo, qui deinceps singularum ætatum proprij
existant, eodem modo interpreteris.

*In viris cur pul-
sus maiores, &
vehementiores.*

*Fœmina, quando
masculo calidior.*

*In mulieribus
cur pulsus tardo-
res & mitio-
res.*

*Pulsus singula-
rum ætatum qua-
les.*

GERON, Pueritiæ magnus, celerrimus, creberrimus, &
medius: iuue- tutis maximus, vehementissimus: senectutis mini- 40
mus, tardissimus, rarissimus, imbecillimus, cui rhythmus inæ-
qualis sit adiunctus. MATHETES, Cur puerorum pulsum mag-
num

num esse dixisti? GERON, Quia calor natiuus in ipsis auctus est, *Pulsus puerorum cur magni existant.*

copiosa quoque aëris essentia indigent, quæ per arteriæ eleuationem non modò ad spiritus animales nutriendos, sed etiam ad augendos attrahitur. adhuc quia arteriæ eorum sunt molles, facile

5 eleuationi cedunt. Quinetiam puerorum pulsus non solum magni, sed etiam maximì esse possent, nisi id arteriæ circumdatæ, per succorum abundantiam, & vires imbecillæ impedirent. MATHE-
TES, Quare horum pulsus magnos esse dicis, cum ipsorum arteriæ sint paruæ? GERON, Aliud est magna arteria, aliud magna eius

10 eleuatio. illa igitur si paruæ arteriæ comparetur, merito magna: si verò eleuatio arteriæ in pueris, illi, quæ est in iuuenibus, conferatur, parua esse dicetur. nam magnum maiori comparatum, eius respectu paruum dici solet. MATHESES, Cur puerorum pulsus velocissimus est, & frequentissimus? GERON, Quia magna
15 parui valis eleuatio, vsui non satisfacit. imò longè minus suppeditat, quàm necessitas requirit. quare velocitas & frequentia in auxilium vocatur, vt magnæ eleuationis loco (quæ quidem est necessaria, sed perfici nequit) summa sit velocitas, & frequentia.

MATHESES, Cur medius etiam puerorum pulsus inter iuuenes,

20 & senes, in quarto pulsum genere vocatur? GERON, Quia vires illorum non sunt tam magnæ, quàm in adultis, nec tam imbecillæ, vt in senibus. MATHESES, Propter quid iuuenum pulsus maximì dicuntur? GERON, Quia calor magis adhuc quàm in pueris auctus est. sunt enim natiuo calore calidi: ascititio autem, qui acris

25 est, & quasi igneus, calidissimi. præterea facultas est validissima quæ vehementissimos pulsus generat, adiuuatque vt magnitudo increseat. MATHESES, Cur iuuenum pulsum ex duobus tantum generibus conflatum esse protulisti: qualis autem in secundo aut tertio genere sit, omisisti? GERON, Quia in hoc non degenerat à moderato. quando autem aliquod ex quinque generibus aliàs

30 in compositis etiam pulsibus omittitur, illud nihil à naturali, vel à moderato tunc recessisse intelligendum est. MATHESES, Quæ eius mediocritatis ratio in iuuenibus existit? GERON, Quia summa magnitudo calori satisfacit, non aliorum pulsum auxilio indigens. MATHESES, Quos pulsus senes obtinent? GERON, Con-

trarios his qui pueris conueniunt. sunt enim frigidissimi, eoque pulsus tardos & raros edunt, vel tardissimos, rarissimosque, si alias ætates respiciamus. Quia verò temperamentum eorum collabitur, eoque facultates ipsorum debilitantur, non immerito etiam

35 pulsus eorum sunt imbecilles, vel potius imbecillissimi, si cum cæteris ætatibus conferantur. MATHESES, Cur rhythmici inæqualitatem senum pulsibus apponis? GERON, Quia summisio arteriæ

40

Pueri quale temperamentum.

Pulsus iuuenum qualis.

Senes quos pulsus habeant.

tardior in ipsis est, quàm eleuatio. parum enim aut nihil recre-
menti ex adustis humoribus prouenit, eò quòd calor eorum sit
debilitatus, ipsiq; non multum nutriantur. At quia vsus eleuatio-
nis licet non magnus, mediocris tamen in ipsis remanet (natiuus
enim ipsorum calor refrigeratione, seu euentilatione indiget, &
spiritus animalis nutritionem desiderat) bona quoque ratione
velocior in illis eleuatio, quàm summissio existit. vsus verò sum-
missionis in omnibus alijs etatibus ante vltimam senectutem, ele-
uationis vsui respondet, eoq; rhythmici æquales prodeunt, hoc est
celeris summissio, sicut & eleuatio. **MATHESES**, Quales reliqua-
rum ætatum pulsus existunt? **GERON**, Quantò ætates quædam
pueris, vel senibus viciniore, tantò propius quoque senium, vel
puerorum pulsum accedunt. **MATHESES**, Quos pulsus anni tem-
pora & regiones gignunt?

*et
regiones quod-
nam pulsus gignunt.*

GERON, Ver medium in omnibus generibus moderatos
efficit: æstas paruos, celeres, frequentes, & languidos: hyems par-
uos, tardos, raros, & languidos: autumnus diuersos, & langui-
dos. **MATHESES**, Quis alius præterea in vere, cùm aër est tem-
peratissimus, pulsus prouenit? **GERON**, Vehemens. quia tunc cor-
pora sunt saluberrima, & facultas pulsuum effectrix robustissima,
instrumenta pura, calor temperatus. **MATHESES**, Cur veteres

*Pulsus veris me-
dio cur maximi.*

pulsus maximos & vehementissimos medio veri ascribunt? **GE-
RON**, Quia licet magnitudine & vehementia moderati sint, nulla
tamen anni pars, tantos, tamq; vehementes habet. Ob quod si eos
ad alia anni tempora conferas, omnium maximi sunt & vehemen-
tissimi: quibus tamen maiores & vehementiores in alijs statibus
corporis reperiuntur. hîc verò pro anni solùm temporibus eos
describimus. **MATHESES**, Sûntne ex æquo pulsus omnium me-
dio vere maximi? **GERON**, Nequaquam, sed singuli cuiq; pro
sua natura respondent. non enim calidi & adusti natura, aut pi-
tuitosi & frigidi medio vere pulsus maximos obtinent: calidiores
& sicciores temperamento, longè ante medium ver eos sortiun-
tur: humidiores & frigidiores natura, post medium ver, ineunte
iam æstate, tales acquirunt. Qui verò optimum corporis statum
consecuti sunt, soli medio vere maximos pulsus repræsentant.

*Pulsus in æstate
& hyeme quales.*

MATHESES, Quales æstate & hyeme pulsus oriuntur? **GERON**,
Cùm facultas ob aëris intemperiem debilis sit, parui, & languidi
gignuntur. quia verò æstate calor increfcit, hyeme autem immi-
nuitur, illi, quod ob defectum magnitudinis deest, velocitas &
frequentia suppeditat: huic autem tarditas raritasq; imminuti ca-
loris comites adfunt. **MATHESES**, Quos pulsus autumnus pro-
ducit? **GERON**, Cùm inconstans, & naturæ nostræ inimicus sit, vi-
resq;

Pulsus autumnus.

resq; debilitet, languidos generat, in primis autem tribus generibus diuerfos. **MATHESES**, Quos vocas diuerfos? **GERON**, Qui per temporis interualla sibi inuicem succedunt. præterea aliud est diuersitas, quæ Græcis *επιρροφύζια*, aliud inæqualitas, quæ *ἀνισομαλία*

Pulsus diuersi qui dicuntur.

MATHESES, Quando igitur pulsuum diuersitas esse dicitur? **GERON**, Cùm pulsus parui, celeres, & frequentes aliquan diu perseverant: postea autem magni, tardi, rari, paulatim eis succedunt: qui licet diuersi sint & inæquales, nunquam tamen in suo

Pulsuum diuersitas quando.

ordine tactu æquales existunt. **MATHESES**, Cur potissimum diuersi pulsus in autumno reperiuntur? **GERON**, Quia ipse quoq; diuersus est, ac vno eodemq; die, nunc vt circa meridiem, calore æstuat: nunc, putâ manè & vespri, frigore infestat. non autem medijs veris pulsus consequitur, sicut Galeno placuit, qui illū mixtam calidi & frigidi naturam habere vt hoc, existimauit. **MATHE-**

In autumno cur diuersi potissimum pulsus.

MATHESES, Quot menses singulis anni temporibus attribuendos censes? **GERON**, Secundum medicinæ professores certus eorum numerus obseruari non solet. nam ipsi pro æris ratione partes anni iudicant, vocantq; tunc ver, quando ille temperatus est: æstatem autem vbi calor & siccitas excellit: autumnum verò, cùm frigus & siccitas: sicut hyemem, cùm frigidus & humidus aër dominatur, qui ordo à natura institutus est. **MATHESES**, Hæc anni temporum partitio ab astrologorum ratione discrepare videtur, si bene memini, **GERON**, Rectè meministi, nam illi omnia tempora anni aequè longa statuunt, singulisq; tria signa circuli zodiaci attribuant: medicus autem ex sensu illa distinguit. In regione Hip-

Menses singulis anni temporibus qui tribuendi secundum medicos.

pocrates Thaso ver ab æquinoctio, quod hyemem sequitur, ad vergiliarum ortum, siue ad septimum Maij diem perdurat. æstas inde incipit, & ad arcturi, siue ad decimum quintum Septembris diem continuatur, duratq; ad menses quatuor, & dies decem. autumnus ab arcturo exoriens vergilijs occiduis desinit, sic vt duos ferè menses absoluat. hyems ab occasu vergiliarum, siue calendis Nouembris incipiens, quatuor menses, diesq; decem, vt æstas, absoluit. Quid opus est verbis, alia regio hæc anni tempora longiora: illa breuiora pro ipsius situ habet. **MATHESES**, Manèntne semper singuli anni temporum status similes? **GERON**, Non, sed sæpius admodum mutantur. nam vt Hippocrates docet, æstas interdum etiam verī, & hoc nonnunquam hyemi simile apparet. atque id nonnunquam calore æstuantī respondet. Si igitur quodlibet anni tempus frigidum fuerit, pulsus, quales in hyeme:

Anni tempora quomodo variant apud astrologos & medicos.

si verò calidum, quales in æstate, apparebunt. atq; ita de alijs anni temporibus, vbi natiua sua temperamenta non seruarint, censendum erit. **MATHESES**, Quid de varietate regionum adfers, ea-

Anni temporum status dissimiles.

Pulsus pro regionum diuersitate quifiant.

démne in his quæ in anni temporibus ratio seruanda est:

GERON, Quidni? siquidem in vehementer calidis, pulsus sicut in mediaestate produciuntur: in valdè frigidis, quales in media hyeme: in temperatis, quales in medio vere. idem iudicatio etiam de alijs aëris circumflui statibus. nam calidæ, regionibus calidis: frigidæ, frigidis: temperatæ, medio veri consimiles existunt. MATHETES, Perge obsecro reliquos pulsus causarum secundariorum enumerare.

Pulsus somni quales.

GERON, Somni incipientis pulsus minores, rariores, & languidioresprehenduntur. vbi iam alimentum fuerit elaboratum, maiores, tardiores, rariores, & vehementiores. At si diutius æquo somnus protrahatur, pulsus item imbecilles, & parui euadunt: tardi autem & rari permanent. MATHETES, Cur initio somni pulsus tales gignuntur, quales iam retulisti? GERON, Quia tunc calor naturalis ad interiora viscera, exterioribus membris relictis, deferitur, vbi ciborum, quos in alimentum sibi conficere nititur, materia obruitur grauaturq̃. quanuis autem vitalis facultatis officium non sit cibos concoquere & transmutare: tamen hæc & aliæ omnes, quæ corpus inuicem gubernant, consortij lege afficiuntur. MATHETES, Ob quid pulsus maiores ac vehementiores fieri dixisti, vbi alimentum iam per somnum est elaboratum? GERON, Ob calorem rursus augescentem, & facultatem confirmatam. nam calor innatus, quem cibi per initia somni grauarent, ijs modò paulatim confectis, & in alimentum assumptis, valentior euadit. MATHETES, Cur tardiores & rariores ponis? GERON, Id Galeni sententiæ non est consentaneum: quanquam sic esse videatur ijs, qui arteriæ summisionem percipere nequeunt. nam pulsus dormientium velocius summittitur, minus autem & tardius eleuatur. quare partim est celer, nempe summisione: partim tardior, putâ eleuatione. nam maior in illis ob fuliginosa excrementa eiicienda necessitas ingruit, quæ tunc redundant, quando concoctiones in ventriculo, iecore, venis, arterijs, ac in toto corporis habitu obeunt. calor autem adeò magnus in illis non est, qui refrigerari postulet, cum aucta pulsus magnitudo ei satisfacere possit. MATHETES, Cur rariores existunt? GERON, Quia exterior quies in pulsu dormientium, externæ vigilantium similis existit, nec quicquam in ea variat: ob quod rarior dici non deberet: quanquam illis talis videatur, qui summisionem arteriæ non percipiunt. nam omne tempus summisionis, quæ maior est quàm eleuatio, in dormientibus, tempori quietis adiungunt, eoque falsâ raritatis species apparet. Adhæc eidem quieti etiam tempus eleuationis partis latentis addunt. nam exiguam eleua-

Pulsus dormientium qualis.

- elevationis partem sentiunt: maiorem, tanquam minus exercitati ignorant. quanuis etiam in tangendis pulsibus periti, non omnes elevationis & submissionis arteriarum partes sentire possint, vt qui illas non attingant. *MATHESES*, Suntne pulsus in quouis somno conuulsiles? *GERON*, Non, quia hic non vnus est generis, sed alius salubris, alius insalubris. salubris autem dicitur, vbi calor innatus, ad interiora, alimenti acquirendi gratia, vtpote defatigatus, & siccatus, fertur: tandiu verò iste perseverat, donec succi, quibus calor sese recreat, elaborentur. Notandum autem duos caloris innati motus esse peculiare: vnum magis ei proprium & primarium, cum foras mouetur, vt perficiendis animalium muneribus adsit: alterum dum intrò fertur, & se alimenti recipiendi gratia in seipsum colligit. *MATHESES*, Qui somnus est insalubris? *GERON*, Qui diutius perseverat, grauis, profundusq; in quo calor nativus intrò diutissime retinetur, non alimenti causa, sed quia imminutus est exhaustusq; vt vix tuendis visceribus satis esse possit: vel quòd humore copiosissimo, qui ipsum remoratur, & foras prodire non permittit, impeditus sit. *MATHESES*, Quomodo Greci hunc somnum appellant? *GERON*, *Κῶμα*. Latini soporem. in hoc igitur parui, tardi, rari, & imbecilli fiunt, eò quòd facultas obfessa sit, & calor decreuerit. Quòd si minores, tardiores, rariores, & imbecilliores euaserint, totus motus ferè interit, & mors in propinquo est, quæ comaticis, & carum experiuntibus frequenter superuenit. *MATHESES*, Quid propriè per carum intelligis? *GERON*, Omnium motionum sensuumq; præter spirationem, priuationem. *MATHESES*, Quales pulsus sunt eorum, qui subito ex somno expergescunt? *GERON*, Magni, celeres, frequentes, vehementes, vt non nihil vibrent, sed mox ad mediocritatem reuertantur. Est autem expergefactio duplex, vna spontanea, altera violenta. hæc fit dum homo euigilare cogitur ex vociferatu, in somnio terrifico, tactu molesto, vel ex re alia simili. Cum itaq; violenta ista expergefactio corpus inflammet, quando facultatem subito irritat, caloremq; naturalem ab interioribus ad malum, si quod accadat, propulsandum euocat, pulsus magni, celeres, crebri, & vehementes eduntur. nam calor est auctus, & facultas irritata. Vibratio autem simul euenit, eò quòd calor vniuersè cieatur, sed protinus desinat. vibrati enim pulsus ob summum caloris incrementum euenire solent, præsertim si arteriæ non fuerint molles. At in eo qui sponte est experrectus, pulsus non tam magni, celeres, crebri, & vehementes fiunt: vibrati autem rarissime, quanquam exercitatos non lateat. *MATHESES*, Quando spontanea & naturalis fit expergefactio? *GERON*, Cum

Somnus alius salubris, alius insalubris.

Caloris nativus motus duo.

Insalubris.

Sopor, & quales in eo fiunt pulsus

Carum quid propriè.

Pulsus subito expergescentium.

Expergefactio duplex.

Violenta.

Pulsuum vibrationum causa.

Spontanea eius pulsus.

natiuus calor humore fatiatus, quo per somnum in visceribus nutritus est, temperie sua recuperata (nam humidior ex sicciore euasit) proprio suo motu ad exteriorum membrorum officia iuanda, reuertitur. Quia verò interea dum alimenta conficiuntur, copiosa humidorum fuliginum materia, in ipsummet calorem natium, meatusq; & partes, quæ ad extimam cutim vsque habentur, surrepsit, non ipse adeò expeditè & facile ad exteriora transit. Vt igitur fumosos hosce vapores excutiat, dissipetq; & meatus expurget, ac totum deniq; corpus sibi peruium faciat, primos pulsus magnos, celeres, crebros, & vehementes sibi adhibet: atq; hos cum maiori impetu elaborat, corpus recalescit, facultasque irritatur.

Exercitia quos efficiant pulsus.

His similes pulsus exercitia moderata initio efficiunt: immoderata paruos, celeres, creberrimos, & imbecilles. valde autem immoderata admodum paruos, tardos, raros, & imbecilles. si continuata fuerint, donec facultas resoluatur, ei peculiares oboriuntur. MATHETES, Quare labores moderati pulsus vehementes excitant? GERON, Quia facultas omnes vires eis perficiendis adhibet, exequiturq;. nam ipsa irritata, vehementiores motus profert. Præterea pulsandi necessitas partim ob caloris incrementum, partim ob spiritus exhaustos augetur, eoq; magni, celeres, & crebri fiunt. Immoderati verò, quia vires exoluunt, pulsus languidos, paruos, & caloris augmenti gratia creberrimos, non tamen velocissimos. nam summa celeritas facultati resolutæ non accommodata est, eoque celerrimorum loco frequentissimi succedunt.

Labores moderati cur pulsus vehementes excitent.

Labores immoderati quos faciunt pulsus.

At labores immodici nimium (in quibus is qui se exercet, sæpè & diu quietem desiderat, iterumque ad laborem, quem vix exequi potest, redire compellitur) pulsus valde paruos, & languidos, tardos autem & raros tum propter hanc, tum propter caloris innati decrementum efficiunt, quod ex euacuatione nimia, & spirituum exhalatione est subsecutum. MATHETES, Quid si facultas omnino fuerit resoluta? GERON, Tunc vermiculares, & deficientes pulsus huic proprii nascuntur. MATHETES, Quæ hæcenus dixisti, de puris intelligo, quid si impura immodicè exercentur? GERON, In ijs plurimi succi ad ventriculos eorum confluere, pulsusque pro diuersis qualitatibus & casibus, qui tunc eueniunt, immutare solent. Porro si ei qui omnibus ex æquo succis scatet, Græcis *αθηθωρεως* dicitur, pulmo & thorax affectus sit, quam primum velociter exerceri ceperit, in spirandi difficultatem incidet, & pro huius ratione pulsus eiusdem quoque variabuntur, quos alii fortè ob exercitationem prouenisse putarent.

Pulsus facultatis resolutæ.

Pulsus ex exercitijs corporum impariorum.

MATHETES, Quales pulsus ex balneis calidis fieri solent? GERON,

- GERON, Ex moderatis magni, celeres, crebri, imbecilli: ex
 valdè immoderatis, nimium tardi, creberrimi & languidi. *Pulsus ex bal-*
 MATHETES. Non miror quòd magni, celeres, crebri inde proueni- *nearum vsu quia*
 ant: sed cur vehementes generentur, ignoro. GERON, Id inde ac- *les.*
 cidit, quòd balnea alios calefacere, alios refrigerare soleant: alios *Balneorum com-*
 rursus humectare: alios exicare: hos euacuare, illos replere. MATHETES, Quanam re calefaciunt? GERON, Aëre & aqua calida, si- *moda quæ.*
 cut eodem aëre, eademq; aqua refrigerant, dum innatum calorem
 resoluunt, spirituumq; essentiam exhauriunt. Cæterum balnea
 humectant lauacris, & aque irrigatione, iisdemq; contrà exiccant.
 nam si quis diutius ijs vtatur, corpus siccum euadit, eò quòd ca-
 lor aque, casu id præster. Replent autem balnea, eò quòd alimen-
 tum ad partes exteriores trahant, si quis statim à cibo eis inside-
 at. euacuant autem ieiunos, dum sudores eliciunt. Cæterum alia
 commoda balnea præstant, dum sudores abstergunt, densata
 aperiunt, meatus recludunt, expurgantq; temperiem inæqualem
 corrigunt, lassitudinem tollunt. His si quis opportunè & medio-
 criter fruatur commodis, temperamentum moderatum acqui-
 ret, vires augebit, & vehementes inde pulsus consequetur. contrà
 si abutatur, vel intempestiuo ingressu, vel longiore infessu, facul-
 tatem offendet, quæ languidos & paruos pulsus, ob calorem verò
 auctum, celeres, & crebros gignet. Quod si abuti illis pergat,
 minimos, tardos, creberrimos, & languidos edet: quia per nimi-
 am euacuationem resolutionemq; viribus destituetur: vnde eti-
 am animi defectiones, quæ *συνίπται* Græcis dicuntur, accidunt, *Pulsus formican-*
 quas pulsus formicantes præcedunt. Vbi quis ex balneo quo im- *tes defectiones*
 modicè abusus est, exierit, corpusq; refrixerit, tales fiunt pulsus, *præcedunt.*
 quales calor imminutus, & facultas imbecillis gignere consuevit.
 MATHETES, Quos pulsus frigida balnea efficiunt? GERON, Par-
 uos, tardos, raros, imbecilliores, aut magnos, vehementes & mo- *Balnea frigida*
 deratos. MATHETES, Quæ causa est eiusmodi pulsum? GERON, *quos faciunt pul-*
 Calor imminutus, & facultas affecta, quæ imbecilliores quidem, *sus.*
 non tamen accuratè languidos efficit, idq; si frigus aquæ, cui insi-
 detur, intra corpus penetrauerit, immutaueritq; viscera. quòd si
 illud interiora non penetrauerit, sed potius lauantem calefecerit,
 id casu fieri dicemus. Coniuncta autem facultas, quæ validior est
 quàm dispersa, auxilio erit, vt pulsus magni & vehementes fiant,
 non autem celeres & crebri, eò quòd magnitudo sola vsui satis
 potest facere. MATHETES, Quos pulsus cibus & inedia efficiunt?
 GERON, Copiosus facultatem grauans, inæquales & im- *Pulsus ex cibo*
 moderatos: moderatus autem magnos, celeres, crebros, fre- *& inedia qui fia-*
 quentes, exiguus immutat pulsus, sicut moderatus, sed minùs, nec *ant.*

Cibus abundans. diu. MATHETES, Cur abundans cibus eiusmodi pulsus inaequa-
les generat? GERON, Quia facultas valdè impeditur premiturq̃,
sicut antea est explicatum. MATHETES, Cur inordinatos edit?
GERON, Quia ordo perturbatur idè, quòd facultas nunc sese eri-
gat, nunc declinet, ac iterum collectis viribus exurgat: quod non
statò, nec certo tempore agit: quia onere prohibetur. MATHETES, Cur moderatus cibus calorem augeat, non possum satis
præceptor intelligere. GERON, Quia nunc qualitas caloris in
nobis intenditur: nunc essentia eius in nobis crescit, vnde ani-
mal bifariam quoq̃ calidiùs fieri contingit: vel quòd plus calido-
rum humorum, vt sanguinis, aut bilis contraxerit: vel quòd eos
calidiores quàm antea habeat. MATHETES, Magni igitur pulsus
celeres & crebri fiunt, quòd cibi calorem promoueant, atque
ea de causa nos excalefaciant? GERON, Sic existimo, non so-
lùm autem calor auctus in ijs, qui mediocriter cibum assumpse-
runt, sed etiam facultas robusta pulsus tales efficit. MATHETES,
Cur ipsa ex cibis inualescit? GERON, Quia illi temperamentum
corporis attemperant. hæc enim dissolueretur, eò quòd ca-
lor corporum mixturam depascatur, nisi per cibos iterum resi-
ceretur, atque hæc est altera magnitudinis pulsus & vehementie
ocasio. Sic porrò de crudis succis intelligendum: quòd dum
concoquuntur, vertunturque in alimentum, robur facultati ad-
dant, augeantq̃ calorem. MATHET. Parcùsne cibus etiam pulsus
reddit maiores, celeriores, crebriores, & vehementiores, sicut mo-
deratus? GERON, Non adeò manifestè, licet periti deprehendant:
citò autem abolentur, quia pauci cibi celeriter absumuntur. atq̃
sic pulsus ex cibis immutantur cùm nutrire incipiunt. qualitates
enim ciborum, antequàm in nutrimentum vertantur, aliter pro
sua ratione pulsus immutant. Quippe lactuca tandiù refrigerat,
quandiu coquitur: cùm autem nutrire inciperit, caloris natui ef-
ficientiam auget. Item potus & cibi frigidi eousq̃ refrigerant, pul-
susq̃ pro frigoris ratione immutant, donec euincantur, fiantq̃
alimentum. MATHETES, Quos pulsus cibi penuria adfert? GERON,
Quia facultatem dissoluit, primo fiunt parui, celeres, crebri, &
languidi: deinde paulatim minores, tardiores, rariores, & langui-
diores: postea minimi, tardissimi, creberrimi, languidissimi: no-
uissimè formicantes, qui falsò veloces videntur, vt antea de his
proditum est. MATHETES, Quales pulsus ex vini potu fiunt?
GERON, Quales ex cibo, sed in hoc differunt, quòd qui ex
vini potu proueniunt, statim fiunt, citòq̃ desinant, præterea cele-
riori & maiori, quàm vehementiores & frequentiores exi-
stant. MATHETES, Cur ex vino maiores pulsus fiunt, quàm ex ci-
bis?

*Facultas cur fiat
robustior ex ci-
bis.*

*Pulsus ex cibi
penuria qui.*

*Pulsus ex vini
cerenissimèq̃ potu
quales.*

bis: GERON, Quia illud magna ex parte calidius est, quàm cibus. ea de causa etiam pulsus ob calorem auctum maiores & celeriores fiunt: ex cibo autem magis vehementes. Nam essentia alimentii ex cibus quò est densior, ac solidis membris similior, eò temperamentum gratus est, & firmitus. Porro ex cibus maior est pulsus frequentia, eò quòd magnitudo & celeritas tanta non est, quanta ex vino, quæ necessitati satisfaceret. MATHESES, Quid de potu cereuisiæ adfers, cuius loco vini in multis regionibus vsus est. GERON, Eodem modo pulsus illa variat, quo & vinum: sed hoc magis, illud minùs. Nam quæ cereuisiæ tenuiores, non autem adeò calidæ sunt, minùs magnos & celeres pulsus efficiunt: vehementes autem, paulò postea. quæ verò sunt calidiores, quàm nonnulla vina, vt amaræ, acres, crassæ, largiùs calefaciunt corpora, eòq; magnum, & celerem pulsus magis excitant. Id autem obseruandum erit in omni potus genere, paruusne sit, an moderatus, vel superfluous, MATHESES, Quos tandem pulsus faciunt animi perturbationes obsecro?

Cereuisiæ potus quos faciat pulsus.

GERON, Ira altum, magnum, celerem, crebrum, & vehementem: lætitia magnum, tardum, rarum, moderatum: tristitia paruum, tardum, rarum, languidum: timor recens celerem, inordinatum, inæqualem: inueteratus eundem habet, qualem tristitia. MATHESES, Cur ira pulsus illos quos iam recitasti, generat? GERON, Eò quòd per eam spiritus citò effundantur, sanguisq; ad exteriora erumpat: atq; hæc eò magis agitatione accendantur. quòd autem vehementes edat, facultatis irritatio efficit. MATHESES, Quid eam irritat? GERON, Quod ipsam infestat, siue humores sint noxij, quos perferre nolit, sed potiùs eijcere conetur, vt in morborum solutionibus, quas *nevrois* Græci nominant: siue motus coactus, ut in exercitijs: siue dolor, cum quo natura pugnat: siue aduersi quippiam, quod primùm facultatem rationalem, deinde vitalem consortij lege afficit, vt hostes, & terrores. MATHESES, Cur non similes iam dictis in lætitia quoque statuisti? GERON, Quia, etsi in hac etiam spirituum & sanguinis ad exteriora motus fiat: tamen non tam velociter, sed lentius obitur, vt in quo non adeò feruidi spiritus, & humores, sicut in ira, reddantur. atq; ideo sola pulsuum magnitudo in ea augetur, celeritatis & frequentia expers, vt quæ sine his vsui satis esse possit. MATHESES, Cur non vehementem, sed eius loco moderatum posuisti? GERON, Quia facultas non incitatur, nec inualescit, eòq; in mediocritate perseverat: sin autem lætitia ingens fuerit, in qua multi spiritus digerantur, pulsus sequentur contrarij, nempe pauci, crebri, & languidi: nouissimè formicantes, & mors ipsa. MATHESES, Quæ tristi-

Pulsus perturbationum quas les.

*Ira.
Lætitia.
Tristitia.
Timoris.*

Facultatem quid irritat.

Pulsus lætitia.

Pulsuum tristitia causa.

Timoris.

Pulsus quales edantur, si affectiones commiscantur.

Amoris pulsus qui.

Concubitus pulsus proprii.

tia pulsuum causa est: GERON, Motus contrarius, qui spiritus & sanguinem tardè introducit, exteriora membra calore, & viribus destituens. MATHETES, Cur timoris pulsus magnitudine potius & vehementia, quàm in totum à tristitia dicatis differentes, & iræ contrarios protulisti? GERON, Quia ille spiritus & sanguinem subito ad interiora reuocat: id quod pallor, tremor, & extremarum partium frigus testatur, præsertim in effeminatis timore perculsis. MATHETES, Ob quid in eo pulsus inæquales, & inordinatiprehenduntur? GERON, Quia copia humorum facultatem præmit, affluxuq; tumultuario grauat, perperam vibratus pulsus minori ascribitur, cum is ex calore aucto, & valida facultate foras prorumpente, duroq; simul instrumento procreetur. atque hæc de recenti timore intelligi debent. nam inueteratus non subitum ad interiora motum, sed lentum, vt tristitia reddit, cui etiam similes pulsus repræsentat. MATHETES, Possuntne animi affectiones commisceri? GERON, Possunt. nam ira sæpè cum timore hominem inuadit: quando etiam pulsus inæquales habet, non quidem sua sponte (semper enim tales haberent) sed quia hic illi adiunctus est. Merito igitur tunc varij & inæquales apparent, cum non solum à diuersis causis, sed etiam à natura contrarijs immutentur. nam pulsus alti, magni, celères, & vehementes ob vindictæ cupiditatem existunt, vtpote facultati foras celeriter prodeunt irritatq; familiares: humiles autem parui, tardi, & languidi intermiscuntur, quia timor accipietidi, quàm spes dandimaior est. Quamobrem vtriq; pro causæ vincientis natura, variari inuicem videntur, ac nunc ira, nunc metus superat. MATHE. Cuius alterius animi affectionis pulsus habes, & quales ipsi sunt? GERON, Amoris, cuius inæquales, nominis expertes, & inordinati existunt. MATHE. Quare tales habet? GERON, Quia aliq; quoq; perturbationes animi, vt tristitia, & gaudium, ei adiunctæ sunt. si melancholica etiam sollicitudo accedat, multò molestior erit affectio, quæ hominem macilentum, cogitabundumq; de hominum, vel rerum quas amat elegantia, reddit: aliàs nullus proprius amoris pulsus est Hippocrati. quia arteriæ nihil amatorij in pulsu, sed perturbatum amantis animum indicant. In verecundis siue sceminitis, siue puellis vtriusq; sexus pulsus fiunt inæquales, sicut etiam in timen- 35 tibus: sed hoc intercedit discriminis, quod timor naturalis quamprimùm desinat: formido autem penè perseueret, pulsusq; mutatio in ea continuetur, etiam si frequentius arteriam explores. MATHETES, Sontne etiam pulsus proprii concubitus inueniri? GERON, Ira, eiusq; mediocris, existunt magni moderati, & vehementes moderati. quia cum superfluum seminis recrementum excernit, 40

excernit, vires alleuat, mentem exhilarat, vapores fuliginosos excutit. **MATHESES**, Quales immodicæ coitionis pulsus sunt? **GERON**, Parui, celeres, crebri, & languidi. nam vires post laborem, aut motum validum, aut grauem animi perturbationem, debilitantur: celeres autem, & crebri, tum propter spiritus exhausti penuriam (sic enim pulsus necessitas augetur) tum quod ex motu incalcescat, in illa apparent. **MATHESES**, Qui pulsus nimium immodicæ proprii sunt? **GERON**, Parui, tardi, crebri, languidi. quia enim ipsa plurimos spiritus euacuat, vires resoluit, corpusque siccatur. Atque hæc de pulsuum origine, differentia, causisque hoc loco suffecerint: nunc ad respirationem, quam eundem usum & rationem ac illos habere dixi, reuertar, repetamque nonnulla nuper dicta ut sequentia melius intelligantur.

Respiratio duplex est: propria, & accidentaria: illa inspiratio vocatur, qua aer in pulmones, eiusque asperas arterias & priores cerebri sinus, thorace dilatato, attrahitur: hæc expiratio, qua aer & vapores fuliginosi, ex iam dictis membris, thorace submisso (ut supra docui) efferuntur. atque ea duplici quiete constat: cuius prior per inspirationem brevis est, altera per expirationem longior. **MATHESES**, Quot sunt respirationis differentiæ? **GERON**, Tres ab essentia aeris inspirati, vel spatio quod thorax respirando percurrit, sumuntur. unde alia magna, alia parua, alia mediocris vocatur. Tres item à temporis spatio petuntur, quo ipsæ perficiuntur, ut velox, tarda, mediocris: & totidem à quietis tempore, ut frequens, rarior, illi contraria, & mediocris: sed cum tardio rem à singulis differentiis ademeris, sex tantum remanebunt. **MATHESES**, Quæ magna est? **GERON**, In qua thorax in omnem dimensionem multum eleuatur, vel copiosus aer partibus respiratoriis sanis trahitur: nec non thorax, magna vi musculorum intercostalium attollitur, aut multus aer fuliginoso vapore mixtus, expellitur. **MATHESES**, Quæ parua? **GERON**, In qua omnia iam dicta contraria eueniunt. **MATHESES**, Quæ velox siue celeris vocatur respiratio? **GERON**, In qua thorax paucio tempore multum spatij perficit. **MATHESES**, Quæ tarda nuncupatur? **GERON**, In qua contrarium accidit. **MATHESES**, Quæ frequens seu crebra dicitur? **GERON**, In qua thorax breuissimo tempore quiescit. rara, in qua longissimo. **MATHESES**, Quot, & quæ sunt respirationis causæ continententes, optime præceptor?

GERON, Tres, ac prima vsus est, seu vrgens necessitas, eaque maior & minor: illa sanè, qua natius calor in corde per ipsam refrigeratur: hæc autem, qua spiritus animalis in cerebro (ut antea docui) ex aere per nares ad illud inspirato, & vitali spiritu in plexu

reticulari plenius elaborato, nutritur. Altera est, idonea facultatis animalis vis, siue robur, quo thorax & aliae partes respiratoriae mouentur. tertia, thorax & aliae partes respiratoriae, dum facultati obediunt, eò quòd temperata, & ab impedimentis libera existant. **MATHESES**, Hæc ita habere credo. sed quæ magnam & velocem respirationem efficiunt? **GERON**, Necessitas alterutra, vel utraq; vrgentior, facultas animalis robusta: quanquam ea quoq; imbecilla, magna & celeris respiratio fieri possit: multum autem imbecille, si vsus postulet, in vicē magnæ & celeris, frequens substituat. necnon instrumentum facultati obediens. **MATHESES**

Magna & velocis respirationis causa.

Parua, tarda, frequentis & raras causa.

Quid efficit respirationem paruam, tardam, frequentem, & raram? **GERON**, Vna ex causis contrarijs, vt solus vel calor natiuus valde imminutus, vel sola inualida facultas, vel sola instrumenti inobedientia, reliquis duabus non immutatis. Ex tribus iam dictis, nunc duæ, nunc tres concurrunt: non tamen necesse est, vt

omnes causæ contrariæ simul adsint. At frequentiore respirationem, partium hinc dicatarum angustia, & dolor, auctusq; calor natiuus gignit: raritatem autem delirium, aut calor imminutus. **MATHESES**, Quid magna respiratio indicat? **GERON**, Calorem natiuum, vel ascititium adauctum, vel mentis alienationem testatur. **MATHESES**, Quid paruam? **GERON**, Dolorem partium, quæ respirationi seruiunt, vel caloris natiui refrigerationē. **MATHESES**, Quid rursus velox notat? **GERON**, Calorem naturalem increuisse, vel partes respiratorias angustiores euasisse, vel eadē dolore cum febris infestari. **MATHESES**, Quid significat tarda respiratio? **GERON**, Calorem insitum decreuisse, vel partes respiratorias sine caloris incremento, dolere. **MATHESES**, Frequens, aut rara tandem quid ostendit? **GERON**, Calorem natiuum auctiorem esse factum, partis respiratoriae dolorem, citra caloris incrementum: sicut rara, calorem refrixisse, vel mentem esse alienatam portendit. Porro nullæ ex his sex respirationis speciebus, seu difficultatibus spirandi, affectum aliquem absolute & firmiter declarant: eò quòd singulæ seorsum duabus, vt paucissimis sint communes. **MATHESES**, Quomodo igitur certò affectus ex respiratione potero cognoscere? **GERON**, Si compositas inuicem diligenter obserues. de quibus postea audies, vbi de affectuum

Respirationes compositæ certò affectus signant.

signis tractabimus. nunc me quieti committam. Cras tempestiuus me accedas.

Ioannis

Ioannis Guintherij Ander-
naci Medici

DE VETERI ET NOVA MEDICINA
COGNOSCENDA, COM-

MENTARII PRIMI

DIALOGVS SEPTIMVS.



10

ERON, Cum iam omnium corporis humani partium naturam eiusque facultates, & actiones, seu officia, ex quibus vita nostra, bonaque valetudo consistit, intellexeris: proximum est, ut nunc ea tibi recenseam, quae aduersam facere soleant. Nam sine illorum notitia

15

& obseruatione, reliqua omnia, quae hactenus audiuiisti, parum aut nihil ad institutum tibi profutura essent. Tu ergo diligenter animum aduertas, ijs, quae deinceps sum tibi communicaturus. si aequalis similarium partium essentiae, seu qualitatum primarum temperatio, & decens compositarum structura, aptaque ambarum

20

connexio, bonus corporis status, sanitas, seu prospera valetudo existit, ac dicitur: certe inaequalis, ac illi contrarius, malus erit, aduersaque valetudo, & morbus iure a nobis, sicut Graecis νόσος, siue νόσημα, siue ἀσθενεία κατὰ φύσιν nominabitur. Ac summi medicinae

Mali status corporis tria genera: morbus, causa, symptoma.

25

authores, tria mali huius status corporis genera constituerunt: nempe morbum ipsum, causas eiusdem, & quae illi superueniunt acciduntque: Graeci συνημματα, Latini casus vocant, quae actionem eius partis quam obsident, impediunt. MATHE. Quot igitur sunt morborum genera? GERON, Duo. vnum, quod ex intemperie

Morborum genera duo.

30

primarum qualitatum, tum simplicium, tum compositarum, in singulis partibus prouenit: alterum, quod in compositis, seu instrumentarijs ex vitata conformatione, magnitudine, numero, & vnione contrahitur, vel (si mauis dicere) quod ex structura naturali contraria generatur. MATHESES, Qui morbi similarium proprii sunt? GERON, Qui ex calidi, frigidi, humidi, & sicci intem-

Similarium proprii morbi.

35

perie proueniunt, si Galeno credimus. Sin autem penitus rem perpendamus, non solum illi ex hac, sed etiam ex ipsarum structura oriri solent: uti si quae male sit effecta, hoc est breuior, vel maior euaserit, quam conuenit. nam si vnaquaeque illarum non solum temperiem ex quatuor qualitatibus, sed etiam iustam magnitudinem, certamque figuram a natura accepit, certe ex his quoque

Non solum ex intemperie, sed etiam ex mala structura morbi similarium.

40

violatis morbi ipsis obuenire possunt. nec non etiam ex peculiari partium forma laesa proueniunt. cum enim haec actionum

Morbi ex peculiari partium forma.

*Morbi ex secundis
qualitatibus.*

*Morbi ex cerebri
essentia.*

*Actionem offendi
non solum ab
intemperie.*

*Morbi maligni
non ex primis
qualitatibus.*

*Morbi ex vitia-
ta forma, tempe-
rie, & materia.*

causa sit, & illi eam impedire ac offendere soleat, cur non etiam morbus ex forma, quæ læsa est actio, ex vitioso temperamento contracta illis annumerari debeat? Præterea morbi similibus partibus adueniunt non solum ex primis qualitatibus, sed etiam ex secundis. **MATHESES**, Quomodo id fieri poterit? **GERON**, Im-
pressiones rerum, ob duritiem in partibus difficilius recipiuntur, & factæ pertinacius retinentur: vnde duro præditi cerebro imaginibus & simulacris fuscipiendis inepti apparent, quamuis memoria plurimum valeant. cum autem partes duriores flecti non facile possint, molliores autem, non firmam satis naturam
habeant, utraque ad motiones sunt inhabiles. Iam etiam cerebri
essentiæ natura vitia similiarum procreare potest, nam quibus crassa illa obtigit, non tardum, hebesque ingenium consequuntur, ut qui tenuem ipsam ab initio sortiti sunt, acre & felix consequuntur. Ex raritate cutis, humores immodicè dissipantur, sudoresque
largius digeruntur. Ex densitate cutis, parcius quam expedit, eucuantur. Vbi cornea oculi membrana proprio colore destituta est, visionem offendit. cum autem ventriculus acriori quam expedit sensu præditus est, vomere & singultire solet, alioque modo in actionibus suis turbari, ut Galenus quoque docet. Hæc autem
vitia non in morbis partium instrumentariarum ab illo comprehenduntur, sed ad similes pertinere videntur: non tamen eiusmodi sunt, quales primis qualitatibus attribuuntur. aliud namque est actionem à crassitie partium offendi, aliud à temperamento vitioso, aliud à raritate, vel densitate, aliud à calido, vel humido. Qui dicunt morbum esse non solum intemperiem ipsam, sed etiam quod intemperiem sequitur, à Galeno dissentiant. nam is cum de similiarum partium morbis disputat, solius intemperaturæ ex primis qualitatibus mentionem facit. **MATHESES**, Ergo aliunde etiam morbi similiarum partium, quam ex primis qualitatibus proveniunt? **GERON**, Indubiè, sicut paulò antè dixi: ut febres pestilentes, morbus gallicus, & qui maligni vocantur: nec non quos venena toto genere lethalia concitant. propterea hi quoque auxilijs non calidis, frigidis, humidis, siccis, oppugnantur: sed his quæ tota essentiæ suæ natura agunt, ac singulares vires, non
evidentes qualitates obtinent. Præterea cum hæc tria, nempe propriæ formæ, temperies, & idonea materia singulas partes constituent, rationi consentaneum est, ut morbi quidam singulis illis attribuantur, quorum beneficio illæ rectè valent, & officia sua probe exercent. **MATHESES**, Quæ materiæ vitia dicuntur? **GERON**, Si pa-
laxior, aut astrictior: tenuior, aut crassior: rarior, aut densior: mollior, aut durior: vel alieno quodam colore infecta red-

- et reddatur, aut si acutiore, vel obtusiore sensu sit prædita. hæc enim non semper intemperiem, sed etiam sæpius materiæ paucitatem, & abundantiam sequuntur: quemadmodum etiam magnitudo, & conformatio ob diuersam illius conditionem variantur. *Morbiformæ!*
- 5 **MATHESES**, Qui morbi ad formam referendi videntur? **GERON**, Omnes qui maligni dicuntur, sicut ij qui ex primis illis qualitatibus oriuntur, ad intemperiem pertinent. Porro nonnulla vitia ex prædictis ad similes partes non spectant: nonnulla morbos his partibus proprios excitant, ab illis, quos primæ qualitates gignunt, omnino differentes. **MATHESES**, Quamobrem? **GERON**, Nam quæ mala ex magnitudine, conformatione, duritie, mollitie, colore, sapore, crassitie, tenuitate, raritate, densitate, laxitate, & astrictione in similibus partibus generantur, non ad illarum structuram, sed ad instrumentarias spectant. **MATHESES**
- 15 **Similarium compositio**, prædictorumne vitio corrumpitur? **GERON**, Minime, quia illarum actiones integre permanent, quocumque ex illis affecto. **MATHESES**, Maligni igitur diuersi generis sunt ab illis, qui ex primis qualitatibus concitantur? **GERON**, Sunt utique, siue autem eos ad formam, siue ad temperamentum, siue ad
- 20 occultas qualitates referre velis, nihil refert: quanuis tamen melius formæ quàm alteri cuiquam attribuantur. siquidem partium similarium natura vniformis existit, quæ maximè mutari per huiusmodi morbos solet, quod febres pestilentes indicant, in quibus ægrorum cutis vario colore, & omni alia qualitate perinde
- 25 afficitur, vt sibi similis, & vndequaque simplex, sicut in alijs morbis dici nequeat. Est itaque similarium partium forma actionum earundem causa, eaque magis quàm temperies: & sicut actionum vis & robur ei ascribuntur, sic vitia quoque in illa esse possunt, quæ morbi ex tota, vel in tota essentia partium Galeno appellantur. *Forma similarium actionum causa.*
- 30 **MATHESES**, Duo morborum genera similibus partibus propria numerasti, atque vnum ex intemperie, alterum ex tota partium essentia provenire dixisti, nunc oro qui, & quot in vnoquoque genere inueniri soleant, exponas. **GERON**, Qualitatum primarum excessus, octo morbos in hoc genere progignit: simplices quidem
- 35 quatuor, cum singule qualitates exuperant: compositi vero etiam totidem, sic vt duæ qualitates inter se iunctæ, calor & frigus, cum humore & siccitate excedant. **MATHESES**, Potestne morbus aliquis ex solo calore aut frigore contrahi? **GERON**, Galenus sanè
- 40 siccam affectionem esse, eoque frigida & humida remedia postulare tradit: nunc autem affirmare id videtur, cum febrem in solo calore constituit. *Morbi ex tota essentia.* *Octo morbi similarium.* *Morbi ne ex solo calore & frigore.* *Galenus variis.* **MATHESES**, Quid tu sentis? **GERON**, Id quod rei

natura docet, nempe solius caloris excessu morbos nasci posse. quod enim veteres quidam dixerunt, facultatem calori excedenti, humorem autem frigori vincenti superuenire, similitudinem quidem veri habet, sed aliqua ex parte falsum est. quamuis enim calor siccitatem sibi asciscat, non tamen ilico, sed postquam vis ipsius diu inualuerit, id efficit: nec omnis siccitas, quæ ex caloris efficacia prodit, talem generat intemperiem, qualis inter morbos recenseri debeat. *MATHETES*, Quantum igitur illam exuperare oportet? *GERON*, Vt partis affectæ actionibus insigniter incommodet: aliâs morbi autor esse nequit. Idem de frigidis morbis intelligas. licet enim frigus vitata concoctione humores procreet: non tamen celeriter, aut ita eximie semper, vt propter illos intemperies morboſa putari queat. *MATHETES*, Quot modis composita sit intemperies? *GERON*, Duobus: vno, cum solæ ipsæ qualitates exuperant: altero, cum humor quoque affluit, in quo duplex vincat qualitas. At hoc morbi genus, quod ex humorum collectione nascitur, tumoremq; contra naturam excitat, ad instrumenta refertur, de quibus postea agemus. *MATHETES*, Vt omnia quæ iam dixisti, melius retineam, paucis repetas. *GERON*, Prima ac summa morborum genera tria existunt, quæ diuersas corporis partes infestare solent: vnum quod similes: alterum quod instrumentarias: tertium quod vtrasque communiter affligit. propria verò similium etiam in tribus consistunt, nempe in materiæ immoderatione, vel in temperamenti intemperie, vel in totius essentia, aut formæ corruptela. *MATHETES*, Quæ materia dicitur immoderata? *GERON*, Mollior, aut durior: laxior aut attritior: tenuior, aut crassior: rarior, aut densior quam naturæ conuenit. *MATHETES*, Quæ & quot intemperies similiarum partium morbos pariunt? *GERON*, Primarum qualitatum tum simplicium, vt calida, frigida, humida, sicca: tum compositarum, vt calida humida: vel calida sicca: item frigida humida, aut frigida sicca. *MATHETES*, Quæ nomina vniuscuiusq; intemperiei morbis induntur? *GERON*, Nulla ferè propria, sed quodammodo circumscribuntur: vt calidæ, febris, exustio in igne, aut in sole, aut calor nimius ex motu, aut alia causa excitatus: frigidæ, maximus totius corporis vel partis algor, quo homo nonnunquam emoritur, vel pars à corpore decidit, vel morbum attonitum, comitalem, tremorem, aut conuulsionem experitur: humidæ, cum pars quædam adeo resoluta est, & mollis apparet, vt actionem suam obire nequeat, idq; cum nulla materia extrinsecus affluit. siccæ, marcor: quo vel totum corpus, vel pars aliqua, vt os, velut in sabulum putredine resolutum contabescit. *MATHETES*, Quomodo appellantur mor-

Intemperies composita quot modis fiat.

Summa morborum genera.

Propria similiarum.

Materia immoderata.

Intemperies morbos parientes quot.

Calida.

Frigida.

Humida.

Sicca.

- tur morbi qualitatū compositarum, quos nuper retulisti GERON, Soli absq̃ humoribus difficulter cognosci possunt, nisi valdè sint insignes, eoque nullis certis nominibus donati sunt. Qui autem materiam habent coniunctam, neminem latere possunt, vt
- 5 qui tumorem edant, vnde etiam sua habent nomina: verbi gratia, Intemperies calida & humida, cui sanguis est additus, inflammatio, Grecis φλεγμονή dicitur. Calida, sicca, quę bilem habet coniunctam, gręcè ἐρυθρινή, sicut ἥρωης vocatur, latino caret nomine. Frigida & humida, pituitę particeps, οἰδημα gręcè nuncupatur,
- 10 qui laxus tumor est, prementi digito cedens. Frigida & sicca, qualis bilis atra est, scirrhus, hoc est, tumor induratus, & cancer. At si huiusmodi tumores non ex vno humore, sed ex mixtis generentur, tunc etiam nomen ab eo, qui in ipsis vincit, appellationem sortiuntur. interdum enim phlegmone erysipelatodes vocatur,
- 15 hoc est, inflammatio ex sanguine, & copiosiore bile contracta: aliās œdematodes, in qua pituita magis quàm sanguis abundat: aliās scirrholes, quando humor melancholicus magis quàm sanguis vincit. Sic de erysipelate phlegmatode, aut œdematode, aut scirrhole dicendum est, cum aut sanguis, aut pituita, aut atra bilis, flauam superat. Rursus œdema phlegmatodes, aut erysipelatodes, aut scirrholes, tumor vocatur, in quo sanguis, vel bilis flaua, vel atra pituitam vincit. Cum autem scirrhus phlegmatodes, erysipelatodes, aut œdematodes dicitur, tumor est, in quo sanguis, aut bilis, aut pituita copiosior est quàm atra bilis, quàm flaua,
- 25 quàm pituita. atq̃ hi tam simplices, quàm compositi similium partium morbi existunt: nunc ad instrumentarias me conferam. MATHESES, Antequam id facias, obsecro explices quid essentię totius partis nomine comprehendas. GERON, Spiritum & calorem ipsius genuinum, facultates, & ipsarum formam. MATHESES,
- 30 Qui sunt essentię, seu formę ipsius morbi: GERON, Maligni, qui partium essentiam primario, & per se oppugnant, vtpote venenosi, partim ex veneno intus genito, sicut est morbus comitialis, strangulatus vteri ex putri semine, animi defectiones ex grumo putrido, singularis cordis palpitatio: partim ex assumpto veneno, aconito, taxo, ephemero, cantharide, lepote marino, & similibus.
- 35 Huius generis sunt contagiosi, qui ex virulentarum bestiarum oecursu affligunt: nec non pestilentes, ex aëre syderum viribus infecto prouenientes, sicut febris, & bubo pestilens, carbunculus, & id genus alij similes: nonnulliq̃ minus graues, vt exanthemata, rubrę purpuręq̃ cutis maculę, pituitę eruptiones quędam consuetę: insuper morbi quidam insoliti & noui, calores ardentes,
- 40 graues difficultates spirandi, febris sudorifera, morbus gallicus,

Morbi absq̃ humoribus.

Phlegmone.

Erysipelas.

Oedema.

Scirrhus.

Essentia totius partis quid.

Morbi essentię seu formę.

Maligni ex veneno intus genito vel assumpto.

Contagiosi.

Pestilentes.

Morbi insolidi.

Morbi instrumentarium partium.

Conformationis morbi.

Læuitatis & asperitatis vitia.

Dilatatio.

Asstrictio.

& elephantiasis : nec non qui sequentibus temporibus ex nouis syderum concurfionibus, & permiffionibus superueniunt. Atq; hæ omnes differentiæ ad vnum fimalaris morbi genus referuntur. miror veteres medicos illas prætermiffisse. MATHET. Qui, & quot morbi funt partium instrumentarium? GERON, Sicut quinq; ad illas conficiendas integra requiruntur, nempe congrua conformatio, magnitudo, numerus, coniunctio, & fimalarium continuitas : ita fi vitientur, totidem morbi emergent. imò plures, fi illæ magis diuidantur. Conformatio, quæ Græcis *ὑποπλασία* vocatur, deprauata, tria morborum genera nomine fuo comprehendit. vnum quod in figura: alterum quod in afperitate & læuitate: tertium quod in foliditate, & meatibus confiftit. ac in fingulis hisce alij morbi proueniunt. Figura nanq; partium multis modis variare folet: recta curuari, curua dirigi, omnesq; flecti, reflecti, diftorqueri, inæqualiter crefcere, aut minui : & quæ rotundæ, interdum quadratæ fiunt, & hæ alias figuras affumunt. MATHETES, In quibus variatæ huiufmodi figuræ apparent? GERON, In fimis natura, aut iftu, aut cafu: nec non in varis, vacijs, planijs : item in ijs quibus caput rotundum, vel oblongum, vel quadratum nimis exiftit: in fractura malè curata, luxatione, callo eminentiore articulis innato: adhæc in corde, pulmone, & alijs partibus malè figuratis. Notandum autem figuram in alijs partibus primariò, ac per fe corrumpi: in alijs fecdariò, ac cafu : ficut pulmo, cùm thorax anguftior eft redditus, formam rectam feruare nequit. MATHET. Quot vitia in læuitate & afperitate ftatuuntur? GERON, Vnicum duntaxat genus, nempe quo partes quæ læues effe debent, exafperentur: quæ verò afperæ, læuigentur. Quando enim afpera arteria nimis exafperata eft, raucedinem adfert : lingua autem & fauces, tulfim excitant. aliàs interdum offa quædam exafperata magis quàm par eft, alio modo infeftant. idem vitium etiam apparet, cùm ventriculus natura afper, aut vterus, nimium læuis & lubricus euafit, ficut etiam offa nonnulla. MATHETES, Quos morbos partes meatibus quibusdam, feu cauitatibus donatæ, & natura folidæ experiuntur? GERON, Meatus quidem, per quos contenta diftribuuntur, multis funt oportuni, dum vel plures, vel pauciores apparent : latiores, vel anguftiores, vel omnino funt aboliti. folidæ autem partes, cùm nimium excavatæ fuerint, & meatus aliquos acceperint. MATHETES, Exemplà vitiorum per cenfeas. GERON, Dilatatio nimia, vt in oculo, pupillæ, venæ in varice, arteriæ in aneurifmate : aut huic in eodem genere contraria, afstrictio, & obftructio. MATHETES, Quomodo fit afstrictio? GERON, Si meatus anguftiores ob caulam exteriorem reddantur:

tur: veluti si cutis meatus ex siccitate densiores fiant, conuiuant: aspera verò arteria & gula, ex angina premente coarctentur. *MATHETES, Quo pacto fit obstructio?* GERON, Cùm meatus materia influente, intusque hærente, quasi infarcti, angustiores

Obstructio.

5 euadunt, sicut frequenter in cute, venis, arterijs, intestinis, omnibusque ductibus euenire solet. *MATHETES, Qui morbi sunt partium earum, quæ sinibus suis ac receptaculis recipiunt continentur?* GERON, Nimia capacitas, ut ventriculi, thoracis, & scroti: rursus immoderata coarctatio, ut thoracis summisio, quæ ad tabem de-

Morbi receptaculorum.

10 ducit, tantaque ventriculi astrictio per medicamentorum vim inducitur, ut conuenientem cibi copiam excipere nequeat. Huc etiam spectat repletio, præsertim ventriculorum cerebri, ut in apoplexia: vteri, in mola: vesicæ, in calculo: quamuis hic morbus dici non debeat, sed morbi causa. *MATHETES, Quot morbi vitio ma-*

15 gnitudinis nascuntur? GERON, Duo. nam partium moles vel supra modum excedit, vel imminuitur plus quam ratio postulat. *MATHETES, In quibus?* GERON, In capite amplo, oculis magnis, lingua grandi (salua tamen eius essentia) in mammis, testibus

Morbi ex magnitudine.

20 utrisque, vel altero ipsorum, in struma, & cæteris tumoribus contra naturam sic adauctis, ut actionem offendant. Ea verò magnitudo naturalem statum excedens, raro post natalem diem obtingit, si pars eam sustinens, propriam seruet figuram. *MATHETES, Quando minor partium moles, quam par est, apparet?* GERON,

Cùm vel tota partium essentia, vel membrum aliquod alimenti 25 defectu contabescit, ut caput, oculus, & lingua, singula exigua: digiti, cruraque imminuta. atque hæc vitia vel ab origine sunt nobis annata, vel ex alimenti copia, siue inopia contrahuntur. quæ verò ex humorum affluxu procreata sunt, non illis, sed tumoribus contra naturam annumerari debent. *MATHETES, Quando morbi ex*

Morbi ex numero.

30 corrupto partium numero prouenire solent? GERON, Cùm videlicet vel plures, vel pauciores æquo existunt. *MATHETES, Quales illæ esse solent.* GERON, Vel naturales, sed non necessariae, ut sextus digitus, tertius testiculus: vel naturæ in totum aduersantes, ut verrucæ, calli. *MATHETES, Quando numerus partium minor est,*

35 quam debet? GERON, Cùm ipsæ vel natura ab origine deficiunt, ut in eo qui mancus nascitur: vel postea detrahuntur, sicut in illo, cui manus amputatur, siue partim, siue ex toto. At cùm portio quædam ab instrumento prorsus tollitur, ut ossa, digitus, pes, vena varicosa, glandula indurata, solius numeri morbus vocatur.

40 cùm autem non ex toto, sed ex dimidio adimitur, non solum numeri, sed etiam magnitudinis vitium existit. *MATHETES, Quomodo morbi ex vitiosa compositione fiunt?* GERON, Situ & con-

Compositiones morbi.

nexu contrario, partes enim vel sedibus suis recedunt, peruersoq;
ordine collocantur, vel perperam connectuntur, colliganturq;
Fit namq;, vt quod superiorem locum obtinere debet, inferiorem
occupet: &, vt quod in sinistra consistere decet, ad dextram ver-
gat: nec non, vt quod anteriorem sedem postulat, in posteriore si-
tum sit: aut, vt id longius distet, quod natura propinquius esse cu-
pit: aut, vt quod mediam regionem obsidere oportet, lateri ad-
hæreat: aut, vt quod intus subsistit, extrinsecus extet, sicut cum
pulmonis fibræ per thoracis vulnera exeruntur. **MATHESES**, In
quibus situs ita variat. **GERON**, In quibus artus luxati sunt, aut
omentum, siue intestinum in scrotum prolapsum, manus scapu-
lis admoræ, siue brachijs. **MATHESES**, Quando vicinæ partes non
benè inuicem consentiunt, connectunturq;. **GERON**, Quando
linguæ & penis vincula, ligamentaq; articularum laxa nimium,
intenta, aut rupta fuerint, vel longiora, breuiora: crassiora, tenui-
ora: latiora, aut angustiora: item cum vel oculorū palpebræ, vel la-
bra oris, vulgæ, aniuæ: nec non cum digiti, alię partes siue ab ori-
gine, siue ob vlcus contra naturam coalescunt. Ad hoc genus mor-
bi pertinent etiam prauæ articularum iuncturæ, vt cum is qui a-
lium excipit, sinum vel angustiorē, vel latiorē quā alter re-
quirat, habeat: vel contrā, cum is qui alteri inseritur, crassior iusto
fuerit. Quot igitur modis instrumenti structura corrumpitur,
tot in hoc genere morbi exoriuntur. atq; hi etiam sicut alij omnes
iam commemorati, instrumentis simplicibus ascribuntur. Sunt
enim hæc duplicia, nempe prima & secunda: illa ex similibus
proveniunt, vt musculus, vena, arteria: hæc ex primis bonam vel
malam compositionem sortiuntur, vt digitus: prosperamq; vale-
tudinē, vel aduersam ex eisdem obtinent. **MATHESES**, Qui mor-
bi instrumentariarum partium compositi vocantur. **GERON**,
Qui primariò plures simul partem vnā obsident. Sunt autem
ex his alij proprij: alij accidunt. **MATHESES**, Quando proprij di-
cuntur. **GERON**, Cum duo, aut plures morbi instrumentariam
partem vel eandem, vel diuersas infestant, vt suffusio, & vnguis,
vel rhyas oculi, nam huic morbi isti sunt peculiare: sic nimia ma-
gnitudo & asperitas naturę contraria, linguę. **MATHESES**, Quan-
do morbi accidere solent. **GERON**, Cum pleriq; similiarium par-
tium simplices, vel aliquis compositus, vt inflammatio vnā in-
strumenti particulam, aut singuli singulas obsident. Casu hic mor-
bus compositus, aut plures simul morbi ad totum instrumentum
referuntur, quia similiarium partium morbi simplices aut compositi
toti instrumento ex accidenti attribuuntur, sicut lippitudo, tuni-
cæ coherentis inflammatio, proprius ei morbus est, oculi verò
acci-

Morbi ex situ.

*Morbi compositi
instrumentaria-
rum partium.*

- accidentarius. sic ceratoides tunice erosio tanta, vt rhagoïdes per eam excidat, eoque pupilla torqueatur. hi sanè affectus oculi sunt vitia: licet erosio, ceratoidis mēbranæ: prolapsus rhagoidi, contorsio pupillæ sit peculiaris. Potest etiam in hoc genere proprius
 5 morbus, & accidentarius simul incidere, vt luxatio pariter & inflammatio: sic quidem vt illa primarius instrumenti, hæc autem singularum instrumenti partium morbus existat, instrumenti verò non primarius, nec proprius, sed accidentarius. Quinetiam morbus instrumentarius ei qui ex diuortio, seu dissolutione
 10 continui accidit, coniungi potest, sicut in tumoribus contra naturam fieri solet. *MATHESES*, Quid de quinto morborum genere habes, quod vtriusq; partibus tum similaribus, tum instrumentarijs commune esse retulisti. *GERON*, Si Galeno credimus, vtrumq; continuitatis diuortium solutioq; existit. sin autem rem peniti-
 15 tius, sicut Argenterius & alij quoq; præclari viri inspiciamus, huiusmodi vitium siue morbum instrumentarijs duntaxat propriū, non similaribus pariter communem esse dicemus. *MATHESES*, Quæ res & quomodo vnitas corporis partes diuidunt soluuntq;.
GERON, Primū tenues, & ad incidendum accommodatæ, vt
 20 ensis, telum, ac sagitta: deinde acres & rodentes: postea graues, duræ & obrusæ: tandem, quæ rumpendi facultatem obtinent. non autem vno genere comprehendi possunt. nam quædam ex eis replendo, quædam alio modo vires suas exercent: omnia tamen tendendo rumpunt. *MATHESES*, Quibus nominibus quatuor illa
 25 morborum genera simplicia, in continuitatis solutione appellantur. *GERON*, Diuisio, quæ tenuibus & secantibus efficitur, vulnus
 nobis, Græcis τραύμα, quæ potissimū in carne & vera cute accidit: quæ autem in summa, quam *Ἀνδερμυδία* superius appellauī, ex-
 coriatio nuncupatur: quæ ex acribus accidit, latinè vlcus, ἕλκος. *Vlcus.*
 30 græcè dicitur. quæ ex grauibus & duris fieri solet, generali quidem nomine caret, speciali autem contusio appellatur. quæ à tendinibus prouenit, ruptura, Græcis ρήγμα seu ρήγξις dicitur. His por-
 rò inferiora quædam genera subiiciuntur, quæ singulis partibus propria nomina recipiunt. nam quælibet diuisio, siue in ossibus,
 35 siue in carne, siue in neruo, siue in alia quauis parte facta, vulnus appellatur. cū autem quædam solutio punctim, quædam cesim fiat, illa propriè punctura, ab actionis modo vocatur. hæc etiam vulneris nomen accipit. quæ verò ab acuto & secante alio modo fit, in ossibus capitis, Græcis ἐγκοπή, διμικροπή, & ἑδρα nominatur.
 40 At quæ solutio ex erodentibus prouenit, communē in omnibus nomine vlcus nobis nominatur: in ossibus autem peculiariter caries, Græcis τρεψιδαν. Interdum vlcera quoque ipsa à materia ro- *Caries.*

*Contusio.**Contusa.
Fractura.**Conuulsio quid
signet.**Anuulsio.**Membranis solu-
tis nullum no-
men peculiare
inditum.**Ruptura in mus-
culis & carne.**Anastomosis.**Solutio continui-
tatis.*

dente, quæ partes exulcerat, erosiones vocantur. *MATHESES*, Quomodo partis diuortium vocatur, quod à grauib. & duris rebus extrinsecus accidentibus contrahitur? *GERON*, Eius sanè, quæ ictibus cedere, cogitq; in seipsam & comprimi potest, contusio: sic enim caro, nerui, & molliora puerorum ossa affecta, contusa dicuntur: durioris autem partis, vt ossis comminuti, fractura. Quod si id leuius affectum fuerit, quamuis non propriè contusio, appellari tamen non facillè aliter potest. Porro si caluarie os frangatur, Græcis *ρωγμή*, & *ρήξις*, quasi fissura seu rima nuncupatur. si à tendentibus fiat diuissio, ruptio dicitur: solutio vnionis in neruis Galeno conuulsio vocatur: licet id nominis tensioni illorum magis conueniat, qua ipsi ad originem suam trahuntur, neque id tamen propriè. *MATHESES*, Quàm ob causam? *GERON*, Quia conuulsionis nomen motum vitiatum, non vnionis diuortium medicis significat: in ligamenti, aut partibus instrumentarijs diuissio ex tensione facta, auulsio nominari potest: quæ verò in membranis, tunicis, & alijs partibus tensioni aptis, si carnem & musculos excipias, à tendentibus prouenit, nullo peculiari nomine donata est: quæ in musculis & carne fieri consuevit, generali nomine ruptura, à Græcis *ρήγμα* nominatur. *MATHESES*, Quæ aliæ sunt solutionis species? *GERON*, Hæ simplices quidem sunt vnioersæ: quæ verò à Galeno interdum adiſciuntur, ex illis sunt compositæ: aut eorum numero adscribuntur, verbigratia: si, cum sanguis vel ore venæ alicuius patefacto exit, quod malum Græci *ἀνατόμωσιν* appellant: vel cum ille in venam quandam magno impetu irruit, eamq; copia adeò distendit, vt disrumpatur, *ρήγμαμασμων* Græci vocant: vel cum sanguis parte aliqua ob acrem materiã exesa exit, quæ solutio continuitatis nominari debet, certè ad vulnus, aut rupturam, aut vlcus vitia, illa reducenda sunt. *MATHESES*, Adapertionem igitur vasorum, propriè ne vnionis solutionem dici posse iudicas? *GERON*, Non, sicut nec illud vitium, quo sepiùs ob tenuitatem ipsius, & vasorum tunicarum raritatem exilit, græcè *διπλήθισιν* vocant. Porro affectus ex contusione & corruptione mixtus, græcè *ἐκχύμωσις*, quasi humorum in partem aliquam effusio nobis dicitur. cavitatem autem, quæ ab ictu inducta, citra aliam diuisionem remanet, contusionis species est, & nobis illisio, Græcis *ἐνθλασις*, nuncupatur. Quando exterior partis affectus sedes non diuisa, nec compressa apparet, interior autem pleraq; exigua diuortia indicat, vitium est ex contusione & fractura mixtum, & Græcis *θλάσμα* appellatur. Aliud ex iisdem compositum malum, in quo pars congesta non modò introrsum recedit, sed etiam extrinsecus diuisiones quasdam repræsentat, proprii nominis ex-

pers

pers est. Hęc de morbis simplicibus ex vnitatis diuortio cōtractis, satis esse poterunt: eoq; nunc ad compositos tum similarium, tum dissimilarium partium, accedam. MATHE. Qui similariū existunt?

Partium similarium morbi compositi.

GERON, In quibus diuisio altera alteri coniuncta, vt fractura cum vlcere, aut vlcus cum auulsione, vel erosione, vel ru-

ptura. adhęc vnitatis solutio simplicibus vel compositis similarium, aut instrumentariarum partium morbis associata, vt si vl-

cus cum calida, frigida, humida, & sicca intemperie absq; humoribus infestet: vel si id vnā cum calore & humore, vel cum frigo-

re, & siccitate affligat: vel si idem vlcus simul cum herpete, aut oēdemate, aut scirrhomolestet. MATHESES, Quot modis pars in

his à naturali statu recedit? GERON, Tribus. nam vlceris causa

vnionem suam amittit: ob alia verò calidior, & humidior, siccior-

ue, aut frigidior, & humidior, siue siccior quā natura postulat,

euadit. Adhęc compositus est morbus, cum etiam alia quæuis

Alius morbus compositus.

vnitatis diuisio, alteri morbo, siue similis, siue instrumentariæ

partis, connexa fuerit. Quare si tumor in his postremis tam mag-

nus inhereat, vt actionem vitiet, is morbus existit: atq; tunc pars

affecteda quatuor morbis tentatur, aliās casus tantum morbi est, aut

20 affectio, & dolor. Eodem modo, si erysipelas interdum cum vlce-

re infestet, carbunculus semper cum illo consistit. Cancer & her-

pes frequentius adiuncta habent vlcera, aliquando sine his con-

sistunt. MATHESES, Quid si omnes hi morbi vlceris expertes sint?

GERON, Nihilominus compositi sunt, sicut etiam in intemperie,

25 cui materia affluerit. MATHESES, Quot in totum morbos par-

tium similarium compositos esse dixisti? GERON, Quatuor ex

Galenī sententiā numerantur, nempe calidus simul & humidus,

calidus pariter & siccus: item frigidus & humidus: frigidus atque

siccus, dum scilicet ambæ qualitates supra naturæ modum excel-

30 lunt. Quòd si etiam humorum affluxus his adauctis accedat, toti-

dem quoq; morbi proueniunt, ab illis diuersi, qui citra humo-

rum alluuiem inuadunt. At si omnes partes inflammatae simul &

vulneratae fuerint, tres sanè necessariò, interdum quatuor mor-

bos sustinent. MATHESES, Tumores, quos supra nominasti, sim-

35 plicesne morbi, an compositi censendi sunt? GERON, Compositi.

quia nullus eorum purus ac sincerus existit. MATHESES, Qui dis-

similarium partium compositi morbi sunt? GERON, Qui plures,

atq; diuersas partes simul infestant: accidentarij verò, qui vnā

tantum sedem instrumenti occupant. nam cum omnis inflamma-

40 tio partis, compositus sit morbus, lippitudo autem inflammatio,

hęc sanè etiam compositus morbus erit, tunicæ quidem annatae

proprius, vniuerso autem instrumento accidentarius. MATHESES,

Similarium partium morbi compositi quatuor.

Morbi cum bno morum affluxu.

Dissimilarium partium morbi compositi.

*Morborum differe-
rentia.*

Genera morborū intelligo: quę sunt illorum differētię & species.
 GERON, A compositionis natura, vel excessu, vel defectu,
 alij dicuntur magni, hoc est vehementes seu validi, alij parui: qui-
 dam maximi, minimi, & extremi seu acutissimi. simplices, qui ex
 vna causa conflati sunt: nonnulli compositi, qui cum alio morbo
 à natura sua alieno iunguntur, & inter hos complicati, qui confu-
 si dicuntur, & propria naturę suę ab alio distincta retinent, vt
 tertiana quotidianę coniuncta, sed diuersis horis inuadens. Ad-
 hæc ex causis propinquis quidam morbi vocantur calidi & frigi-
 di, aut humidi & sicci: alij in numero, vel magnitudine, vel
 conformatione, vel coniunctione, vel vnione vitata consistunt. Cę-
 terum alij morbi à remotioribus causis, aut proximis petuntur:
 vnde biliosi & pituitosi appellantur, qui à bile aut pituita nascun-
 tur: quanquam etiam biliosi vocentur, in quibus bilis redundat,
 vel obstruitur. At æstiuui nominantur, qui in æstate gignuntur,
 vt quartanę æstiuę, eię sunt proprij: hyemales, qui per hyemem
 generantur: sicut vnales & autumnales, qui vere & autumnno
 proueniunt. quanuis etiam omnes illi autumnales nominentur,
 qui sicut in autumnno aliās generati, inconstantes sunt, & in-
 certi. Similes illis sunt hi, qui ab ira, tristitia, timore, exercitio
 immodico, somno, vigilia, otio, vel labore contrahuntur. Iam
 nonnulli morbi nomina habent à causis, quę aut ipsos gignunt,
 aut augent, aut fouent, aut tollunt. sicut etiam nonnulli à
 causis euidentibus solum oriuntur, vt febris diaria: nonnulli ab
 occultis, vt putridę: quidam ab externis causis, vt vulnera: qui-
 dam ab internis, vt vlcera. Insuper alij morbi ex primaria causā,
 alij ex accidentaria, alij à putredine, sicut alij ex alijs causis fouen-
 tur incendunturq̃. Adhęc quidam ex propinqua materia exci-
 tantur, vt inflammatio ex sanguine: quidam ex bile, vt erysipelas,
 & herpes: quidam ex pituita, vt oedema, & alterum scirrhi genus.
 Ex remota materia, vt tumores, alij ex cibis biliosis, vel pituitosis,
 vel melancholicis, vel ijs qui sanguinem copiosum gignunt. ex
 materia subiecta alij morbi similes, alij instrumentarij vocan-
 tur: alij singulares, alij generales. sic quidam communes, quod om-
 nes naturas inuadant: quidam proprij dicuntur, quia singulares
 corripunt. nonnulli solidis partibus dicati sunt, qui ab habitu, in
 quo consistunt, vocantur, vt febris hectica. Præterea morbi non-
 nulli pueriles, nonnulli seniles, quod in illis solum, vel magna ex
 parte gignantur, dici solent. Similiter morbi muliebres, cutis,
 neruorum, capitis, cordis ventriculi ex propinquiore, vel remota
 materia nominantur. Adhęc à fine morbi alij leues, alij lethales,
 alij medij, qui nec solui, nec suapte natura accidere possunt. præ-
 terea

terea quidam paulatim, quidam subito gigni dicuntur: quidam primogenij, quidam secundarij, & ex consensu nasci feruntur. Sunt qui per crîsim subito, aut paulatim, idç per sudorem, vel per vrinam, vel alio modo soluantur. alij sunt communes, & genera-
 5 les, Græcis *παγκοινῶν* & *κοινῶν νόσων*, seu *νοσήματα* dicti, sicut autem communes illi multos inuadunt, ita qui græcè *σποράδες*, hoc est, sparsi nominantur, separatim homines corripiunt. Ex communibus autem græcè *ἐνδημοί* appellati, certum semper locum aliquem obtinent, vnde patrij vocari possunt. *Πανδημοί* verò, seu *Πανδημοί*
 10 aliquo anni tempore in regione hac, aut illa grassantur. horum perniciosissimi, qui multos occidunt, pestilentes vocantur. alij in locis calidis, vel frigidis, vel humidis, vel siccis fouentur: alij solidas partes occupant, & in habitu esse dicuntur, vt febris hectica: alij humores, vt febres putridæ: alij spiritus, vt diarîæ. Cæterum
 15 à tempore generationis nonnulli recentes, & noui, nonnulli inueterati vocantur: quidam innati, quidam post natalem diem oriuntur. aliqui in ætatis principio, aliqui in augmento, vel in vigore, aut declinatione consistunt. Quinetiam à tempore, quo ad finem perueniunt, hi breues, illi longi, quidam producti nuncupantur.
 20 *MATHET.* Quæ aliæ sunt morborum differentiæ? *GERON.* Quæ ex proprietatibus, vel accidentibus sumuntur. ille enim mores ipsorum indicant: vnde quidam benigni, quidam maligni dicuntur, nec non hi legitimi & accurati, græcè *ἀκριβοῦς*, illi spurij, siue illegitimi, græcè *νόθοι*. Præter hæc omnia morbi existunt, quorum
 25 alij actiones animales, alij vitales, alij naturales offendunt. atque hi delirium, aut vigiliam, aut lassitudinis sensum, vel dolorem: illi defectiones virium, aliqui sitim excitant. Extant etiam morbi, qui ex corporis qualitatibus nunc arquatū pariunt, nunc inflammationes, & iecoris obstructions: nunc naturalem colorem in
 30 nigrum vertunt, vt lienis obstructions. Ab operibus quoq; nonnulli dicuntur, qui excrementa retineant, vel nimium expellant, vel sanguinem corrumpant, vel pituitam, vel bilem copiosam gignant, vel aliud quid efficiant. A noxa etiam quam inferunt morbi, alij vehementes, alij languidi: hi graues, illi leues dicuntur. A
 35 morus ratione quidam acuti, hoc est, celeres, quidam tardi nominantur: aliqui continui, vel intermittentes: ordinati, vel inordinati: æquales, vel inæquales: incrementales, vel decrementales, vel eundem semper tenorem seruantes: aliqui redeunt, recidimq; facientes: nonnulli in alios transeunt, vt si laterum dolor in peripneumoniam degeneret: nonnulli immobiles, vt qui ex atra bile: nonnulli motu faciles, vt qui ex flaua oriuntur. Postremò aliqui morbi quatuor tempora obtinent, vt qui pau-

*Accidentaria
morborum differ-
rentiæ.*

latim finiuntur: alij duo vel tria, quales per crism soluuntur. Atq[ue] hæ sunt veræ & necessariæ morborum differentiæ. **MATHETES,** Quot sunt accidentariæ? **GERON,** Quæ à rebus externis, siue hominum nomenclaturis, siue alijs captantur, vnde morbi chironij & telephij, vlceraq[ue] chironia, & telephia, vel regius morbus, vel comitalis appellantur. Ita ex loco, vnde originem habuerunt, dicuntur Gallici, Anglici, vel similes. Iam omnia morborum genera, differentias, quantum tibi necesse fuerit, explicatas habes. si quid adhuc de his amplius desideres, apud Argenterium, & alios quosdam recentiores copiosius tractatum comperies. Ego breuitati in hac institutione, quæ iuuenturi potissimum dicata est, studere volui. Cuius rei gratia nunc doctrinæ ordo postulare videtur, vt morborum causas simili compendio tibi exponam. Nulla enim sine harum notitia, & obseruatione, ægris remedia: nulla viuendi ratio commoda præscribi potest: quibus morbi vel curari, vel præcaueri debeant. **MATHETES,** Quot igitur sunt causarum morborum omnium genera?

Morborum causarum genera.

GERON, Quatuor Aristoteli, vt materia, forma, efficiens, atque finis. Galenus his addit vtilitatem, scopum, instrumentum, exemplar, voluntatem, & eam sine qua non potest quicquam fieri. sed non omnes istæ superioribus adiunctæ, præter instrumentum, & eam sine qua non, dictam, necessarias esse puto.

Morbus in qua materia.

MATHETES, In qua materia morbus consistit? **GERON,** In ipsius ægri corpore, cui penitus insidet, sicut imago ceræ impressa, non autem in vicioso humore, licet is efficiendis illis materia quodammodo existat. **MATHETES,** Quid formalis morbi causa existit?

Causa formalis.

Finalis.

GERON, Species ei impressa. **MATHETES,** Quæ finalis dicitur? **GERON,** Ob quam actiones, vel corporis totius, vel partium offenduntur, abolenturq[ue]. **MATHETES,** Quæ efficiens vocatur? **GERON,** Omnium princeps & summa, vt quæ corpus nostrum inuadat, optimumq[ue] eius statum corrumpat.

Instrumentalis.

MATHETES, Quam causam instrumentum nominas? **GERON,** Ea, quæ assumuntur siue medicamina, siue alimenta, per quæ morbus promoueri solet. **MATHE.** Quæ deniq[ue] est, sine qua non potest morbus consistere?

Sine qua non.

GERON, Quæ ei quod fit, præstat, vt actio sine illa nequaquam, cum illa verò facilius, aut citius, aut vehementius fiat. Solet hæc sæpius sub efficiente includi. neque enim hoc efficiens dici potest, quod ad agendum qualitatem ac quantitatem non habet, neque modum ac ordinem seruat. **MATHETES,** Qua ratione, & modo causæ istæ nos ita stare solent? **GERON,** Aliæ internis, aliæ externis iniurijs: ex quibus illæ abditæ, obscuræ, cognatæ naturæ sunt, & insitæ, Græcis *ἰατρικὰς*, quasi præcedentes dicuntur, quas iam inde

- inde ab origine contrahimus : hæc manifestæ, euidentēs, accessoriæ. Inter inſitas rursus aliæ naturales, aliæ naturæ aduerſariæ existunt. *MATHESES*, Quæ naturales? *GERON*, Quæ temporum & ætatum decursu paulatim nos immutant, & ad extremum vſque senium, mortemq; ipsam perducunt, vix vt percipiamus. calor enim natiuus, etsi nos, quouſq; viuimus, alat, tueatur, regatq;: tamen etiam temporis processu, hos velocius, illos tardiùs mutat, ac pro suo cuiusq; vitæ termino conficit, ad quem vix vllus peruenire solet. *MATHESES*, Quæ sunt extra naturam causæ? *GERON*, Semen, matrisq; sanguis ab initio vitiatuſ. ſemen quidem, præſertim patris temperatum, ſimilares quoq; prolis partes temperatas efficit: calidum verò atq; ſiccum, aut frigidum & humidum, ſimiliter quoq; eis temperaturam naturalem ſeu genuinam inducit: cuiusq; etiam vitio pater dum prolem generaret obnoxius fuit, illud huic per ſemen iniectum communicat, vt quod ex vniuerſo detractum corpore, tum morbi, tum cauſæ eiùs vim in ſe contineat. Hac ratione ſenes, valetudinarij, debilesq;, nec non morbis quibuſdam laborare conſueti, liberos ſibi ſimiles iſſdem vitijſ obnoxioſ progignunt. *MATHESES*, Quid maternuſ ſanguis ad morborum generationem conſert? *GERON*, Cùm ille primum foetus ſit alimentum, certè altera temperamenti ſtatuſq; ipſiuſ cauſa eſt, & ſua quoq; vitia, etſi leuiora quàm ſemen, ei imperit inſeritq;: vnde etiam grauida ſummam temperaturæ vim & naturam foetui ſuggerit. Cui nanque cibo, aut potu mater plurimùm aſſueuit, iſ quoq; foetui gratuſ eſt: vnde mulier vinolenta, liberoſ vino deditoſ, pharmacorum ſtudioſa, ad medicamenta procliueſ pariet. Quòd ſi ipſa geſtationiſ tempore quartana febrilaboret, foetum edet, qui poſtea diu illa quoq; conſictabitur: ſi nono menſe laterum inflammationem experiatur, prolem quoque huic vitio opportunaſ gignet: ſi octauo menſe parotide aſſicta fuerit, liberi etiam purulentuſ aureſ per totaſ vitaſ habebunt. *MATHESES*, Mirum eſt foetus non ſolum prima conformatione ex ſemine, ſed etiam toto geſtationiſ tempore, tum ex materia ſanguiniſ, tum ex alijs humoribuſ, atq; alimentis ad morboſ hoſce, aut alioſ procliuioreſ generari. *GERON*, Non eſt quòd mireris, ſi originis noſtræ vim & ſimilitudinem, familiaritateſq; cum foetibuſ perpendaſ. Tanti momenti eſt, ex ſaniſ robuſtiſq; parentibuſ procreari. *MATHESES*, Quid præſtant cauſæ acceſſoriæ extrinſecuſ? *GERON*, Alias ſæpè in nobiſ morborum efficiunt. *MATHESES*, Quot ſunt, quæ morboſ in nobiſ efficiunt? *GERON*, Duæ, quarum prima exterior, altera interior eſt. Atque hæc rursus biſariam ſcinditur, nempe in antecedentem,

*Cauſe morborum naturales.**Non naturales.**Morbi hereditarij.**Cauſe morborum acceſſoriæ.*

*Causæ morbo-
rum effectrices
tres.*

& continentem, quæ etiam proxima vocatur. **MATHESES**, Sunt ergo tres numero causæ omnes, morborum effectrices. **GERON**, Indubiè, nempe exterior seu evidens, quæ foris corpori, aut ijs quæ in illo continentur, aduersatur: deinde continens, quæ in corpore morbo proximè adhærescit: postea antecedens, quæ etiam intra illud fixa prior quàm continens, hanc efficit, excitatq̃. **MATHESES**. Quæ omnium primæ sunt summeq̃ necessariae. **GERON**, Evidentes, vt ex quibus cæteræ proueniant. Ita verò omnes inter se coherent, vt continens ex antecedente, hæc ex euidente de-

*Morbus quando
ex singulis cau-
sis accessorijs gi-
guetur.*

riuetur. cum autem inter se connexæ sunt, euidens primum locum obtinet, postremum continens, medium antecedens. **MATHESES**, Omnis igitur morbus ex tribusne causis progignitur. **GERON**, Nequaquam, sed aliàs ex duabus, aliàs ex vnica. **MATHESES**, Si immodicus cibi potusq̃ vsus, venas adeò diduxerit, disruperitq̃, vt pleuritis inde secuta sit, quæ euidens huius causa dicen-

Causa euidens.

da erit. **GERON**, Cibi immoderatio. **MATHESES**, Quæ anteceden-

Antecedens.

dens. **GERON**, Venarum ruptio, vel diductio, vel sanguinis effluxio, vtraq̃ in corpore posita. **MATHESES**, Quæ causa copię sanguinis lateri impacti, & putrescentis existit. **GERON**, Continens, sed non solum illius, sed etiam febris, quæ ipsam comitatur. **MATHESES**, Quod si febris putrida ex balneorum astringentium vsu accendatur, quam eius causam esse censes. **GERON**, Euidentem, sicut cutis astrictæ, prohibitæq̃ transpirationis antecedentem: & putredinis hinc exortæ, continentem proximamq̃. Atq̃ in his

*Euidens & con-
tinens.*

tria causarum genera connexa videntur. **MATHESES**, In quibus duæ causæ simul apparent. **GERON**, Cum destillatio ex tempestate austrina in pulmonem defertur, quæ arterias obstruat, & anhelationem excitet: vel vbi calculus è rene, motu nimis immoderato delapsus, meatum vrinarium obstruit, euidens & continens. **MATHESES**, Quando vna tantum causa adesse dicitur. **GERON**, Cum vulnus gladii ictu infligitur. At exterior euidensq̃

*Singularum cau-
sarum vsus &
excellentia.*

causa in omni morbo est necessaria: eò quod firmus interiorum habitus, sine graui illius impetu neque labefactari, neq̃ naturalem statum vnquam amittere potest. adhæc maior continentis quàm antecedentis causę vsus existit. **MATHESES**, Suntne aliæ causarum morbos efficientium species & differentię. **GERON**, Procul dubio, nam singulæ interdum sua ui, interdum aliena seu fortuita operantur: verbi gratia, scamonía natura sua corpus nostrum calefacit: cum autem biliosum humorem calidum ac feruidum educit, casu ac fortuito refrigerat. **MATHESES**, Quotuplex ergo est causa efficiens. **GERON**, Triplex, nam vel principalis seu perfecta est, vel adiutrix, vel sine qua nihil effici potest. primo loco dicta,

*Causa efficiens
triplex.*

propria

propria vi id, cuius causa est, etiam sola efficit: secunda, per se quidem nihil prestat, sed efficiendo operi adiumenta suppeditat, unde Græcis rectè *auxillioy* quasi adiutrix, & socia nuncupatur: tertia nullam licet efficiendi vim obtineat, neque quicquam in opus
 5 conferat, tamen nihil sine ipsa fieri potest. *MATHESES*. Exemplis hoc illustres: *GERON*, In purgationibus arte petitis, princeps causa, medicamentum peculiari facultate præditum existit: adiutrix autem vocari debet, temperamentum calidum, quod vniuersis catharticiis inditum est, ut quod illorū vires confirmet augeatq̃.
 10 huiusmodi sunt etiam odorata, quæ illis admisceri solent, virium exacuendarum gratia. At causa sine qua nihil fieri posse dicitur, nativus noster calor est, citra quem medicina esset inefficax. Similiter cum frigida tempestas destillationem in articulis concitat, illa simul cum recrementorum capitis abundantia princeps causa est,
 15 humorum autem tenuitas, adiutrix: articulorum verò imbecillitas, & meatus per quos humor influet laxiores, eius causæ vicem agunt, sine qua nihil præstari potest: huic etiam locus, tempus, & iustrumentum adiungi consuevit. Id porro observatione dignum est, omnem causam efficientem opus suum, quod ei assit,
 20 stit, conservare, augereq̃: ubi verò decesserit, nihil amplius fieri posse: quod autem effectum fuerit, vel breui, vel longo post tempore aboleri. *MATHESES*, Ut causarum efficientium generatiam absolvesti: ita quoq̃ species ipsarum deinceps enumeres.

GERON, Petitioni tuæ acquiescam, ubi te prius admonuerim, alias ipsarum ad vitam degendam esse necessarias, alias non
 25 item. In illis comprehenditur aer, in quo versamur, cibis, potus, motus, quies, somnus, vigilia, quæ excernuntur, aut retinentur, & animi perturbationes. *MATHESES*, Quæ causæ non sunt necessariae? *GERON*, Omnes res quæ fortuito incidunt, ut telum, gladius, lapis, bestia, & id genus aliæ. hæ autem causæ præcaveri arceriq̃ nequeunt: illæ verò observatione possunt. Ex his moderatæ bonam valetudinem conservant: immoderatæ aduersam faciunt: contrariæ amissam restitunt. *MATHESES*, Qualis igitur
 30 aer natura valetudinem bonam tuetur? *GERON*, Qui serenos reddit dies, tenuis, purus, & temperatus. *MATHESES*, Qualis aduersam? *GERON*, Crassus, densus, impurus, contagiosus: multo autem maior efficaciorq̃ eius vis ad morbos excitandos, quam ratio victus existit. id quod in anni temporum, & tempestatum mutatione, nec non in pestilentia, & alijs contagiosis morbis sæpius
 40 experimur. *MATHESES*. Quanam de causa aer morborum auctor est? *GERON*, Vel qualitatum, vel essentiæ vitio, vel subita itinerum, & locorum mutatione. siue enim ille calidior, frigidior,

Princeps causa.
Adiutrix.

Causa sine qua non.

Causarum alie necessariae, alie non item.

Aer natura valetudinem conservans.

Aer quare morborum auctor.

Aër quomodo corpus humanum immutat.

Aëris essentia quot modis corrumpatur.

Cibus, potusque quomodo morborum auctores existant.

humidior & siccior, vel à regione, vel à loci situ, vel ab anni tempore, vel à cœli statu fuerit, spiritus, humores, ipsumque corpus immutat. **MATHESES**, Quomodo? **GERON**, Omnis calor æquo maior, & iecur & lienem inflammat, mentem hebetat, efficitque ut anima deficiat, & sanguis prorumpat. siccitates, acutas febres, lippitudines, tormina, vrinæ difficultatem, articulorum dolores faciunt. per hymbres, longæ febres, alui deiectiones, anginæ, cancro, morbi comitiales, resolutio neruorum, oriuntur. veris quidem status æqualis, naturæque suæ similis, cœlum mite, placidum: regio temperata, locus editior, & apricus, quem perflant Fauoni, salubritatem adferunt. His contraria minus tuta sunt, ut ex quibus complures morbi generentur. **MATHESES**, Si tot modis aëris temperies vitatur, quot essentia ipsius corrumpitur? **GERON**, Varijs. nunc enim vaporum exhalationibus nimium humectatur: nunc terræ, aquæ, cadauerum, & aliarum rerum putridarum expiratione graui inficitur: nunc pestilentiaë seminibus, vel è syderibus demissis, vel in ipso genitis inquinatur: atque ita per inspirationem attractus, in totum corpus distribuitur, spiritusque & humores contagione inficit, ac varios inde morbos, eosque occultos procreat. sicut etiam in peregrinantibus accidit, cum vel graui tempore è sedibus suis discesserint, vel ubi in grauiore regionem venerint. Fit quoque sæpè, ut ex incluso aëre, in liberum, apertumque, & salubrem transitus, imbecillis, & iam recens à morbo conualescentibus pericula afferat. quia aër non solum qui ventis nimium agitur, sed etiam qui nullis perflatur, valetudini bonæ aduersatur. **MATHESES**, Quomodo cibi potionesque morborum auctores esse solent? **GERON**, Si tum qualitate, tum copia naturalem modum excedant, siue tempore intempestiuo, aut ordine præpostero ingerantur. Calida quidem & acria, allium, cœpa, porrum: adhæc vinum vetus, & id genus similia medicamenta, si liberalius assumantur, febrem excitant. Frigida verò, lactuca, cucurbita, melones, pepones, cucumeres, & potus aquæ frigida, cereuisiæ, niuis. nec non medicamenta frigida, altercum, papauer, cicuta, mandragora, similes morbos pariunt. Non solum autem vitiosi natura cibi potusque, sed etiam saluberrimi nimis abundantes frigidos affectus generant. vini enim, licet natura calidi, plenior potio, apoplexiam, morbum comitalem, torporemque producit. **MATHESES**, Defectusne alimenti etiam frigidos morbos, ut excessus concitat? **GERON**, Sunt qui id affirmant ex Galeno persuasi, sed reipsa ille primum siccos parit, deinde vel calidos, ut in his, qui facile accenduntur, & ex inedia in febrem incidunt, vel tandem frigidos & siccos. humore siquidem deficiente, caloreque debili-

debilitato, corpus frigidum & siccum deniq; euadit, non tantum frigidum. Nam quæ potestate calida existunt, nisi prius vincantur, eorumq; vis, quæ in illis latet, caloris nostri beneficio excitetur, non calefaciunt, sed restincto calore refrigerant. Quod si etiam multi cibi non probè concocti lienem obstruant, via caloris natui intercluditur, & pars ipsa refrigeratur, ut in ijs accidit, qui angustiores meatus ab initio fuerint consecuti. **MATHESES**, Quæ alimenta ac medicamina siccis morbos procreant? **GERON**, Quæ exiccandi vim habent, ut acerba, austera, & in nonnullis etiam amara, falsa, & acrida. adhæc parcior humidioris cibi & potionis vsus, nec non inedia corpus exiccant. Cum enim humor perpetuò innati caloris vi digeratur, si minus humidæ materiæ reponi possit, quàm absumatur, siccis tandem morbos sequi necesse est. Interdum alia quoq; ratione forsan alimenta siccis morbos pariunt, si ipsa ob duritiem, meatus obturent, per quos ad omnes corporis partes distribui deberent. Sic enim corpus minus scilicet nutriri potest, eoq; extenuari, tabescere, sicariq; cogitur, sicut accidit, cum iecur crassius viscosusq; humoribus obstruitur. **MATHESES**, Quorum alimentorum medicaminumq; vsus humidos morbos producit? **GERON**, Similium, præsertim aliquantò liberalior: multo autem abundantior etiam frigidos inducit, restincto videlicet calore. Ita quoq; fit, cum plus humoris gignitur quàm dissoluatur, & humida quæ excerni consueuerunt, retinentur. **MATHESES**, Quibus morborum causis excreta retentaq; corporis recrementa subiiciuntur? **GERON**, Quandiu in illo hærescunt, interioribus: cum autem immoderatiùs expelluntur, aut retinentur, euidentibus. **MATHESES**, Quænam sunt illa excrementa? **GERON**, Aluus, vrina, sudor, bilis flaua è fellis vesicula, atra ex liene in ventrem infusa, mucus è naribus & palato, sputum è pectore, lac è mammis. Hæc sanè salubritatem corpori adferunt, si naturæ legibus quotidie euacuentur: sicut etiam sanguis per ora venarum in ano extantium, & menstruus ex utero, semenq; è vasibus genitalibus, statò tempore, aut ex consuetudine effluens. Si verò minus moderatè & intempestiuùs, aut non larga satis, nec qualia conuenit erumpant, aut in totum, vel aliqua ex parte supprimantur, varijs morbis causam præbent: quamuis ipsa his tanquam symptomata superuenire, ac comitari soleant. Nam superfluitates eorum, quæ toto genere naturæ aduersantur, cum molestæ ipsi, atque graues existant, morborum materiam suggerunt: vnde cum plærunque natuius calor vel grauatur, vel opprimitur, omnes eius actiones periclitantur. Est, dum excrementa copiosiora, putredinem, & alienas à natura qualitates grauesq; experta corumpantur: in-

*Quæ siccis morbos
bos gignat.*

*Humidi morbi
vnde proueniunt.*

*Excreta retentaq;
quibus causis
subiiciantur.*

*Excrementa sua
superflua quæ.*

terdum vias meatusq; corporis sic obstruunt, vt alimenta quidem in illud totum distribui, non autem inferius per aluum deijci possint. Sic in morbo iliaco, aut in intestini prolapsu (quoniam id tanquam vinculo constringitur) excrementa infra transmitti nequeunt, sed mole sua corporis partes adeo sæpe onerant, vt vomitione reddantur. Quod si hæc præterea putrescant, ita totum corpus fœtore & praua qualitate inficiunt, vt licet illa rursus deijciantur, homo tamen sæpe mortem subeat. Similia eueniunt, quando vrina, aut menses, aut hæmorrhoides supprimuntur, quibus grauisima succedunt pericula. sic cum aliæ excretiones necessariae cohibentur, varij, & omnigeni morbi prodeunt. Præterea tum subita ciborum suauissimorum repletio, tum immodica repentinaq; excretio, etiam illorum, qui toto genere naturæ aduersi sunt, grauisimos morbos adfert. Idèò suppurati vstionem, aut hydropici incisionem experti, si pus, aut aqua simul ac vnauice effluerit, omnes, vt Hippocrates docuit, commoriuntur. multo magis periclitantur, quibus aliud sine modo fusa sit, aut vrina largius æquo profluit, aut qui sudore resoluuntur. horum enim vires sæpe adeo conuelluntur, vt anima simul deficiat, èd quod non parum spiritus calorisq; cum excrementis digeratur, vnde tum naturales, tum animales functiones languescant, cruciatuq; ac frigidi morbi exoriantur. Quare larga & subita vacuatio periculosa, & naturæ inimica existit, præsertim in *infuetis*: cui respondet etiam sanguinis ex vtero, ex hæmorrhoidibus, ex naribus, aut ex vulnere ampla profusio, vt quæ spiritus, caloremq; natiuum, & vires longè celerius quàm quiduis aliud dissipet, exhauriat, digeritq;. *MATHESES*, Satis de excretis, retentisq; iam discussisti: quomodo motus, & quies morbos possunt excitare?

GERON, Alius motus naturæ, alius voluntati est dicatus. primo alimenta in ventriculum, intestina, venas, & id genus alias partes attrahuntur: excrementa eorum depelluntur: cor verò & arteriæ continuò pulsant. altero, qui nobis exercitatio dicitur musculi & nervi primariò ac voluntate: deinde ossa, ligamenta, venæ, arteriæ, carnes, cætereq; partes ex consecutione, eoq; fortuitò agitantur. *MATHESES*, Quid secundus peragit? *GERON*, Moderatus quidem, calorem natiuum internis in partibus quasi sopitum torpidumq; excitat, diffundit, forasq; educit, & per vniuersum corpus distrahit digeritq;: immoderatus autem dissoluit, sicut eius intermissio illum extinguit. *MATHESES*, Quæ sunt secundi motus seu exercitationis differentiæ? *GERON*, Alia est velox, vt saltatio, pilæq; vsus, digladiatio: alia est robusta & valida, vt fossio, grauis ponderis gestatio, vel sublatio, luctationes:

Morbus ex motu & quiete quomodo fiat.

Motus differentie.

nes: alia vehemens, vt teli ponderosi iaculatio, disci iactatio. MATHESES, Quas singulæ istæ exercitationes, siue labores, aut ope-

Exercitationes.

ræ, mutationes in corporibus edunt? GERON, Velox, corpus densum, & tenue: tarda, rarum & auctum reddit: robusta, firmum

5 durumq; imbecilla, molle & laxum: lenis & parua, crassum, languidum & molle. Atq; hæc quidem ille in suo genere mediocres præstant: naturæ autem vires egressæ, siue perpetuæ ac continentes, morbos concitant. Nam magna defatigatio spiritus, viresq; exhaurit, dissipat, & corpus deniq; refrigerat. eadem mu-

10 sculorum, neruorum, & ligamentorum robur resoluit, membranasq; nonnunquam adeo relaxat, diuellitq;, vt ramicem intesti- norum generet. quinetiam viscera concutit plerumq;, vt tenuiores venas disrumpat: vnde vrinæ profusio, vomitio & nausea, spuitiones, laterum dolores, alijq; affectus subsequuntur. Item

Motus immodici incommoda.

15 sanguis vniuersus ex motu vehementi ita sæpè diffunditur, vt excalfactus liquatusque proprijs sedibus coerceri nequeat, sed his ad apertis foras erumpat, inflammationesq; illis adferat: aut si cohibeatur, capitis dolores, pulsationesq;, & continuas febres concitet. Præterea humores corruptos, qui aliàs quieti, loco ignobili

20 continebantur, & processu temporis à natura concoqui & euinci, tandemq; expelli poterant, irritat, adeoque agitatur, vt postea corpus foetido vapore inquinent, & huc illuc effusi, scabiem, tubercula, varios abscessus, febres putridas, alui profluvia, vomitiones, & id genus alia vitia producant. Quæ de causa consilium est, ne

25 impura corpora, & omnibus ex æquo succis plena, exercitationem, aut labores subeant. MATHESES, Quæ vitia diuturnius otium & quies longa contrahunt? GERON, Cruditates humorum, viscerum obstructions, excrementorum collectiones, calorem nostrum ignauum, ad omnesq; sensus, & mentis actiones segnem:

Otium & quies

30 corpus graue, languidum, torpidumq;, & morbis quàm plurimis opportunum reddit. Postremò hoc aduertendum est, quòd Celsius ex Hippocrate dixit: subitum otium ex nimio calore, & subitum calorem ex nimio otio, sine graui noxa non esse. MATHESES, Quomodo somnus morborum auctor est?

“

“

35 GERON, Si vel longior, vel breuior, vel intempestiuior fuerit. MATHESES, Quem vocas longiorem? GERON, Qui vltra septem, aut octo, aut summum nouem horas durat: breuiorem, qui infra septem finitur: intempestiuiorem, qui interdiu, & statim à cibo captatur. MATHESES, Quare tales sunt insalubres? GERON,

Somnus quomodo morborum existat auctor.

40 Quia longior, cum mouendi, expellendiq; vis, in eo diutius conquiescat, efficit, ne excrementa opportunè foras post concoctionem propellantur: sed cum in cerebro alijsq; corporis parti-

bus coaceruentur, spiritus obscurantur, sensus mentisq; vires torpescunt & debilitantur. vnde qui natura, aut vitio vltra debitum somnolenti sunt, raro ad plenam senectutē perueniunt. Breuior autem noxius est, quod concoctio in eo perfici nequeat: vnde cruditates superueniunt, quæ multiplices & varios morbos generare solent. At qui non conuenienti tempore capitur, nempe interdiu, & præsertim à cibo statim, idē valetudinem offendit, quod cerebrum humidis vaporibus repleat: vnde capitis grauitates, alijsq; frigidi affectus procreantur: adhæc quia ille plæruncq; interrumpitur, concoctio ciborum absolui nequit, eoq; ventriculus acidus ructus edit, & flatibus distenditur. *MATHESES,*

*Somni mediocris
commoda.*

Quis ergo mediocris somnus, & quid commodi ad salubritatem præstat? *GERON,* In quo omnes totius corporis eiusq; partium motus & sensus, animalis functio, ipsaq; mens conquiescit: naturalis autem facultas, maximē concoctio, & retentio corroboratur, vt valentiū officium suum obire possit. In hoc enim calor natiuus visceribus se inserit, vt cibis & humoribus concoquendis non solum in ventriculo, intestinis, & iecore, sed etiam in totius corporis habitu acriter incumbat: per eundem etiam spiritus labore & vigilijs dissipati reficiantur, donec alij ad actiones continuandas sufficiantur, nec non vt vitia coërceantur, quæ naturam opprimere consueuerunt, sicut sanguinis eruptio, alui profluuiū, vomitio, omnesq; aliæ præter sudorem, immodicę euacuationes.

Sudor.

MATHESES, Cur sudor emanat per somnum? *GERON,* Quia humores, vbi alimentum probē concoctum distributumq; fuerit, in extimas summāsque corporis partes erumpunt. quamuis illæ etiam in eo frigescant, tegmentisq; simul indigeant. *MATHESES,*

Vigilia.

Quid vigilia immodica detrimenti corporibus accersit? *GERON,* Spiritus exhaurit, corpus & præsertim cerebrum exiccat, sensus obtundit, animum perturbat, calorem natiuum, humidumq; primogenium dissipat: vnde læsa concoctione, multæ cruditates proueniunt, bilis inflammatio, phrenitis, & continuę febres, acutiq; morbi excitantur. *MATHESES,* Cur animi perturbationes inter evidentes morborum causas retulisti?

*Animi perturbationes
cur eiusdem morbo-
rum cause.*

GERON, Quia cum spiritus turbidi, motusq; à recta ratione auersi sunt, corpus nostrum valdē immutant, & natiui calorem nunc intrā ad cor: nunc extrā ab illo transferunt. At nullus ferē eorum vsus, etiamsi moderati sint, præterquam gaudij apparet. hoc enim cor exhilarat, spiritusq; lætitia recreat, calorem natiuum excitat, sanguinem & humores extenuat, quibus salubritas acquiritur, sanitasq; conseruatur. *MATHE,* Quot numero sunt affectus animi? *GERON,* Sex, vt metus seu timor, mœstitia seu mœror, sollicitu-

*Animi affectus
quot & quas exci-
tent mutatio-
nes.*

- licitudo seu anxietas, gaudium, ira, & verecundia. MATHE. Quid
 singulę efficiunt? GERON, Timor seu metus spiritus, & sanguinem *Timor.*
 ad interiora viscera contrahit, defertq; sic, vt extremę partes refri-
 gerentur, corpus expallescat, trematq; vox interrumpatur, & vi-
 res deniq; conuellantur. Eodem modo mœror seu mœstitia, anxie *Mœror.*
 tas & verecundia, calorem & spiritum genuinum intrò reuocant: *Anxietas.*
 ille quidem subitò, hæc autem paulatim & leuiter. extremas igitur *Verecundia.*
 partes refrigerant, non tamen vt somnus & aëris circumflui
 frigus: interiores calfaciunt: eò quòd is calor, ac spiritus in cor so-
 lum recurrant. Gaudium ingens, & insolitū, spiritum caloremq; *Gaudium.*
 natium tam largitè e corde in extremas corporis partes profun-
 dit, vt id omnino refrigeratum, vel animi defectionem, vel mor-
 tem subitam experiatur, sicut nonnullis etiam accidit, qui omni-
 no vel senes, vel languidi, vel imbecilles essent. Ira verò similiter, *Ira.*
 calorem & spiritum e corde foras educit, non quidem vt gaudi-
 um paulatim, sed repentē permouet. nemo tamen ex omnibus
 ob illam subitò interijt, nec calore dissipato exanimatus fuit. MA-
 THETES, Quidnam sit, dum in corde ira aggregatur, exardescitq;
 GERON, Calor inflammatus in omnes partes defertur, vt homo
 extra sese commotus feratur. ira quidem primū spiritus, dein-
 de humores, corpusq; calfacit, inflammat, & sæpè in diariam, vel
 continuam febrem rapit: vel si vitiosus humor inest, in putridam,
 aliòsue affectus ex bile feruida, & humoribus confusis perducit.
 Si sollicitudo & anxietas infestat, spiritum caloremq; tum intrò
 tum extrà vehementer compellit, motu tamen inæquali. Quæ
 porrò aliæ restant perturbationes animi, ad superiora referri de-
 bent. nam omnes hæc immoderatè spiritum, & calorem simul
 consumunt. atque hæc de necessarijs & euidentibus causis, quæ
 nos immutare possunt, indicauimus. restant adhuc quædam non
 necessarię, de quibus nunc pauca solū tibi adferam, ne iusto sim
 prolixior. MATHE. Quænam illæ sunt? GERON, Quæ potis-
 simū declinari possunt, veluti sunt, primum caldaria, quæ nos
 immodicè calefaciunt, exiccantque, tandem autem calore dissi-
 pato refrigerant: deinde etiam balneę, quæ vel refrigerant & hu-
 mectant, vel calefaciunt & humectant, vel calefaciunt & exic-
 cant, sicut vel arte factæ ex herbis, ad affectus curandos efficaci-
 bus, vel naturales, vt sulfureę, nitrosæ, aluminosę, salfulæ, ferratæ,
 bituminosæ, æratæ, plumbeæ, auratæ, chalcanthinæ, marinæ.
 Nam quacūq; prædite qualitate fuerint, eadem corpus nostrum
 afficiunt. idem vnctiones, emplastra, oleaq; agunt, dum vires suas
 calore nostro excitatas, per cutis meatus altius corpori inferunt.
 quinetiam uestimenta fomentaq; corpori admoventur, ne insi-

*Cause morbo-
rum non neces-
sarię.*

*Concubitus quæ
mala adferat.*

*Morbi ex causis
internis.*

tus corporis calor exhalet. præterea florum, aromatūq; odores, fumi, aut vapores, siue manifesta, siue abdita vi præditi, dum spiritu excipiuntur, interiores quasdam partes euidenter immutant. Eodem modo medicamenta, vel imprudenter à nobis, vel consultò assumpta, primis, vel secundis, vel tertijs qualitativis, vel tota essentia spiritus, humores, & corpus imbuunt. Ex his autem, quæ corpori extrinsecus eueniunt, sanguinis è naribus, aut è vulnere profusio ad valetudinem corporis necessaria non est: vt quæ copiosior calorem natiuū, spiritus & vires corporis exhauriat. Concubitus etiam nulli vtilis est, nisi cui antea consuetus, nunc diu sit intermissus. huic enim moderatus conducit, non frequens numero, sed natura, pro ætatis & corporis ratione: quia sic naturam semine, quasi onere grauata leuat. MATHESES, Quid immoderatus incommodi affert? GERON, Spiritus calorem, humoremq; primogenium consumit, concoctionem perturbat, mentem atq; sensus debilitat conuellitq;: corpus enervat, soluit, torpidumq; efficit. eodē modo cibi: quanquam minùs periculi ex illo, quàm ex his immoderatoribus accedere videatur. His motibus etiam clamores & vociferationes adiungi debent: ex quibus interdum venæ, arteriæ, & membranæ diuelluntur. Huc quoq; dolores acerbissimi, & intollerabiles, motusq; exteriores pertinent, vt nauigatio, vectio, gestatio, inequitatio, & id genus alijs: quibus humores & spiritus grauius exagitantur. Eiusdem generis sunt frictiones vehementes, duræ, siccæq;: nec non contusiones, casus, attritus, vulnera, ferarum morsus, bestiarum virulentarum ictus, aliæq; fortuita, & quasi fatalia: quibus corpora nostra varijs modis subiiciuntur. MATHESES, Solentne etiam morbi ab internis quibusdam causis, sicut ab exterioribus, quas hætenus enumerasti, prouenire? GERON, Maximè. ijq; ex spiritu, sanguine, humoribus, excrementis, & ijs quæ in partibus corporis continentur. Atq; hæc sanè quandiu intra nature leges perseverant, salubritatis causæ non nuncupantur: si verò illas excedant, morborum effectrices. MATHESES, Quibus modis id fieri solet? GERON, Abundantia & defectu. quanuis autem spiritus exuperare nequeat, tamen deficere per magnam eius penuriam consuevit. Porro calculus, lumbrici, & alia id genus, quæ toto genere naturæ aduersantur, semper, dum adsunt, exuperant: nunquam autem deficiunt. At sanguis, humores, & excrementa, siue excellant nimium, siue pauciora sint, quàm conuenit, vitiosa existunt. Cùm solus tantum sanguis alijs humoribus copiosior est, Græcis πλεονέχεια: cùm reliqui humores redundant, καχεξυμία appellatur. Porro omnium etiam quæ nobis contenta dicuntur, intemperies, tum simplex, tum

tum coniugata, nec non crassities, tenuitas, durities, mollities, lentor, & acrimonia: item putredo & totius essentiae corruptela, ad vitiositatem pertinent. atq; in hac omnes interiores morborum causae consistunt, quas euidentes hoc pacto producant. Calor sa-
 5 nē ingens aëris nos ambientis, spiritum caloremq; natium immi-
 nit: sic balnea & medicamenta dissipandi facultate praedita, ali-
 menti parioris vsus, & inedia, excretio immodica, labor, mo-
 tusq; omnis vehementior, vigiliae, gaudium insolitum, concubi-
 tus intempestiuus, dolor intolerabilis, sanguinem & humores
 10 tandem consumunt, spiritus caloremq; innatum debilitant, & hu-
 mores coarctant. Sic aër crassus, nebulosus, aut nubilus, frigi-
 dusq; alimentorum abundantia, excrementorum vberior pro-
 uentus, otium diuturnum, somnus largior altiorq; metus, tristi-
 tia, & id genus alia, si modum exceßerint, genuinum calorem suf-
 15 focant, extinguuntq;. Aër putridus, & grauis odoris, alimenta
 corrupta, putridaq; & sine ordine assumpta, excrementorum sup-
 pressio, meatum obstructio, atque inde perspiratus impeditus,
 spiritus, humores, contentaq; inficiunt. otium & somnus si praeter
 debitum protrahantur, idem praestant, sed fortuito, & quia
 20 excrementa augent. Adhuc aër pestilens, & alio modo infectus,
 venena hausta, seminis putridi, aliorumq; superfluatorum retentio,
 venenatorum contagio, et bestiarum virulentarū morsus ictusue,
 spiritum caloremq; natium, & totam sanguinis humorumq; ali-
 orum essentiam corrumpunt, et morbis obnoxios reddunt. At ca-
 25 lor nimius aëris nobis circumflui, & eorum quae nos circundant,
 quaeq; cutim densant, nec non ciborum potionumq; & medica-
 mentorum calidorum vsus; item excrementorum suppressio, me-
 atuum obstructio, putredoq; inde nata, exercitatio motusq; ve-
 hemens, ira & vigilia, calidam intemperiem spiritibus, sanguini,
 30 alijsq; contentis inferunt: sicut frigidam inuehit contrarius supe-
 rior aër, & alia quae nos extrinsecus ambiunt, supra recitatis con-
 traria: item similibus alimentorum parior, vel liberalior vsus,
 medicamenta frigida, larga excretio, magna superfluitatum sup-
 pressio, otium, motus immoderatus, somnus, metus atq; tristitia,
 35 sicca aëris tempestas, & ea quae nobis occurrunt, siccandi vi praedi-
 ta, cibus potusq; tenuis, & inedia, medicamentaq; extenuantia,
 euacuatio immodica, motus vehementior, vigilia, mœror, solli-
 citudo, siccam intemperiem promouent: humidiorē autē dies
 pluuij, balnea ex dulci aqua, praecipue secundum cibum, potio
 40 liberalior, alimentorum humidiorum esus, minor excremento-
 rum euacuatio, vita otiosa, somnus largus, animus hilaris & quie-
 tus. MATHESES, Qualitatum primarum vitia ex quibus proue-

Calor natiuus
quomodo suffocatur.

ad id, infirmitas
quae a frigore
procedit.

ad id, infirmitas
quae a frigore
procedit.

Spiritus & hu-
mores inficiunt.

ad id, infirmitas
quae a frigore
procedit.

Sanguinem cor-
rumpunt.

ad id, infirmitas
quae a frigore
procedit.

niant, & augeantur percensuisti: quæ aliarum sunt causæ evident-
 tes: GERON, Crassæ cibi & potus materiæ, vt panis fermenti &
 salis expers, caro maiorum animantium, pisces, vinum rubrum,
 spiritus humoresq; crassos, & similis naturæ excrementa profe-
 runt, similiter etiam, sed fortuito, quæcunq; refrigerare & den-
 sare docuimus. Alimenta verò subtilis materiæ, potusq; similis li-
 beralius assumptus, tenues illos generat: sicut lentos, aut acres, si-
 milia tum alimenta, tum medicamenta. Eadem ratione humores
 siue excrementa, cibis aut medicamentis proprijs indurescunt,
 aut molliuntur, sicut etiam calidis & siccis, aut valdè humidis, va-
 porosisq; MATHETES, Quæ spiritus & humores exagitant? GE-
 RON, Ea quæ illos valdè extenuant, aut inflammant. MATHETES,
 Quæ subito comprimunt, aut vehementer commouent? GERON,
 Dolor acerbis, nimia exercitatio, ira, timor, & omnes tum corpo-
 ris, tum animi perturbationes. MATHETES, Evidentes causæ di-
 uersæne vires obtinent? GERON, Ita, aliæ nanq; materiam mor-
 bis suppeditant, vt alimenta, & excrementa: aliæ illam inmut-
 tant, solasq; ei qualitates impertunt, sicut aëris & eorum quæ
 nos ambiunt, intemperies, motus, quies, somnus, vigilia, & ani-
 mi perturbationes, quæ rariùs morbos excitare solent. MATHE-
 T. Quomodo interiores morborum causæ ab evidentibus promo-
 ueantur, clarè exposuisti: dic nunc ex quibus singuli morbi pro-
 creantur? GERON, Cùm aliq; à solis evidentibus, externisq; causis
 originem suam habeant, aliq; non solum ab his, sed etiam ab inter-
 nis, ijsq; vel antecedentibus, vel continentibus, primam vniuscui-
 usq; causam condiscere oportet. MATHETES, Ex quibus igitur si-
 milarium partium tum simplex, tum composita intemperies, pu-
 tredoq; earum, & totius essentia corruptela prouenit? GERON,
 Ex evidentibus plerunq; . nam hæ dum leniter, & ex æquo to-
 tum corpus inuadunt, primùm spiritus, qui tenuiorem sortiti es-
 sentiam, omni patent iniuriæ: deinde humores, & reliqua con-
 tenta, deniq; solidiorum partium essentiam, vi aut qualitate affi-
 ciunt, quacunq; ipsa pollent. Quare si validiores causæ diu infe-
 stent, & pars ijs opportuna, vicina sit, eaq; iam affectui obnoxia
 (nam quatuor ista in omni rerum actione concurrere debent) 35
 vitium quoq; seu morbus proximè in illam migrabit, nonnun-
 quam etiam morbi isti similes à solis internis, & antecedenti-
 bus causis exoriuntur. MATHETES, Quamobrem obsecro? GE-
 RON, Quia vitiosus putridusq; humor, firmitus parti adherescens,
 essentiam eius tandem corrumpit, sicut pulmonem & iecur pu-
 tre scire sæpius deprehendes; ita suppressi seminis, & excremen-
 torum quorundam prauitas, in veneni naturam degenerans, præ-
 cipue

*Spiritus, & hu-
 mores quæ exagi-
 tent.*

*Causarum eui-
 dentium vires
 diuersæ.*

*Morbi ex quibus
 causis procrean-
 tur.*

*Similium par-
 tium vitium ex
 quibus causis.*

- cipue partium essentiam contaminat. At spiritus, sanguis, humores, & excrementa, quacunque intemperie, aut aliena qualitate afficiantur, mox eadem partes corporis inficiunt, nunc leui, nunc firmitus permanente. Proinde similes morbi, interdum a solis
- 5 euidentibus causis, interdum præter has, etiam ab antecedentibus simul, & continentibus contrahuntur. *MATHESES, A quibus instrumentalium partium morbi fiunt?* *GERON, A naturalis earum figure, aut seminis, conformandique facultatis vitio, aut à membris in partu, aut post eum, dum ipsa adhuc molliatene-*
- 10 *racque essent, confortis: aut inde quod multo post collisa, aut contracta vitiose, siue medici, siue ægrotantis culpa & errore coaluerint. quanquam etiam interiores causæ figuram plerumque inuertant: quales sunt tumor contra naturam, incisio, conuulsio, & neruorum resolutio. adhæc multa cavitatis & meatuum vitia, quando sinus exulcerati, non bene curati inter se conglutinantur, com-*
- 15 *mittunturque. Eodem modo figura vitiat, ubi interior canalis, aut meatus à caruncula, aut duro tuberculo, aut tumore, aut callo, aut grumo, aut humore crasso, viscosoque oppletur. item cum meatus comprimente aliquo foris coarctantur, aut hi ipsi in se rerum*
- 20 *frigidarum, aut exiccantium interuentu concidunt. adhæc cum retentrix facultas meatuum ora impetu quodam constringit. E contrario etiam figura partium corrumpitur, cum medicamenta aperiendi, incidendi, detergendi, expurgandique vim sortita, partes vehementer emolliunt & laxant: idque expultrice facultate val-*
- 25 *ida, aut retentrice imbecilla. Figure asperitatem pariunt, medicamenta, humores, & excrementa nimis acerba, quales sunt fructus immaturi, aliæque acria, abstergentiæque, interdum adeo valida, ut partes ipsas vel erodant, vel exulcerent: leuitatem, cibi, potus, humores, ipsæ tum viles, tum superuacui, pingues ac glutinosi. MATHESES, Quid si pars aliqua desideretur?* *GERON, Ea ratione à conformationis vitio, aut incisione, aut vitione, aut putredine, aut frigore perijt. MATHESES, Quid si superflua quædam accrescat?* *GERON, Id valida natura efficit, quæ naturale quippiam ex*
- 30 *utili, eaque abundantiore materia progignit, qualis est in conceptu sextus digitus, in adultis tuberculum carnosum. Porro ex inutili materia faui, ganglia, steatomata, atheromata, verrucæ, atque id genus alia tubercula constantur. MATHESES, Quid magnitudinem partis immodicam auget?* *GERON, Vtilis materia copiosior, robustaque natura, quæ frictione, calore, pice, aliisque trahentibus medicamentis adiuuatur. MATHESES, Quæ molem partem alicuius im-*
- 40 *minuit?* *GERON, Vis imbecilla, alimenti penuria, & aliæ causæ similes. MATHESES, Quæ partes propria sede atque situ depellunt?*

*Compositarum
partium morbi
unde.*

*Figura quomodo
vitiatur.*

*Partium maior
aut minor numeri
us à natura.*

*Magnitudo par-
tis auget.*

Imminutio.

Depulso à sede.

GERON, Ligamentorum solutio, aut laxitas, vt in luxatis, vel motu repentino, vel vehementi: aut mollientium vsus, aut partium continentium disruptio, vel laxitas, qualis in ramicibus intestinorum alijsq̃, & in descisso abdomine, pulmonisq̃ elapsu, pectore

Dissolutio.

vulnerato, MATHETES, Quid vicinarum partium connexionem dissoluit? GERON, Cum illæ inter se cohæreant, aut communia

Diuisio.

illarum vincula laxantur, intenduntur, vel abrumpuntur. MATHETES, Quæ vnionem diuidunt? GERON, Flatus, tumorq̃ copiosus, vel acer, vel pungens, vel erodens, nec non motus inter causas euidentes immoderationis: item quæ contundunt franguntque, vulnerant, perforant, vruntq̃. MATHETES, Suumne ac singularem morbum quæq̃ causa simplex producit? GERON, Non, sed

Morbus nullus per se solus.

plerumq̃ variis. solus enim ardor frigidam destillationem è capite concitat, ex qua spirandi difficultas ac corporis resolutio subsequitur: adhæc iecoris bilem accendit, irritatq̃, vnde febris procreatur. quin & contrariæ causæ eundem morbum simul plerumque pariunt. sicut enim solus calor cerebrum dilatans, eiusque meatus patefaciens, excrementa diffundit, fluidaq̃ reddit, ita frigus immodicum, quasi comprimens ipsum, & coarctans; illa exprimit depellitq̃. MATHETES, Cum igitur complures morbi

*In morborum con-
cursu quid agen-
dum.*

fuerint, quid agendum erit? GERON, Vniuscuiusq̃ causa interior seorsum inuestigari debet: quod si multæ reperiantur, obseruandum, sintne implicitæ, an connexæ, vel disiunctæ: siquidem earum obseruatio, non minùs quàm morborum, ad curationem conducit: implicitæ autem vix vnquam seorsum tolli possunt: ex connexis prius antecedens, quàm consequens subtrahi debet: dis-
iunctæ separatim tollendæ sunt. MATHETES, Quæ defluxiones

*Defluxionum
causæ.*

mouent, & in certam aliquam partem deducunt? GERON, Causæ euidentes, vt iam dixi, caput infestantes, deinde interiores, partiumq̃ vires robustæ, vel infirmæ. Fluxionis autem materiæ sunt humores illi quatuor, sanguis, bilis tum flaua, tum atra, pituita, aquosa materia, flatus, & quicquid ex his permixtis conficitur.

*Materiæ defluxio
qualis.*

MATHETES, Quomodo omnis materia fluit? GERON, Vel suapte natura & sponte, vel aliunde impulsæ. Sponte quidem, cum vel copiosior est, vel colliquefacta, vel iactata vehementius: talis namq̃ propria sede coerceri nequit, sed suo pte ipsius impetu effluit, elabiturq̃. impulsæ verò fluit, aut viribus partis expellentis ea, quæ tum qualitate, tum quantitate molesta sunt, aut refrigerantis, aut astringentis cuiusdam, aut comprimentis efficacia, quæ defluxionis à cerebro causæ sunt effectrices. MATHETES, Cur in hanc po-

*Defluxionis de-
cubitus.*

tiùs quàm in illam partem ea fluxio decumbit? GERON, In causa est pars corporis, quæ vel recipit, vel attrahit. illa sanè, quia imbecilla

cilla est, aut prona, subiectaꝫ ei, quæ illam mittit. *MATHETES,*
 Quæ imbecillis est naturæ? *GERON,* Cutis, alæ, inguina, glandu-
 læ, & aliæ quæcunq; laxæ & molles, natura vel morbo sunt: sicut *Partes imbecil-*
 contusa, contrita, vulnerata, & alio modo id genus vitata. nam *lis naturæ.*
 5 prona fluxioni obnoxia est, si vias amplas latasq; ad se vergentes,
 spectantesq; & ingredientibus obtineat, angustas autem, quæ ab
 ea egrediuntur. Eadem ratione humores faciliè ad renes, pulmo-
 nes, articulos, & alias partes defluere consueverunt. Præterea ad
 eam partem, quæ inferius sita, influxioni subiecta est, eò quòd
 10 materia grauis faciliùs deorsum, & in procliue feratur: quan-
 quam etiam flatus, vapor, & bilis tenuissima faciliè in omnem par-
 tem excurrat. Adhæc singulæ partes, dolore, motu, frictione, & ca-
 lore, siue hæc ab externis causis prouenerint, irritatæ, fluxiones ad
 se attrahunt. Colligitur autem humor in parte bifariam, nempe
 15 collectione vel defluxione. *MATHET.* Quoniam modo? *GERON,* *Collectio humo-*
 Partis vitio & imbecillitate. dum enim alimentum ad ipsam *ris.*
 allatum neq; conficere, neq; absumere potest, copiosa deinde re-
 crementa & superflua colligit: aut cum ipsa valentior, plura quam
 possit concoquere allicit: aut cum densior & astrictior fuerit, ex-
 20 crementa neq; faciliè depellere, neq; dissipare potest. Hæc de mor-
 borum causis breuiter tibi indicare volui. deinceps ad ea quæ il-
 lis superuenire soleant, interpretanda aggrediar. *MATHET.* Me-
 tuo ne difficiliora sint, quam vt intelligere possim.

GERON, Ne metuas, faciliè assequeris. sunt enim eiusmodi *Morborum cas-*
 25 quæ non intus, sicut morbi & complures causæ, omnino latent *sus.*
 abditæ, sed foris, sicut etiam signa, apparent, & nobis sunt conspi-
 cua: Græci *συμπτώματα* quasi cum morbo incidentia: Celsus casus
 appellat. *MATHETES,* Quid illa esse dicis? *GERON,* Affectus mi-
 nus naturales, vbiuis in corpore consistentes. duplici autem mo-
 30 do nomen ipsorum vsurpatur: primo generatim, cum pro omni
 eo accipitur, quod corpori minus naturaliter accidit, siue mor-
 bus, siue eius causa interior existat: altero speciatim, seu pro-
 priè, quò id, quod in corpore, morbo eiusq; causa excepta, mi-
 nus naturæ idoneum reperitur, intelligi solet. *MATHETES,* Quo-
 35 modo symptoma à morbo causaq; ipsius differt? *GERON,* Sic,
 quòd morbus quidem primariò, & per se functionem corporis of-
 fendat: causa autem fortuitò: symptomata verò neutro modo:
 quia nondum ex toto naturæ aduersantur, sed minus quam par
 est, ei sit idoneum: vel quòd morbus in parte quadam tantum,
 40 causa in contentis, symptoma ipsum tum in vtriusq; tum in fun-
 ctionibus consistat. Summatim, quicquid in corporis essentia, vel
 in contentis minus naturaliter consistit, si nondum actionem pa- *Symptoma ven-*
 rium.

*Alia symptoma-
ta.*

*Morbus conse-
quens.*

*Morbus & sym-
ptoma nullum vi-
tium esse potest.*

*Affectus, morbi
causa, & sympto-
ma non idem.*

*Morbus & cau-
sa cur idem affe-
ctus.*

*Symptomatum
genera tria.*

lām offendit, symptoma censendum est, quacunque ex re trahat
originem. Proinde etiam nigrities ex insolatu contracta, & vrin-
æ, aliorumq; excrementorum color, seu odor minus naturalis,
citra morbum grauis, aliq; id genus affectus adeo leues, vt actio-
nibus nondum incommodent, symptomata dici possunt. At si
alius morbus ex alio proueniat, vt cum iecur æstiuans calidam
ventriculo intemperiem impresserit, non simpliciter hæc sym-
ptoma, sed morbus appellari debet: eò quòd in parte hærescat, cu-
ius actionem per se euidenter offendit, quanquam non primari-
us, sed consequens potius dici mereatur. MATHETES, Potestne
vitium aliquod, & morbi, & symptomatis appellationem conse-
qui? GERON, Nequaquam, diuersa licet ratione: quia nihil functio-
nem lædere, & simul non lædere potest, nam quando facultas san-
guifica in iecore languida est, & deinde vitiatum humores in toto
corpore subnascuntur, qui febres aliosq; morbos generent, quam
uis humorum corruptio affectus sit minus naturalis ex morbo
factus, non tamen symptoma, sed illius causa censenda est, eò
quòd in contentis subsistat, & actionem fortuito offendat. MATHETES, Potestne idem affectus, morbi causa, & symptoma dici? GERON, Non utique, licet symptoma alterius esse causa possit, sicut
accidit, quando complura ex eodem morbo symptomata conti-
nenter exoriuntur, nam cum frigida intemperies ventriculi con-
coctionem offendit, sic vt ex hac cruditas ciborum sequatur, inde
q; alius magis soluitur, actandem alimentum minus in cor-
pus distribuatur: tunc causa morbi antecedit: symptoma verò
proximè comitatur: non symptoma morbum antecedit, neque
vlla causa protinus sequitur. MATHETES, Potest igitur idem af-
fectus interdum & morbus & eius causa simul existere? GERON,
Potest, sed neutrum symptoma appellari debet. MATHETES, Quam-
obrem? GERON, Quia morbus, quamuis interdum alterius mor-
bi, & symptoma quoq; alterius symptomatis causa esse possit, ta-
men illud neq; morbus, neq; proxima eius causa vsquam esse de-
prehenditur. MATHETES, Quot symptomatum genera ex-
tant? GERON, Tria summa. primum est læsa partium actio ex
morbo procedens: alterum simplex corporis affectus: tertium
immodica tum excretio, tum retentio: quæ duo posteriora ex
functione offensa proficiuntur, inter se planè promiscua: vt que
aliàs corporis affectibus, aliàs functionum noxis succedant. MATHETES, Quomodo ista duo symptomata cognoscuntur? GERON, Cum bis in vesicula fellis obstructa est, atq; ideo à reliquo
sanguine expurgari nequit, sed cum eo propter actionis illius no-
xam permanens, in vniuersum corpus diffunditur, tunc cutis fœ-
do co-

do colore inficitur, regiusq̃ morbus simplex fit symptoma. vring
etiam crassescunt, flauescuntq̃, & alui excrementa albicant, bilis
expertia. Ita simplices corporis affectus, & excrementorum vitia
ex actione laesa proueniunt. MATHESES. Quarum actionum of-

ex actione laesa proueniunt. MATHESES, Quorum actionum of- *Offense action*
fensa corpori accidunt GERON. Animalis & naturalis: ac inter il- *num.*

las sensilium, motricum, & principum. Inter sensiles actiones vi- Sensilium.

fitio vel aboletur, ac cæcitas dicitur: vel imbecillis est, ac hebetudo: vel deprauata, ac hallucinatio & error vocatur. Cùm autem auditio prorsus amissa est, surditas: cùm imbecillis est, grauitas: cùm

10 deprauata, tinnitus nuncupatur. Toridē differentiē sunt in odoratu, gustatu, & tactu. MATHESES, Quibus in rebus sensus præ-

dicti offendi falliq; solent. GERON, Visus in colore, figura, & ma-

gnitudine : auditus in sono : odoratus in odore : gustatus in sa-
 pore : tactus in qualitate tactili, calida, frigida, humida, & sicca, ex il-
 15 lis orta. Nam videndi facultas per suffusiones ea foris cernere vi-

detur, quæ oculo insunt: audiendi vis per tinnitum aurium ea sonare extrinsecus putat, quæ intus circa membranas cerebri mota, sonant: odorandi verò, eos odores à vicinis corporibus attolli

opinatur, qui ex interiori quadam vitiositate humorum in nari-
 20 bus contenta, & alijs rebus foedis exhalant. Gustandi verò facul-
 tas offenditur, cùm lingua alio quodam humore imbuta, sicut

amaro, in ictericis omnia quæ gustat, tali sapore prædita existimat. Nam humor qui antea quietus in lingua delitescibat, nunc àre gustata motus, vel absq; hac percipitur, non autem res gusta-

25 ta. Tangendi facultas fallitur, vbi cutis scabra, arida, & rugosa, *Tactus noxa*,
 symptomatis viriatur. *M A T H E T E S*, Quæ actionum motus volun-
 tarij offensiones seu noxæ apparent?

GERON, Cùm motus tactusq; vel abolitus, vel debilitatus, vel *Motus voluntatis
rinoxæ.*

deprauatus est, isq; vel in parte aliqua, vel in toto corpore accidit:
30 in illa tum neruorum, tum musculorum. neruorum autem qui
respirationi seruiunt, resolutio est, græcè ἀσπνοια dicitur: voci dica-

torum, ἀφ᾽ ὧν vocatur: lingue peculiarium, sermonis vitium. MATHETES, Qui muscoli resolui solent: GERON, Ceruicis vesicæ, & ani. vnde vitium illorum inuita, vrinæ & alui excretio appella-

35 tur. MATHETES, Quo nomine hoc malum in toto corpore nun-
ciatur? GERON Solo paralyticis: cum principum autem facula. *Paralyfis.*

cupatur. GERON, Solo paralytico, cum principum autem faculta-
tum resolutione, apoplexia. MATHETES, Quæ noxa actionis in
motu debili, & tactu existit. GERON, Stupor, difficultas spirandi, *Noxa actionis
in debili motu.*

40 vitiosus vocis sonus, vrinæ difficultas, idq̃ pro neruorum affe-
ctorum differentia. MATHETES, Quæ in deprauata motus actio-
ne consistit? GERON. Convulsio, nempe iniurita musculorum &

neruorum ad originem suam retractio, nunc in vna parte, vt mu-

Singultus.

sculis, nunc in toto corpore fiunt, sicut tetanos, emprosthotonos, opisthotonos: cum principum facultatum noxa, epilepsia. singultus ferè & aliquo modo conuulsio est, qua facultas expul-
 trix humores ventriculo infarctos expellere conatur. Sic etiam seminis profluuium, quod cole sit erecto: quod laxato illo
 5 accidit, retentricis facultatis imbecillitati ascribendum est. MATHETES,

Tremor.

Quid in eo vitiat motus existit? GERON, Tremor partium voluntati contrarius, quo illæ seorsum & deorsum vicibus mutatis feruntur: item horror, inæqualis totius corporis concus-
 sio, turbatioque: adhæc rigor, similis quidem motus, vt in
 10 horrore, sed maior, præterea sternutamentum quod vehemens est efflatio, qua nares interioris cerebri sinus, & ossa ἡθμοειδῆ

*Horror.**Rigor.**Sternutamentum.**Tussis.*

expurgantur: ita etiam tussis, quæ vehementissima quædam est efflatio, qua spiritus copiosissimus simul & celerrimus foras actus, ea impetu suo attrahit ac propellit, quæ vias ipsius obstru-
 unt. pandiculatio, qua omnia membra ad vapores ex eis discuti-
 15 endos distenduntur. oscitatio, qua vis expultrix ad flatuosos maxillæ spiritus dissipandos mouetur. MATHETES, Quæ principum

*Pandiculatio.**Oscitatio.**Principum functionum noxa.*

animæ functionum noxæ sunt? GERON, Imaginatio abolita, vt sopor, qui καδρος & καἀλησις græcè vocatur: aut debilis, vt somnus
 20 grauior, qui Græcis ὑπνῆμα siue λήθαργος nominatur: aut deprauata, vt delirium. sic cogitatio prorsus abolita, quæ dementia, siue stultitia: debilis, quæ fatuitas: aut deprauata, quæ delirium existit, memoriæ vel abolitio, vt obliuio: vel imbecillitas, vt torpor:
 vel deprauatio, vt delirium. MATHETES, Quæ vitalium actio-

Vitalium actionum læsio.

num læsio existit? GERON, Pulsatio abolita, vel imbecillis, vel deprauata, de quibus postea rursus audies. MATHETES, Quæ tandem naturalium functionum noxæ nominantur? GERON, Eadem ferè, quæ in animalibus ratio dicta est, in his quoque tenenda erit. nam cum singulæ partes similes, quatuor tum facultatibus, 30
 tum functionibus donatæ sint, si trifariam ipsas lædi contingat, quod vel nullo modo, vel leuiter, vel deprauatè obeantur, erunt certè vniuscuiusque ipsarum, quatenus similis est, symptomata duodecim. Quod si eadem quoque ex naturalium instrumentorum ordine existat (quoniam præter eas quibus se alit & tuetur, 35
 alias quoque toti corpori communes vires accepit) alijs symptomatis duodecim erit obnoxia. MATHETES, Exemplis ea mihi explices.

Ventriculus concoctionis instrumentum.

GERON, Cum ventriculus concoctionis instrumentum, nullum familiare alimentum appetit, nec gula resoluta attrahit, vel id difficile ac longo tempore facit, vel inter attrahendum, 40
 veluti palpitans, aut tremens conuellitur, ac concutitur. His symptomatis accedit interdum immoderata cibi & potus cupiditas,

vt in

- vt in grandi fame, quæ græcè vocatur βάλιμος, & canina, vel alienæ qualitatis desiderium, vt in vitio mulierum, græcè dicto κίτη, accidit: vel cùm alimentum nullo modo, aut parum, aut corruptè in corpus distribuitur. id namq; partium fit attractione. Simi-
 5 liter ventriculo accidit, vt vel nequaquam cibos concoquendos *Retentrix facultas offensa.* retineat, vt in lienteria: vel vt minùs quàm par est, eos amplectatur, donec perfecta sit concoctio alsimilatioq;: vnde fluctuationes excitari solent: aut si amplectitur, non retineat, donec conficiantur: vel vt vitiosè retineat, dum ipsos apprehendit cum conuulsione, quam singultus indicat, aut cum concussione, vt rigor
 10 febrium in toto corpore ostendit, vel cum palpitacione, quam sensus manifestant: vel cum tremore, quem non facile deprehendes, nisi insolitam & obscuram ventris à cibo molestiam animaduertas, quæ illi accidit, dum onus, quo grauatur, supra vel infra
 15 cum ructibus, & magna spirandi difficultate conatur expellere, sic tamen, vt nulla fluctuatio, inflatio, palpitatio, ac singultus infestet. MATHESES, Qualis actionis ventriculi noxa censetur, cùm cibi in qualitatem animali familiarem nullo modo immutantur? GERON, Nobis cruditas, Græcis ἀπείδια vocatur: qua cibus talis
 20 permanet, qualis assumptus est: sicut cùm difficulter, & longo temporis spatio consumitur, *Crudititas.* *Σεγδυνείψια*, quasi tarda concoctio vocatur: cùm autem vitiosè obitur, cibus in alienam qualitatem, & naturæ minùs familiarem in ventriculo commutatur: ex qua forma corporis corrumpitur, vti in morbo elephantiaco, & leuce.
 25 Huic vitio etiam id adiungi potest, quod sanguinis confectiorem prorsus impedit, aut imbecillem, aut vitiosam reddit, sicut in aqua subter cutem: nec non aliarum partium singularum concoctiones, à quibus ille nutriuntur, abolitæ, aut imminutæ: aut vitiatæ, quas leuce, ophialis, alopetia, & similia symptomata sequuntur. MATHESES, Quæ læsio expultricis functionis est? GERON, *Expultricis facultatis læsio.* Aut eius abolitio, qua nihil expellitur, sicut in morbo iliaco, quo stercus vomitu rejicitur, & in arquato, siue flauo, siue nigro: aut debilitas, qua excrementa tardiùs expelluntur: aut deprauatio, qua vel citiùs quàm par est ante concoctionem absolutam, vel
 35 tardiùs post illam protruduntur: vel cum aliquo symptomate prædicto, vel vbi venter inæqualiter, vel immoderatè in cibos irruit. Atq; tot sunt symptomatum genera.

MATHE. Quomodo illa inter se differunt? GERON, Cùm quin *Symptomatum differentia.* que sensibus percipi soleant, alijs visioni subiiciuntur, vt mali colores, quos morbi inuexerunt, qualis est flauus in arquato, pallidus, in eo aquæ subter cutem genere, quod græcè λευκοσλεγμασία dicitur, & vitiligine: niger in elephantiaci. MATHESES, Quenam odo-

ratui obueniunt. GERON, Insuaues, grauesq̃ odores, qui ab alis, auribus, naribus, ore, aut corpore vniuerso ob affectum aliquem putrescentibus feruntur. MATHETES, Quæ ad auditum pertinent. GERON, Soni minùs naturales, vt aurium tinnientium, narium, faucium, asperæ arteriæ, thoracis, & pulmonum stertenti-
um: item dentium stridores, ventriculi rugitus, & intestinorum
crepitus. MATHETES, Quæ ad gustatum referuntur. GERON, Sa-
por ingratus, vel sudoris dulcis, amari, falsi: vel sanguinis, qui per
os, aut alium meatum rejicitur, dulcis falsi, amari: aut eorum quæ
ex pulmone, aut ventriculo excernuntur, dulcium, amarorum, 10
falsorum, austerorum, & acidorum. MATHETES, Quæ deniq̃ ta-
ctui sunt peculiaria. GERON, Calor, frigus, humor, & siccitas, vn-
de mollities, duritia, vel alia qualitas tactilis, vt in cute dura, ari-
da, intentia, laxa, & rugosa prouenit. Atque hæc secundi generis
symptomata, nempe simplices corporis affectus habentur. MA- 15
THET. Quod tertium genus illorum existit.

*Tertium genus
symptomatum.*

GERON, Excrementa quæ aut essentia, aut qualitatis, aut
quantitatis vitium contraxerunt. MATHETES, Quid vocas es-
sentia vitium. GERON, Id quod cum excernitur, toto genere na-
turæ aduersatur, vt calculus, arena, lumbrici: aut cum illius excre- 20
tio minùs naturalis est, vt sanguis, qui è naribus, auribus, ore, siue
spuito, siue vomitu, è vesica vel aluo profluit, & quomocunq̃
contra naturæ leges erumpit. MATHETES, Quæ vitiosa excre-
mentorum qualitas est. GERON, Cum eorum color à naturæ mo-
do recedit, veluti si vrina, aluus, menstruum, sputum, aut vomiti- 25
o nigra sit, liuida, aut viridis: nec non grauis odoris, saporis a-
mari, falsi, acidiq̃. vel si lentorem, aut acrimoniam, crassitiem, aut
tenuitatem, siue aliam qualitatem minùs naturalem, tum his, tum
alijs, quæ in corpore excernuntur, inesse deprehendimus. MA-
THETES, Quod eius quantitatis vitium est. GERON, Cum mini-
mè iustus naturæ modus in his seruatur, sed illa copiosius, vel mi-
nùs profluunt. MATHETES, Propriè hæc excrementorum vi-
tia symptomatis annumerari debent. GERON, Maximè, si origi-
nem ex morbis sumperint: quæ verò non inde, sed ex alimentis
prouenerunt, quorum vel qualitas vitiosa, vel immoderata quan- 35
titas perseuerat, impropriè symptomatis ascribuntur. MATHET.

*Excrementorum
qualitas vitiosa.*

*Quantitatis vi-
tium.*

Quid si excrementa intus contra naturam coërceantur. GERON,
Nouos plerosq̃ morbos excitant, eosq̃ longè plures, quàm vllæ
aliæ causæ potuerint, MATHETES, Generibus ac differentijs sym-
ptomatum enumeratis, iam obsecro edoceas, vnde singularium 40
illorum causæ proueniant. GERON, Cum multa de his in mor-
borum explicatione superius audieris, non opus est, vt hîc sim
proli-

*Excrementorum
retentio.*

*Symptomatum
causæ.*

- prolixior. Symptoma, siue læsa quarumlibet partium actio, ex morbo suapte natura, sine vllius rei adiumento, suboritur. **MATHE-
TES**, Vbi morbus consistit, qui ex animalibus functionibus sensum, motumq; offendit? **GERON**, In cerebro, propria facultatis
 5 illorum sede, vel in horum instrumento. **MATHE-
TES**, Quis morbus illam impedit? **GERON**, Intemperies, aut continui solutio, aut astrictio, aut obstructio, quæ vel ex tumore minùs naturali, vel humore influente contracta sit. his nanque impedita facultas sentiendi, mouendique instrumentis influere nequit: qui instru-
 10 mentum occupat, modò partem eius principem, & primariam, modò cæteras, quæ illi subsidium adferunt, aut quauis ratione vtilis sunt, infestat. ac in illa sanè, qualis crystallinus oculi humor est, intemperies, continuitatis diuisio, & situs mutatio affligit. hic siquidem de sede sua peculiari sæpe decedit. **MATHE-
T.** Qui morbi
 15 in cæteris instrumenti partibus molesti sunt? **GERON**, Non solum intemperies, & continuitatis diuisio, sed etiam instrumen-
 torum vitia, vt pupillæ dilatatio, vel angustia, humorum defectus, vel excessus, eorumq; tunicarum crassities, aut color alienus, suffusio, vnguis, & quæcuncq; pupillæ succrescunt: deinde vlcera,
 20 inflammationes, aliq; tumores, qui totius oculi simul & morbi, & symptomatum causæ existunt. eodem ferè modo etiam aurium obstructio ex tumore, vel tuberculo, vel sordibus, vel ijs quæ in illas incidunt, nascitur. **MATHE-
TES**, Vnde narium fit obstru-
 ctio? **GERON**, Ex attritu, vel tumore, vel polypo, sicut oſis, quod
 25 græci vocant à colo ὀσπεδῆς, obturatio ex grauedine. **MATHE-
T.** Quæ odoratum corrumpunt? **GERON**, Fœtores ei insidentes, quemadmodum sapor falsus, acidus, aut amarus gustandi iudici-
 um lingue subuertit. **MATHE-
TES**, Quomodo tactus motusq; sym-
 ptomata, stupor, vel resolutio fiunt? **GERON**, Neruis refrigeratis,
 30 aut ligamento, aut alio quodam extrinsecus premente, aut crasso lentoq; humore obstructis. Atque ista spiritum & vim animalem prohibere solent, ne latius transmitti, distribuiq; possit. **MATHE-
TES**. Quæ causæ sunt offensionum actionum naturalium? **GE-
RON**, In similari quidem parte, ac priuata, intemperies, & essentie
 35 corruptio: in dissimilari, seu instrumentaria, aliæ. nam ventriculus, iecur, aut aliud instrumentum, erysipelate, inflammatione, ac similibus tumoribus interdum peruertuntur: vnde concoctio imbecillis, aut deprauata subsequitur. **MATHE-
TES**, Qui morbi vim attrahendi interpellant? **GERON**, Non modò similes, sed etiam
 40 instrumentarij. ita tuberculum carnosum, vel aëus quiuus tumor, in gula subnascens: quo via cibis præcluditur, intercipiturq;: vnde vel omnino nulla attractio, vel difficilis, vel deprauata quasi

Situs functionum sensilium & motricium.

Narium obstructio.

Odoratus corruptio. Gustatus.

Tactus & motus symptomata.

Naturalium functionum vocæ causæ.

Attrahentis facultatis noxa vnde.

*Retentionis no-
xæ causæ.*

salu quodam, aut tremore obitur. MATHETES, Quæ causæ retentionem alimenti impediunt? GERON, Eadem, & flatus: sicut etiam accidit, cum ventriculus non arcuè illos complectitur, neque firmiter adhærescit. MATHETES, Quæ excretionem offendunt?

*Excretionis no-
xæ auctor.*

GERON, Morbi similes, viarumque angustia, atque obstructio. accelerat autem illam excrementorum copia, vel acrimonia: sicut crassities, aut viscositas remoratur. MATHETES, Quæ interiores simplicium symptomatum causæ existunt? GERON, Siue in partibus corporis, siue in excrementis, citra functionum noxam inherescant, coloris sanè minus naturalis auctor est succus, et humores à salubri statu alieni, qui vel in cutim se extulerunt, vel cum excrementis exciderunt. At grauis & foedus odor, ex putredine contrahitur. Sapor extraneus, ex humore, qui in os influit, aut qui excrementis permiscetur. Sonus minus naturalis, ut rugitus, murmur, ex instrumentorum angustia, vel copia flatuum, vel cum ipsi huc illuc impelluntur. Atque hinc constat morbos tum horum, tum superiorum symptomatum causas existere. MATHE.

*Excretionum naturalium vitiosa
qualitas.*

Ad quas referenda est, vitiosa naturalium excretionum, ut alui, vrinae, menstrui, & sudorum qualitas? GERON, Ad eas, quas simplici affectui attribuendas esse dixi. porro augent illam permulsum ingens ciborum copia: vel eorum corruptio, & acrimonia, quæ vim excernendi incitat: vel lubrica, fluxilisque materia: vel contentricis facultatis imbecillitas: vel sensus corporis exquisitior: vel impedita alimenti distributio: vel excrementorum aliunde affusio: vel vniuersi corporis colliquatio. sic enim vrina, alui, sudor, & menstruum valentius, vberius, & frequentius erumpunt. MATHET.

*Excretionum au-
gentia.*

Quæ excrementa minuunt? GERON, Alimenta pauciora, crassa, astringentia, excreticis vis imbecilla: obtusior partium expellentium sensus, meatus angusti, & obturati: cutis perspiratus immodicè solutus. MATHESES, Quas causas excretionum minus naturalium esse putas? GERON, Alias, ut sanguinis profusionem, quæ vena sanguinis officina, vel rupta, vel exesa, vel ad aperta fieri solet: uti superius abundè est explicatum. quanquam etiam sanguis ita interdum extenuatus, ut feri speciem repræsentet, ex tunicis venarum rarioribus, ac laxatis emanet. MATHESES, Quæ vomitiones cient? GERON, Cibi liberalius assumpti, bilis acris, vel quæ pondere grauant, ut sanguis, pituitaque copiosa, aliquo in loco subsistentes. Atque hæc tria, cerebri destillationem, oculorum lachrymas, sputorum editionem, seminis profluuium, & omnem denique ex quacunque parte euacuationem, naturæ contrariam incitant. Nam in his retentrix facultas excrementorum pondere grauata, vniuersa tandem elabi concedit. expultricis autem vis irritata, eadem

Vomitiones cientia.

eadem omnia impetu deturbat. MATHETES, Vnde nam dolor sensibus quibuscunq; accidere solet?

*Dolor sensuum
vnde.*

GERON, Ex rei obiectione vehementia: visionis sanè ex nimio lucis splendore: auditui ex aspero, & valido strepitu: odoratui ex
5 odore sædo: gustatui ex sapore ingrato. At dolores tactus ideò sunt grauiissimi, quòd hic in crassa admodum, & solida materia positus sit, primus, omniumq; animantium communis, & in valde efficacibus qualitatibus versetur. MATHETES, Vnde dolor tactus generatur? GERON, Ex quolibet immoderato calido, frigido,

Tactus dolor.

10 duro, acuto, graui, & eo, quod subito in illum qualitatis vi & efficacia irruit: quæ proxima doloris causa est, putà calefaciens, refrigerans, contundens, incidens, erodens, diuellens. Nam instrumentum tactus, non vnum ac simplex est, sed quod in extremitatum caloris, frigoris, humoris, & siccitatis mediocritate, formaq;

15 conuenienti, & situ consistit: ob quod etiam neq; à temperatis, suisq; similibus, sed à dissimilibus & contrarijs variè afficitur: sic tamen, vt ab ijs offendatur ledaturq;. hoc autem obseruandum, ea quæ violenter & subito in tactum irrumpunt, tam diu solum dolorem inferre posse, quàm diu agant, sensumq; moueant: & hoc

20 iterum mutato, dolorem simul remittere. Quamuis autem torpor aliquis, vtin oculo, rei visorie simulacrum, causa ipsius opifice sublata, aliquandiu remaneat, obscuram quandam doloris imaginem referens: non tamen ipsa dolor est. MATHETES, Similisne dolor in omnibus partibus, ab eadem causa prouenire potest? GERON,

Dolor pro partium natura.

25 Nullo pacto. quorum enim essentia crassior, eorum quoq; dolor vehementior. Vnde non solum ille, sed etiam alia grauissima symptomata ventriculo, acerrimi sensus tangendi instrumento, eueniunt: vt rosio, animi defectio, difficultas, abolitio spiritus, morbus comitialis, deliriū, mentis alienatio, sopor, inexpugnabilis dormiendi necessitas, sensuumq; interceptio: eaq; magna

30 ex parte confortij lege, quod inter omnes partes, maximum & ceterissimum cum corde & cerebro obtinet. Hæc de symptomatum causis, videor mihi satis pro instituto persecutus: quod adhuc restat, sigillatim postea tractabo: nunc commodius esse puto, vt

35 deinceps subiungam, quibus signis morbi latentes, & abditi, eorumq; causæ, & symptomata dignosci possint. Nihil enim sine illorum cognitione, in summis medicinæ partibus, fructuosum præstare poteris. MATHETES, Quæ sunt illa obsecro? GERON,

40 Symptomata siue signa, quæ nos in affectuum interiorum & latentium noticiam perducunt. Ne autem varia illorum appellatio te perturbet, obserues idem valere, siue signa, siue inditia, siue notitas nomines: græci *σημεία*, tantum appellant. nam quod *σημείον*, *note.*

*Signa, inditia,
note.*

Summa signorum genera.

dicatur, oratoribus magis pro signo necessario usurpatur. MATH. Quot sunt principalia signorum genera? GERON, Tria. quorum alia valetudinem aduersam, præsentem indicant, ac græcis *ἀσθενήματα*, siue *ἐνδεύματα*, hoc est demonstratiua, seu indicatiua nuncupantur: atq; inter illa, quæ incipientis affectus notæ sunt, *πρῶτα* vocantur: alia futuram, quæ nobis præfagia, græcis *προγνώσματα*, nominantur: sed non tam subito, quam morbus inuaserit, sed aliquantò post aduenturam indicant: ac idè *ἐπιφαινόμενα*, quasi superuenientia græcis nominantur: alia præteritam, ac latinis memoratiua, græcis *ἀπομνήσματα*, quòd animum memoria refricent, dicuntur. Porro in singulis horum generibus, quædam propria sunt, essentiamq; morborum perpetuò comitantur, vt quæ ab illis secerni nequeant, simulq; cum morbis inuadant, & desinant: quemadmodum membranæ costas cingentis inflammationis propria inditia sunt, febris acuta, lateris dolor pungens, difficilis spiratio, tussis: quædam differentiam morbi, magnitudinem, & morem ostendunt, nobisq; ceu assidentia, græcis *παρὰδόντα*, nominantur, quòd morbis assideant, non autè prorsus coniuncta sint, & adhaereant, sicut illa, quæ affectu significant, et simul cum morbo inuadunt desinuntq; sed nunc cum morbo, nunc post illum, nunc etiam non appareant, eorū nec propria, nec firmiter assident, sicut in pleuritide dolores ad iugulum, & præcordia vsq; pertingentes, dolorq; capitis, qui non assiduus feбри assistit. Ex demonstratiuis rursus aliqua salubrem corporis statum indicant: aliqua morbidum, aliqua medium: nonnulla morborum speciem monstrant, vt pulsus durus membranam: mollis & vndosus pulmones, similesq; partes molles: nonnulla morbi causam vt humorem tum bonorum abundantiam, quæ græcè *πλεονεξία* dicta est, tum vitiosorum, quæ *κακοχυσία*, vocatur: nonnulla cruditatis & concoctionis inditia nuncupantur. nam quæ cruditatem ostendunt, morbi principium significant, quæ manifestam concoctionem, incrementum eius testantur: quæ concoctionem perfici notant, ipsius statum: quæ perfectam esse produnt, eiusdem declinationem monstrant. Præter hæc sunt, quæ signant morbi tempora, genera, locum, in quo vitium insidet, generationis modum, & quando ille soluetur, & qua ratione. Ad hæc sunt, quæ regionem indicant, per quam expelletur. præterea extant, quæ causas, & effectum ostendant, proprijs nominibus destituta, si pauca excipias. nam quæ subitam in morbis mutationem per excreta, aut abscessum naturæ vi factum, quam græci *κρίσην* vocant, ostendunt, *κρίσην* appellantur: quæ verò aliter morbum solutum indicant, peculiariter vocari nequeunt. Satiùs igitur est, morbo-

rum

Signa assidentia.

Dolores in pleuritide.

Statum corporis notæ.

Signa cruditatis & concoctionis.

Signa critica.

rum læuium, aut grauium, periculi, aut salutis indicia, mala & bona, pessima vel optima nominare. Nam voces istæ, mortifera, lethalia, salutaria, salubria & insalubria, non appellandis rebus, sed efficiendis conueniunt: si modò propriè latina lingua (vti certè decet) loqui velimus, quanquam pauci hodie eam sermonis puritatem obseruent. sed verbis relictis, in re ipsa pergamus. Inter summa nuper dicta signa, alia præsentia, alia præterita, alia futura indicant: quædam præsentia & præterita: quædam præsentia & futura: quædam futura & præterita: quædam omnia significant, nempe præsentia, præterita, & futura. *MATHESES*, Cùm tam multa & varia morborum signa existant, oro te, vt singula ordine enumeres, quibus illos inuestigare, perscrutariq; possim. *GERON*, Faciam, ac primùm ea, quæ tum morbum, tum sedem indicant, cui ille inhærescit, expediam. *MATHESES*, Quæ res locum affectum ostendunt? *GERON*, Ea recrementorum species, quæ in parte læsa, siue naturaliter, siue contrà contineatur. nam quæ à proprio loci offensi essentia excernuntur, naturam peculiarem signant. *MATHESES*, Id exemplo declares. *GERON*, Circulus, qui Græcis *βρόγχιον*, appellatur, per tussim reiectus, maximum in pulmone vlcus ex erosa parte, vel putrefacta contractum indicat: cùm asperæ arteriæ, quæ inter fauces & pulmones sita est, portio esse nequeat, eò quòd nulla tanta exulceratio in ea fieri possit, sed mors prius hominem è medio tollat. Quinetiam ramenta per aluum in difficultate intestinorum, quæ *δυσκοπία*, græcè vocatur, deiecta, exulcerationem illorum testantur. carunculæ cum vrina excretæ, renum. recrementa lamas referentia, vesicæ portendunt. Adhæc magnitudo excrementorum, partem affectam monstrat. nam amplum vasis frustum per tussim reiectum, pulmonem exulceratum esse, non asperam arteriam significat, eò quòd vasa quæ ad hanc in ceruice sita tendunt, capillorum modò tenuia sint, & exigua. Sic ampla intestinorum tunica, in alui recrementis per difficultatem illorū deiecta, tenuis quidem superiora: crassa & carnosissima, inferiora intestina exulcerari demonstrant. Præter hæc etiam illa partem læsam ostendunt, quæ ei adnascuntur, sicut fungi in capitis fractura, membranam affectam esse nunciant. at crustulæ quædam, quæ ἐφελκυσ, dicitur, eius partis, à qua excernitur, exulcerationem signat: vrinarij quidem meatus, si cum vrina prodeat: spiritalium autem instrumentorum, si per tussim: gulæ verò & ventriculi, si per vomitum excernatur: intestini, si per alui deiectionem euacuetur. *MATHESES*, Quæ alia excrementa partem offensam notant? *GERON*, Ea, quæ in illa quouis modo continentur. verum hæc nō exquisitè, vt superiora, sed per artificiosam quandam

*Adnata partis
bus quid noceant.*

*Quæ in partibus
continentur.*

coniecturam deprehenduntur. vtpote si vrina per vulnus alia quod emanet, meatus vrinarios, aut vesicam: si sterus, intestinorum aliquod: si cibus excernatur, ventriculum. Quin etiam excernendi modus affectum sedem testatur, quia si sanguis per vulnus saliendo erumpat, arteriam: si spiritus inter respirandum per thoracem effletur, membranam, quæ costas succingit, vulneratam esse indicat. Eodem modo etiam partem læsam excrementa, quæ in ipsa continentur, ostendunt, vtpote calculus, renes, aut vesicam: pus thoracem: sanguis venas, aut alius quidam humor, siue in corpore nostro procreatus, siue extrinsecus aduenerit.

MATHESES. Quæ alia sedem offensam demonstrare solent? **GERON,** Societas ac consortium ipsius, quod cum proximis locis habet, situsq; nam durus in dextris præcordijs tumor, subsistens, iecur, in sinistris lienem affici notat. similiter via, per quam excrementa prodeunt, illam signat. membranosa enim tunice particulæ vomitu reiectæ, gulæ, aut ventriculi inditium est: per tussim, gutturis seu asperæ arteriæ: screatu, faucium: per aluum, intestini cuiusdam: per naturalia muliebria, vteri affecti.

MATHE T. Quæ præter hæc partem affectam notant? **GERON,** Alia etiam symptomata præter superiora, vt si malæ rubeant, pulmonis inflammationem testantur: sanguis in febris continua, græcè *αἷμα*, dicta, pridie quam dies criticus adsit, erumpens, totaq; facies rubicunda, illam finitum iri nunciat, non pulmonis inflammationem, præsertim si eger ex facili spiret. sin autem expuat, difficulter respiret, & dolorem grauem in thorace sentiat, certa pulmonis inflammationi nota est. Insuper ex vno symptomate aliud interdum colligimus, & ex illo rursus aliud, interdum etiam morbum. sicut in macie, seu tæbe, in qua corpus non alitur, græcè *ἀρεσκία*, dicitur, alia symptomata huic superueniunt. Nam impedita alimenti distributio, maciei causa est. huius, obstructio iecoris in gibba eius parte suborta, quæ ex grauitate post concoctionem obitam deprehenditur. Potest etiam hanc tabem excitare intemperies iecoris, aut affectus locus, aut vlcus pulmonum, nec non iecoris & lienis scirrhus, venarum meseraicarum obstructio, ventriculi, intestinorumq; affectus, aut vlcera quæ fluxum excitant. Iam vrinae suppressio indicat calculum, vel grumum sanguinis, vel sudorem futurum, suppressum uero, vel mentis alienationem, ob phrenitidem, aut lethargum.

MATHESES. Quid si mens non sit læsa, nec vlla inflammatio vrgeat, nec febris adsit? **GERON,** Certè solum crassum & glutinosum humorem, præsertim si æger tali cibo, vt caseo, & similibus se vsum fuisse fateatur, illam suppressisse colligimus.

MATHESES. Quam partem affectam tussis notat? **GERON,** Cum respi-

Arteria læsa nota.
Membrana costarum.

Vesicae.
Thoracis.
Venarum.

Societas partium

Iecoris & lienis
affecti nota.

Gulae.
Asperæ arteriæ.
Faucium.
Intestinorum.
Vteri.
Pulmonis affecti
inditium.
Febris continua
solutionis signum.

Pulmonis inflam-
mati nota.

Symptomatis ex
symptomate in-
ditium.
Atrophia & eius
nota.
Macies.

Calculi nota.

Vrinae suppressio
nis causa.

Tussis.

- respiratorijs partibus accidere soleat, illæq; variæ sint, vt pulmo-
 nes, aspera arteria, latera, muscoli, septum transuersum, inquiri de-
 bet inanisne ac sicca, an humida existat. si inanis fuerit, aut late-
 rum inflammatio cruda, aut tenuis in arteriam defluxio, aut spiri-
 5 talium instrumentorum refrigeratio, aut tuberculum, tumorue
 sub septo transuerso putridus subesse indicatur. *MATHE TES, Que*
ex istis omnibus propria tussis causa dicitur? GERON, Exnotio-
ribus, laterum inflammatio cruda, aut febris. si hæc vrget, late-
rum, vel pulmonum inflammatio erit. si dolor laterum tussis con-
 10 *iunctus est, illorum inflammatio. si malæ rubeant, & ægri in re-*
spirando multum laborent, pulmonum cetisebitur. at si febris af-
fligat, cui tumor in dextris præcordijs adsit, & grauis dolor, qui ad
iugulum peruenit, iecori inflammatione compresso tussis adscri-
benda est. sin illa non accidant, caput tenui forsan defluxione la-
 15 *borat, quod ex febris essentia & sputo cognoscitur. verum tussis*
tunc non est inanis, vt, in qua aliquid educatur, os humidum sit,
& sputum præcesserit. MATHE TES, Quid defluxionem illam ex-
citauit? GERON, In solatus, vel sub luna inambulatio, & corporis
quædam grauitas. MATHE TES, Quid tussim mouet, si neq; hæc
 20 *egger accidisse dicat? GERON, In aqua inter cutem materiam quan-*
dam in thorace esse collectam dicemus, si tumor in ventre sit, &
malus corporis habitus. si neq; is sit, interrogandus æger, num
capite nudo in aëre frigido versatus fuerit, vnde respirationis in-
strumenta nimium perfrixerint, aut si calore æstuanis, aquam fri-
 25 *gidam biberit, aut si torquem aliquem, ex quocunque metallo su-*
per nudum pectus gestarit. atq; eiusmodi tussis, si recens & parua
fuerit, curatur, si spiritus retineatur. MATHE TES, Quid si prædictæ
partes neq; perfrixerint, neq; aliud quid ex superioribus præces-
serit? GERON, Costæ, aut pulmones tuberculo, vel abscessu aliquo
 30 *frigido obsidentur, quod diurnitas morbi declarat. nam si ri-*
gor aliquis nunc sine febris præcesserit, nunc cum febris quadam
exigua, inordinata, & citra occasionem exteriorem sentiatur, ab-
scessum prænunciat. MATHE TES, Quid tussis humida signat? GE-
 35 *RON, Si quod reiicitur, flauum est cum febris, interiora inflamma-*
ri: si cum dolore punctorio coniuncta est, latera: si cum rubore
malarum, pulmones indicant. nam color materiam & inflamma-
tionem prodit. MATHE TES, Quid singula sputa ostendunt? GE-
RON, Cruentum sine dolore & febris editur: sanguinolentum in-
 40 *flammationem ex sanguine ortam denunciat, MATHE TES, Ex*
qua parte vnum quodq; sputum excernitur? GERON, Nigrum &
crassum ex thorace: flauum è pulmone: varijs excrementis mi-
stum, è cerebro: album, tenue, & spumofum per tussim sine febris

*Tussis.**Propria tussis causa.**Tussis inanis seu des.**Tussis humida.**Tussis humida.**Sputa.*

eductum, defluxionem: crasum, destillationem in pulmones demonstrat: in quibus excipitur & inspissatur: si diu ibi manserit, puri simile euadit. id si album, læue, & æquale apparet, concoctæ inflammationis indicium est. si pus per tussim redditur, suppuration, quæ *μπύημα*, græcè vocatur, vel vlcus in pulmonibus existit. quod si suppuration præcesserit, abscessus notatur. si tussis sanguinis sputum, vel acrem defluxionem secuta sit, vlcus subesse consicimus. atq; hac ratione tussis, partem offensam, & morbum indicabit. **MATHESES**, Quæ alia partes affectas significant? **GERON**, Earundem dolores, vt qui pro situs illarum ratione variantur. **MATHESES**, Id explica. **GERON**, Quia cum vlceris notæ per vomitum apparent, si anteriora præcordia doleant, ventriculū affici: si posteriora, gulam affligi argumentum est. Sic dolor præcordia dextra excrucians, iecur: sinistra occupans, lienem malè affectum arguit. Iam diuersa doloris species, suam quæq; partem læsam testatur. hinc pulsatis arterias inflammatione tentatas comitatur: modò pars, in qua illæ consistunt, sensu sit prædita. **MATHESES**, In ea igitur parte sola, quæ sensibilis est, talis dolor percipi potest? **GERON**, Vtriq; cum enim pulmo, sicut iecur & renes, sensus expers sit, neque in illius inflammatione, quæ Græcis *πνευμονία*, dicitur, neq; in laterali morbo, qui *πλευρίτις*, vocatur, ille deprehenditur: idq; accidit, quia nullus neruus, per totum pulmonis corpus dispersus est: ob quod etiam eiusmodi dolor, nec in iocinore, nec in renibus percipitur. imò nec membranam, quæ costis obducta est, & inflammatione tentari solet, affectam indicat: eò quod arteriarum prorsus expers sit. nam hæc per media costarū spatia extensæ, ad illam minimè perueniunt: quanuis punctorius dolor membranas offendi nunciet, eò quod hæc doloris species propriè ad eas pertineat. **MATHESES**, Quis dolor iecoris, & renum inflammationem testari solet? **GERON**, Grauis. nam membrana vtriq; huic visceri, sicut etiam pulmoni annexa, ob neruum in eam disseminatum, sensibilis est. Cum autem à tumore quodam in vtroq; viscere prædicto distenditur, talem doloris speciem experitur. Cæterum qui dolores vllam partem infestant, semper illorum vehementia, siue magnitudo, remissio siue mediocritas, obseruari debet, vt quæ sæpenumero locum affectum simul indicet. Quantum verò dolores laterum, pectoris, & aliarum partium inter se differant, animaduersione dignum est. **MATHESES**, Quæ propria sunt, inter omnes suprà commemoratos locorum affectorum symptomata, ex quibus illi cognoscuntur? **GERON**, Cibi fastidium, ventriculi: alui deiectiones alborubentes, iecoris imbecilli: malæ rubentes, pulmonis inflammati, atq; hi casus certiores

*Dolor quomodo
partem affectam
indicit.*

*Diuersa dolorum
species.*

tiores sunt indices, quando corporis natura ac status, ætas, consuetudo, & prægressa victus ratio simul respondent. MATHETES, Quia nuper meministi societatis ac consortij, quod partes læsæ cum alijs habent, cupio ex te discere, quænam propriè ex se, ac primariò, quæ verò ex aliarum consensu, pariter doleant. GERON, Hæc peculiariter affecta dicitur, in qua morbus constanter perseuerat. ex consensu autem ac secundariò, quæ ex alia, vel cum ea, morbum non diu sustinet, licet eo nondum penitus sit liberata.

Pars propriè affecta.

Ex consensu læsa.

Tribus modis fit affectus per sensum.

Primus.

Secundus.

Tertius.

Crurum resolutio per consensum.

Digitorum seu por ex consortio.

- MATHETES, Quot modis id contingere solet? GERON, Tribus potissimum: primò, vbi pars aliqua cum altera prius offensa ob peculiarem consensionem, quam ambæ inter se habent, condolefcit: vtpote quando caput ob vterum, vel ventriculū afficitur, oculi, vel caput ob vapores, humoresue in ventriculo contentos, sursumq; eleuatos, simile suffusioni vitium, vel dolorem experiuntur. Iugulum ob iecoris, vel lienis, vel aliorum viscerum grauitatem, affectu aliquo, aut tensione, membranæ costas succingentis interuentu, vexatur. Mammæ, & inguina ob vterum laborantem: peritonæum, quo iecur integitur, & alligatur, ob membranam, quæ septum transuersum constituit, affigitur: adhæc quando ventriculus in colico dolore consentiens, nauscat. Si certior esse voles de capitis dolore vnde venerit, inquiras, num ventriculus doleat, aut ructus acidus edat, qui cruditatem ciborum significant, aut nidorolentos, qui corruptionem illorum testantur, aut biliosa vomat, nam si hæc fiant, nulla de dolore consortij lege facta dubitatio erit, præsertim si à vomitu ante & post cibum facta, meliusculè habeat. Altero, cum pars materię, quam ab alijs præparatam suscipere consueuit, destituitur: vtpote cum vox efflatione, quæ illius materia est, amissa vitiat. Tercio, cum aliqua facultas, quæ ad partes quasdam, cum naturaliter actiones suas obeunt, descendit, ob aliud membrum, à quo illa transmittitur, primariò affectum prohibetur. exempli causa, quando crura propter spinalis medullæ inflammationem resoluantur, & manus digiti sensum amittunt, cum ea pars spinæ quæ circa dorsi initium consistit, prius fuerit affecta. Nam instrumentorum vocis, crurum & digitorum actio, licet nulla affectione contra naturam violetur: tamen, quia illa hoc carent, quod naturaliter ad ipsa peruenire debet, ex consensu affici dicentur. Guttur enim efflatum spirituum, digiti vim sensoriam, crura motoriam recipiunt: quibus illa suis singula in naturalibus actionibus vtuntur. MATHETES, Iam intelligo, quid sit partem aliquam corporis propriè, ac per se duntaxat, quid rursus casu ac fortuito, siue ex consensu alterius affici: dic nunc amabò, potestne eadem pars

*Partes primarij
ex consensu læ-
sas diagnosticare
quid conferat.*

tum primariò ac propriè, tum secundariò ac consortij lege, quod cum altera habet, simul offendi: GERON, Indubiè, quando ipsius offensio diu perseverat, duratq̃. Non parum autem refert, ut primariò læsam partem, ab ea, quæ alterius consensu laborat, dignoscas. nam hinc condisces, cuinam morbo remedia adhibenda sint, quodq̃ illa quæ primariò affecta est, curata, nullus in ea quæ secundariò offendatur, affectus vitiosus relinquatur, quo usq̃ aliquis in ea perseverantior fuerit. MATHETES, Cum multas variasq̃ partium affectuum notas his recensueris, metuo, ne mihi facile, sicut alia excidant, eoq̃ te rogo, ut summatim iterum eas perstrin-
gas, quænam potissimum, & quot existant. GERON, Quamvis non opus esse iudicem: tamen in hoc quoque tibi gratificabor.

*Note partium
vitijsorum.*

Sunt igitur excrementa, actio læsa, doloris proprietas seu species, situs & peculiaris accidentia. MATHETES, Necessariòne ista semper affectum demonstrant: GERON, Licet non omnia, tamen aliqua ipsorum. MATHETES, Eius rei testimonium adferas: GERON, Peculiaris dolor, situs, & propria symptomata, iecur inflammari aperte ostendunt, quamvis neq̃ actio offensa videatur, neq̃ excrementa profluant. Eodem modo sola sanguinis expul-
tio, vlcus factum, venamq̃ erosam testatur, quamvis nullum ex reliquis signis prodeat. MATHETES, Quid nomine excretionum intelligitur: GERON, Interdum portio quædam sedis affectæ, quæ certò aliquid signat. quia circuli cartilaginei per tussim eiectionem arteriam asperam notant: carunculæ quædam, quasi capilli vrinę insidentes, renes: ramentum in alui excrementis, tenue quidem
superiora, crassum verò & carnosum, inferiora intestina exulcerari denunciat. Interdum non partis essentia, sed quod ei adherescens excidit, ut intestinorum adeps. interdum quippiam, quod pars læsa continet: veluti si vrina per vulnus acceptum profluat, vesica: si excrementum alui, intestinum fauciatur: pectore autem
vulnerato, si spiritus effletur, membrana costis obducta diuellitur. Præterea excretionis modus affectæ sedis notitiam affert. nam sanguis ex vlnere tanquam saltu exiliens, arteriam adaper-
tam esse notat. Quod si pura & solitaria loci affecti portio excrenatur, ex proximis sedibus provenit: si excrementis naturalibus
tota permisceatur, ex longinquis & sublimioribus prodit. Porro actionis læsio eam partem, quæ illam edit, offendi indicat, sicut cæcitas, oculum: surditas, auditum: cruditas, ventriculum.

Excreti nomen.

*Excretionis mo-
dus.*

*Quæ propriè par-
tem affectam in-
dicent.*

MATHETES, Quæ res partem primariò affectam esse testatur: GERON, Doloris species. nam pulsans quidem, vel arteriam, vel
locum ei proximum affici ostendit: pungens autem, membranam: conuellens, nervos, aut tendines: extendens, venas: contun-
dens

- dens ac profundus, ofsium membranas: laxus & mollis, carnem: grauis & obtusus, viscera: aut aliam partem obtusiori sensu præditam. *MATHESES*, Quid offensæ partis, dolorem tumoremq; indicat? *GERON*, Situs ipsius ratio. nam si dolor dextris præcordijs penitus insidet, iecur afficitur, non lien. si verò sinistris, lien, non iecur infestatur. Quod si tumor dextra præcordia obsidens, per extremas costas lunari figura porrigatur, iecur eo affligi indicium est: si in ventris longitudinem extendatur, rectis abdominis musculis, ascribi debet. atq; hæc signorum genera affectas sedes indicant, quarum propria, & quæ separari nequeunt, certissima deprehenduntur: quæ verò assidentia vocauimus, multorum sunt communia, & ambigua. At non solum ex signis, sed etiam inuestigatione quadam cognoscuntur. Siue igitur actio læsa fuerit, siue excrementum, siue dolor infestet, pars affecta primum ex situ & specie quodammodo innotescit: deinde inquirendum, num alia quoq; symptomata priori coniecturæ consentiant. nulla enim solitaria existunt, sed multa semper vnius, eiusdemq; morbi coniunguntur. Quod si ergo vna eademq; pars affecta, ex illis vniuersis ab ægro auditis significetur, iam ipsa comperta erit, sin autem ipsa varientur, dissideantq; alia quedam inuestigari debet, donec tandem aliqua reperiatur, quam affici certa indicia confirmant. *MATHESES*, Quomodo vnica tantum sedes laborare nocitur? *GERON*, Si omnium symptomatum notæ eodem tendant, neq; vlla aliò quoq; declinet. At non satis est hoc tibi constare, sed etiam scire oportet, propriōne affectu pars aliqua, an alterius, & cuius consensu laboret: adhæc si peculiari, num etiam primario, an ex alio, qui præcesserit, suborto affligatur. *MATHESES*, Exemplis hoc reddas dilucidius? *GERON*, Si quis abs te consilium de spirandi difficultate petierit, inquirendum est, num ea actione vitata, instrumentū quoddam respirationi dicatum, afficiatur, faucesne, an aspera arteria proprio vitio laboret. sin autem nullum in his deprehendatur, in pulmonem, aut thoracem, aut septum transuersum, aut vicinas partes referri debet. Quod si stertor respirando percipiatur, & tussis sine doloris sensu molesta sit, pulmo offensus est: si thorax dolore prematur, præsertim circa dextri lateris costas, priores quinq; quas *ὀστέες* greci vocant, ex alijs signis dignoscendus est. Nam si punctorius infestat, cum febris continua, & tussis, qua cruentum expuitur, membranæ costas cingentis inflammationem testatur: grauis autem cum febris continenti, tussiq; sicca, iecur inflammatum indicat: id autem magis confirmant, tumor in dextris præcordijs, lunari figura subsistens, lingua scabra, & nigra, sitis admodum vehemens, magnum cibi fa-

Doloris & tumoris notæ.

Symptomata nulla solitaria.

Vnica sedis affectus signa.

Spirandi difficultas cui instrumentum eo ascribenda.

Pulmo offensus.

Membrana costarum.

Iecur inflammatum.

stidium, vomitus biliosus, frequens deiectione biliosa, vrina crassa
 & rubra: si multa ex hisce signis desint, alijs partibus ascriben-
 dus est. *MATHE TES*, Quid si dolor sub lateris sinistri costis excru-
 ciet? *GERON*, Proprietate ipsius animaduersa, coxa, muscoli abdo-
 minis, lien, colon intestinum, ren sinister, & aliae illius regionis
 partes omnes, quarum magna est affinitas, considerari debent. 5
 Si dolor ille inferius ad crus vniuersum pertinet, atque id incessu
 ingrauescit, signaq; defluxionis ipsum præcesserunt, coxæ attri-
 buendus est. Si verò is contactu manus, quamuis blando depre-
 hendatur, & tussi, sternutamèto, & alta inspiratione exasperetur, 10
 abdominis musculos obsidere significatur. si verò tumor cum do-
 lore, sinistris precordijs circumscriptus appareat, ægerq; difficul-
 ter in sinistrum latus decumbat, & flatus copiosi inter concoquen-
 dum excitati, ventriculū distendant, aut per ructus erumpant,
 metusq; & tristitia diu molestant, lienis affectus argumentum 15
 est. At si dolor fixus ab ea regione, qua meatus vrinarius inter co-
 stas extremas & coxam progreditur, per ilia in vesicam ferè per-
 tingens, aluo soluta non omninò conquiescat, sed vomitio varia,
 crebraq; vrine reddendæ cupiditas, cum ardore, eiusq; essentia, vel
 quæ in ipsa continentur, minùs naturali in statu existant, renem 20
 affici demonstrat: colum autem dolor vagus, lateq; diffusus: qui
 aluo citata, liquataq; sedatur. Interdum affecte partes, non ex con-
 sueta inuestigatione, sed acri tantum iudicio deprehenduntur.
 verbi gratia, si quis ter quaterq; meri puris, libræ instar quotidie
 per aluum reddat, nunc cum recrementis, nunc absq; illis seorsim, 25
 sic vt nullus neq; dolor adfuerit, neq; sitis, neq; cibi fastidiū, neq;
 valida febris, sed lenta solum, neq; æger decumbere cogatur, non
 ex alio abscessu, quàm sub transuerso septo, rupto emanare po-
 test: vt quod in solo mesenterio parte ignobili, & sensus experti,
 nec non in ima eius sede contractum sit, è qua pus sincerum, in- 30
 testino recto influere potuerit. *MATHE TES*, Cur non in ventricu-
 lo, aut intestinis tale pus collectum est? *GERON*, Quia in his sine sen-
 su esse non potest: neque in renibus, aut vesica: quia ex his non in
 aluū, sed ad vesicam transitus est. neq; in iocinore, aut liene: quia
 horum abscessus ægrotantem, prorsus conuellunt cum febris ar- 35
 dente, siti & alijs grauibz symptomatis. *MATHE TES*, Quomodo
 affecta sedes dignosci potest, si multa indicia, variaq; symptomata
 concurrant, quorum neq; vires, neq; notæ ad vnam pertingant?
GERON, Tunc etiam sedes affecta non simplex, nec vnica esse po-
 test: imò neq; morbi simplices, sed reuera confusi, & impliciti ap- 40
 pellantur, qui etiam difficulter explicari possunt: præsertim cum
 affectæ partes vicinæ sunt, & in communem quandam actionem
 consen-

*Coxæ dolor.**Abdominis mu-
sculi affectio.**Lien affectus.**Renis affectus
colon.**Meri puris ex-
cretio.**Mesenterij affe-
cti nota.**Si multa signa
apparent, quo-
modo pars affe-
cta cognoscatur.*

consentiant. MATHE. Quomodo discerni poterunt? GERON, Singu-
 lorum indiciorū vires, ac nature obseruande sunt, quotcūq; ean-
 dem partē simul demonstrant, seorsum referri debent, donec tan-
 dem deprehendantur, quę partes primariō sint affectę. Verbi gra-
 5 tia, si quis difficulter respiret, veteriq; tussi laboret, stertat, sputūq;
 copiosum edat, & lateris dolor deinde his accedat, necesse est non
 solū hoc, sed etiam pulmones iam diu obstructos fuisse, eoq; mor-
 bum hunc pleuriticum asthmati implicatum dici posse. Rursus
 non vna pars, sed plures affici videntur, cum vrina difficulter, cum
 10 acri dolore, ardoreq; excernitur, & pus, quā primum illa reddi-
 tur, effluit: sic vt ipsa nunc sponte non profluat, nunc intercipia-
 tur: adhęc cum dolor antequam vrina prodit, acrius excruciat, &
 sabulosum, aut viscosum quippiam exit, dolorq; sæpius ad anum
 vsq; pertingit. MATHE T. Quę partes hic offendi solent? GERON,
 15 Colis meatus, vlcere: vesica, calculo affici notatur. Hęc autem de
 partibus vicinis dicta sunt: quę longiūs inter sese distant, prom-
 ptius cognosci, sicut etiam morbi in ipsis, possunt, eō quod sym-
 ptomata prorsus dissimilia edant. MATHE TES, Exemplum pro-
 feras? GERON, Cū vrina purulenta citra doloris sensum reddi-
 20 tur, sic tamen, vt lumbi doleant, faucesq; & ceruix intumescant
 cum rubore, spirandi & deuorandi difficultate, febrēq; ren, vlce-
 re: fauces angina torqueri nuntiantur. MATHE TES, Si partes affe-
 ctę signis istis indicantur, ex quibus obsecro affectus ostendun-
 tur? GERON, Ex iisdem ferē ambo plerūq; innotescunt: sed nunc
 25 offensa sedes, nunc affectus ipse manifestior existit. Vt igitur mor-
 bum breuiter cognoscas, quęras ex agro, primum, totōne corpore,
 an in parte aliqua doleat. nam si dolorem in eo sentire fateatur,
 statim lassitudinem adesse censebis. Qualis autem sit, inde compe-
 ries, si eger se, vel saltu, vel alio exercitio & modo, qui eam excitare
 30 potuerit, antea commouisse dicat. At si hinc membra tanquam fra-
 cta sentiat, tensoriam: si verō illa tanquā aciculis pungi con-
 queratur, vlcerosam esse: si inflammatione, & tensione eadem
 tentari affirmet, inflammatoriam esse scias: si deniq; citra vllum
 exercitium, corpus lassum fuerit, spontaneam esse cognoscēs. Atq;
 35 ita qualis sit corporis status, & quid inde futurum denuciare po-
 teris. nam tensoria lassitudo, morbos ex humorum copia: vlcero-
 sa, ex vitiosis succis futuros prælagit. maximē si anni tempestas,
 natura ægri, & morbi eo tempore grassantes, consentiant. MA-
 THE TES, Ex quo alio morbum deprehendis? GERON, Ex tactu,
 40 quo vel calorem, vel frigus, in corpore, aut parte, & tumor ne ali-
 quis, an nullus appareat, percipies. nam si pars multum caleat, mi-
 nus autem tumeat, nec pulset, colorem autem ex rubro flauescen-

*Quę morbos de-
nunciant.*

Lassitudo.

Tensoria.

Vlcerosa.
Inflammatoria.

Spontanea.

Erysipelatis nota. *Canceri.* *Intemperaturæ.* tem habeat, erysipellate ipsam laborare significatur: si verò tumida, dura, insolens, & nigricans existat, cancro affici dicitur: si dolor cum calore aut frigore vrgeat, magna subest intemperies, quæ inflammationem excitare potest. Quod si internus ægro esse videatur, statim interrogandus erit, an sitiat, vel caleat: si hæc fateatur, febris expectabitur: nec non partis offensæ inflammatio: quia interiorum dolores cum febris, citra inflammationem esse nequeunt. Exempli gratia: si dolor punctorius in latere excruciet, inflammatio illius aderit: si grauis, malæque rubescant, pulmonum. item si grauis dolor cum febris renes obsideat, illorum inflammatio, quæ grecis *νεφρίτις*, vocatur: si lienem, huius: si vterum, ipsius quoque: si vesicam, etiam illius inflammatio præsens erit. adhæc si dolor cum febrili calore, & excrementorum vomitu vmbilicum exerceat, eius quoque inflammationem adesse noueris: si aluum, in recto intestino, ita si ventriculum, tensiones, dolor, febris, sitis, vomitus biliosus, molestant, inflammatio etiam illius indicatur: idem dolor iecur affligens, sic vt ad iugulum, & dorsum ascendat, illud inflammatum esse signat. *MATHETES*, Quid dolor capitis in febris notat? *GERON*, Inquirendum est, illène primario incæperit, an hanc secutus sit. nam si incæperit, duraueritque, partem aliquam intus affectam esse demonstrat: si increuerit, rogandum quotus sit dies febris, & si concoctionis signa præcesserint, ægerque iuuenis sit, & facie rubicunda, sanguinis per nares profluum instat. sin autem caput doleat, & facies non rubescat, nec venæ intendantur, maxilla verò & labrum tremat, ventriculusque dolorem sentiat, vomitionem futuram declarat. *MATHETES*, Quid dolor capitis absque febris signat? *GERON*, Quærendum est, totumne caput, an pars eius afficiatur, eaque anterior, an posterior, numque dolor frequenter repetat. si eger dicat statim eum redire temporibus, in altera tantum ipsius regione, dextra vel sinistra, *ἐμπροσθεν*, græcè, à dimidia caluariæ parte, nominabitur. *MATHET.* Vnde naturam morbi cognoscam? *GERON*, Ex doloris proprietate, sicut antea de parte affecta etiam dixi. nam si tensio sine grauitate percipitur, à vapore tenui & flatulento trahit originem: si mordax ac vehemens, ex humorum aut vaporum acrimonia: si cum grauitate & pulsu, ab humorum copia. *MATHETES*, Habentne alij quoque morbi, suas dolorum species? *GERON*, Vtique, & præsertim morbus gallicus. nam in hoc dolor noctu scapulas, vel pectus affligit: recidius est, & vehemens, cibo potuque leuatur: ægri maximum frigus sentiunt: humectatione, leuique calore, & medicamentis offenduntur. tunc accedit, quod aliquando cum frequentiore spuitione infestet, aliquando tumores venereos, vel ardorem sentiunt

tiunt vrinæ. aliquando osium excrementiæ, græci ἐξοσέως, vocant, in ipsis apparent: id quod longè certissimum de hoc morbo signum est. adhæc, si dolor ex concubitu, aut retentione, aut immutatione vrinæ, cum astrictione alui prouenerit. MATHETES,

5 Qui alios morbos dolores proprii indicant? GERON, Si renes doleant, latusq; è directo partis affectæ situm, & vrina retineatur, aut tenuissima, turbidaue, aut cum calculis, arenisue reddatur, illorum affectus, non colicus existimandus est. Porro si foemina circa coxam doleat, & paulò ante peperit, aut abortiuit, vel mensium

Dolor nephriticus.

10 fluore laborauit, certè non coxendicis, sed vteri dolor, obligamenta quæ inguinibus illigantur, censendus est. Sin autem ista non euenerint, deficiant autem menses, dolorq; in anteriore & posteriore parte sentiatur, coxendici ille attribuendus est. MATHET.

Coxarum dolor.

15 Quid si ægri nullum se dolorem percipere dicant? GERON, Viscera manu contrectari debent, (nam sæpe dolor internis partibus, quas illi non cognoscunt, oboritur) & inquirendum, num ventriculo, iocinori, lienì, vtero, vesicæ, vel musculis interioribus obuenerit. solent autè plerumq; de externo dolore conqueri, cum magis interno afficiantur. MATHETES, Quibus indicijs parui tumores, partium interiorum deprehenduntur? GERON, Propria

Tumores parui quomodo deprehendendi.

20 quadam ratione potius, quàm aliena. videndum autem, ne ventriculus cibo, aut flatibus plenus sit, cum partes hæc contrectari debent, eò quòd illi impedimento sint. rogandum autem, an tumor sit cum febrì. nam si ille ante hanc sentiatur, nō ratione febris accedit, sed fortè visceribus scirrhus induratis ascribi potest. si verò

Interior pars affecta quomodo cognoscatur.

25 dolor febrì coniunctus fuerit, scirrhus inflammatorius, seu φλεγμονώδης, græcè dicitur: sin æger non doleat, tunc febris & scirrhus iamdudum prouenerunt. Si tumor non præcesserit, excitatus autem sit cum febrì, inflammatio, vel erysipelas inflammatorium esse, quod ex febrì constat, æstimari debet. nam ardens, viscerum erysipelas sequitur: continua, quæ σιωχέος, græcè vocatur, vel tertia

30 tiana continens, inflammationem. MATHET. Quid si in parte exteriori tumor appareat? GERON, Tunc & pars & affectus, nomen habent commune: verbi gratia in glandulis, bubo. MATHETES,

35 Quæ tumorum est materia? GERON, Alij ex magna defluxione, alij ex partium excrementis, & abscessus dicuntur, eòq; inquirendum, quomodo, & quales ipsi generati sint. qui enim dolorem adfert sine pulsu, ruboremq; habet, erysipelas est: qui mollis, & turgentì cedit, albidiq; coloris, ex pituita natus est, & græcis οἰδημα, 40 vocatur. qui verò renititur, & pellucidus est, ex flatu contrahitur, & inflatio græcè ἐμφύσημα, dicitur. si durus, pulsus & doloris expers, scirrhus. qui autem duritiem & punctiorum dolorem re-

Erysipelas. Oedema.

Scirrhus.

*Cancer.**Phyma.*

præsentat, cancer, si citò crescat. qui ad suppurationem statim tendit, phyma. qui in glandulis indurati sunt, *καυράδες*, appellantur, & cum suppurant, pus mellis instar reddunt. MATHE. Qui alij affectus minùs naturales sunt, quos ad morborum genera, & species eròu referri superiùs dixisti. GERON, Materiæ alterius quàm conuenit excretio, eaq; per regionem minùs idoneam, & tempore inopportuno, præterq; consuetudinem, vel cum difficultate. MATHE TES, Quam materiam putas. GERON, Humorem aliquem liquidum, aut crassum, siue sanguineum, siue pituitosum: sic ut obferuetur, quo ex loco, quo colore, quaq; essentia prodeat. non enim quiuis sanguis excretus, naturæ contrarius est, sicut is, qui à partu, & per menses tempestiuè, & mediocriter fluit: item qui per nares die critico, aut post dolores capitis excernitur. licet eius profluuium per crism, non in omni morbo acuto, lethargo, & peripneumonia laudetur, cò quòd vtraque affectio à frigidis excitetur humoribus: si tamen à calidis partim fiat, non est vituperanda: quemadmodum neq; in puellis, quibus menses nondum eruperint: vel quibus hæmorrhoides sunt suppressæ, sanguinis effluxio improbanda est. quanquam omnis immoderata vitiosa sit, mali habitus futuri, & aquæ subter cutem caussa. MATHE TES, Cur sanguis naribus post casum ex alto, vel percussione emanat. GERON, Ob venam fractam in cerebro, huiusq; vel membranarum ipsius læsionem. MATHE TES, Vnde sanguis prodit, si per sputum duntaxat edatur. GERON, Ex gingiuis, vel aliquo oris vlcere, si adsit. sin autem modicus per tulsiculam reijciatur, ex aspera arteria. qui verò cum respiratione & tulsicula expuitur, varijs recrementis permistus, ac niger, è cerebro in arteriam asperam defluit. quare videndum est, num tale quippiam è naribus sit excretum, id quod à balneo, in solatu, & capitis exustione, fieri solet. MATHE TES, Vnde sanguis crassus & niger excernitur. GERON, Ex venis thoracis, cum pars aliqua ipsius inflammata est cum feбри. tunc enim pleuritis infestat. Cum autem sine feбри illa calet, serosus sanguis, non crassus, nec congelatus excreatur. MATHE TES, Vnde per vomitum exit. GERON, Ex ventriculo: is interdum refrigeratus in illo, & congelatus redditur: interdum è naribus profluens ad gulam descendit, cum illæ obstructæ sint, non venarum ora. MATHE TES, Quid si fluxus sanguinis è naribus, ipsius per vomitum excretionem non præcesserit, sed aquæ frigidæ post saltationem excalfactionemq; corporis, potu. GERON, Is à congelatione per hanc facta, incrassatus editur. atq; ideo rustici hoc malum, piperatis curant. MATHE TES, Vnde tenuis & serosus humor vomitu reijcitur. GERON, Ab exteris ventriculi venis, quæ

*Sanguinis excretio.**Profluuium per crism in morbo acuto.**Sanguinis effluxio in puellis per menses.*

quæ grandiores iecoris portæ dictæ ramī sunt, refudat, ob quod etiam ater & tenuis existit. MATHETES, Vnde venæ istæ oriuntur? GERON, A ramo, qui ad lienem descendit, maximè si parte superiore sanguis profluat. si verò per anum, disquirendum, num à capite, mesenterio, tunicis intestinorum vlceratis, vt in dysenteria, an ex oris venarum in ano extantium. sin autem ex his manet, videndum ab externisne, an internis fluat. nam si ab externis profluat, tactu, visuq; cognoscitur, si tumidæ existant: sin ab internis, pondere, & deijciendi difficultate deprehenditur: item quòd sanguis, aut alia recrementa prodeant. sin absq; aliorū permissione excernatur, sanguis serosus, tenuis, & splendidus ob seri permissionem apparet. Quòd si vlcus intestinum rectum affligat, tenesmus adest, & sanguis recrementis liquidis aliquo modo permisceri solet, sed non multum, vt in superiorum vlcere accidit. Minus egri dolent in recti intestini vlcere, cum aluum deijciunt, quàm in superioribus affectis: eò quòd excrementa hîc citius, ob illius rectitudinem transeant. At si à colo sanguis excernatur, magis recrementis mixtus est, doloresq; maiores, & ægri non statim deijciunt. Quando autem à tenuibus intestinis sanguis effluit, vehementes sunt dolores, & maior eius cum excrementis permixtio cernitur, ægriq; longè post dolores excernunt. Copiosus, colore aquæ, in qua recens caro lota sit, assimilis, ex venis meseraicis per aluum excretus, iecoris imbecillitatem indicat: sicut crassus, & picis, vel bituminis modo niger, sine dolore per anum descendens, præsertim in otiosis & voracibus, partem quandam à iocinore abscissam affici notat. At vulnere factò, per anum excretus, intestina vulnerata signat, idq; si stercora etiam exeant, per vomitum autem reiectus, ventriculum offensus testatur, præsertim si chylus siue cibi cremor simul erumpat. Porro sanguis cum saltu exiliens, arterias adaptatas esse ex vulnere notat, vti citra saltum erumpens, venas: illarum autem tenuis, harum crassior existit. Naturalia læsa, sanguis cum vrina, vel sine illa per colem effluens signat, si antea instrumentum aliquod ipsi indurum fuerit, aut medicamentum acre, sin autem cum vrina prodeat, statimq; subsidat, vesicam. si verò diutius in matula hæreat, antequam resideat, renes affici, & ex illis descendere dicitur. ex his etiam minus serosus, ex vesica magis profluere cernitur: hunc autem medicamentum acre, & vlcus: illum dolor, vel calor præcessit. MATHETES, Quid sanguis ex vasis seminarijs elapsus notat? GERON, Immoderatum coitum præcessisse. MATHETES, Qui per muliebria fluens indicat? GERON, Vel supradictos locos, vel ipsum vterum, vel eius ceruicem affici. sin autem paulatim sine sensu excernatur,

*Sanguis in graui-
da profuens.*

*Abortus ex fluo-
re sanguinis bilio-
si.*

Pus effluens.

*Aperitio absces-
sus.*

Puris odor.

*Puris essentia &
qualitas.*

minoreq; copia, ipsum vterum offendi notat, nisi foemina pepe-
rerint. si maiore abundantia, ceruicem ledi: idq; sine aliquo partu,
& post difficilem solet accidere. Magna sanguinis in grauida mu-
liere per vterum profusio, abortum iam fecisse, vel paulò post ex-
perturam esse, vel imbecillem foetum indicat. Exigua vero, sero-
sum potius, & sanguineum humorem fluxisse arguit: & si eo tem-
pore contingat, quo foemine consueuerunt purgari, minus peri-
culosa est, praesertim quando sanguineae sunt, & id ex consuetudi-
ne habent: nam in biliosis, acrimonia bilis vim expultricem susci-
tat. Tales, ubi sanguis in eis retinetur, citius abortiunt. Quò au-
tem foetus grandior extiterit, tantò maior sanguinis copia ex vte-
ro excernitur. Quinetiam copiosus sanguis, ore magnae alicuius
venae patefacto, vel rupta aliqua insigni, vel exesa: isq; tenuis & se-
rosus per resudationem emanat, per intestina erumpens, vulnere
iuxta abdomen facto, illa esse laesa testatur: vt si vomitu reiiciatur,
ventriculum: si per sputum, vulnus ad thoracis canalem perue-
nisse, non autem pulmones necessariò offensas esse notat, nisi te-
nuis ipse & spumofus appareat. MATHETES, Si per aures & ocu-
los etiam effluat, quid portendit? GERON, Venam aliquam cere-
bri, aut eius membranam, idq; post ictum, vel casum, ruptam esse:
quemadmodum etiam si per os, vel nares reiiciatur. Hoc obser-
uatione dignum est, aliquando sanguinis serum, vel sanguinem
serosum, ob ipsius tenuitatem, nimiamq; venarum & cutis rari-
tatem per ipsius meatus emanare, ex vena autem & arteria per vul-
nera. MATHETES, Quos affectus pus ex parte aliqua prodiens, in-
dicat? GERON, Abscessus apertionem, praesertim si tumor dolorq;
antecefferit. sin autem excrementis permistum magis cernatur,
locus in quo continetur, remotior esse cognoscitur, vt renes, vel
iecur. Differt autem pus alterum ab altero essentia & qualitate,
pro partium singularum natura & alimentis. Nam partes carno-
sae album & aequale, mediocriterq; crassum, qualem essentiam san-
guis obtinet, progignunt: neruosa viscosum, crassum, album,
quale ex vesica reddi solet: articuli sanguinolentum reddunt: vi-
rorum naturalia tenue, liquidum: ex glandulis meatuum semina-
riorum, glutinosum, visci & albuminis oui agitati instar. Adhuc
quod excernitur è renibus, vesica, & alijs partibus, in quibus ex-
crementa continentur, foedi odoris: quod à parte gangrenam, aut
cancrū experta, aut vsta, ob putrefactionem cadauerosum quid-
dam odoratu refert. Aquosum, partem frigidiorē notat, ex qua
effluit: sicut flauescens & acre, rodensq;, partem intemperatam ca-
lore, vel bile in eam defluente, vel adustam. At album, leue, e qua-
le, modicū, partem quidem fortiorē, facultatem autem eius ma-
lè affe-

- lè affectam: quemadmodum paucius, & tenuius, quàm vt expui possit, intus retineri, vel callum in vlcere, aut sinum fieri significat. MATHETES, Quid vrina copiosior solita designat? GERON, *Vrinae excretio.* Quòd æger peponibus se repleuerit, aut fœniculum marinum, aut lauer, aut medicamentum aliquod ex cantharidibus assumpserit; aut si nihil ex his præcesserit, morbum adesse notat, qui largiore eius profluuiò solui consuevit, vt aquæ inter cutem genus, quod *ἀνασάρκω*, dicitur, aut alium quendam acutum. Quòd si nullus ex his appareat, de vitio in renibus suspiciò erit, præsertim *Anasarca.*
- 10 si dolor, vel grauitas circa illorum regionem percipiatur. sin autem morbus in renibus subsistat, & perseueret, diabetes præfens, *Diabetes.* aut futurus indicatur. MATHETES, Quid signat vrina tum sani, tum ægri copiosior, quàm potus assumptus, præcipuè noctu reddita? GERON, Paruam alui deiectionem, sicut larga post fluorem ventris, deriuationem ad renes ostendit, curationisq; spem adfert. copiosa autem cum cruore mista, instrumentum aliquod, aut medicamentum acré vesicæ inditum. larga non semel, sed pluribus vicibus reddita, ardorem, vel obstructionem ceruicis vesicæ ex tubere, vel calculo factam indicat. copiosa turbulenta, humorum commotionem arguit. per vulnus, vel anum excreta, vesicam erosam. Quòd si præter voluntatem egrediatur, musculi illam ambientis resolutionem, vel vlcerationem naturalium signat.
- MATHETES, Sûntne alij adhuc superflui humores, quorum excretio morbos indicat? GERON, Pituitosi, similesq; & sanies, quæ *Pituita excretio* græcis *ἰσχυρ* vocatur, eorumq; excretionis modus, essentia, qualitas, & mistio cum alijs suos singuli morbos produnt per nares, os, aluum, yterum, pudenda virilia: hq; copiosiores quàm alij humores. quia maior illorū portio, quàm horum post sanguinem in corpore nostro existit. Interrogandus igitur æger, vt in sanguinis
- 30 effluxione docui, num sub dîo versatus sit, frigusq; senserit in capite. Quòd si largior æquo pituita, spumosaq; & longis intervalis expuatur, cerebrum, ex quo per palati foramina educitur, minus humidum, flatibusque obnoxium signat. si tenuis, continuè, & largiter, per multos dies fluat, destillationem esse, quæ græcè *Catharrus.*
- 35 *καθάρσις* appellatur: præcipuè cum vna laxata fuerit, vel interna oris pars vlcerata, vel si corpus concalescat. vbi laxatio vna restituta fuerit, frequens spuitio conquiescit. si vlcus infestet, falsi humoris copiosi in cerebro redundantis inditum est: atq; tunc ex facili curatur. si non, luis venereæ argumentum est, præsertim post
- 40 argenti viui vsum. Quòd si eadem pituita sine vlcerè fluat, ita vt caput simul, scapulæq; & pectus doleant, morbi venerei suspiciò est, sic vt etiam neq; vlcus, neq; dolores, neq; fluxus ventris infe-

*Recidiva morbi
Gallici.*

*Pituitæ excretio
quid notet.*

stent, sed corpus emacietur. in ijs autem, qui illum experti sum, recidiva timenda est. Cæterum si pituita cum leui tussicula educatur, aspera arteria affecta est. si verò spumosa, crassa, glutinosaue excernatur, è pulmonibus ægrè spirantibus exit. si cum sono edatur, anhelationem parit. crassa & putris notat, morbum diuturnum, si ad fundum in aqua descendat: si innatet, pus est. Sincera, aquosa, & albuminis ouorum similis vomitu reiecta, cruditatem, & stillationem ex cerebro signat, quòd si destillauerit, & alui deiectiones spumosa appereant, è cerebro fluxisse Hippocrati creditur. Acida in ventriculo subsistens, magnam famem: sicut dulcis par- 10 uam cibi appetentiam ostendit. Amara, bilem ei admistam esse, si- cut falsa, serosos humores, & putredinem testatur. si diu reijciatur, è cerebro defluxit: pauca verò, & spumosa, solaq; sine multis excrementis per aluum descendens, à recto intestino redditur. sit autem ea spumosa per agitationem, vt in tenesmo. E contrario 15 multa vitrea alijs excrementis mixta, ab intestinis expurgatur, nunc cum ægri medicamentum acre assumpserint, nunc cum fluxus vitiosus præcesserit. illud enim talem ab intestinis abradit, præsertim si ventris tormina sentiat: vt etiam exulceratio illorum inde futura, prænnunciari queat. At si cum vrina reddatur, vel co- 20 piofa, glutinosaq; calculum vesicæ notat, præsertim si vrina suppressa sit, & æger pondus ac grauitatem supinus magis, quàm re- ctus sentiat: irem si naturalia scalpat, & interna costarum pars stumpeat. Pauca, cui insunt filamenta, dolorem, vel calculum renum significat: maximè si æger arenas aliquando antea reddiderit, & 25 aliàs hæ retentæ fuerint. Quæ saluæ & albumini oui agitati similis, per naturales partes sine vrina, vel cum ea excernitur, sic vt naturalia quidem erigantur, sed citra coitus desiderium, continuam glandularum iuxta meatus seminarios inflammationem, vel seminis abundantiam seu morbos denunciat. MATHETES, 30 Quæ vitia bilis vberior efficit?

*Bilis quæ vitia
excitet.*

GERON, Per vomitum, & tussim in lateris dolore & febris reddita, pleuridem, ex ipsa contractam. nam in hac sputum fla- uum esse, aut subflauum, aut spumofum, & paucum solet. Sin autem vomitu, flauum, & amarum reijcitur, flaua bilis è vesicula fel- 35 lis in ventriculū, propter intestinorum astrictionem, vel in- signem illius post vomitum pituitæ & cibi attractionem, defluit. At si rigor præcesserit, aut secutus sit, siue cum febris, siue citra il- lam, & ipsa bilis copiosa per ventrem & stomachum continuè fluat, cholera morbi suspitio est, præsertim vbi victus morbo 40 huic generando idoneus antecesserit, qualis ex peponibus copio- sis, oleribus calidis, amygdalis, tempore calido, & ab eo qui habet ven-

Cholera morbus.

- ventriculū calidū, assumitur. Viridis, ac æruginosa bilis ex magna assatione, vel suille carnis esu contrahitur. Purpurei coloris, seu glastea bilis, per aluū citra medicamenti vsū excreta, ventris profluuij, quæ græcis *Διάρροια*, dicitur, vel difficultatis intestinorum, quæ *δυσελγία*, vocatur, principium indicat, præcipuè si cum torminibus, & pituitosis excrementis, aut ramentis, aut sanguine exeat, sin autem cum sero, aut liquidis alijs excrementis, quæ ramenta sunt aquosa sine rosione, sicut in quibus ouiluteum sit dissolutum, lienteria censerī debet. *Glastea bilis excretio.* MATHET. Vnde sincera bilis profluit. GERON, Ab exterioribus partibus, ac nota est: quippe multa per vesicam, multa cum vrina expurgatur: per vterum etiam cum alijs excrementis. sic quoq; per nares & pulmones euacuatur. per aures pauciora. at quæ ex capite prodit, non sincera, sed quæ pituitam quandam crassiores, admixtam habeat. Quæ per vomitum reijcitur, lutei oui colorem & essentiam refert, vulgo vitellina dicitur, ac in febris, morbi longitudinem nunciat. MATHETES, Quorum vitiorum humor melancholicus index est. GERON, Si per vterum excernitur, eius frigidam intemperiem notat, cum nihil aliud sit, quàm sanguis perfrigidus, siue congelatus. *Lienteria.* Sincera bilis per vesicam cum vrina. 20
 odoris, modicum & prauum, cancrum in vtero exulceratum, ostendit. Si verò pars offensa indurata sit, & dolor anum pungat, certum est cancri vterum obsidentis, testimonium. MATHETES. Quid sputum nigrum reiectum portendit? GERON, Laterum inflammationem ex humore melancholico contractam, si aliàs adfit. nigrum & tenue per vomitum excretum, humorem melancholicum, è ramis venæ portarum, in ventriculū delatum, signat. per aluū descendens aliquid bituminis Iudaici instar, nigrum, difficultatem intestinorum indicat, quæ improprie dysenteria appellatur: illis consueta, qui in otio degunt, vel mutilati sunt, vel alimentis valentis materiæ vtuntur. MATHETES, Quæ præterea corporis affectus ostendunt? *Vteri cancer.* 25
 GERON, Concreta quædam materia, vel ramenta, quorum etiam superius mentio facta est. Sunt autem ea, grando, vel granum ordeī instar, per tussim reiectum: item calculus aliquis, aut grando ex pituita in pulmone nata: pellicula grandior, asperge arteriæ ramentum: item squamulæ, quæ partes sunt arteriæ: nec non intestinorum ramenta, pingue aliquod, calculus, vel pituita indurata. Quæ verò per aluū redduntur, ea prius dolor aliquis præcedit: quæ vomitu reijciuntur, vlcus in ventriculo indicant, vt plerumq; per venenum assumptum contingit. Per naturales autem partes, ramenta carnosa prodeuntia, non vesice, sed renū *Pleuritis ex humore melancholico.* 30
Ramenta. 35
 40

propria sunt: sicut furfuracea, vesicæ: arenæ rubræ, renum: cineritia, vesicæ. calculus ex arenulis multis & rubris concretus, è renibus descendit, sic ut dolor præcedat. durus ex multis integumentis, è vesica redditur. Si crusta è naribus prodit, & nonnihil sanguinis, vlcus subesse solet: si verò pellicula, plus sanguinis effluit. Putredinem testantur ubicunq; substiterint, vermes in ventriculo contenti, qui per os & nares exeunt: in intestinis, qui per anum, sicut lumbrici casei vermibus similes, pruritus excitantes: sic tineæ duorum cubitorum per aluum, vel os excernuntur. est autem vermis albus, ex multis particulis, veluti seminibus cucurbitæ compositus, in lateribus serratus, capite paruo, longo, cauda breui, latus & longus: alij ut semen cucurbitæ: alij duorum cubitorum instar longi absq; oculis. alij vermes omnes rotundi sunt, hic latus & tenuis est. Pediculi putridæ materiæ, ex ficuum, carnis viperinæ, & similibus esu procreatæ, notæ sunt, præsertim in corpore calida & humida intemperie prædito, si vestes non sæpe mutantur: si manus crebrò scalpantur: si adsint papulæ aque plenæ. MATHETES, Quid sudor denunciat? GERON, Salutaria, si per totum corpus æqualis est: si ex parte tantum aliqua, ut fronte in morbo acuto erumpit, aliæque signa mala adsint, mortem significat. sic in omni febris & dolore frigidus, maximè qui durat. Qui in fine accessions superuenit, & morbum non finit, prauorum humorum abundantiam testatur. Interdum per morbi initia inuadens, pestilentia nota est, ut quæ ante annos aliquot in magna Germaniæ inferioris, & superioris parte grassata, Anglicus sudor dictus fuit, qui tanquam febris peracuta, multos nimia spirituum digestionem in subitum exitum præcipitauit. Cæterum sudores etiam humorum naturam repræsentant. nam in morbo regio, & biliosis, amarus percipitur: in pituita falsa, falsus: in pituitosa febris, insipidus: in sanguine inflammato, dulcis. Sic odor antequam sit refrigeratus, aut aërem expertus. nam si grauiter oleat, magnam prauitatem humorum, ut in elephantiacis, ostendit, si verò refrigeratus hircum referat, nihil mali repræsentat, cum is odor sanis etiam familiaris existat. MATHETES, Si excretionem rerum quas hæcenus enumerasti, morbos indicare possunt, nonne etiam retentiones contra naturam id præstare solent? GERON, Maximè. nam pituita si per nares aut palatum minus quàm solebat, naturaliter expuat, destillationes, morbum comitalem, attonitum, & conuulsiones adferre consuevit. Si ergo morbi isti iam præsentem sint, causam eorum in promptu habes: si nondum inuaserint, prædicere eos poteris. Item si quæ vomitu antea reiciebatur, nunc retenta, colicos vel nephriticos,

Sudor quid notet.

Sudor Anglicus.

*Excrementorum retentio.
Pituita retenta.*

vel

vel articulares, sicut etiam quæ per aluum deici solent, eos-
 dem morbos parit. *MATHETES*, Quid retenta bilis, quam sani per
 aluum quotidie naturaliter rejiciunt, excitare solet? *GERON*,
 Ventris astrictionem, meatuumque fellis obstructionem, ob
 5 quam excrementa alui cineritia, vel alba, quod bile tincta non
 sint, apparent. *MATHETES*, Quid bilis retenta, quæ tempore ve-
 ris, vel aliàs per vomitum reddi solet, producit? *GERON*, Oris
 amarorem, tandèmq; fastidium cibi, vel choleram morbum,
 vel biliosam febrem æstate futuram: vel si in æstate retineri cepit,
 10 difficultatem intestinorum, aut alui profluuium, autumno fore
 prænuntiat. *MATHE*, Sanguis menstruus retentus quid signat?
GERON, Aquam subter cutem futuram, vel sanguinis ex naribus
 profluuium, vel sputum. sin autem subito ille suppressatur, & nau-
 sea cibi premat, conceptus argumentum est. quòd si non conce-
 15 perit, viciosos humores, & malum vteri habitum notat. At si flu-
 xerit quidem, sed minùs coloratus, & sine ordine, morbosam po-
 tiùs, quàm gravidam mulierem indicat. Præterea si feminae sang-
 menstrua non habeant, sanguinem in alimentum potius sumunt,
 quàm vterum gerant, præsertim si aliæ partes præterquam ven-
 20 ter, & mammae crescant. *MATHETES*, Quid præfagiunt ora vena-
 rum in ano extantium, αἰμορροΐδες Græci vocant, suppressa? *GE-*
RON, Prauitatem humorum, & aquam subter cutem, insaniam,
 aut tabem. Adhæc alius astricta, indurataq; adeò, vt ægrè educi
 queat, vel colicum dolorem excitat, vel capitis dolorem, vel ver-
 25 tiginem. At arenæ externi solitæ, si retineantur, calculi genera-
 tionem promouent, idque potissimùm, si circa renes grauitas sen-
 tiatur. *MATHE*, Sputum retentum in thoracis affectibus, quid sig-
 nificat? *GERON*, Spiritus difficultatem, mortemq; ipsam instare ta-
 bidis, pleuriticis, inflammatione pulmonis, aut magna defluxio-
 30 ne laborantibus. *MATHE*, Quid sudor, vel perspiratio insensibilis
 impedita præfigit? *GERON*, Cutis affectus, pruritus, scabiem, le-
 pram, febrem. Vrina autem multis diebus suppressa, aquam sub-
 ter cutem, vel crassos succos, vel sanguinis grumos, vel calculum,
 vel partium vicinarum, & vesicæ inflammationem, vel nimiam
 35 ob copiam illius, tensionem. In acutis autem morbis retenta, aut
 mentis alienationem notat, aut quòd sudor copiosus, aut ventris
 profluuium prægressum, vel subsecutum sit. Quare cùm accedes
 ægrum, vidēsque morbum aliquem ex materia cuiusdam copia
 natum, quæres num quid euacuari solitum retineatur: veluti si
 40 quis febri continua ex sanguine laboret, & detractionem illius,
 quam in vere moliri solitus erat, aut purgationem nunc intermi-
 serit, morbum ex redundante humore futurum præfagire licet.

MATHESES, Qui morbi totius corporis, vel partium eius, ex intemperie fieri, deprehenduntur?

Morbi ex intemperie.

GERON, Febres, tum ex calidis, tum ex frigidis humoribus putredinem expertis, procreata: de quibus postea seorsum agitur. Quauis autem nonnullis ipsarum frigus, aut horror, aut rigor in accessionibus obueniat: non tamen hæc, materiæ ex qua

Calor partis eximius.

constant, sed naturæ aliena expellentis ratione, oriuntur. MATHESES, Quid calor in parte quadam eximius indicat? GERON, Dolorem in ea vel iam esse, vel futurum. si cum materiæ defluxu vrget, inflammationem, vel erysipelas signat. MATHESES, Quid ardor, vel calor circa ventriculum denuntiat? GERON, Si os amarum est, & vomitus infestet, bilem in eo contineri dices: si nunquam vomitus, neque nausea molestat, calidam intemperiem subesse, quæ ex siti, ructu nidorolento, ac inde quod ægri parum appetant, ex aquæ verò frigidæ potione, vel pomorum, vel frigidorum oleorum esu multum adiuuamenti sentiant, facile deprehenditur. at complures de iecoris, quam ventriculi calore, conqueruntur, quod hunc semper frigidiores tum natura, tum ex humoribus cerebri, in ipsum destillantibus, falso existiment. nam manuum fissura, quam iecori calido ascribunt, ob ventriculi vitium, ali-

Iecoris calidi aut frigidi nota.

quando sine insigni iecoris intemperie, prouenit. MATHESES, Quæ alia pars iecur calidius testatur? GERON, Manus, volæ, plantæ pedum, calidiores ab eo effectæ: idque trifariam. primum, quia calor in ipsis magis euidentis est: deinde, quia temperatus in calidior parte difficilius cognoscitur: tertio, quia calorem illius partis naturalem esse putamus. at in frigidior sede, calor non tam cito percipitur: vel quia elanguescit in hac, vel quia ea ipsa tardius afficitur: adhæc, quia multæ venæ in ista parte existunt, quæ calorem attrahant. Nam cum hic in extremis subsistat, neque ulterius progredi possit, necessariò ibi colligitur: vel densitas membranæ siue cuticulæ, calorem retinet. MATHESES, Huicne soli notæ credendum est, iecur esse calidius? GERON, Nequaquam: sed eius humores (multos enim biliosos serofosque gignit) colorque faciei, calor, & frigus considerari debent. Nam calidior temperamento præditi, vel rubicundum, vel pallidum colorem, vrinas fla-

Renum calidiorum nota.

uas, orisq; siccitatem habent: nec non calorem quandam in præcordiis sentiunt, sicut in hypochondriaco affectu, vtraque illorum parte. MATHESES, Quomodo renum calor deprehenditur? GERON, Facilius quam iecoris, vel lienis, vel pulmonum, eo quæ grandior in eis cuitu ob pinguedinem incensus est: tum quod copiosus sanguis ex magna venâ affluat. non dico, quod ægri præterea in dorso cubent, longoque decubitu calorem concipiunt.

MATHE.

- MATHESES, Quid vrina signat, cui pingue insidet? GERON, Si *Vrina cui pingue insidet.*
renes calfacti sint, & febris vrgeat cum corporis gracilitate, id
consumptum colliquatūq; iri præfagit. MATHESES, Quid ven- *Ventriculi frigus.*
triculi frigus notat? GERON, Cruditatem, cuius est mala illius
5 concoctio, grauitas, multi post somnum flatus, sputum frequens,
acidi ructus, appetentia auctior quàm conuenit, nulla aut modica
sitis. MATHESES, Quid vteri frigus portendit? GERON, Si menses *Vteri frigus.*
non fluant, aut albi sint, mucosiq; flatus copiosos, paruam vene-
ris concupiscentiam. In quibus verò ista contingunt, hæ sunt in-
10 fæcundæ. quanquam etiam calidiores & sicciores foeminae, non
magis quàm illæ concipiant, sicut etiam quæ densiores vteros ha-
bent. MATHESES, Quid extremarum partium frigus monstrat? *Partium extre-
marum frigus.*
GERON, Si non diu perduret, febris quotidianæ initium. si verò
perseueret, & ventris, aliarumq; partium dolorem vehementissi-
15 mum præcessisse. In eo autem, qui colicum, vel alium dolorem
passus est, mortem futuram prænuntiat, maximè in pueris: modò
illud non ab exteriori causa originem duxerit. In acuta febre, calo-
ris natiui penuriam, mors subsequitur. Quòd si citra febrim aut
dolorem accidat, membri cuiusdam imbecillitatem designat, quæ
20 emaciationem, *ἀρεσφία*, greci vocant, vel resolutionem, si absque
dolore est: si cum illo, græcum *οἰδημα*, futurum prænuntiat. MA-
THESES, Quos affectus sicca intemperies ostendit? GERON, Na- *Morbi ex sicca
intemperie.*
res acutæ, tempora collapsa, oculi concaui, cutis circa frontem du-
ra, intenta & arida, corpus emaciatum, ventérque quasi lumbis
25 alligatum, pectus ex carne, aliâque id genûs siccæ partes, febrim
hecticam, aut tabem, quæ *ἀρεσφία*, dicitur, aut diurnam alui reso-
lutionem præcessisse: præsertim si huiusmodi symptomata diu-
tius durarint. At lingua arida, siccâque, & dura, vt æger loqui ne-
queat, ac nigra, nec non satis intolerabilis, febrem ardentem te- *Febris ardens
nota.*
30 stantur. Cutis totius corporis macra & arida, sic tamen, vt caro
non nimium sit consumpta, morbum ex serosis humoribus con-
flatum, vt furfures, vel pruritum significat. Si membrum aliquod
arescat, aut potius alimentum non sentiat, id exiccari, vel resolui,
vel insigniter refrigerari indicat. Motus autem difficultas, situsq;
35 partis mutatio, resolutio, stupor, attonitus morbus, seu apople-
xia, defluxionis frigidæ indicia existunt. Insignis membri perfri-
ctio, rarò sine sideratione, ob calorem extinctum durare potest. sic
etiam nulla pars humidior, citra tumorem aliquem fieri solet. Si
40 quæ mollior iusto euaserit, eam humidiores quoque esse opor-
tet. Interdum mollities citra resolutionem, superuenire solet, li-
gamentis genuum adeò mollitis, vt rectè stare nequeant: id quod
& pinguibus mulieribus, & illis euenire consuevit, in quibus

*Defluxio frigida.**Humida affectio*

membra non rubescunt, sed potius crassescunt, corpore bene valente: quanquam frigus aliquando in tota tibia sentiant. MATHE-
TES, Quæ vitia secundæ qualitates indicant?

*Qualitates se-
cundæ quosindi-
cent affectus.
Color.*

GERON, Auriginosus, seu luteus color, qui ex bile copiosa gignitur, in toto corpore, morbum regium, vt bilis nigricans, 5
quæ totum sanguinem inficit, arquaturnigrum, si lienis grauitas
& tumor adsit. MATHESES, Apparetne illa in alio etiam morbo?
GERON, Maximè, in acuto, aut post illam, vel etiam sine feбри.
MATHESES, Quid in his notat? GERON, Si septimo die in feбри
apparet, morbum crisi solutum esse: si absque feбри, obstructiones 10

Fætor.

iëcoris, aut lienis significat. MATHESES, Quid pallidus in puellis
color monstrat? GERON, Cordis palpitationem, arteriarumque
in ceruice pulsus, aut respirationem difficilem, aut dolorem ca-
pitis, coxarumque, & grauitatem. MATHESES, Quinam affectus,
& qua de causa fœtere solent? GERON, Cancer, gangrena, scabies, 15
carbunculi, ob humorum, excrementorumque, vel partium exul-
ceratarum putredinem. At excrementa, quæ in fluxu ventris li-

*Odor quos mor-
bos indicet.*

enteriaci, & alio, quo bilis per intestina citra moram descendit,
non sædum odorem repræsentant. MATHESES, Qui alij morbi
ex odore ingrato cognoscuntur? GERON, Ozæna, cum sanguino- 20
lenta, vel crustulæ sanguineæ, idè cum anhelitus difficultate, ex
naribus redduntur: nec non polybus, qui tumor magnus est, ro-
tundusque, ex quo nulla sanies redditur, sed excrementa in eo re-
tinentur, & tandem putrescunt. Si verò nihil horum accadat, &

excrementa in vtraque parte putrida existant, ex cerebro descen- 25
dunt, vel in ossibus spongiosis putrida retinentur, eoque inspira-
tio difficilis auditur. Fœtor autem ab ore, naribus, alis, pedibus,
vlcere, siue sanguinolento, siue sanguinis experte, prouenit. MA-
THESES, Cur ex ore? GERON, Id fit, aut ob dentes putridos, aut

ob vlcus pulmonum, aut humiditas ventriculi materias corruptas. 30
quare loco inuestigato, rogandum, vlcusne in ore sit, an dentes pu-
tredinem experti sint. Si ex ventriculo fœtor exhalat, manè, non
à cibo percipitur: si ex pulmone, quauis hora, adestque anhelitus
difficultas, vel purulenta reijciuntur: si vlcus in ore est, pituita
fertur acceptus. Cui anhelitus malè olet, is suspirio, quod Græci 35
ἀόδωα, vocant, laborat. Elephantiacorum corpus vniuersum fœdi
odoris est, præsertim cum sudore refrigeratur. adhæc qui humi-
dos habent pedes, grauiter olent, quod faciliè deprehenditur.

*Ructus nidoro-
lenti.*

MATHESES, Quid ructus nidorolenti, aut acidi signant? GERON,
Illi calorem, hi frigus ventriculi indicant. MATHESES, Quomo- 40
do sapor morbi, causæ ipsius cognitionem præbet? GERON, Si
manè priusquam alimentis immutetur, interroges, qualis in ore

Sapor.

acri-

sentiat. nam amarus bilem: sanguis, vel pituita falsa, humoris acrimoniam. idcirco exulcerationem presentem, aut futuram notat. **MATHE.** Quid adiumenti ad morbi notitiam adfert color? **GERON.** Magis ipse affectus, eorumque causas, quam quoduis aliud 5 monstrat, quamobrem cutis color considerandus est, nisi humores ad intima descenderint. Color excrementorum humoris naturam, partis autem affectu morbum ostendit. Itaque de vrine colore, de excrementis, & sanguine reiecto, cum æger, tum astantes rogarī debent. **MATHE.** Quorum morborum indicia adhuc restant?

- 10 **GERON.** Continuitatis diuortij. in hoc æger interrogandus est, num illud recens, an vetus: item, num ab exteriorē, vel interiorē causa factum sit: adhuc vtrum loci offensi ratione sit periculofum, an extra periculum. **MATHE.** Quorum partium solutio periculum minatur? **GERON.** Principum membrorum interiorum, quod spiritus eorum dissipentur, vel quod sanguis profundatur, vel calor ab aere ambiente extinguatur, non autem necessario mortifera exteriorum partium, vel inuolucrorum ipsarum diuisio habetur, quanquam vt plurimum sit periculosa. verbi gratia: si pars cerebri, vtraque ipsius membrana, pericardium, & 20 tunica iecur integens, violatae sint: item si illae, quae nobilibus inseruiunt, vel excrementis recipiendis, vel essentiae praepparandae, quam generare debent, dicat: vt fellis receptaculum, vesica, ventriculus, intestina, vena caua, arteria magna, pulmones, septum transuersum, venae carotides, iugulares, diuisae sint, vel nerui, 25 puncti, aut semisecti. **MATHE.** Quorum partium solutio minus periculosa existit? **GERON.** Exteriorum & carnosarum, at nervosarum omnium periculosa, vt quae circa articulos, membranasque ob dolores vehementiores fiat. Inter ea quoque difficilem curationem recipiunt, quae circa emissaria habentur, vel dolorificae sunt. **MATHE.** Quid si vlcera vetera sint? **GERON.** Querendum, num ab externis causis, an interioribus quibusdam, aut abscessu prouenerint. nam vlcus difficilius curatur, quam vulnus recens. **MATHE.** Quid si vlcus post tumorem ortum sit? **GERON.** Inquirendum qualis hic fuerit. nam si inflammatio suppurata, minus periculosa est: si ab erysipellate, magis timenda est propter acrimoniam: si post laxum tumorem, qui Graecis *σίδημα* vocatur, excitata sit, magnus est sinus, & copiosa materia: si à scirrhusubortum fuerit, metus ne carcinoma fiat: si ab abscessu, aut tuberculo, fistula expectanda est: quare cauitas estimanda est, expuris copia, qualitate, & specillo indito: si sinus intus titat, multo 40 difficilius curatur. **MATHE.** Quid si in ventre inferiore solutio siue diuortium continuitatis accidar? **GERON.** Interrogari debet,

Color.

Continuitatis diuortij nota.

Vlcus.

Solutio in ventre inferiore.

num saltus, casus ex alto, aut percussio præcesserit, an vlcus sensim factum, ibiq; foramina illa sint, per quæ vasa seminaria descendunt, tunc magnus admodum tumor, ob relaxationem apparet. In quibus autem maximus, altóque loco ventris, idq; post saltum, aut rupturam acciderit, ij manè dolorem acrem sentiunt. Si mulieri, quæ binos fœtus, vel vnum grandiorē pepererit, diuisio

In puerpera.

continuitatis obuenerit, indubiè membranæ ruptura erit. MATHESES, Quando in venis & arterijs fit solutio? GERON, Cùm istę rumpuntur, vnde mox sanguis vel profluit, vel intus manet. sin post casum vehementem, magna sanguinis profusio sequitur, & ille facile putrescit, nam qui tenuis, rarefactam cutis tunicam egredi solet, serosus est, & modicus existit: si ora vasorum adaperita sint, sanguis nō vniuersè, sed paulatim erumpit. Arteria rupta, sanguis cum quodam saltu exilit, si verò ea sub musculis & cute rumpatur, hæc quidem ad cicatricem perducitur, ipsa verò adhuc manet vlcerata, ἀνδρῶν ποτα, græci vocant, ac magnus est tumor, in quo color cutis non mutatur, nec calor magnus, vt inflammatione vrget: verum pulsatio maximè per initia, etiam sine amplo tumore sentitur, quod in inflammatione fieri non solet. MATHESES, Quo-

Arterie solutio.

modo arteriæ diuortium deprehendam? GERON, Quòd si in poplite pulsus sub cute percipiatur, tumorq; appareat, qui prementi renitatur, ac si flatibus turgescat, ab alijs tumoribus frigidis, vt steatomate differt: quia in his nulla statim à primo die pulsatio percipitur, nisi fortè in parte, cui insit arteria, quam tumor comprimit. MATHE. Qua ratione ossis fractura cognoscitur? GERON, Facile, quando per transuersum facta est: difficilius, quando veluti minutę partes ab eo secundum longitudinem dissiliunt, ipsa autem tibia secundum transuersum integra manet, ob quod digito, vel scalpello, vel specillo tentandum est, num scissura ad longitudinem deprehendatur, atque hæc sunt species affectuum ferè omnes, præterquàm illa, quæ ad malam compositionem refertur. MATHESES, Qualisnam hæc est?

*Compositio dea-
pranata.*

GERON, Si quid annatum sit, vt polypus, & ozæna, vnguis, encanthides, calculus. MATHESES, Quid si non pateant oculis? GERON, Notæ petendæ sunt ex affectu, aut parte offensa, si calculi metus est, primum dispice, quo loco dolor vrgeat: deinde, an quandoque vrinas fabulosas, vel crassas æger reddiderit: item, num calorem vel pondus in renibus deprehenderit: nec non si vrinæ rubræ sint, vel turbidæ & arenosæ præcesserint: postea tenuis & perspicuæ, calorque adsit & grauitas citra lumbos, nam si hæc omnia consentiant, calculum testantur, quem inordinata victus præcedentis ratio, inequitatio post cibum, atque hic

- hic ex crassiore materia sumptus confirmat. Quinetiam in vesicam descendere solet cum dolore, donec retinendo excruciet, & reddatur. quòd si interdiu excretus fuerit, nulla de eo est dubitatio. At si calculus grandis in renibus fixus sit, continui diuortium
- 5 parit, redditque pus cum sanguine. Interdum pondus ac grauitas renum, calculum magnum in illis ostendit. Vesicæ calculus paruus, meatum sepe intrat, & vrinam impedit. magnus, se illi opponit, & vrinam retinet, vel læuis, vel asper. leuis sine vlcere est, sed quod subsidet, albori ouorum non agitatorum simile apparet.
- 10 asper sanguinem cum pure reddit. si corpus moueatur, inæqualiter sanguis ille excernitur, & grauitas circa os sacrum, vel pubis sentitur, aliâq; excrementa simul, cum conatu quodam deijci velle videntur. *MATHE.* Quæ vesicæ calculum signant? *GERON.* Pruritus *Vesicæ calculi nota.* circa pubem, frequens colis erectio, vel internæ coxarum partis
- 15 dolor. atq; hæc vel omnia, vel quædam ex eis, vesicæ calculum comitari solent, eoque de his æger interrogari debet. *MATHE TES.* Quæ alia species deprauatæ compositionis restat? *GERON.* Situs vitiosus, qui ex naturali facile deprehenditur, veluti si os loco suo in alienum translatum sit: quòd tum figura, tum motus impedi-
- 20 menta indicant. Cùm itaque membrum citra tumorem, nervorum contractionem, vel ligamentorum duritiem nec flecti, nec extendi extremè potest, luxatum esse dicitur. At actiones violatæ magis partem læsam, quàm affectam ostendunt, siue illæ corrumpantur, siue imminuantur, siue prorsus tollantur. Sicut enim
- 25 diuersi morbi oculorum actiones imminuere, corrumpere, aut tollere solent: ita leuitas intestinorum, ventriculi functionem subuertere: huius cruditas, quæ ructus nidorosos parit, illam vitare dicitur. Præter hæc consideranda sunt, num actio vitiosa, parti principali, an alteri, sine qua illa fieri nequit, vel cuius auxilio melius obitur, aut quæ illam tuetur, attribuenda sit: veluti in oculis, *Oculorum actio imminuta.* vtrum crySTALLINUS humor, cui visio ascribitur, læsus sit, vt in glaucomate, an nerui visorii, qui vulgò ex græcis optici vocantur, offensi, sine quibus non potest actio perfici: vel membrana ceratois violata, vnde visio tenebrosa euadit, quæ deterior est, quàm
- 35 perspicua, & pupillæ structura vitiosa: vel num membrana annata dicta, solum, & palpebræ afficiantur, quæ oculis tuendis, vindicandisq; ab externis iniurijs sunt appositæ. Atque hæc communia morborum inchoantium, præsentiumque indicia, siue notæ sunt. *MATHE TES.* Licetne futuros quoque præfagire?
- 40 *GERON.* Indubiè. nam sicut in cælo nunquam tempestas ingruit, quam non signa quædam præcedant, quibus nautæ, ceteriq; probè periti homines certiores fiant: ita humanum corpus, nullus

inquadit morbus, quem non signum aliquod denuntiarit. Antequam autem hæc enumerem, scire te volo, ex morbis alios breui, alios multò post futuros esse: atque ex his, qui longius adhuc absunt, quosdam ob presentes eorum causas cognosci, prædicique: quosdam, quòd nullas habeant occasiones, non posse. illos autem qui in propinquo sunt, ex causarum ipsis excitandis efficacium præsentia, aduenturos intelligi. Primi igitur ex cæli annique temporum statu, & ijs quæ corpora nostra immutant, atque ex victu, prænoscentur. Secundi ex humorum vel copia, vel prauitate, partium imbecillitate, intemperie, & dolore. **MATHESES,** 10
Quinam ex aëre? **GERON,** Ex frigido & sicco, cùm Aquilo spirauerit, tussis, faucium exasperatio, ventris astrictio, vrinæ suppressio, horrores, lateris, & pectoris dolores, expectari debent. quamquam ille sanum corpus spisset, mobilius, atque expeditius reddat. **MATHESES,** **Quinam ex calido, & humido?** **GERON,** Si Auster 15
flauerit, capitis dolores, sensuum tarditas, aurium hebetudo, alui solutio: in summa totum corpus hebes, humidum, languidumque fieri solet. quòd ceteri venti huic, vel illi propiores spirauerint, eò magis vicinos his illisue affectus pariunt. Denique omnis calor, iecur, & lienem inflammat, mentem hebetat, animæ defecti- 20
onem, & sanguinis profluuium adfert. **MATHESES,** Quos frigidus aër nuntiat? **GERON,** Modò neruorum distentionem, modò rigorem: illud græcè *σπασμός*, hoc *τετάνος*, vocatur, nigritiem in vlceribus, horrorem in febribus. **MATHESES,** Qui prædicuntur ex cæli siccitatibus? **GERON,** Febres acutæ, lippitudines, tormina, 25
vrinæ difficultates, articulorum dolores. **MATHESES,** Qui rursus ex humido aëre, ac imbribus? **GERON,** Longæ febres, alui deiectiones, angina, cancri, morbi comitiales, resolutio neruorum, quæ græcis *παράλυσις*, nominatur. neque solum interest, quales dies sint, sed etiam quales præcesserint. **MATHESES,** Solentne etiam mor- 30
bi ex anni temporum statu prænosci? **GERON,** Vtique, si suam quæque naturam non retinent. hyems itaque sicca, si ventos habeat septentrionales, ver autem austros, & pluuias exhibet, ferè subeunt lippitudines, tormina, febres, maximeque in mollioribus corporibus, sicut in mulieribus. si austri pluuiæque hyemem occupant, ver autem frigidum & siccum est, grauidæ quidem feminae, quibus tum adest partus, abortu periclitantur. hæc verò quæ gignunt, imbecilles, vixque vitales edunt: cæteras lippitudo arida, & si seniores sint, grauedines, atque destillationes malè habent. **MATHESES,** Quid si à prima hyeme austri, ad vltimum ver con- 40
tinuarint? **GERON,** Laterum dolores, & phrenitis quàm celerissime, ægros rapiunt. **MATHESES,** Quid mali vere statim per initia calido

*Morbi ex cali
statu.*

*Morbi ex anni
statu.*

- calido, quod æstatem quoque similem exhibet, metuendum. GERON, Nihil aliud, quàm quòd multus sudor in febribus subsequatur sit. MATHETES, Qui morbi timendi, si æstas sicca aquilones, & autumnus sequens hymbres, austrosq; habuerit. GERON, Tota
- 5 hyeme, quæ proxima est, tulsis, destillatio, raucitas, in quibusdam tabes. Quòd si autumnus æquè siccus, eisdem aquilonibus perflectur, omnibus quidem mollioribus corporibus, præcipuè mulierum, secunda valetudo contingit. durioribus autem instare possunt, & aridæ lippitudines, & febres partim acutæ, partim longæ.
- 10 & morbi melancholici. MATHETES, Solentne etiam morbi in optimis tempestatibus generari. GERON, Vbi dies æqualiter sereni, siue calidi, siue frigidi, siue temperati existunt, tunc non solum certior valetudo est, sed priores etiam morbi, si qui inciderunt, leuiores sunt, & promptius finiuntur. vbi autem variant, nullis
- 15 non periculosa sunt. vnde fit, vt autumnus multos opprimat, eò quòd corpus, & estate, & deinde meridianis caloribus relaxatum, nocturnis, atq; matutinis, simulq; etiam vespertinis subito frigore excipiat. Hinc omnes quoque tempestatum mutationes repentinæ, suspectæ esse debent. quanquam illud cælum, quod mor-
- 20 bum fecit, in id quoque genus, quod natura peius est, in hoc statu mutari salubre existat. MATHETES, Quos singula anni tempora affectus excitant. GERON, Ver eos maximè, quæcunque humoris motu nouantur, vt lippitudines, pustulas, profusionem sanguinis, abscessus, melancholiam, infantiam, morbum comitalem,
- 25 anginam, grauedines, destillationes. MATHETES, Nulli alij præter hos, morbi in eo tempore contrahuntur. GERON, Qui in articulis, neruisq; modò vrgent, modò quiescunt, tunc potissimùm & inchoantur, & repetunt. MATHETES, Quos æstas adfert. GERON, Cum superiores plerisque morbos, tum febres vel continuas, vel ardentes, vel tertianas: nec non vomitiones, alui deiectiones, auricularum dolores, quos *αυρίδαι*, græci vocant, oris
- 30 vlcera, caneros, maximè naturalium, & desudationes. MATHETES, Quæ vitia in autumnum incidere consueuerunt. GERON, Omnia serè quæ in æstatem, sed præterea febres incertæ, lienis dolor,
- 35 lor, aqua inter cutem, tabes, vrinæ difficultas, tenuioris intestini morbus, leuitas intestinorum, coxæ dolores, morbi comitiales. tunc etiam diutius malis fatigati, & ab æstate proxima pressi, alijs nouis morbis conficiuntur, & quidam longissimis implicantur, præsertim quartanis, quæ per hyemem quoque exerceant.
- 40 nullum quoque aliud anni tempus magis pestilentia, cuiuscunque ea generis sit, opportunum existit. MATHETES, Quæ vitia hyems irritat. GERON, Capitis dolores, tulsim, & quidquid fauces,

Morbi in optimis tempestatibus.

Singula anni tempora quos excitent morbos. Veris morbi.

Æstatis.

Autumni.

Hyemis.

latera, & viscera offendit. MATHETES, Quid si totus annus eundem ferè habitum obtineat? GERON, Humidus & calidus pessimus est: deinde humidus & frigidus, varios morbos excitare solet: plerunque etiam pestilentes, maximè cum cœlum putridis terræ & aquæ exhalationibus infectum est. siccus salubrior est, eoque pauciores, sed acutiores progignit. MATHETES, Quando ex victu morbi prædici possunt? GERON, Cum in sæcundo quidem anno, homines fructibus horarijs se replent, sequuntur plerunque febres tum continug, tum intermittentes, alui deiectiones, difficultatèsque, & id genus alij affectus. in sæcundo autem, cum anno nā caritas est, ob quam prauis vti cibis homines coguntur, tormenta, leuicāsque intestinorum, inflammationes viscerum, erysipelata, aliāque id genus vitia grassantur. MATHETES, Qui morbi ex corporum immutationibus concitantur? GERON, Si cursus, aliāue exercitatio, aut balneum, aut medicamentum calidum præcesserit: item si ex vita quieta ad laboriosam, ex frugali ad luxuriosam transierit, lassitudo, aut febris, aut inflammatio, aut erysipelas plurimū sequitur. MATHETES, Qui morbi in vniuersum, seu generatim, ex humorum copia & prauitate, alijsque supradictis causis abditis prænoscentur? GERON, Superius docui, idè non est opus hic repetere. huius autem te admonere volo, vbi corpus aliter se habet, quàm consuevit, neque in peius tantum, sed etiam in melius, morbus instat. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, coloratiórque factus sit, suspecta habere bona sua debet, vt ait ille. cum enim ea, neque in eodem habitu subsistere, neque vltra progredi possint, ferè retrò quasi ruina quadam reuoluuntur. MATHETES, Quibus notis singula morborum genera ex illis præfagiuntur? GERON, Insania timenda est, vbi quis expeditiùs quàm consuevit, & subito loquitur, solitoque audaciùs: aut vbi quis rarò, & vehementer spirat, arteriasque concitatas habet, præcordijs duris & tumentibus. Insaniæ quoque inditia sunt, frequens oculorum motus, & in capitis dolore tenebræ ipsis offusæ, vel somnus nullo dolore substante ereptus, continuataque nocte & die vigilia, vel prostratum contra consuetudinem corpus in ventrem, sic vt ipsius alui dolor, id non coegerit: item insolito robusto adhuc corpore, dentium stridor. Febris recidiua expectatur, si sine ratione, sinèque bonis signis subito finita est. Mentis turbationem sæpè portendit, aurium dolor acutus, cum febre continua & vehementi. ex eo casu iuniores interdum citra septimum diem moriuntur, seniores tardius. Mens labat, quibus neque causa doloris, neque sensus eius adest. Furorem in mulieribus venturum, mammae sanguine suffusæ testantur. Vitia pulmonum, laterum doloribus succedunt.

Morbi ex victu.

Morbi ex corporum immutationibus.

Morbi ex humorum copia & vitiositate.

Insaniæ futuræ notæ.

Febris recidiua.

Mentis alienatio.

Furores in mulieribus.

- succedunt: infania, pulmonum affectibus: delirium, capitis vul-
 neribus: neruorum distentio, vigilie: neruorum rigor, aut disten-
 tio magnis corporis febrilibus. Neruorum distentio in puero
 denuntiatur, si in continua febre venter nihil reddit, mutaturque
 5 ei calor, nec somnus accedit, ploratque is assidue. eadem, vel ri-
 gor timeri potest, si tumores super vlcera subito esse desierunt,
 idque à tergo incidit. Capitis dolores adueniunt, si malus color
 diu, sine morbo regio apparet. capite, aut visceribus, aut alio la-
 borant, qui faciem diu habent pallidam, & tumidam. Atræ bilis
 10 morbus subest, si longa tristitia cum longo timore, & vigilia est.
 Lippitudinis metus est, si tempora sæpe dolent, noctu corpora
 insudant, frons prurit. Pituitæ impetus aliquis, citra caput timeri
 potest, si ante febres graue est, aut oculi ex somno caligant, aut fre-
 quentia sunt sternutamenta. Sanguis ex parte aliqua profluit, si
 15 calor, aut sanguis abundat. Mali habitus corporis suspicio est, si
 quis sine causa emacrescit. Pulmonis affectus ex angina, cum subi-
 to finita est, efficitur, sæpeque intra septimum diem occidit, quod
 nisi accadat, sequitur, vt aliqua parte suppuret. Tabes metuenda
 est, vbi frequens destillatio in corpore tenui, longoque affligit.
 20 eadem subit, si lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta
 dies purgari non potuit. Vomicae aliquæ interdum excitantur,
 aut circa vigesimum, aut quadagesimum, aut etiam sexagesi-
 mum, si pulmonis dolor neque per sputa, neque per cucurbitulas,
 neque per sanguinis detractionem, neque per victus rationem fi-
 25 nitus est. MATHESES, A quo die numerabo? GERON, Quo pri-
 mum aliquis febricitauit, aut inhorruit, aut grauitatem eius sen-
 sit. MATHESES, Vnde hæ vomicae nascuntur? GERON, Modò à
 pulmone, modò à contraria parte. MATHESES, Quæ suppuratio-
 nem prænuntiant? GERON, Calor partis, quam afficit, dolorque
 30 & inflammatio, & si quis in partem sanam decubuit, onerare eam
 ex pondere aliquo videtur. MATHESES, Quomodo deprehendi
 potest, quæ nondum oculis patet? GERON, Si febris non demit-
 tit, eaque interdum leuior est, noctu increscit, multusque sudor
 oritur, tussendi cupiditas est, & penè nihil in tussi excreatur:
 35 oculi caui sunt, malæ rubent, venæ sub lingua inalbescent, vn-
 guis in manibus adunci fiunt, digiti, maximeque summi calent:
 in pedibus tumores fiunt, spiritus difficilius trahitur, cibi fastidi-
 um est, pustulæ toto corpore oriuntur. quod si protinus initio
 dolor & tussis fuit, & spiritus difficultas, vomica vel ante, vel cir-
 40 ca vigesimum diem erumpet: si seriùs ista coeperint, necesse est
 quidem vt increcant, sed quò minùs citò affigerint, eò tardiùs
 soluentur. MATHESES, In quibus morbis suppuratio fieri solet?

Neruorum dis-
tensio.

Capitis dolores.

Atræ bilis mor-
bus.Lippitudo.
Pituitæ impetusMali habitus,
Pulmonis mor-
bus.

Tabes.

Vomices.

Suppurationis
nota.Suppuratio ab-
dita quomodo
deprehendi que-
rit.

*Suppuratio in
quibus morbis
fieri solet.*

GERON, In longis febribus, nam si sine dolore, sineque manifesta causa remanent, id malum in partem aliquam incumbit: idque in iunioribus, quartana autem in senioribus, ex eiusmodi morbo fere nascitur. Suppuratio etiam aliqua ijs oboritur, quibus dolor, aut prurigo cum rubore, aut calore sine febre est. Circa aures aliqua futura est, si vrina in homine sano, parum liquida est. In superioribus partibus, abscessus aliquis expectatur, si precordia tumorem mollem habent, neque habere intra sexaginta dies desinunt, hæretque omne id tempus febris: ac si inter ipsa vlcera non sint, circa aures erumpit. Abscessus in maxillis, vel articulis erit, si lassitudinis sensus in febre est. Adhæc abscessus plerumque infra septimum transuersum, ex eo casu fit, cum vrina tenuis, & cruda interdum sic diu fertur, vt alia signa salutaria sint. In inferioribus autem partibus abscessus nascitur, si precordia dura, dolentia, hominem ante vigesimum diem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximèque in adolescentibus: vtique si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt. MATHESES,

*Tumor ad sup-
purationem ten-
dens.*

Quis tumor potissimum ad suppurationem tendit? GERON, Cum omnis longus eò fere spectet, is magis qui in præcordijs, quàm is, qui infra est. MATHESES, Quæ aliorum affectuum notæ sunt? GERON, Cruditates, præcordiorum dolor, aut grauis inflam-

*Cruditatis nota.
Iecoris inflam-
mati.*

matio, aut vrina, quæ non toto die concocta fertur. Iecoris inflammati, singultus frequens, & præter consuetudinem continuus.

Lienis.

Lienis, tumor, aut capitis dolores, in quibus quædam ante oculos, tanquam imagines obuersantur. Magnos lienes, gingiuæ, malæ, & os foetidum, aut sanguis partem aliquam prorumpens testatur: aut mala vlcera in cruribus, & ex his nigra cicatrices fient, si ex superioribus nihil eueniat. Aqua inter cutem instat, vbi in imo ventre & coxis dolor est: sed hoc morbi genus ab illius oriri solet. Idem malum excitatur, quibus desidendi voluntas est, venter

*Aque inter cu-
tem nota.*

nihil reddit, nisi & ægrè & durum, pedes tument, nec non modò dextra, modò sinistra parte ventris oritur, atque finitur, sed à iocinore, id malum proficisci videtur. Insuper hoc vitium significatur futurum, vbi intestina circa vmbilicū torquentur, *σπόφος*, vocant græci, eaque neque tempore, neque remedijs soluuntur. Præterea etiam aqua inter cutem, aut tabes sequitur, si ora venarum sanguinem solita fundere, subito suppressa sint. Dolor circa articulos aut circa viscera, morbusque futurus, per vrinam crassam, ex qua quod desidit, album est, ostenditur. Similiter viscerum dolorem tumoremque, cum aliquo periculo subesse, aut corpus certè integrum non esse, viridis vrina testatur. Vlcus in vulua est, si febricula mu-

Torques.

lieri ex inguine orta est, neque causa apparet. Vesicæ, vel renum exul-

Vlcus vteri.

Vesicæ et renum.

exul-

- exulceratio notatur, si sanguis, aut pus in vrina est. In renibus vitium est, si vrina crassa, carunculas quasdam exiguas, quasi capillos habet, aut si bullas, & malè olet, & interdum quasi arenam, interdum quasi sanguinem trahit. dolent autem coxæ, quæq; inter
 5 has, superque pubem: & accedunt frequenter ructus, interdum vomitus biliosus, extremæq; partes frigescunt. Vrinæ crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est, aque simile, vel rufum, vel pallidum est, paulum tamen in eo leuamenti est. aluus verò cum multo spiritu redditur. In vesicâ autem ma-
 10 lum est, si vrina paulatim destillat, vel si sanguis per hanc effluit, & in eo quædam cruenta concreta sunt, idq; cum difficultate excernitur, & circa pubem inferiores partes dolent. MATHESES, Quibus indicij calculi cognoscuntur: GERON, Vrina difficulter
 15 arenosa est: nonnunquam autem sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea redditur. quidam promptius recti, quidam resupinati, maximeq; hi, qui grandes calculos habent: quidam etiam inclinati reddunt, colemq; extendendo dolorem leuant. Grauitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est, atque ea
 20 cursu, omniq; motu augetur. quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis vicibus implicant. Fœminæ verò oras naturalium suorum, manibus admotis scabere crebrò coguntur. nonnunquam si digitum admouerint, vbi vesicæ ceruicem is vrget, calculum sentiunt. Subita deiection, aut febricula in-
 25 stat, vbi aluus pluribus diebus non descendit. Pedum tumores, longæ deiectiones indicant. Podagram, chiragram, aut alterius articuli morbum futurum esse denuntiat dolor, prout in pedibus, manib; sue, aut alia quadam parte sic est, vt eò loco nerui contrahantur, aut si id membrum ex leui causa fatigatum, æquè frigido
 30 calidoq; offenditur. Habes nunc quoque vnde futuros morbos cognoscere poteris. quia verò tum hi, tum instantes, præsentēsq; non ita facile à quouis deprehenduntur, pauca quædam superioribus adijcere institui, quibus instructior aliquantò factus, certius de ipsis iudicium ferre queas. Nam morbi per initia adhuc
 35 parui, sicut etiam symptomata, seu casus, eorumq; indices obscuri, nunc hanc, nunc illam sedem impetunt, sic vt interdum pleuriticum dolorem esse putemus, qui futura sit pulmonis inflammatio: interdum vt materia ad cerebrum feratur, quam in inferioribus fore existimabamus: interdum vt morbus biliosus ob eius-
 40 modi humoris copiam censeatur, qui tamen fiat pituitosus, bile scilicet euicta, euacuataq;. Quamobrem, vt singulorum affectuum notitiam facilius consequaris, causas illorum paucis repetam.

Calculi indicia.

MATHETES, Quid ergò causam morbi, præsertim eius qui nunc fit, esse dicis?

Causa morbi propriè que dicatur

GERON, Id propriè, cuius contactu afficimur, & quo separato, conualescimus. Nonnulli id, quod nondum adhuc agit, sed quod possit agere, causam appellant, utpote cruditatem, etsi illam non efficiat. Similiter alij id vocant, quod quidem antè egit, sed iam agere desijt. MATHETES, Ergo affectio corporis morbum præcedens propriè causa vocari debet? GERON, Vtiq; sicut mor-

Continens.

Antecedens.

Evidens.

bifica. MATHETES, Quot eius sunt species? GERON, Tres potissimum. Prima vocatur continens & proxima, qualis est in febris generatione, putredo: altera antecedens, ut cutis astrictio, im-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

585

590

595

600

605

610

615

620

625

630

635

640

645

650

655

660

665

670

675

680

685

690

695

700

705

710

715

720

725

730

735

740

745

750

755

760

765

770

775

780

785

790

795

800

805

810

815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925

930

935

940

945

950

955

960

965

970

975

980

985

990

995

1000

- humorem. MATHETES, Vbi causa morbi similis continetur? GERON, In propria partis essentia. MATHETES, Vbi morbi compositi? GERON, In parte affecta, vt instrumentaria hærent. sin autem affectus minimè firmus, aut constans fuerit, neque causa eius, 5 neque ipse in læsa parte continebitur, sed per eam transibit. MATHETES, Quæ alia interdum causam morbificam indicant? GERON, Affectio totius corporis, temperamentum, siue ægri natura, ætas, regio, anni tempestas, æris status, victus ratio, consuetudo, & summatim omnia, quæ præcesserunt, ad morbos causasq; 10 eorum accuratè cognoscendas valent. his addenda erit ciborum, porionum, & medicamentorum experientia, vsusq;. MATHETES, Quo pacto illa morbi causa, quæ iam quidem egit, sed agere amplius desijt, inuestiganda erit? GERON, Eodem, sed euidenter causæ maximè ex affectionum, quæ in corpore animantis præcesserunt, 15 animaduersione cognoscuntur. MATHETES, Ergo omnia tum præsentia, tum præterita intueri conuenit? GERON, Indubiè, sed medicus præsentia per se: præterita verò non solum ab ægro, verum etiam ab ipsis familiaribus & domesticis condiscet, quò faciliùs cum locum affectum morbumq; ipsum, tum causam eius 20 efficientem, quæcunq; sit, intelligat: quamuis præteritorum notitia magis ad causas morbificas inueniendas, præsertim verò ad affectus partesq; læsas cognoscendas, magis sit necessaria. Proinde si morbus nuper inceperit, percontator ægrum, num se exercuerit, an vinum meracius biberit, aut calida medicamenta assum- 25 pserit, aut laconico vsus fuerit. nam si hæc fateatur, calidi morbi suspicio est: veluti cum corpus valde incalescit, os est amarum, bilis vomitio, sitis, vel capitis dolor vrget, de febrì continua, vel intermittente, eò quòd tales causæ eam generent, coniectura est. Atque hic quoq; principalia causarum morbos efficientium, & 30 signorum genera obiter rursus in memoriam tibi reduxi, quò faciliùs illos dignoscas. vnum adhuc reliquum esse videtur, vt qui humores in vnoquoq; ægro excellant, cognoscas. Nisi enim id compertum habeas, nullam idoneam cuiuscunq; morbi curationem institues. MATHETES, Oro igitur te, optime præceptor, vt 35 singulorum humorum singulares notas adijcere digneris. GERON, Quanquam istas in prioribus dialogis aliqua ex parte commemorarim, tamen hic quoque in gratiam tuam paulò copiosius tractare non grauabor.

Humorum abundantium in corpore notæ.

- Corpus itaq; sanguine plenum indicant, si ille dulcis, prom- 40 ptè per nares, sputa, anum, venasq; in ea extantes, menstrua, & vrinas excernatur, & hic, qui fluorem ipsius experitur, facile eum toleret. item si vasa omnia referta, etiam in oculis manifestò di-

Sanguine pleni corporis indicia.

*Vena turgentes
liuidæ.*

*Graciles plerig
multo sanguine
abundant.*

*Sanguinei homi-
nis color.*

*Humores quan-
do ab externis in-
trò recedant.*

stendi cernantur, præcipuè corpore multum calefacto: adhæsi ca-
lor totius cutis blandus, mitis, & halituosus appareat. At in men-
struis suppressis venæ turgentes, & liuidæ, sanguinis crassi, & pi-
ciliquidæ similis copiam signant. Præterea rubor in corpore ex-
ercitato, aut aliter calefacto, excitatus, vires eius mediocres, & bo-
num sanguinem testatur, sicut etiam pruritus in vena aliquando
incisa oboriens. MATHETES, Quale corpus, sanguinis largi com-
pos, esse dicitur, carnosumne, an tenue? GERON, Carnosum utiq;
pinguedinis expers: quanquam etiam plerique graciles multum
sanguinis, spiritus, & caloris natui in venis & arterijs habeant.
Cum autem hi ob carnis penuriam externis iniurijs calefacienti-
bus, refrigerantibus, & prementibus magis subiiciantur, minus
sunt vitales, quàm benè carnosum. MATHE, Quis color faciei & reli-
qui corporis in homine sanguineo appareat? GERON, Rubicun-
dus, roseus, floridus, ceu ex albo & rubro mistus, ac ex sanguine,
spiritu, & colore bono splendescens. color enim in cute efflores-
cit, humoribus subiectis similis est, nisi illi intrò recesserint. MATH.
Quando intrò recedunt? GERON, Per initia febris accessionum,
& verecundiæ: per somnum, metum, mœrorem; nec solus sanguis
tunc, sed etiam cum eo spiritus, & calor nativus introrsum refu-
git: sicuti ab internis foràs, in augmento statutq; accessionum, in
impudentia, vigilijs, gaudio, æstu, laconico, & id genus alijs, elici-
tur. Vnde etiam partes extremæ, cum sanguine, spiritu, & calore
genuino destituuntur, refrigerari solent: cum hæc rursus recipi-
unt, incallescere. MATHETES, Quid oculorum, & linguæ rubedo
portendit? GERON, Non totius corporis, sed partium ipsarum
humorem indicat. Rubra itaq; lingua sanguinem, viridis bilem,
nigra bilem atram, alba pituitam signat. MATHETES, Quæ aliæ
sanguinis copiosi notæ sunt? GERON, Pulsus magnus, velox, fre-
quens, plenus, valida in temporibus pulsatio, lassitudo sponta-
nea, tensiva, oscitatio, pandiculatio, nausea, capitis & oculorum
grauitas, vrina crassa, rubra, & copiosa, morbus ex multo sangui-
ne familiaris & frequens, ut inflammatio, febris continua, putris,
& non putris (quæ πυώδης grecis dicitur) pustulæ sanguineæ per
totum corpus erumpentes, somnus facilis, lenis, & moderatus, fre-
quens somnium de rebus iucundis, & rubris, de sanguinis pro-
fluvio, de natatione in dolio sanguinis pleno. Huc accedit etiam
quod sanguinei simplices sint, et stupidi sensibus, impeditiores ad
res considerandas, & ad iram tardi, liberales alioqui, hilares, faceti,
ad risum prodigues, rerum iucundarum & hominum amantes, in-
terdum vino, voluptati, & veneri dediti. MATHETES, Hos animi
mores ex naturali temperamento obtinent: sed quales ex eo quod
contra

- contra naturam est, consequuntur? GERON, Cum sanguis cerebrum copiosior occupat, & temperamentum eius immutat, ex animi actionibus aut imaginatio, aut memoria, aut cogitatio vitatur, duabus ex his saluis: atq; affectus dicitur delirium, eiusq; ^{Delirium, & eius species.}
- 5 species ex sanguine tres hoc pacto erunt simplices. quemadmodum quatuor rursus compositæ emergunt, vbi imaginatio simul cum memoria, salua remanente cogitatione: aut cum imaginatio simul & cogitatio, superstita memoria: aut cum memoria & cogitatio, salua imaginatione: aut cum imaginatio, memoria, & cogitatio simul omnes deprauantur. MATHESES, Quis affectus sequitur, imaginatione debilitata? GERON, Veternum, quod græci ^{Veternum, suis letburgus.} *κῶμα*, vel *λήθαργον* vocant. MATHESES, Quis, eadem prorsus abolita? GERON, Detentio, græcis *κατάληψις*, dicitur. ita si memoria est infirmior, affectus stupor: si abolita, obliuio comitatur. Eodem
- 15 modo, vbi cogitatio debilitata est, stultitia: vbi abolita, dementia sequitur. atque sic etiam ex alijs humoribus fieri audies. MATHESES, Quibus notis sanguinea vitia ab alijs distinguuntur? GERON, Rifu & cantu, quæ in alijs oboriri non videntur. MATHESES, Qua de causa? GERON, Quia talis sanguini vis inest, vt imaginationes etiam tristes, lætas, ac iucundas reddat, quæ nihil mœroris & tristitiæ habeant coniunctum. Itaq; si sanguis cerebri temperamentum de statu suo ita deijcit, vt homo delirare cogatur, cantabit is, & ridebit, iucundissimæq; res ipsi videbuntur. Nam cum imaginatio sola deprauatur à sanguine, non autem cogitatio simul & memoria, flores, fructus, prata floribus amcenissimis vestita in cubiculo esse, vel res etiam sanguineas, vel lectum sanguine conspersum putabit, sed non sine cantu, & risu. Interdum accidit, vt quis ridendo alium interficiat, quanquam huiusmodi delirata tuciora tum ægro, tum familiaribus eius esse soleant. Si ergo solum imaginatio à sanguine fuerit deprauata, æger hæc, similiaq; phantasmata experietur: ceterum prudenter de rebus alijs ratiocinabitur, eorumq; memoriâ, vt in sanitate firmam habebit. MATHESES, Quæ pituitam abundare significant? GERON, Si nulla promptè, & citra noxam per aures, oculos, nares, palati
- 35 foramina, sputum, vomitum, deiectiones, fluores albos, mulieribus & viris communes, sed his ex vesica, illis ex vtero euacuentur. item si acidi, vel aliud quid redolentes sudores erumpant. Idem testantur etiam obesior corporis habitus, eiusq; grauitas & color albicans, plumbeus, aut liuidus, aut ex albo liuescens: item
- 40 mollicies, frigus si attingatur, & situs: facies tumida, lingua alba & mollis, saliuâ dulcis, insipida, acida, salsa, copiosa in ore cum sputo confuso aquosoq; mucus per nares & palatum vberius fluens:

Pituita indicia.

alius pituitosa, frigida, humidior, liquidior, cruda, aquosa, alba, mucosa, lenta; vrina alba, pallida, modò tenuis, modò crassa & turbida: menstrua quoque mulierum albicantia: nec non alius sanguis vasculo exceptus, pallefcit. Insuper, magnum etiã pituitæ abundantis argumentum est, si ægri medicamenta pituitam ducentia, præsertim hyeme, & in morbis pituitosis, ex facili tollent: nec non calidis aliâs, & siccis iuuentur: frigidis contrã, & humidis quomodocunque adhibitis, offendantur. Iam somnium quoque frequens aquarum, pluuiæ, niuis, pituitæ index est, nec non ad somnum altiore propensio, sensus hebes, motus tardus, partium omnium segnities, & grauitas: pulsus exiguus, tardus, rarus, & mollis, mentis tarditas, torpor, & facilis rerum obliuio, stoliditas. Sunt autem hæ naturales quædam facultates, ex corporum temperamento profecti. **MATHE TES**, Quales in morbis apparent? **GERON**, Tot delirij species, quot ex sanguine oriri dixi: vbi pituita cerebrum obsederit, & temperamentum eius, actionesq; animales vitariar. Cùm autem illas, aut debilitarit, aut aboleuerit, supradictos in sanguineo temperamento affectus inducit. **MATHE TES**, Quæ signa sunt delirij pituitosi? **GERON**, Eo laborantes, nugaces eiulmodi sunt, qui tardè loquuntur, ita vt in re aliqua narranda, quæ paucis & breuib; possit expediri, eius exitum, finemq; non inueniant. adhæc stabiles sunt, vt qui tardè, aut rarò moueantur, pituitæ naturam sequentes. **MATHE TES**, Quæ pituitam, acidam, & salsam peculiariter ostendunt? **GERON**, Lingua manifestò eam in saliuâ, & sanguine cùm dentes fricantur in os manante, ostendit. Salsam indicant color, calorq;, & præcedens salforum alimentorum vsus, pruritus, scabies. **MATHE TES**, Quæ seri pituitæ abundantis indicia habentur? **GERON**, Multa eius portio, per saliuam, vomitum, aluum, vrinas, & sudores emanans, laxus corporis tumor. adhæc timiditas, nam pigrum, frigidumq; illud existit, non acre, nec malignum, nisi corrumpatur, tum enim vigilias quoque, & animi perturbationem, timoremq; parit, sicut corrupti sanguinis, aut alterius prauis humoris serum, si in vasis contineatur, mentis alienationem, furorem, & insaniam concitat. **MATHE TES**, Pituitæne etiã flatu ascribi debent? **GERON**, Maximè. nam pituita quoque à calore imbecillo calefacta, mutataq; in vaporem, in ventriculo frigido, humidòq; gigni solent: quanquam calor quoq;, flatu ex pituitosa materia sepiùs excitet: id quod in doloris colici curatione experimur. Nam medicamenta vix calida, in illo adhibita, humorem liquant, & nisi prius attenuetur, incidatur, & concoquatur, in flatu degenerat. **MATHE TES**, Quæ bilem copiosorem in corpore signant? **GERON**,

Pituita salse & acida signa.

Seri pituita.

Flatu ex pituita.

Bilis nota.

- RON, Corpus tactu calidum, siccum, rodens, gracile, hirsutum; adhæc venæ & arteriæ ampliæ: color autem oculorum, faciei, & totius denique corporis, pallidus, rufus, flauus, nigellus. Præterea si biliosa, amarâq; nunc flaua, nunc viridia, vomitu sponte, vel
- 5 arte citra molestiam euacuentur. Insuper aluus continuè sicca, pauca, acris, & vrens: sæpè biliosa, flaua, pinguis, & dolorifica. Urinæ admodum flauæ, tenues, in quibus pauca subsideant: & si à cibo diutius abstinenceatur, igneæ, & rodentes. Idem facit sudor flauus in stragulo, & linteis, vt qui amarus in lingua percipitur.
- 10 In eius initio horror, & punctura veluti aciculis cutem infestat: aures in biliosis admodum, excremento magis flauo, & largiore scatent: nares mucore rufo, flauo, viridi, paucò: oculi torquentur lippitudine: lingua sicca est, scabra, pallida, rufa, flaua, præsertim manè, aut post laborem: os saliuamadet, sputumq; amarum est.
- 15 rosio in ventriculo, & magis in eius ore percipitur: vnde conuulsio, comitialis morbus, & syncope stomachica oboriri solet: sitis vehemens, & insatiabilis, frigidis, & humidis placatur: quibus aliàs etiam biliosi oblectantur, contrarijs offenduntur. Est etiam copiosè bilis nota, cibi fastidium, quòd aliàs calidiore natura præ-
- 20 ditis, accidere æstate solet, & per febres præsertim acutas: adhæc somnus exiguus, levis: vigilie propemodum continuæ, & inquietudo: somnium de igne, incendijs, rixis, & pugnis: pulsus magnus, velox, frequens, vehemens, & durus. Postremò hoc peculiariter biliosis inest, quòd corpora eorum celeriter augecant.
- 25 MATHETES, Quali animo sunt præditi? GERON, Dextro, & prudenti, ad omnia tamen præcipiti, astuto, doloso, iracundo, audaci, temerario, confidenti, glorioso, vindictæ cupido, acri iniuriarum vindice, & liberali, sæpè etiam prodigo, & ingenio perspicaci, cogitabundoq;. MATHETES, Quales in morbis apparent?
- 30 GERON, Si bilis cerebrum inuaserit, temperamentumq; ipsius immutauerit, vt vel imaginatio, vel memoria, vel cogitatio violetur, delirant. atque in ea animi affectione audaciores sunt, & amarulentiores ijs, qui à pituita, & atra bile fiunt. Verùm eiusmodi mentis alienationes periculosiores existunt, ex quibus etiam egri
- 35 audaciores, & amarulenti magis euadunt. MATHETES, Qui morbi comitari biliosos solent? GERON, Herpes, erysipelas, febris tertiana, ardens, & cholera. MATHETES, Quæ atram bilem ostendunt? GERON, Corporis totius calor, & siccitas, pili copiosi, nigri, sæpè rufi, & flauī, venæ ampliæ. MATHETES, Quæ humorem melancholicum? GERON, Corporis frigus, & siccitas, humor, nigredo, pili rari, venæ angustæ, lienis durities, inflatio, dolor grauis: color fuscus, viridisq; palpebrarum, præsertim inferiorum, & to-

*Mores biliosorum.**Biliosorum morbi.**Atræ bilis signum.**Melancholici bilis morbi nota.*

tius corporis: sanguis ex vena incisa, vel aliter diuisa excretus, crassus, concretu facilis. Insuper non paruum indicium bilis est, si tali humore præditi, medicamenta illum purgantia faciliè tollent: item si sanguis crassus per hæmorrhoidas, & incisionem venæ amplam excernatur. **MATHETES**, Qualis ater humor in gustu percipitur? **GERON**, Cum in naturæ limitibus adhuc consistit, nullius propemodum qualitatis sensum exhibet: interdum verò acidus, simul & acerbus, verum obscurè percipitur. Cum autem naturæ inimicus euaserit, tunc insigniter acidus, acerbus, vel acris rodensq; tum ipsum vomentibus, tum olfactuprehenditur. 10

Ater humor acidus.

Acerbus.

Acidus & acerbus.

MATHETES, Cur ater humor acidus est? **GERON**, Quia nondum à calore natiuo satis est concoctus. **MATHETES**, Cur acerbus? **GERON**, Quia calor humorem aqueum, sicco terrestri mixtum, nihil prorsus adhuc concoxit. **MATHETES**, Cur acidus, & acerbus simul interdum existit? **GERON**, Id diuersarum partium ratione, aliàs non fieri solet. Nam in sapore acerbissimo, calidum, humidum aqueum nullo modo concoxit: in acido autem, magna ex parte humor itaque ater interdum acerbus est, cum calor humidum in eo prorsus non concoxit: interdum acidus, ubi calor humidum quidem concoxerit, sed non perfectè. **MATHETES**, Cur acris & rodens? 20

Acris & rodens.

Excretus atræ bilis humor terram eleuat.

MATHETES, Quibus alijs notis cognoscitur? **GERON**, Excretus terram, fermenti, aceti q; acerrimi instar eleuat, & bituminis modo ex adustione liquidior splendet. idem partes quibus insidet, erodendo exulcerat, eumq; nec musca, nec mus, nec aliud quoduis animal, degustat. Quicquid enim terram fermenti more subleuat, naturæ aduersum est, & à calore alieno adustum, in eam vim & speciem mutatur, vnde acrimoniam acquirat, & velut cinis quidam reddatur: quemadmodum fex vini non vsta, frigida & sicca est: vstionem autem experta, adeò calida fit, vt carnem 30

Differentia inter atram bilem naturalem, & non naturalem.

vrat, liquet, & corrumpat. **MATHETES**, Quomodo vtraque bilis dignoscitur, tum quæ ex flaua in iuuentute adusta, secundum naturam prouenit, tum quæ reliquorum humorum, præsertim bilis flauæ incendio, vel putredine orta est? **GERON**, Naturalis in declinantibus ætate apparet, modò rectè illi valeant: atq; illis duntaxat conuenit. minus naturalis autem, cuius ætati molesta est. **MATHETES**, Quæ alia signa atram bilem indicant? **GERON**, Urina crassa, nigra, fusca, aliàs viridis, & liuida: interdum rubra, obscura: aliàs alba, tenuis. Sudor niger in stragulo, linteo, & panno cernitur: sapore & odoratu acidum respicit. Aluus nigra, acerbissima (si quis gustare velit) concreta, obscura, humorem melancholicum signat. acida verò & acris, fluidaque & splendescens, 40

atram

- atram bilem. insuper sputum modicum, ructus acidus, nonnunquam acris & rodens, cum ardore quodam in ore ventriculi deprehenditur. Appetitus vitiosus: interdum caninus ex materia acida, os ventriculi obsidente, apparet. Præcordia sinistra, aliquando dextra, in melancholia, & flatulenta affectione offenduntur. Menstrua in sabulo, vel panno fusca, & ab alijs humoribus diuersa. Grauis dolor capitis, præcipue sinistri lateris, oculi limpidi, lucentes, fixi, horridiꝑ. vigiliæ, & insomnia crebra, aut somnus leuis, plenus insomnijs turbulentis, & terrificis, quæ dormientes experge faciunt. Somnia dira, vt mortis, cadauerum, sepulchrorum, tormentorum, daemonum, nigrorumꝑ aliorum. pulsus rarus, pro contraria humoris natura, in sanis & ægris. MATHESES, Quales humor melancholicus animi mores efficit? GERON, *Mores melancholici.* Frigidus & siccus tardos, ineptos, & stolidos magis quàm pituita: nec non timidos & mæstos, taciturnos, faciles ad lachrymas. Quia autem humor ille, siccus natura est, facilius inflammari, quàm pituitosus solet, ac calefactus, iam alias qualitates animo inducit. Nam ingeniosos, graues, studiosos, integros, constantes, seueros, pertinaces efficit. atra bilis, ex flauæ adustione prognata, *Ater humor.* *Atra bilis ex flaua.* 20 versutos, callidos, iracundos, acerbos, iniuriarum memores, implacabiles, malignos, vt etiam mortem sibi consciscant: inuidos, fraudulentos, auaros, parcos, eris alieni soluendi tardos, & illiberales. Cæterum omnes melancholici ad venerem sunt procliuēs: ex nigro quidē humore frigido, quod flatulenti sint: ex atra verò *Melancholici ad venerem procliuēs.* 25 bile, per adustionem flauæ. quia, cum illa per membra procreationi destinata mouetur, hæc ad agendum impellit: quod vel nullus alius humor, vel atra bilis magis præstare potest: aut quia ex melancholico temperamento, peculiaris quædam propensio ad venerem nascitur. MATHESES, Quos mores in temperamento contra naturam, humor iste parit? GERON, Similes vt reliqui, si cerebrum occuparit, eiusꝑ temperamentum immutet, ita vt actiones animales, aut vitariar, aut debilitarit, aut in totum aboleuerit. MATHESES, Qui morbi atram bilem comitari solent? GERON, Cum ex immoderato sanguinis crassi, vel bilis flauæ, vel pituitæ calore 35 generata, non probè discutitur, quartana febris, aut continuæ, quæ *Quartana febris alijs succedens.* *quæ συνεχής*, græcè dicitur, aut tertianæ, aut quotidianæ succedere consuevit. ex humore autem atro putrefacto, legitima quartana oritur. MATHESES, De alijs humoribus quod nimium adusti, febrim quartanam procreent, non dubito: de pituita autem 40 nondum persuasus sum. GERON, Si morbus comitalis Galeno à pituita crassa, & humore melancholico gignitur, adhæc si pituita subamara, & calida, vrendo sit in flatulenta melancholia, mirum

non est, quartanam, alphas, elephantiasin, & scirrhus, præsertim in hisce regionibus, frigido, copioso, crudioreque alimento afflue-
tis, excitari. MATHE T. Quæ autem inter quartanas, alijs febribus
superuenientes deterrima existit? GERON, Quæ ex tertiana, hoc
est, flaua bile adusta contrahitur, nam reliquarum eius specierum
malignissima est. Hinc etiam vehementissimos in corpore mor-
bos, cancrum, elephantiasin, & similes procreat, vnde etiam diffi-
cultas intestinorum ab illa incipiens, lethalis est. MATHE TES, Po-
tèstne ex duobus humoribus, tertius alienus generari? GERON,
Actione caloris potest, sed non quiuis. MATHE TES, Quis ergo? 10

*Bilis ex sanguine
& pituita mistis
oritur.*

*Ex flaua bile, &
sanguine.*

*Niger humor ex
bile, sanguine, &
pituita.*

GERON, Bilis ex sanguine & pituita. Cum enim eadem ex utroque
separatim oriatur: quid ni ex coniunctis quoque poterit? ita ta-
men, ut calor, qui in pituitam agit, maior existat, quam qui in san-
guinem. Quia si par, æqualisque esset, sanguis ante adustus esset,
quàm pituita in bilem conuersa. adhæc bilis atra ex bile flaua, &
sanguine fieri poterit: quia ex singulis illis separatim nasci solet, vbi
aut nulla, aut certè non tanta caloris inæqualitas, ut ex duobus il-
lis vnus proueniat, requiritur, quanta cum ex sanguine, & pituita
bilis flaua gignitur. Ob eandem causam atra bilis ex tribus simul
coniunctis, bile, sanguine, & pituita procreari potest, sicut ex tri-
bus elementis, aliud quiddam. MATHE TES, Cur bilis non ex san-
guine simul, & humore nigro generatur? GERON, Quia ipsa neque
seorsim ex humore nigro, neque ex pituita, & humore nigro oriri
potest. MATHE TES, Potèstne sanguis ex bile, pituita, & humore
nigro oriri? GERON, Quanquam sanguis ex pituita fieri queat, 25
tamen ex bile, & humore nigro non potest: ita neque pituita ex
bile, & sanguine simul coniunctis, neque ex bile, & humore nigro,
neque ex hoc, & sanguine procreatur, etsi ipsa ex sanguine solo gi-
gni queat. MATHE TES, Audiui iam, quibus signis humores sin-
guli, vel plures, inuicem conuenire, & abundare cognoscantur: 30
qui fit autem, quòd tot modis à suprà citatis vitientur? GE-
RON, Quia mutantur, dum increfcunt, ac decrefcunt ætatibus,

*Cur humores va-
riè deprauentur.*

*Color sequitur hu-
morem subie-
ctum.*

anni temporibus, victus ratione, & temperamento, sicut etiam
regione: vnde etiam colores varios corporibus inducere solent.
Nam si in temperamento alicuius, sanguis reliquis humoribus
dominetur, meritò ille roseo colore tinctus erit. ita si pituita, albo: 35
si bilis, flauo: si ater humor, oleaceo. Nam qualis humor cute sub-
iectus, talis in ea color efflorescit, nisi ille intrò recesserit. Quine-
tiam Hippocrates memoriæ prodidit, colorem in hominibus
pro vinctis humoris dominio, in ætatum successione mutari. 40
Cum enim sanguis in adolescentia vigeat, colorum faciei, tum
reliqui corporis rubicundus, roseus, floridusque, seu ex albo, & ru-
bro

bro mistus cernitur. in iuuentute, ob bilis abundantiam, ad flauum vergit: in ætate declinantium, cum in ipsa bilis nigra naturalis, alios humores superat, ad nigrorem declinat: senes, qui ex parte pituitosi sunt, albiore apparent. **MATHESES**, Alióne tempore, quàm in ætatem successione colores mutari solent? **GERON**, Non, quia tunc solum etiam humores mutantur. **MATHESES**, Quid si ipsi perturbentur? **GERON**, Tunc quouis tempore mutari possunt, vt floribus accidit, cum in aquam deiiciuntur, vel manibus tractantur, vel alio simili modo afficiuntur. **MATHESES**,
 10 Qua ratione humores perturbantur? **GERON**, Si non modò ad interiora regrediantur, sed etiam si extrorsum egrediantur. Nam si quis rubro colore præditus, vel maximum aliquod periculum, vel mortem timeat, sanguis vnà cum spiritu intrò ad principium cor adiuuandum recedit. Quò fit vt facies, & corpus vniuersum,
 15 tam diu pallidum maneat, quoad metu detinetur. Sin autem quis candido colore tinctus, aut irascatur, aut pudore, aut verecundia afficiatur, statim rubore suffunditur, ob eam quidem causam, quia sanguis simul cum spiritu foràs erumpit, nempe delicti, siue veri, siue ficti, quod verum existimatur, celandi, aut vindictę exercen-
 20 de gratia. In summa, pro anime perturbationum varietate, humores vel extrorsum, vel intrò feruntur. **MATHE**, Similíne humores vniuersi essentia constant, an inter se differunt? **GERON**, Pituita,
 & humor ater crassam, hic autem crassiorem, quàm illa obtinet: bilis flaua, tenuem: atra autem bilis propriè dicta, interdum te-
 25 nuior quàm flaua existit. Sanguis verò, si moderatus calore est, etiam mediocris apparet. porrò vnusquisq; crassus etiam grauis existit: qui tenuis, leuis quoq; est. Hinc flaua bilis sursum natura fertur, nisi cum graui aliquo humore permista fuerit, propter quem inferiùs descendere cogitur. Atra bilis & pituita, cum gra-
 30 ues sint, deorsum tendunt. **MATHESES**, Ergo grauitatis, & leuitatis ratione in corpore mouentur? **GERON**, Nequaquam. nam si hoc fieret, humor niger, & pituita in inferiore animalis loco, tantum essent, ita tamen, vt nigra bilis in infimo subsisteret: proximo verò pituita, sed nihil aut sanguinis, aut bilis ibidem inesset. rur-
 35 sus sanguis, in medio tantum corpore: non autem ater humor, nec pituita, nec bilis existeret: hæc rursus, sola in superna corporis regione, sine alijs humoribus hæreret. Sed humores tum crassi, tum
 40 tenues, in omnibus corporis regionibus inueniuntur: non ergò ob crassitiem, vel leuitatem huc, & illuc perpetuò tendunt. Verum quatuor in vnaquaq; corporis particula insunt facultates, de quibus antea, vt attractoria eius quod familiare est. nam biliosæ partes nutriuntur, bile, pituitosæ, pituita, mel: cholica, atro hu-

*Materia humo-
rum diuersa.*

*Humores non gra-
uitatis aut leui-
tatis ratione, sed
facultatum, que
singulis partibus
insunt, mouen-
tur.*

more, sanguineæ, sanguine: altera, retentoria eius, quod attrah-
ctum est: tertia concoctrix eius, quod retinetur: quarta, expul-
trix excrementi illius, quod ex concoctione prouenerit: atq; hac
ratione humor, vel tractu, vel vtroq; mouetur. MATHETES, Cur
vtrorq; GERON, Quia si pars aliqua pituitosa nutriri pituita de-
beat, & hæc alteri sanguineæ aduersetur, molestaq; sit, illa quidem
pituitam ad se trahet, hæc autem eam tanquam opprimentem à
se propulsabit. atque sic pituita & tractu, & expulsionem mouetur.
MATHETES, Omnis igitur humor, qui trahitur simul & propelli-
tur, citius mouetur, quam si vel solum pelleretur, vel traheretur: 10
GERON, Indubiè. id etiam de humoribus, qui deorsum feruntur,
dici potest: eò quod ad infera citius, quam ad supera moueantur,
cum natura sint graues, vtpote ex primis corporibus conflati: sed
hi magis, illi minus, pro terræ dominantis ratione. Qua de cau-
sa, cum eiusmodi essentiam sortiti sint, deorsum feruntur: non so- 15
lum autem ob essentia ipsorum prauitatem, sed etiam à facultate
partium inferiorum deorsum ad alendas illas tendunt. MATHETES,
Si ergo humores duplici motu, tum proprio, tum alieno,
nempe partium tractu, ad inferiora vergunt: quomodo ad superio-
ra alenda peruenient? GERON, Sola tractione, cui nonnihil ob 20
essentiæ suæ grauitatem renituntur: vnde fit, vt ad inferiorem cor-
poris regionem nutriendam facilius, velociusq; quam ad superio-
rem moueantur. Hoc quoque notari debet, singulos eosdem hu-
mores inter se differre. nam aliter habet sanguis, qui ad sublimas
partes, aliter qui ad inferiores tendit: ille tenuior, hic crassior exi- 25
stit: quamuis vtrobiq; communi qualitate præditus. Pituita ve-
rò, quæ sursum vergit, etiam tenuior, sed minus frigida & alba,
quàm quæ ima petit. Bilis flaua, quæ ad superiores partes fertur,
flauior paulò, vtpote tenuior, magisq; calida est, quàm quæ infe-
rius descendit: quanquam eadem vi generali vtroque in loco pos- 30
leat. Iam niger humor sursum repens colore, facultate, & qualita-
te ab eo discrepat, qui deorsum tendit.

*Humores an om-
nes simul reduc-
dare possint.*

MATHETES, Cum iam abundè satis declararis, quando sin-
guli humores in corpore abundant, quibusque notis dignoscan-
tur: dic nunc obsecro, possintne omnes simul eodem tempore 35
etiam redundare? GERON, Possunt herculè: idq; duplici ratione.
prima græcis dicitur *πληθώρα*: altera *κακοχymία*: illa humorum co-
pia, hæc tanquam ipsorum vitiositas, seu corruptio. In plethôra
venæ & arteriæ puro & sincero sanguine solo, siue omnibus suc-
cis æquabiliter refertæ sunt. In cacochymia autem impuro, siue 40
bilioso, siue pituitoso, siue melancholico, siue seroso, aut flatulen-
to copiosiore scatet, quàm vt confici queat. At plethoræ duæ
rursus

Plethora.

Cacochymia.

Plethoræ species.

- rurfus species exiftunt: vna in qua fanguis, licet neque copia, neque qualitate mediocritatem excedat, tamen vires ex quauis alia caufa imbecillas premit: altera, in qua fanguis iam naturæ moderationem exuperat, & magis augescens ei familiaris effe definit. hæc
 5 ipfa aut leuis eft, cum fanguis mediocritatem paulum fuperat: aut tenfua, cum idem iam valorum tunicas præ copia diffendit, ac ferè deuellit. hæc quanuis nimium redundet, vires tamen non grauat, vt quæ cum fanguine & carnis mole plerunque, vt in athletico-
 10 rum ftatu, æqualiter augefcat. ac fi vires inualidæ fubfiftant, copia humorum maior his cenfenda erit, quàm vulgus plenitudinem ad vires appellant. Quinetiam alia quæuis copia ex vitiatif humoribus contracta, vires corporis excedit, & naturæ grauis eft. Atque hæc figna omnis humorum copię in vafis fubfiftentis
 15 quod notari debet, quando omnes fimul particulæ in eo ftatu constitutæ funt, nec vlla in quam fanguis decumbat magis, quàm cæteræ decliuif exiftit. item quando eadem fimul æquabili & moderato calore funt præditæ, fanguisq; neque ob frigus introrfum refugit, neque extrorfum ob nimium vel ex aëre, vel ex bal-
 20 neo, vel ex potu vini, vel ob corporis exercitationem, vel ex febris, vel ex vilius caufæ calefacientis vi, calorem concitatus, & turgidus, vel quafi colliquatus, venas in tumorem attollat, diftendatq;. MATHETES, Quod præterea fignum eft copię in vafis contentæ? GERON, Alterum eft venarum tenfio, cum qua dolor
 25 aliquis percipitur, atque ea non modò materiæ copiam, fed exuperantem quoque testatur. hæc tenfua eft laffitudo, fponfe pro-
 30 ueniens, in qua tum corpus, tum omnes artus quafi pondere adeò grauantur, vt difficulter moueri queant. & fi corporis iplius moles amplior euafert, brachiæque, crura, & tibiæ inturgescant, non venarum duntaxat, fed totius corporis eft repletio. Præter hæc
 35 figna indicant etiam iftam corporis repletionem, venę pleniores, quæ oris adapertis, nonnihil fanguinis redundantis in arterias transfundunt, nifi humores nimium craffi vifcofiq; fuerint: nec non pulfus vehemens, magnus, & plenus, non modò in brachijs
 40 & manus iunctura, fed etiam in temporibus, digitis, & in fingulis externis partibus difficilis, moleftusq; apparens: adhæc fpiritus, qui neque ex alto corporis, neque liberè, fed difficilior, frequentiorque, præfertim in exercitatione trahitur. Insuper alię notæ ex præterita victus ratione fumptæ, præfentes has confir-
 mant, nempe cibus plenior, & valentior: balnea infolita ftatim
 45 poft eum in vsum moderatum exhibita, in quibus ille tanquam ferosus liquatufque in corpus fuerit diftributus. Notiofa vitę ratio,

*Communis re-
pletionis figna.*

*Vasorum reple-
tionis indicia*

*Totius corporis
repletio.*

*Plenitudinis nota
ex victus ratio-
ne.*

*Propria repletio-
nis signa.*

*Copia vires gra-
uantis notæ.*

*Morborum ex
pulsu cognitio.*

Vires resoluunt.

Vires grauant.

*Pulsus vires re-
soluentium.*

*Pulsus eorum
que vires gra-
uant.*

in qua nihil è corpore discussum sit, sed omnia retenta, cutis densior, omnisque consueta euacuatio suppressa, longè euentius materiam repletioni suppeditant. MATHE T. Intelligo hæc communia quidem repleti corporis signa existere: propria verò cuiusque copiae ac repletionis non item. quare si placet, hæc quoque 5 subiungas. GERON, Vasorum repletio sola est, quando corpus in plethora nihilò magis ingrauescit, & vires vniuersæ æquales permanent. At copia quæ vires grauat, inde notescit, si corpus artiusque ingrauescant, & ægrius moueantur: adhæc si grauis somnus, altiusque, & perturbatus inuadat: si laborans se grauitate premi, onusque gestare, aut loco moueri non posse somniet. Quemadmodum autem humorum tum singulorum, tum omnium simul, copiae & immoderationes, nec non alij affectus enumeratis notis, sic etiam ex pulsu, respiratione, & vrina dignoscuntur. sed primum de pulsu, quomodo ille ex naturali statu in alienum mutetur: deinde etiam de vrina tractabimus. MATHE TES, Oro te, mi praeceptor, sic pergas. nam ea quæ superius de ipsius origine, & differentia, pro temperamenti, ætatis, sexus, animi & corporis affectus ratione docuisti, non parum adiumenti ad naturæ, corporis, & animi noticiam comparandam mihi præstare poterunt. 10

GERON, Gaudeo te fructum aliquem ex doctrina mea percipere: aduertas igitur reliquis, quæ hîc iam subiiciam. prius autem ea quæ vires corporis resoluunt, quæ grauent, quæ irritent, nosse oportet, vt tum communes, tum proprios morborum pulsus facilius addiscas. MATHE TES, Libenter exte audiam. GERON, 25 Alimenti penuria, morborum malignitas, summæ animi perturbationes, dolores nimij, aut longi, profluvia superflua, magnæque intemperies, vires resoluunt. Humorum autem copia, morbi instrumentariarum partium, vt inflammationes, scirrhi, tumores, abscessus, corruptiones variæ, & morbi perperam compositi, illas grauant. Eadè verò quæ resoluunt, aut grauant, etiam ipsas irritant, dum facultatem ad certamè prouocant, quo incommoda repellere nititur, sepe omnia coeunt & complicantur. MATHE, Quales pulsus vires resoluentia edunt? GERON, Primò paruos, tardos, crebros, languidos: deinde minimos, tardissimos, creberrimos, & languidissimos. Quòd si resolutio fieri pergat, nonnulli pulsuum motus integri periunt, intermittuntque, & deficiunt, sicut im- 30 puri, siue reciproci, siue non reciproci, vermiculantes, & formicantes. At vires grauantia, inæquales, proprii nominis expertes, & inordinatè producunt: deinde eos, quibus propria insunt nomina, vt intercurrentes, intermittentes, caprizantes, vndosos, vibratos, conuulsos, & serratos. Porro quæ vires irritant, pulsus magnos,

magnos, altos, celeres, crebros, & vehementes efficiunt, modò facultas sit robusta. *Pulsus vires irritantium,* sin autem imbecilla, paruos, tardos, crebros,

& variè inæquales. *MATHESES*, Id exemplis mihi ordine declares.

GERON, Cum vires ex nimijs profluuijs, vt diarrhœis, dysenterijs, menstuis superfluis, hæmorrhoidibus, sanguinis fluore, sudoribus, perforationibus (quas chirurgi moluntur) in hydrope, empyemate, siue puris collectione, & in seminis profluuiio, atq; id genus alijs. si magnus fuerit excessus, pulsus redduntur parui, celeres, crebri, languidi: in maximo, vermiculantes, & formicantes, quos solent præcedere deficientes singulares. Quòd si febres adsint, tunc vermiculans manifestior est, & longius durat. sin autem febris superuenerit, præsertim magna, abigit vermiculantem, aucti caloris gratia. nam partium quarundam tarditate, & raritate, vsui satis esse nequit, eoque formicans, nonnunquam deficiens, in vicem eius succedit. *MATHESES*, Qui tandem dolorum pulsus existunt?

GERON, Per initia maiores, celeriores, crebriores, & vehementiores: deinde minores, celeres, crebri, & languidiore sunt: tandem parui, tardi, creberrimi, & languidi: nouissimè formicantes. *MATHESES*, Quid vehementiores in dolore efficit? *GERON*, Facultas irritata: quia priusquam collabatur, ad id, quod sibi molestum est reiiciendum & propulsandum totis viribus incumbit. Eadem robusta, maiores, celeriores, & crebriores, vtpote sibi familiares. imbecillis autem valdè frequentes reddit. *MATHESES*, Qui do-

lores vires resoluunt? *GERON*, Qui vel principem aliquam partem affligunt, vel diuturni sunt, vel ingentes: quocunque autem horum pulsandi facultas violetur, & deficiat, pulsus edet: in parua quidem defectione minores, debiliores: celeres autem, & crebros, quia spiritus, qui tum efferuescunt, agitantur. in maiori vero, paruos, tardos, creberrimos, & languidos. *MATHESES*, Qui pulsus intemperiem testantur?

GERON, Calidam quidem, ac simplicem ex æstu, aut febriliaria profectam, magnus, velox, frequens, simulq; æqualis: talis etiam hæcticam febrim, licet paulò durior, indicat. *MATHESES*,

Qui simplicem succorum abundantiam, quam plethoram appellasti, signant? *GERON*, Eam quæ nondum vires adhuc premit, magnus, velox, creber, & æqualis: nec non vehemens, turgidus, ac plenus (viribus robustis peculiaris) sicut & febrim continuam simplicem, quæ Græcis *συνεχὴς* dicitur. *MATHESES*, Qui produnt

intemperiem humoribus vitiosis infectam? *GERON*, Magnus, velox, frequens, sed non æqualis, tum in vno, tum in pluribus motibus: talis etiam putridam febrim ostendit. nam in ea arteriæ

Pulsus vires irritantium,

Dolorum pulsus

Dolores vires resistentes.

Plethoræ pulsus & febris continua.

summissio velocior est, quàm eius eleuatio, nimirum, vt putrida fuligo expurgetur. exterior autem quies breuior existit, quam frequentior etiam pulsus comitatur. **MATHESES**, Qui intemperiem frigidam ostendunt. **GERON**, Rarus, tardus, & paruus: si fuerit sicca, etiam durus: si humida, mollis: idè si illa simplex extiterit. nam si ex humoris alicuius influxu contracta fuerit, inæqualis quoque pulsus accedit, præsertim si humor ipse crassus, viscosus, & copiosus magis, quàm tenuis & modicus, nobilem partem obsideat. **MATHESES**, Quibus pulsibus separatim, partium affectuum morbi notantur.

*Inflammationis
pulsus.*

GERON, Inflammatio partis neruosa, membranosa, tensorio, serratili, & vibrato: partis mollis, ac carnosæ, in qua vomicae esse solent, vndoso potius quàm serrante: sicut cerebri, pulmonis, & carnis inflammationes. At pars pluribus & maioribus arterijs prædita, magno, veloci, & frequenti pulsu, serrantis loco declaratur. si autem hæ ipsæ venæ, & arteriæ, quas inflammatio occupauit, obstructæ fuerint, & compressæ, inæqualis erit. Eodem pulsu inflammationes septi transversæ, stomachi, ventriculi, pulmonis, renum, & membrorum, quæ accurato sensu prædita sunt,prehenduntur. quanquam tempora illius pulsibus variant. nam initio illi maiores sunt, celeriores, frequentiores, vehementiores: in augmento crescunt, suntque magis serrantes, & vibrati: in statu, propter vires labefactatas, minores, veloces, frequentes, languidi, & manifestius serrantes percipiuntur: in declinatione omnes sunt mitiores. At inflammationem diuturnam, & in scirrhum indurescentem, gracilis pulsus, & durus demonstrat. Latera obsidentis, quæ græcè *πλευρίτις* dicitur, non nimis magnus, velox, frequens, sed propè durus, mediocriter vehemens, serratus, index est. **MATHESES**, Quare velox illi ascribitur. **GERON**, Quia febris acuta, semper pleuritidi coniuncta est. **MATHESES**, Cur durus. **GERON**, Quia membrana costas succingens inflammatorio humore distenditur. cum verò duræ arteriæ attolli nequeant, pleuriticorum pulsus minùs magni esse possunt: eoque ipsorum loco frequens nunc maior, nunc minor redditur, vt vsui satis fieri queat. Rarior in pleuritide pulsus, quàm inflammationis ratio exigat, carum futurum portendit, eò quòd cerebrum humidus, pituitososque vapores, ex ipsa inflammatione exortos, recipiat. si pulsus adhuc rarior, & maior fiat, Veterini in cerebro subnascens maximum indicium est.

*Pleuritidis pul-
sus.*

GERON, Quia febris acuta, semper pleuritidi coniuncta est. **MATHESES**, Cur durus. **GERON**, Quia membrana costas succingens inflammatorio humore distenditur. cum verò duræ arteriæ attolli nequeant, pleuriticorum pulsus minùs magni esse possunt: eoque ipsorum loco frequens nunc maior, nunc minor redditur, vt vsui satis fieri queat. Rarior in pleuritide pulsus, quàm inflammationis ratio exigat, carum futurum portendit, eò quòd cerebrum humidus, pituitososque vapores, ex ipsa inflammatione exortos, recipiat. si pulsus adhuc rarior, & maior fiat, Veterini in cerebro subnascens maximum indicium est.

*Suppurationis,
sive empyematis
pulsus.*

GERON, Suppuratorum, quos Græci *πυώδεις* vocant, pulsus sunt vt in statu inflammationis, inæquales, inordinati, & in omnibus hecticis: vbi verò pus iam confectum, paulò æqualiores fiunt: quando autem

autem erumpit, latiores, tardiores, rariores, & languidiores: si durities, & tensio excellant, etiam serrati. si facultas ad ea quæ instant expellenda incitetur, pulsus prodeunt magni, celeres, vehementes. si iam ex irritatione defessa sit, ac collabatur, aut arteriæ
 5 obstruantur, aut comprimantur, tardi, crebri, & languidi. Atque hæ causæ inæqualitatis, & ordinis perturbati, confecto tandem pure, mitescunt. quando autem pus adhuc concoquitur, dolores, ac febres magis inualescunt, quàm illo iam maturato. MATHE. Cur pulsus hæcticus huic morbo conuenit? GERON, Quia facultas in
 10 suo conatu persistit, nec elaborare desinit, donec sanies ex affecto loco effluat. MATHE. T, Quales pulsus post illius effluxionem succedunt? GERON, Latiores, tardiores, rariores, & languidiores. facultas enim pugnando defatigata est, calor efferbuit, & corpus est extenuatum. MATHE. T, Vnde pulsus fit latus? GERON, A facultate imbecilli, & loci amplitudine. quò autem maior, latiorq;
 15 ante puris eruptionem erat, hoc post illam est manifestior.

Cæterum marcoris, qui græcis *μαρasmus* dicitur, simplicis *Marcoris simplicis pulsus.*
 quidem (quanuis is raro appareat) in quo corpus totum arefcit, sic vt siccitas naturæ modum excedat, calor autem & frigus
 20 mediocritatem seruet, pulsus est exiguus & languidus, eò quòd facultas in eo sit imbecilla. quò autem magis inualida fuerit, tantò minor & obscurior euadet. Calidi marcoris pulsus, non modò
 paruus & languidus, sed etiam velox & frequens: quia vsus est auctior. cùm autem arteria ob imbecillitatem distendi æqualiter
 25 nequeat, sed mediæ eius partes magis attollantur, non nihil eminent. nam hæ sola leuiuscula cute conteguntur: vtrinque autem sit, tabida carne aggrauantur, eoque minùs attolluntur. In frigidò marcore contrà, tardus & rarus pulsus apparet, eò quòd
 vsus sit imminutus. *Frigidi marcoris pulsus.* Cæterum in quauis marcoris specie, hæcticus pulsus deprehenditur: quia affectus non in humoribus,
 30 sed in solidis partibus, in quibus firma est immutatio, consistit. præterea durus in qualibet percipitur: quia durities siccitatem comitatur. in calida verò magis duri pulsus esse solent, tum propter siccitatem, tum quòd marcor & febris exuccu corpus efficiant.
 35 Tabidorum pulsus sunt parui & languidi ob virium imbecillitatem: non autem adeò celeres, neque frequentes: quia febris ipsorum exilis est. hæctici verò, quòd febris, qua laborant, in solidis hæreat partibus, vtpote hæctica.

Phreneticorum pulsus sunt parui, veloces, frequentes, duri, *Phreneticorum pulsus.*
 40 mediocriter vehementes, raro vndosi, sæpiùs trementes, conuulsorij, & si febris superueniat, tensorij, vibrati. MATHE. T, Quæ de causa tales in hoc morbo inueniuntur? GERON, Duri sanè exi-

stunt ob tensionem, quia phrenitis tenuioris membranæ cerebri, vel septi transversi inflammatio est, & à bilioso humore prouenit; veloces autem & frequentes sunt, quia morbus cum febris magna inuadit: ob quam vsus necessarîo augetur. nisi verò arteriæ durities distentioni resisteret, etiam pulsus phreneticorum magni existerent. MATHESES, Qua de causa mediocriter vehementes illis ascribis? GERON, Quoniam facultas membri sensilis affectione irritatur, atque id quod ipsam molestat, propellere conatur: si verò imbecilla est, vehementes pulsus efficere nequit. MATHESES, Qui reliqui ipsis superueniunt? GERON, Vndosus tunc solum, cum inflammatio cerebrum obsidet. aliàs raro, quia pars affecta nervosa est. Tremulus propter virium imbecillitatem efficitur. Conuulsorius autem, quia affectus in nervosa parte consistit, nempe in septo transverso, & tenui cerebri membrana. Inæqualis sanè in vno motu, vnaq; arteriæ parte, vt in febribus accidere solet. tensus, & vibratus, quia malum in partibus nervosis inflammatis existit.

Anginæ pulsus.

Anginæ pulsus est, qualis omnium inflammationum. fit autem vndosus, si ad peripneumoniam degeneret: si verò membranosa & nervosa partes, magis quàm carnosæ affligantur, conuulsorius: si vrget suffocatio, paruus & rarus: si mors est in vicino, frequens, & inæqualis pulsus apparet. ille quidem ob vsu adauctum: hic autem ob facultatem offensam.

Asthmatis pulsus

Asthma pulsus inæquales, inordinatos, intermittentes, & deficientes habet. quò autem grauius est, eò languidiores, & tardiores: nouissimè frequentes valdè & languidos. Hoc autem symptomata, quo quis non nisi recta ceruice spirare potest, vnde Græcis *ὀρθόπνοια*, vocatur, plerisque morbis commune est. nunc enim instrumenta spirandi sunt angusta, cum tumores naturæ contrarij, repletionesq; in iocinore, liene, intestino crassiore, & finitimis partibus prope septum transversum premunt: nunc, cum thoracis cauitas, aut vasa in pulmonibus, superfluis humoribus infarciuntur, vel immodicis tumoribus cinguntur, vel cum aspera arteria, aut fauces illius opplentur, vt in destillationibus copiosis, & gutturis inflammationibus. At peculiariter dicitur læsa ista respiratio *ὀρθόπνοια*, quæ crassius lentisq; humoribus, in asperis pulmonum arterijs contracta est. Quia igitur facultas in omnibus multum debilitatur, enumeratos iam pulsus edere consuevit.

Stomachicorum pulsus.

Stomachi inflammati pulsus sunt tensorij, & durissimi autem quàm septi transversi, aut membranæ costas cingentis, quia nervi oris ventriculi longè molliores sunt, & essentia ipsius ventriculi carnosa, non autem adeò tensilis. Stomachi siue ventricu-

triculi resoluti ex intemperie quacunque, cum rosione, singultu, vomitu, nausea, cibi fastidio, & dolore, parui, celeriores, frequentes, & languidi existunt. Stomachi aggrauati cibis immoderatis, nulla insigni qualitate præditis, vel humoribus nunc à toto corpore, nunc à cerebro potissimum, nunc à iecore, vel alia parte in ipsum confluentibus, parui, tardi, rari, languidi, & inæquales existunt: quia affectio est frigida, & facultas veluti onere grauata.

Strangulatus, siue suffocationis ex vtero, pulsus variari pro symptomatum diuersitate solent. Cum enim ex materia frigida, crassa, copiosa in vtero collecta conuulsio accesserit, tensorij pulsus fiunt. Cum autem magis melancholica infestat, quæ moestitiam, & animi defectionem inducit, parui, tardi, & rari erunt, idque bona ratione, cum morbus ille sit frigidus: inæquales ac inordinati, quoniam facultas eius grauata est. interdum nimium frequentes, vel deficientes, quando morbus nimium sæuit: nulli autem percipiuntur, si is sæuire non desinat.

Veternosorum pulsus similis est magnitudine, imbecillitate, mollitie, peripneumonico, nisi quod tardior, rarior, minusque inæqualis: intermittens autem magis, quam intercurrentes existat: interdum dicrotus, seu bis feriens. si accedat sopor, vndosus semper occurrit: interdum etiam vibratus obscurus, si pituitosa inflammatio cerebri membranas infestet, quod tamen raro accidit. Quod si abscessus sit ex bile, & pituita mixtus, phrenitis lethargica, vel sopor vigil dicitur. si bilis superet, pulsus, & symptoma phreniticis respondent: si pituita, veternosis. si vterque humor æqualiter abundet, mixta sunt symptomata. Pulsus igitur sunt in phrenitide veternosa, celeres & crebri, ob febrem: lati, ob madidas arteriarum tunicas: breues, quia longitudo, dum dilatescit, breuior euadit.

Catalepticorum seu catochorum pulsus, similes ferè sunt lethargicis, sed non tam inæquales, & languidi, ut illorum existunt: quia in his facultas non adeo est affecta, neque grauata. adhæc in catochis, pulsus molles non sunt: quia tunicae arteriarum non adeo ut in veternosis madent: in quibus non modo arteriæ, sed etiam totius corporis habitus relaxatur, & intumescit.

Paralytici siue resoluti, paruos pulsus, tardos, & raros obtinent: eò quod vsus ob morbum frigidum est imminutus: languidos autem, quia facultas est imbecilla: molles, quia arteriæ madidæ existunt. At si facultas plurimum languescat, & resolutio magna sit, valde parui & crebri pulsus fiunt: inæquales, quia facultas est grauata: intermittentes autem tum ob hæc, tum ob instrumentorum obstructionem gignuntur.

*Epilepticorum
& apoplectico-
rum pulsus.*

Epilepsiæ, & apoplexiæ tensorios pulsus habent, si ægri conuellantur. aliam verò nullam illorum immutationem indicant. magnæ autem, tum valdè tensorios, tum minores, tardos, raros, languidos, & inæquales. maximæ, paruos, crebros, languidos.

*Hydropicorum
pulsus.*

Hydropis ascitis pulsus est paruus, frequentior, leuiter durus, & tensorius. tympanitis longior, velocior, frequens, non imbecillus, subdurus, & tensorius. anasarce latior, mollis, vndosus. Porro quia materiæ ascitis & tympanitis congestæ, infimi ventris partes mole sua distendunt, pulsum tensorium, atq; hunc durum, frequentemq; efficiunt. magis autem hunc ascites, propter inuuldiorē facultatem, caloremq; auctum, præsertim si febris adsit.

*Arquati morbi
pulsus.*

Arquato morbo laborantium pulsus minor est, frequens, durior, non velox, nisi febris adsit, neque languidus. Quod si febres, vel intemperies, vel inflammationes viscerum vrgent, pro istarum ratione pulsus quoque immutari solent.

*Morbi gallici
pulsus.*

Morbi venerei inueterati pulsus sunt parui, tardiores, rariores, languidi: idq; propter imbecillitatem facultatis ex vitiatis spiritibus contractam.

*Grauidarum pul-
sus.*

Grauidarum mulierum pulsus sunt maiores, celeriores, crebriores: interdum etiam languidiores. illi quidem, vt calor natiuius attemperetur: hi autem ob varios affectus, quibus grauidæ affligi solet. Hæc de morbis & pulsibus dignoscendis in præsentia satis esse poterunt. MATHESES, Cum respirationem pulsui per omnia propemodum respondere nuper dixeris, quid ipsius difficultatum species singulæ in corpore significant?

*Respiratio quid
significet.*

GERON, Simples quidem, vt suprâ docui, nihil absolute & firmiter declarant, vt pote duobus affectibus communes. magna enim calorem natiuum, siue aduentitium, vel mentem alienatam, seu delirium testatur: parua dolorem partium respiratoriarum, vel calorem natiuum esse refrigeratum: velox calorem increuisse, vel partes spiritales, angustas euasisse, vel has dolorem cum febre habere: tarda calorem genuinum decreuisse, vel partes spiritales citra caloris augmentum, dolere: frequens calorem illum increuisse, vel partes respirationi dicatas dolorem cum febre, vel sine illa perpeti, vel earundem angustiam sustinere: rara calorem natiuum minutum, seu refrigeratum esse, vel mentem delirare. At compositæ spirandi difficultates certò affectus notant, præsertim magna vel parua, cum veloci, aut tarda, vel cum frequenti, aut rara coniugatæ. Ac magna sanè, & velox calorem natiuum increuisse, & vim animalem robustam esse, spiritaliaque instrumenta ad motum parere nunciat: magna & tarda solos delirantes, non tamen omnes, nec semper indicat: magna & frequens,

quens, calorem ampliorem: rara delirium notat. E contrario parua & velox, instrumentorum spiritalium dolorem, natiuumq; calorem auctum, magna ex parte, interdum autem mentis alienationem significat: parua & tarda partes spiritales sine caloris natiui incremento dolere, vel illum valde refrixisse: parua & frequens, partium spiritalium, vel earum, quæ cum illis mouentur, vt gulæ, ventriculi, iecoris, lienis, dolorem ex intemperie inæquali, tumore calido, continuitatis diuisione per vlcus, membranarum tensione, copiaq; flatuum, aut humorum calidorum, acrimum, aut frigidorum lentorumq; contractum. parua & rara calorem quidem natiuum refrixisse, sed partes spiritales, præsertim pulmonem, & cor vehementius. At respiratio valde celeris, & parua, frequens, calorem genuinum sine dolore increuisse indicat, quæ etiam necessariò magna existit: celeris parum, & valde frequens, calorem cum dolore auxisse testatur, quæ parua quoque necessariò est: celeris & rara, delirio interdum adest, nec non cum hoc, calori aucto, sed nihil necessariò signat: tarda verò multum & frequens parum, minorem quidem dolorem, sed vires animales magis imminutas esse ostendit: tarda autem parum, & frequens multum, solum partis spiritalis dolorem demonstrat. porro frequens æqualiter eundem dolorem, & virium animalium detrimentum notat: rara delirantibus quibusdam adest, & calori imminuto. Atque ex his difficultatum spirandi speciebus, magna & frequens, magna & rara, parua & frequens, parua & rara, præter cæteras certum indicant. Cæterum inæqualis respiratio, artèriarum asperarum angustiam, obstructionem, compressionemq; signat, mouendiq; facultatis imbecillitatem, & musculorum thoracem mouentium conuulsionem, tremorem, & palpitationem.

MATHESES, Hæc superiùs satis intellexi: nunc tandem quomodo morbietiam ex vrina dignosci queant, explices.

GERON, Cùm cibi in ventriculo & intestinis confecti materia, quam græcè *χυλός* nuper appellauì, in iecore iterum fuerit elaborata, sic inuicem secernitur, vt crassior eius portio ad lienem, tenuior ad vesiculam ei appendulam deferatur, tandem in sanguinem ferè degeneret. reliqua his veluti recrementis expurgata, per cauam iecoris regionem ad gibbam penetrat, ibiq; sicut lac concrefcens, ferè quoddam parit, quod partim renes vi sua attrahunt, vt iecoris excrementum, & in vesicam mittunt (*ούρον* græcis, nobis vrina vocatur) partim in totum corpus cum ipso sanguine distribuitur, vt is faciliùs per arctissimos meatus transire queat: vnde à veteribus rectè vehiculum sanguinis appellatur. vbi verò iam serosa ista portio alimentum per totum corpus diduxerit, aut

fudoribus exhauritur, ac diffluit, aut eadem via, qua processit, attracta in renes ac vesicam relabitur. Atq; sic vrina non solum ex iecore ac renibus, sed etiam ex alijs corporis membris ac partibus, siue maioribus, siue minoribus venis emanat, eò quòd alimentum illis sine huius serosi recrementi adminiculo, distribui nequeat. §
 MATHET. Qua de causa aliquid ex vrina iudicari potest? GERON, Quia, cùm diutius sanguini, seu humoribus conuersata commorataq; fuerit, omnem eorum qualitatem induit, eòq; minimè fallax eorum nuntius existit, nisi aliarum rerum permistione immutata, aut immoderata portione dilutior facta fuerit. MATHET. De quibus partibus certius clariusq; testimonium adfert? GERON, De visceribus, præsertim iecore, venis maioribus, capite, pulmonibus, nec non de illis, per quas ipsa effertur, vt renibus, meatibus vrinarijs, vesica, cole. Quamuis enim in his non diu immoretur, superflua tamen quædam, & sordes præterfluens secum rapit & educit, eòq; omnium partium quas attingit, affectus demonstrat. MATHETES, Quæ vrina medico inspicienda offerri debet? GERON, Quæ à prima cibi concoctione, per somnum absoluta reddita est, eaq; vniuersa. MATHETES, Cur eo tempore? GERON, Quia citius excreta nulla subsidentia continet: vt quæ tertix concoctionis sit excrementum. MATHETES, Quare totam, non autem partem eius tantum inspiciendam consulis? GERON, Quia hæc non omnes notas clarè exprimere, neque medicus de singulis iudicare potest. hodie solent plerique, magis autem mulieres vix dimidium vrinæ redditæ portionem medicis offerre, idq; vel rustica quadam ignoratione, vel quòd pudeat, ipsis multum vrinæ, tanquam rei parum honestæ ostendere. MATHETES, Quot horis postquam reddita est, medico adferri debet? GERON, Non tardius quàm sex, aliàs minùs certa indicat: quia color mutatur, subsidentia dissoluuntur, & essentia immutatur. MATHETES, In quo vasculo inspicienda est? GERON, In vitro, albo, tenui, & pellucido, non autem viridi: quia tale colori aliquid admittit, essentiamq; minuit: non etiam in plus satis lato, aut arcto, sed extuberantiori inferius: vt quæ in eo continentur, commodius subsidere possint. MATHETES, Quo in loco vrina reponenda est? GERON, Procul à sole, à frigore, à vento: ne vel turbetur, vel crassescat, sed quieta subsideat, quousq; sensim refrigeretur. Quòd si aut sponte sua, aut frigoris vi, crassa turbidaq; euaserit, leni igne resoluaatur, reddaturq; clara, non autem vehementer agitata est: ne in hac contenta dissipentur, & sede sua dimoucantur, bullæq; rumpantur, sicut in illis fieri solet, quæ ex locis remotioribus ad medicos adferuntur, quamuis diu etiam asseruata, & per aëris immu-

*Tempus vrinæ
inspiciendæ.*

- immutata. MATHETES, Quando medicus de vrina iudicium proferet? GERON, Non antea quàm ipsa in matula integrè subsederit. nam si citiùs illam intueri velis, nihil eorum, quæ in ipsa continentur, cognoscere poteris. MATHETES, Quis locus inspiciundæ
- 5 vrinæ conuenit? GERON, Mediocriter lucidus, non nimium radijs solis illustratus, non obscurus: quia hic non parum coloribus detrahit, ille remissiōres eos efficit. Vt igitur interiores corporis affectiones siue naturales, siue alienas rectè possis ex vrina dignoscere, hæc quæ sequuntur, obseruari debent: vt essentia seu liquor,
- 10 qui Græcis *χύματος*, & *χύμας* dicitur, eiusq; quantitas, qualitas, & quæ in illa continentur. MATHETES, Quæ singulorum istorum sunt species? GERON, Si essentiam spectes, vrina aut est tenuis, aut crassa, aut mediocris: si quantitatē, vel magna, vel parua, vel moderata: si qualitatem, nunc perspicua seu clara, nunc turbida, nunc
- 15 media: si colorem eius, modò alba, modò pallida, modò flaua, modò rufa, modò rubra, modò nigra, & alij colores sub his comprehensi, qui vel pleniùs, vel remissiùs tales existunt: si odorem, aliàs foeda, aliàs suauis, aliàs moderata: post hæc, quæ in vrinis continentur. Denique etiam in aduersa valetudine aduertere oportet,
- 20 an partes vrinæ peculiare, sint affectu. nam illa ex renum, aut vesicæ, aut meatuum, per quos ipsa fertur, aut colis vlcere, aut abscessu, crassior ac turbidior: ex pure autem admisto, alba: ex cruore affuso, rubra apparet, sicut etiam ex arenulis, aut filamentis, variè inficitur. Nisi igitur perspectum habueris, quæ vrina rerum
- 25 exteriorum qualitate, quæq; renum ac vesicæ vitijs alienata fuerit, nihil certò de venarum, & reliqui corporis affectibus pronuntiare poteris. MATHETES, Quo pacto in vrina inspiciunda megeram, si nihil extrinsecus, vel intus acciderit, quòd illam immutare possit? GERON, optimam quanque tanquam exemplar, nor-
- 30 mam & regulam, vt in alijs rebus vniuersis, in memoriam reuocabis, ad eiusq; perfectionem reliquas omnes exiges. MATHETES, Quænam optima vrina censetur? GERON, Quæ ab homine temperato in secunda valetudine, & ætate florenti, naturaliter profluit, non aquæ instar tenuis, neque vt iumentorum crassa, sed in-
- 35 ter has mediocris, pura, non turbida, leuiter rufa, & flaua, quæ portioni hesternæ, diebusq; superioribus assumptæ copia respondeat, quæq; subsidētia habeat, alba, leuia, & æqualia, in acutumq; fastigiata, sine bullulis, sine capillis, sine ramentis, & alijs vitiosis recrementis. Quantum reliquæ vrinarum species, ab hac decli-
- 40 narint, tantò deteriorem habitum, & valetudinem indicant. Notandum autem, vrinam fœminæ etiam temperatæ admodum, & ætate florentis, non parum ab ea, quam masculus reddit, discre-

*Tempus vrinæ
inspiciundæ.*

Locus.

*Quæ obseruanda
in vrina.*

*Vrinarum spec-
ies.*

Essentia.

Quantitas.

Qualitas.

*Quæ in vrina
continentur.*

*Vrina inspicienda
de modis.*

Vrina optima.

*Vrina in fœminis
quantum discre-
pat à masculis.*

pare. nam illius manifestò crassiuscula est, non tenuis, sicut quidam opinantur, non pura & clara, vt masculi, sed paulò turbidior, & multis inquinamentis referta. nam plura in foeminis, quàm in viris recrementa, ad vteri ac vesicæ sinus confluunt, ac pro horum portione, etiam subsidentia magis copiosa, crassa, & alba in illarum, quàm in virorū vrina apparent. Quauis autem vtriuscq; sexus vrinæ inter se differant: tamen etiam optimæ in foeminis existunt, ad quas reliquæ omnes huius sexus conferri debeant. MATHESES, Quomodo omnes vrinarum species inter se distant? GERON, Temperamenti potissimum ratione. vnde illæ, quas foemine reddunt, magis albæ (quæ frigidum indicant) quàm masculorum apparent. Quantò autem calor natiuus auctior euadit, tantò magis in salubri corporis habitu, pallefcit, flauescitq; siue id per ætatem, siue per anni tempus, siue per regionem accidat. Infantium igitur, & puerorum magis albidæ, & crassæ, quàm adolescentium existunt: quibus subsidentia copiosa inheret. MATHESES, Quamobrem? GERON, Quia plurimum licet caloris natiui illis insit, humoris tamen copia obrunditur: quæ prohibet, ne vrina fiat coloratior. MATHESES, Qualis senum est vrina? GERON, Cum pauco calore genuino sint præditi, alba, tenuis, & modici subsidentis particeps, cruditatis, imbecillæq; concoctionis index. Proinde ex sexu, temperamento, tum natiuo, tum accessorio, & ætate facile est colligere, quæ vrina respondeat naturali, quæq; minùs, & quantum ab optima distet. Quinetiam scire conuenit, quod vitæ institutum tenuerit ille, cuius vrinam inspicies: laboriosumne, an quietum: cum luxu, an cum frugalitate. nam exercitatio vehemens, vigilia, animi motus, inedia, calidorum ciborum vsus, sicut etiam aër, vel à regionis cuiusdam, vel æstatis feruore, aliæue de causa excalfactus, calorem natiuum, & vrinam incendant, magis flauas, bileq; mixtas, & paucorum subsidentium participes reddunt. E diuerso vita tranquilla quietaq; otium, somnus largus, luxus, & frigidi cibi, sicut aër quoque siue ex regione, siue ex hyberno tempore, siue ex re alia frige factus, vrinam albas, & crassas efficit, in quibus multa, atque cruda inhærent. Hoc prætereundum non est, vigilias auctore Hippocrate, vrinam albas, aquosas, & crudas reddere, eò quòd concoctio non per illas, sed per somnum fieri soleat. Ideò, qui naturaliter dormiunt, vrinam minùs albas, sed leuiter pallidas excernunt: eorum verò qui contra naturam ex affectu quodam, vt Vaterno, aut Comate somno vrgentur, vrina albescit. MATHESES, Qualem vrinam faciunt, qui frugaliter viuunt, aut inediam sustinent, aut qui luxuriæ indulgent, & copiosis se cibis replent? GERON, Illi sanè flauam

- ac flammeam: hi albam & crudam. **MATHE.** Cùm superius in pul-
sibus concubitus memineris, indubiè etiam vrinę quædam illius
sunt peculiares: **GERON.** Sunt certè, putâ rufę, & flauę, quę non ni-
hil pinguedinis habent admistum. **MATH.** Vnde omnia ea, quę de
5 **vrina** hætenus dixisti, proueniunt, & quid portendunt singula?
GERON. Tenuis vrinę essentia, vera non est, sed po-
tius aqua: quæ à moderata crassitudine recesserit, & nondum in
liquoris naturam transierit. **MATHE.** Quæ igitur vera existit?
GERON. Quæ ex secunda concoctione procreata, conuenienti &
10 essentia, & colore prædita est. Duplex ea inuenitur: prima tenuis,
& pura, talisq; semper postea remanet: altera verò etiam tenuis
excernitur, sed paulò post fit turbida: ambæ crudæ sunt, & conco-
ctionis expertes. In hoc autem inter se differunt, quòd prior sum-
mam adhuc cruditatem subesse: altera concoctionem iam ince-
15 pisse notet. **MATHE.** Quem corporis statum peculiarem vri-
na tenuis significat? **GERON.** Nisi ex immoderatiore potu, aliæue
causa exteriore talis euaserit, renes meatusq; vrinarios ad eò ob-
structos esse signat, vt illi nihil crassi cum liquore præterlabi si-
nant: sicut ferè in vehementi dolore nephritico percipi solet,
20 quando calculus in illis impactus fuerit. **MATHE.** Quid aliud vri-
nę tenuitatem efficit? **GERON.** Imperfecta ciborum concoctio, &
natiui caloris penuria, quam sola intemperies, citra humorum vi-
tia progenerat: quia tam exiguus interdum calor natiuus existit,
vt aquam, vel aliam portionem per vrinam fluere permittat, qualis
25 assumpta fuerit. atq; hæc summum cruditatis inditiũ est. **MATHE.**
Quæ vrina crassa est, & vnde generatur? **GERON.** Quæ à medio-
critate desciiuit, & nisi ex vijs laxioribus, & nimium apertis red-
datur, à calore genuino, crudis humoribus copiosis oppresso, non
intemperie affecto contrahitur: ea quoque duplici comprehen-
30 ditur differentia. vna, si quidem crassa, & turbida emanat, non lon-
gè autem post subsidet, & tenuis redditur: altera è contrario ma-
ner plerunq; crassa, qualis excreta est. Caterum prior crassa inter
bona signa censetur: eò quòd parum turbidi adhuc restare tes-
tetur. Nam cùm spiritus flatuosus, qui humorem efficit turbi-
35 dum, separatur: tunc hic ad eò clarus euadit, vt consentaneum sit,
parum turbidi reliquum ei vrinæ inesse: quæ statim, postquam
reddita est, subsidet. **MATHE.** Quid hæc quoque indicat? **GE-**
RON. Fausta etiam, vt prior, sed paulò minùs: eò quòd sanguinem
agitari bullirẽq; adhuc denuntiet. **MATHE.** Quæ bona ambæ
40 nobis pollicentur? **GERON.** Duo sanè. primum quòd morbus
non ita longè post concoquetur: quanuis enim crassiores hu-
mores bullent, agitenturq;, naturam tamen iam eos secernere, ac

*Vrina vera.**Tenuis.**Vrina quare tenuis.**Vrina crassa.**Quid significet altera crassa.*

*Crassæ vrinæ
plures species.*

separare demonstrat. deinde quod ipsi non prorsus crudi sint. **MATHETES**, Sûntne aliæ adhuc crassæ vrinæ species? **GERON**, Sunt certè, quæ oleum seu adipem liquefactum lentore, & crassitie præsentant, ac commotæ olei instar graues, & viscosæ apparent. **MATHETES**, Quid tales signant? **GERON**, Si tardè profluant, paulatimq; incrassescant, totum corpus colliquefcere: si citius & simul, solos renes calore alieno infestari: si oleosæ post nigras reddantur, salutem: si in valdè acutis morbis quarto die appareant, septimo ægrum moriturum nunciant: si quid loturæ carnis simile illis admixtum sit, tabem, aquam subter cutem, & pestiferum dolo- 10

Mediocris vrina vnde.

rem colicum præfagiunt. **MATHETES**, Vnde mediocritas essentia vrinæ provenit? **GERON**, Ex accurata ventriculi, iecoris, atq; venarum concoctione, quam calor natiuus validus perficit. **MATHETES**, Potestne etiam tum crassa, tum tenuis, ad mediocritatem peruenire? **GERON**, Nimirum. si tandem à calore nostro pro- 15

Vrina perspicua.

bè concoquatur. **MATHETES**, Quænam est vrina perspicua? **GERON**, Quam oculorum acies penetrare potest. **MATHETES**, Quid autem illa notat? **GERON**, Integram perfectamque concoctionem, humorum probitatem, & magnam natiui caloris copiam: qui dum in vrina permanet, subsidens tandem separat distinctq;. At quæ frigoris vi mutata est, & deinde calore sibi restituta, nihil magni adedò significat, nisi fortè in morbis acutis, concoctionis initium. nam tenuis vrina morbi principio non facile cogitur: vbi autem concreuerit, faciliùs turbatur. **MATHETES**, Quæ turbida & obscura? **GERON**, Per cuius medium non transit, sed 25

*Turbida, & obscura triplex.
Prima.*

hæc triplex est. prima quidem exterioris frigoris vi talis euadit, omnium densissima, obscurissimaq;: hæc calori adhibita, statim clara efficitur, & pristinum splendorem recuperat, eoq; nulla calido loco sita turbatur, sed qualis est excreta, talis permanet: altera verò turbida est, cuius liquor vel per se, vel ab interiore quadam 30

Altera.

admistione, præsertim puris in renibus subsistentis, crassescit: nullo autem calore dissolui potest. pleraque verò in ea corpuscula innatant, quæ per quietem cum crassis subsidentibus in imum deferuntur: mox reliqua eius portio sepè expurgatur, claraq; euadit: sicut vinum, quod fece permista turbidum existit. Tertia vrina turbida, vulgo confusa dicitur, tota sui similis est, in qua nihil innatat, nihilq; subsidet, neque aliud quippiam deprehenditur: quo sublato, quanuis illa diutiùs quiescat, nihilo magis tamen in- 35

Tertia.

clarescit, neque igne, neque alio quouis calore dissolui potest. **MATHETES**, Vnde turbida profluit? **GERON**, Ex renum, aut vesicæ 40 affectu, quibus vel copia humoris subsistit, quem vrina secum rapit, vel vlcus simplex: vnde cruor, vel sordities saniosa, purulenta,

*Turbida vnde
profluat.*

aut mucosa manat. Quare quicumque grauioribus doloribus nephriticis, sunt obnoxij, vix vnquam claram vrinam reddunt. MATHESES, Quid turbida significat, quæ sine his affectibus excerni solet? GERON, Crassorum humorum in venis copiam, effusio-

Turbida quid significet.

5 nemq; eorum, quos natuius calor difficulter concoquit: vnde etiam morbi longi, contumaces, capitisq; dolores, generantur. quod si talis vrina diutius perseueret, Veternum, aut Coma minatur. MATHESES, Quid vrina portendit, quæ de repente, & è vestigio turbida euasit? GERON, Materiam crassiore diu ob-

10 structam, nunc vijs adaperitis, è liene, iecore, renibus, aut ex venis maioribus excidere, vt in sanis ferè post exercitationem, in ægris post morbum, præsertim longas febres, vt quartanas, nec non post lienis iecorisq; affectus, & abscessus erumpentes euenire solet, sic vt corpora inde alleuamentum sentiant. MATHESES,

15 Quæ aliæ vrinæ sunt turbidæ? GERON, Rubidæ, siue luteæ, subfidentium expertes: quales per initia februm, & continentium, & intermittentium profluunt: adhæc, quæ cruda simpliciter nuncupatur, turbida etiam, nondum autem confusa æstimatur. Nam illam humor crudus, et superuacuis, è venis, aut è liene, aut è ieco-

20 re, similiter vt in arquato emanans, serosoq; se inferens sanguini, talem effecit: confusa verò nunquam renum, aut viscerum duntaxat, sed venarum semper affectibus succedit. atque hæc non crudorum humorum abundantiam, sed proprii sanguinis, & eorum qui venis insunt maioribus, confusionem, corruptionem, &

25 putredinem, eamq; propemodum malignam denuntiat: eò quod hæc omnia permisceat, confundat, atque perturbet: eoq; in solis febribus continuis, periculosis, & prauis deprehenditur. Vnde ea vrina, quæ etiam nullo renum vitio contaminata est, non semper sanguinis, & succorum eius conditionem demonstrat. Quan-

30 uis enim illa, interdum lutea, crassa, & turbida excernatur: tamen sanguis, si cui tunc detrahatur, admodum purus, & rubicundus apparet: id quod sæpenumero in quartana, tertianaq; intermittente, & arquato etiam euenire solet, cum bilis superuacua, vel ex iecore, vel ex eius vesicula, vel alijs locis in venas defertur: sic

35 vt non sanguini ipsi, sed eius sero tantum permisceatur. Non igitur rectè sanguis mittitur, quàmprimum vrina crassa, et rubra apparet. nam fit interdum, vt vrina tum colore, tum essentia naturali respondeat: sanguis autem detractus, & colore, & essentia vitiosus appareat. MATHESES, Quando id contingit? GERON, In con-

40 tinentium februm statu, antequæ crism, cum vrina perfecte est concocta, quanuis natura, nullam adhuc humoris noxij euacuationem, tentauerit.

Rubida seu lutea turbida.

Confusa vrina.

*Vrina copiosior
vnde.*

MATHESES, Vnde vrina copiosior, vel paucior quam assumpta potio provenit. GERON, Indubie ex victu. nihil enim ex corpore euacuari potest, cuius materia non aliquando fuerit ingesta. In sanis quidem ex usu vini tenuis, aut aquæ, aut medicamenti, quod illam cieat, vel ex aëris nos ambientis occursu, vel ex aliarum rerum exteriorum iniurijs. In ægris autem interdum ex renum vitio, qui serum ex vniuerso corpore, maxima vi proliciunt, profunduntque sedulo, præsertim si æstus febris ardentis, viscera ipsa exurentis, materiam congestam liquarit. quæ copiosa ad eos delata, celeriter profluit, alba propemodum tenuis, subsidentium expers, græcè *Algisimis*, latinis velox vrinæ profluuium, nominatur. Interdum ex interiore affectu, vrina liberalius prodit, nempe cum ampla aquarum copia elabi, iam diu prohibita, erumpit: interdum ex aqua subter cutim: interdum ex magna cruditate aquæ, circa viscera fluctuantis. Hinc enim in renes impetu quodam, aut vi nature, perinde vt in spontanea ventris perturbatione, contendit. MATHESES, Solentne tanta vrinæ euacuatio, corpori aliquid adferre præsidij? GERON, Quauis vires eius aliquantum debilitet: ventriculum tamen, & abdomen, quasi pondere subleuat, sic tamen vt corpus non extenuet. Interdum etiam, huius, & humorum moles colliquescit, dilapsaque in vrinas diffunditur: quemadmodum in potoribus bibulis vini, crasso corporis habitu præditis, accidisse constat, vt in diebus paucis, ex ingenti corporis mole, in magnam gracilitatem, citra vllius morbi vim, inciderint. Aliàs id caloris, aut febris colliquantis efficacia, contigisse nouimus, dum vrina copiosa quidē, non tamen tenuis & alba, sed flammæ, aut pasci colorem imitata proflueret, cui etiam pingue, & oleosum quiddam innataret. MATHESES, Quæ paucitatem vrinæ pariunt, notantque? GERON, Imbecillitas facultatis excretoriæ, vel renum, vel meatuum vrinariorum, horumque obstructio, & tumor renum minùs naturalis, sicut in extenuatis, & à morbis conualescentibus, usu venire solet. Idem efficit febris pestiferæ vehementia, quæ corporis humorem absumit: aliàs in sanis potus exiguus, idque potissimum austerus, crassusque, cibi sicciore, viscosi, & crassi, qui meatus obstruunt, largi sudores, copiosa alui deiectio. Nam cum natura omnia corporis superflua, per consueta emissaria educere molitur, sic vt per hæc maior, per illa minor fiat excretio. nonnunquam etiam vrina fit paucior, quando potus in corporis alimentum absumitur.

*Vrina paucior
vnde.*

MATHESES, Qui odores vrinæ percipiuntur: & quid singuli indicant? GERON, Quauis parum decorum sit, medico vrinam naribus adinouere: tamen non abs re esse cenleo, de odore
reip-

re ipsius aliquid posse iudicare. Malim tamen id officij vel ægro, vel eius familiaribus committere: vt qualis ille sit, fœdusue, an suauis, vel moderatus, vel nullus, ipsi diiudicent. Nulla sanè vrina suauem odorem refert, nisi terebinthina assumpta, vel moscho,

Vrine odores qui.

5 vel laserpitio, vel alio odorato medicamento. Moderatus autem sæpè in sano corpore, & eo quòd benè valet, deprehendi consueuit. MATHETES, Vnde fœdus odor provenit? GERON, Aliquando ex assumptis, aut naturalium vlcere: atque tunc vrina alba, crassaq; existit: cui subsideant purulenta. Quando autem crassior

Odor fœdus.

10 mucus in illa subsidet, ipsaq; cum dolore excernitur, vesicæ calculum significat. Porro vrina fœtida, quæ ex superioribus partibus descendit, siue rubra ac turbida, siue tenuis ac perspicua, nunc cum febre, nunc absque illa, vel humorum, vel partium essentia putredinem nunciat. MATHETES, Quid fœditas recens à vetusta

15 differt? GERON, Illa sanè crassa & turbida, humorem à veta autem essentiam partis cuiusdam putrescere, testatur. MATHETES, Quæ alia fœdi odoris excreatur, & quid signat? GERON, Quæ post crism die decretorio profluit, & copiosa redditur, ea ægro leuationem affert. MATHETES, Cum varios vrinae colores superius enumeraueris, rogo te mi præceptor, vt deinceps exponas, quænam causæ hos efficiunt?

GERON, Præcipuè corporis viscerumq; calor, alieniq; humoris admistio. nam omnia quæ calefaciunt, vt exercitatio, inedia, æstus, & febris, simul vrinas colorant, eoq; magis, quòd sunt

Causæ quibus colores sunt in vrinis.

25 vehementiora. Quinetiam vrina si diutius in corpore subsistat, ac longius à cibo reddatur, coloratior euadit. Initio autem cum ex primo sanguinis sero gignitur, alba existit. deinde vbi magis à natura concoquitur, subpallida, & pallida, seu spicea, & citrina efficitur: quæ à citri colore sic nominatur, mediumq; locum inter omnes obtinet: mox subrufa, & subflaua, nec non rufa & flaua euadit, sicut etiam crocea, & aurea (vt nonnulli vocant) inde rubida, rubraq;, tandem viridis, liuida, & nigra. MATHETES,

Quid albæ tenues, simulq; perspicuæ, & in totum aquæ portendunt? GERON, Insignem renum, vel mesenterij, iecorisq; obstru-

Albæ, tenues, perspicuæ, aquæ quid.

35 ctionem, aut concoctionis imbecillitatem, à summa iecoris, & ventriculi intemperie frigida profectam, denuntiat. in ardentibus autem febribus, bilem cerebrum inuasisse, & delirium fore signat, paulò tamen minùs, quàm superiores albæ. MATHETES, Quid crassæ? GERON, Si pariter cornu instar, perspicuæ sint, quæ

Quid crassæ.

40 græcis γλαυγί, & χαροπαι, dicuntur, puitam mucosam excellere demonstrant: sicut albæ, crassæ, & viscosæ, quales lacteæ appellantur, quòd lacti respondeant, puitam abundare arguunt. Si verò

diutiùs tales apparent, frigidòs longosq; morbos testantur. *MATHE-
 THETES*, Quid subpallida, post albam notat? *GERON*, Mino-
 rem cruditatem quàm albæ, & calorem temperato proximum,
 quasi natura concoctioni incumbat: febris solutionem, si arden-
 tes antecesserint: in acutis morbis, mortem vel tabem præfagit:
 pallida, plus bilis seroso humori mixtum esse, declarat. hæc si magis
 concocta fuerit, coloratior, & subrufa euadit. vnde græcis
κίτρινα, dicitur. *MATHE-THETES*, Quid citrina? *GERON*, Optimum
 corporis habitum, & valetudinem. *MATHE-THETES*, Quæ huic suc-
 cedit? *GERON*, Flaua seu rufa, & crocea. atq; hæ ipsæ puræ, & per-
 spicuæ, meram simplicemq; intemperiem, crassæ & turbidæ, hu-
 morum vitia, admistionemq; denuntiant. Post has turbidæ, ac
 rubræ, bilem rubram sanguinis sero admistam esse, aut sanguinis
 nimis concocti copiam, signant: si perspicuæ sint, flammæ vocan-
 tur, ac nimium iecoris calorem, & sæpe ardentem quoq; febrem
 significant. sin autem crassæ, obscuræq; fuerint, siue cum febre, siue
 citra illam, bilem flauam, aut luteam, aut rubram, sero admistam
 esse demonstrant, qualis in febrium accessionibus declinantibus
 apparere solet: præsertim autem cùm iecur, aut inflammatione,
 aut scirro euidente, vt in aqua subter cutim, vitiatum est: vel cùm
 hoc ipsum, aut fellis vesicula, valdè est obstructa. hæc arquatum
 aut præsentem notat, aut futurum prænuntiat. *MATHE-THETES*,
 Quid vrina cruenta? *GERON*, Siue recentis carnis lotioni, ac ve-
 luti saniei, siue puro sanguini respondeat, vbi refrixerit, quasi gru-
 mum huius concreti, ostendit. *MATHE-THETES*, Quomodo talis fieri so-
 let? *GERON*, Vbi renes attriti, venæq; eorum adaperatæ fuerint,
 sanguis statim ab eis tanquam calculus, pondere, non iecoris im-
 becillitatis gratia (vt quidam opinantur) profluat. Quare si vrina
 neque lumbis, neque renibus casu, vel ictu contusis, cruenta red-
 ditur, certè talis ipsa ex calculo, qui renes atterit, præsertim cùm
 vehemens obitur exercitatio, excernitur: turbida, & nigricans
 hanc præcedit, quando nephritis imminet. *MATHE-THETES*, Quæ ru-
 bris istis vrinis succedunt? *GERON*, Vix nigrae persimiles, & à
 vino, passioq; vulgariter dictæ, vineæ, & passæ: vel sanguinem,
 vel bilem assari, & in atram degenerare, testantur. *MATHE-THETES*,
 Quæ has sequuntur? *GERON*, Primum viridis, siue porri colo-
 rem referens, quæ porraceæ bilis, aut æruginosæ copiam, admi-
 stionemq; signat: deinde cœrulea, siue veneta: tertio liuida, seu
 plumbea, quæ melancholicum humorem abundare, admisceri-
 que, aut nativum calorem restinctum esse, indicat, nisi è plagis,
 & verberibus sit contracta: postrema nigra est, ex rubra quidem
 & viridi conflata summum incendium, bilisq; atræ adiunctio-
 nem

- nem notat: ex cœrulea verò, & liuida, calorem in totum restinctum esse signat. quanquam tales etiam crisi quadam profluant, tum in acutis, tum in diuturnis morbis, melancholicisque: quando dies adest decretorius, & æger ex facili morbum tolerat, euaditq; periculum. *MATHETES*, Ex his coloribus semperne, & certò morbi indicantur? *GERON*, Non semper. aliàs enim cibus non probè immutatus, elaboratusq; neque in sanguinem conuersus, similem sibi colorem vrinæ efficit, idq; non modò in secunda, sed etiam in aduersa valetudine. Verbi gratia, si quis oleribus escæ loco vsus fuêrit, aut medicamentum aliquod, vt rheubarbarum, vel senam, vel casiam fistularem, vel rubeam maiorem, vel croci etiam minimum assumpserit, adeò illa vrinam colore inficere solent, vt nihil ex ea certi cognoscere liceat. Multum etiam refert nosse, an quis pridie exercitationi ampliori indulserit, vel à cibus abstinuerit, vel torfus sit vigilijs, vel defatigatus, vel ira commotus, vel metu perculsus, vel concubitum, vel vomitum, vel purgationem expertus fuerit. nam hæc quoque, sicut portio illorum, quæ bibimus, colorem vrinæ mutant. Si nanque aquam, aut vinum album & tenue liberalius sumpseris, vrina quoque alba, & subtilis erit: si verò hoc crassum, & nigrum fuerit, illa quoque nigra, & crassior excernetur. Interdum colliquatio quoque eorum, quæ in corpore consistunt, alium vrinæ colorem inducunt. nam illa semper earum partium, quæ in corpore humano liquefcunt, pinguedinis, præsertim adipis, similibusq; colorem repræsentant. Sed de his satis: nunc ad ea pergam, quæ in vrinis duplici genere continentur: quorum alterum ex ipsamet essentia vrinæ prouenit: alterum veluti excrementitium existit. Primum rursus ex tribus constat. alia nanque in imo matulæ subsident, vnde Græcis *υποσέδις*, nobis subsidentia, vulgo sedimenta *Hypostasi*. 30 vocantur: alia ad mediam regionem matulæ suspensa sunt, ac Græcis ideo *εναιωρήματα* dicuntur, latino destituta nomine, nisi sublimia vocare velis: alia per vrinæ summa, nubium aëris instar extant: vnde etiam nubes, ac nubecule nobis, græcis *νεφελαι* nuncupantur. quantq; Hippocrates etiam eneoremata sic appellet. *MATHE*. 35 Quid singule istę materię sunt, & vnde generantur? *GERON*, Ea quæ subsidet, crassior ipsius portio existit, vi insiti caloris, à reliqua eius materia secreta, in imumq; depressa, quæ licet per initia non appareat: statim tamen postea segregatur, & stillatitiæ rosarum aquæ feculæ modo coit, eòq; non solum ex ventriculi, aut so- 40 lidarum partium, sed præcipuè maiorum venarum concoctione, prouenit. Sicut autem hæc subsidens materia, & vrina eadem constant origine, sic etiam similem sortitæ sunt essentiam. Co-

*Morbi non semper
per ex vrina ino-
dicari possunt.*

*Vrina colorem
quæ immutatur.*

Hypostasi.

Eneorema.

*Subsident vnde
proueniat.*

*Subsident vrina
materia & li-
quor quid disse-
rant.*

Vrina copiosa, tenuis & aquosa quid signet.

Crassa & turbida, subsidens non verum, sed feculentum refert.

Subsidens ex liquore vrina.

Calor natiuus quid in vrina agat.

Calor natiuus vrinae infirmus.

Vrinae contenta in triplici loco.

Calor natiuus languidus.

Validus qualia molitur.

Quomodo differant summa, media, & subsidentia.

Inditia colorum in contentis.

piosa namque vrina valdè tenuis, ac prorsus aquea, nullum habet subsidens. simpliciter autem tenuis, tenue: quemadmodum in crudis, & ijs qui infirmiter concoquunt. mediocris, mediocre: crassaque crassum, vt in pueris, & alijs qui multum ibi assumunt, conficiuntq̃. At quæ vrina rei cuiusdam externæ, aut à renibus, aut à vesica profluentis, admistione crassescit, turbidaq̃ efficitur, crassamentum profert, quod propriè subsidens non est, sed eius fecula. quæ ratione liquor vring, materiam subsidenti ministrat. MATHETES, Quid illam ab vrina secernit? GERON, Calor natiuus, atq̃ is valens quidem, materiam vring liquori inspersam, minimè tunc conspicuam, celeriter separat colligitq̃, & postea omnino ad inferiora depellit, tandemq̃ adedò cogit, vt æqualis vbique, sui que similis, & levis euadat: hoc est, quæ nihil asperum ac diuulsum habeat. Quod si verò vrinae calor infirmior fuerit, crassiorem hanc eius portionem tardiùs segregat: imò neque ad ima depellit, sed in medio suspendere, siue diuulsum, siue inæquale prope modum finit. Si verò adhuc languidior extiterit, tardissimè eam secernit: cumq̃ non possit cogere, eam vel diuulsum, vel per summam nubis modo immanantem relinquit. MATHETES, Quantum igitur intelligo, ea quæ in vrina continentur, triplicem situm occupant, nempe in imo matulæ, in medio, & per eius summa. GERON, Ita habet. si verò calor natiuus summè languidus existat, sicut in pernitiola febris putrida: aut si nimia humorum nocentium copia opprimatur, veluti in arquato, nec non in febris tertiana sepè, quando bilis abundantior è iecore in venas irrumpens, sero admiscetur: nihil prorsus in vrina segregat, sed illam reliquis ipsius partibus permistam, & confusam relinquit. MATHETES, Qualia calor natiuus validus adhuc, in vrina moliri solet? GERON, Vt quæ in imo subsident, quæq̃ in medio suspensa sunt, & quæ per summam extant, sint alba, leuia, & æqualia. quanquam quæ in medio pendent, minùs bona sint, quàm quæ in imo subsistunt: & quæ in alto extant, deteriora sint duobus reliquis. MATHETES, Qua de causa? GERON, Quia tale subsidens, calorem insitum, perniciosos morbi humores prorsus vicisse, & concoxisse testatur. Id autem quod in medio est, calorem imbecillum quodammodo monstrat, vt qui materiam nondum concoctam satis, queat superare, & ad imum propellere. quod in summo eminet, cruditatem caloremq̃ imbecilliorum esse nunciat. MATHETES, Quid sibi volunt ista, cum alios colores, quàm album repræsentant? GERON, Subsidens nigrum, aut liuidum, pessima quæq̃ signat, atq̃ eius modi pernitiem, quæ naturam prorsus obruat: medium autem vrinae nigrum, aut liuidum, minus exitium: quod in superficie verò

- verò eminet, adhuc minùs : quia calor natiuus in ijs nondum succumbit, sed aliquid adhuc efficaciz reliquum obtinet. MATHE T, *Contenta qualia optima.*
 Qualia hæc vrinarum contenta optima existunt? GERON, Alba, vt dixi, læuia & æqualia, tum quantitate, tum essentia mediocri
 5 prædita. quæcunq; verò ab his degenerauerint, vitiosa sunt. Fiunt *Copiosa contenta quomodo fiant.*
 autem copiosa in sanis bifariam. primùm, cum vel sudores, qui antea erumpere solebant, vel aluus, vel alia quædam naturalis euacuatio supprimitur: atque tunc crassa, & cruda apparent. secundò, alimento pleniore, & facultatis calore: quando illa tum essentia, tum colore sunt mediocria. MATHE TES, Vnde illa pauciora
 10 gignuntur? GERON, Ex inedijs, vigilijs, exercitatione vehementi, alijs causis euidentibus, quæ corporis essentiam absumunt, digeruntq;. MATHE TES, Qualia generantur in ægris? GERON, Crassa, *Qualia in ægris generantur contenta.*
 idq; vel à crudioris materiæ copia, quam natiuus calor euincere
 15 non potest, atque tunc etiam cruditatis inditia comitantur: vel à morborum longorum crisi, quando manifesta illorum fit alleuatio. MATHE TES, Fiuntne contenta in vrinis etiam aliunde, quàm modò dixisti? GERON, Fiunt, interdum etiam ex pure & pituita viscosa. Tenuia enim cruditatem in morbis, aut concoctionis initium demonstrant: in sanis tenues humores nondum ad essentia
 20 mediocritatem redactos. MATHE TES, Vnde contenta læuia proueniunt, quæ superius vocasti continua, nulla ex parte fissa, rugosa, aut diuisa, sed cohærentia, quibus nihil insit asperitatis? GERON, Ab insiro calore valido, sicut contraria his, nempe aspera, &
 25 diuisa ab imbecillo, qui ea nequaquam cogere potuerit. Sic etiam de æqualibus, & inæqualibus contentis iudicandum est. Illorum partes omnes tum crassitie, tum colore sibi inuicem respondent: horum autem dissimilitudine quadam distinguuntur, neq; ex æquo concoctæ, aut coloratæ apparent. MATHE TES, Quid si
 30 non album, sed alium colorem representent? GERON, Si pallidum, flauum, aut rubrum, bilem in venis abundare, aut sanguinem vehementi ardore corrumpi, ostendit. si verò Hippocrati credimus, rubra, & læuia in vrinis rubris, securitatem pollicentur. Sin autem cærulea, liuida, ac nigra existant, vitalem calorem restringi,
 35 aut sanguinem, seu atrum humorem, vel in vasis vrinarijs genitum esse, vel aliunde irrumperere testantur. MATHE TES, Sempërne in vrinis ea quæ retulisti, contineri solent? GERON, Est, cum nulla in illis apparent, idq; vel ob magnam obstructionem, vel ob largiorem porum, ac tenuiorem, qui antea in corpus digeratur,
 40 quàm cum cibo mistus sit, aut concoctionem expertus, atque sic vrinæ tenues fiunt, eò quòd nulla, aut pauca admodum contentorum suppetet materia: sed nihil mali in sanis ostendunt; in ægris

Pauciora.

Contenta lenia.

Æqualia, & inæqualia.

Contenta quando nulla.

autem, qui humorum vitio laborant, aduersa semper: quia vitiosa humorum materia in renibus delitescit, quorum copia natura impeditur. Atque hæc de contentis vrinæ habui, quæ mihi cognitione digna esse videntur. nunc ea quæ in vrinis feruntur, expediam. **MATHESES, Quomodo appellantur?** **GERON,**

*Nomina eorum,
quæ vrinis im-
misceri soleant.*

Corona, seu circulus, nubeculæ, bullulæ, spuma, pus, pituita, semen, grumus sanguinis, calculi, capilli, arenæ, furfuribus similia. Ex his quoque sicut de alijs iam dictum est, nonnulla per summam vrinam innatant: nonnulla per mediam volitant: alia in fundo ma-

CIRCVLVS
seu corona.

tulæ subsident. Ac circulus quidem seu corona, primam regionem ambiens in vrina equali, & sui vbique simili, obscurus apparet: in dissimili verò, aut in humorum agitatione, manifestò, nam cum summa vrinæ portio tenuissima sit, magis immutari solet, & varia sæpè, vel colore, vel essentia oculis subijcit, quæ nondum in reliqua vrinæ parte videri possunt. **MATHESES, Quid corona,** seu circulus signat? **GERON,** Qualis in vasis maioribus sanguis contineatur. alba nanque & tenuis, illum aquosum, tenui quoque sero dilutum monstrat: sicut alba & crassa, pituitosum: citrina naturalem: rufa, copiosa bile, ac flaua perfusum: rubra ac ardens, feruescentem & inflammatum: viridis, bile porracea, & æruginosa imbutum: cœrulea & liuida, melancholia naturali, vel atra bile vitiatum, aut ex corruptione ipsius statim in humorum illorum naturam degeneraturum testatur: vnde posteriores ex ipsis, vel morbum melancholicum, vel comitalem denunciant. **MATHESES,**

SPUMA.

Quid spuma vrinæ signat? **GERON,** Si copiosa admodum citra ipsius agitationem talis euaserit, sensus interiores perturbatos, viscososque humores, & flatus copiosos in corpore vagari, præcipue in cerebri sinibus, ventriculo, & intestinis. atque hæc ex illis distenduntur, doloresque colici subsequuntur: siue ex immoderato fructuum leguminumque usu, siue ob natiui caloris imbecillitatem. Porro colores circuli, & vrinarum sæpius inuicem distant: interdum inter se conueniunt. quod si corone peculiare, ad bonos declinent, vrinæ verò ad malos, securitatem indicant: quia tunc natura humoribus dominari incipit. si verò deteriores sint, quàm vrinæ, periculum minantur: quia tunc humores naturam vincunt. **MATHESES, Quid bullulæ præfagiunt?** **GERON,**

*Circulorum colo-
res.*

BULLULÆ.

Si amplæ diutius coronæ ambitum occupent, obstructions ex crasis, & viscosis humoribus contractas: si verò illæ statim rumpantur, dissoluanturque, flatus, & humores tenues adesse nuntiant: si exiguæ per vrinæ circulum extent, magnum capitis dolorem notant: si albæ & pallidæ sint, exiguum: si citrinæ ac flauæ, acriorem: si yringæ tenuæ, ac contentis eius non prorsus concoctis insint,

calo-

- caloris natiui imbecillitatem indicant: si vrinæ tenui, & subsidenti experti, renum obstructionem: si media regione vrinæ consistunt, dolorem remissum esse, materia scilicet iam discussa, quæ illum excitauit, nec non defluxionem ad pulmones, tum in sanis, tum in ægris factam, ostendunt. Maiores, quæ iam citra ordinem per matulam dispersæ sunt, dolores qui antecesserunt, imminui significant: eò quòd crassior glutinosiorque materia, iam subtilior, magisque concocta & obediens euaserit. In summa, quòd bullulæ minores, densioresque fuerint, & iuxta solum circulum consistant, eò
- 10 plures spiritus, & efficaciores, & crassiores indicant: contrariæ imbecilliores, qui citius discutunt. Quæ totam coronam obsident, totum quoque caput: quæ dimidiam, alteram duntaxat partem eius dolere indicant. Si recens, nec antea in morbo apparuerint, naturam concoctioni incumbere, argumentum est. Deniores bullulæ, seminis profluium, ex illius vasis commotis, & flatibus ad vrinam delatis, procreatum testantur: qui morbus vulgò ardor vrinarum appellatur, quinetiam frigidam renum, & velicæ affectionem, alstrictionemque, & flatuum retentionem portentunt. *MATHESES*, Quid pingua in vrinis declarant? *GERON*, Si
- 20 per summa innatant, & araneorum telis respondeant, hominem rabe, vel ardore consumi, ardenti feбри, vel hectica, vel solos renes colliquescere arguunt. *MATHESES*, Quid puncta tanquam olei diuulsa notant? *GERON*, Eadem, sed minùs firmiter: quanquam ipsa ex oleo epoto, cum vrina interdium, profluant. quòd autem facilius illa discutiuntur, eò morbum læuiorem: quò diutius permanent, hoc difficiliorem demonstrant. *MATHESES*, Quid surfuri vel crassiori faring, vel squamulis similia, in vrinis signant? *GERON*, *EVREPREA*. Si vrina tenuis fuerit, venarum adustiones, ex flammeo febrium ardore contractas: si crassa, vesicæ scabiem significat. *MATHESES*,
- 30 Quid squamæ? *GERON*, Vesicam exulceratam esse, & erosam, præsertim si grauis odor adsit. sin autem absque exulceratione ille proueniat, febris ardor, summas vasorum tunicas colliquat, veluti que in laminas resoluit, vnde solidæ partes consumuntur, sed tantò minùs, quantò squamæ sunt tenuiores. *MATHESES*, Quid
- 35 faring similia præfagiunt? *GERON*, Quæ in summo volitant, vel in imo subsident, eadem quidem, sed grauiora nuntiant. Nam cum vel sanguis crassus, ardore febris adustus, vel caro tenera, ac opima liquata fuerit, eaque tandem durior, veluti in fartagine torrefacta, exaruerit, tunc, quæ per vrinas redduntur, crassiore farinam repræsentant, longe valetudinis aduersæ inditia. hæc autem non in morbis tantum periculosis, sed etiam in gradidis obseruari possunt. Quippe nonnulla tenui farinæ, aut amylo similia

*Ardor vrina.**PINGVIA
vrinarum.**Araneorum telis
similia.**PUNCTA tan
quam olei diuulsa.**EVREPREA.**Squamæ.**Farina similia.*

*Conceptusatus
inditum.*

*FILAMEN-
TA.*

CARNUM.

*GRUMUS
sanguinis.*

Pituita.

ARENÆ.

*Vrina albæ, &
renes.*

in illarum vrinis, etiam cum benè valent innatant: in quibus dum
quietæ seruantur, crassius aliquid, lanæ tenuiter carptæ instar, in
imo subsidet, vel in medio hæret, quod conceptum indicat, vt se-
pè sumus experti. **MATHETES**, Quid filamenta capillorum
illorum in vrinis designant? **GERON**, Vehementem renum calo-
rem, vel largioris crassi cibi, vt erui, & casei vsum. Talia etiam ex
vasis seminarijs excernuntur, dum vel illius profluuium, vel albi
mensēs vrgent, vel vterus fœda colluue scater. Interdum vrina
quoque à primo concubitu reddita, talis apparet. **MATHETES**,
Quid caruncule portendunt? **GERON**, Exiguæ, in vrina crassa, renes
exulceratos esse. **MATHETES**, Quid grumus sanguinis, & pus in
vrina significat? **GERON**, Ille quidem recens, vlcus: pus autem in-
ueteratum ac sordidum, aut in rene, aut in vesicæ ceruice esse in-
dicat. In hoc autē differunt, quòd illud à ceruice magno, cum par-
tis dolore effluat: à rene verò nullo. adhuc, quòd à cole, vel à vesti-
cæ ceruice omnia, vel seorsum sine vrina, vel cum hæc reddi inci-
pit, emanent, sic, vt statim in quiete subsideant. **MATHETES**, Quid
de pituita adfers? **GERON**, Si mucī instar crassā matulæ fundo in-
hærescens, cum dolore reddatur, vesicæ calculum, vel fordi-
dum ceruicis vlcus demonstrat. quæ citra dolorem profluit, ex
crudo renum, aut vicinarum eius partium vlcere, vel abscessu pro-
uenit. **MATHE T.** Quid arene ostendunt? **GERON**, Alię rubrę, alię fla-
uę, alię albę sunt, primę duę species à renibus, posteriores à vesica
prodeunt: quanquam ex rene, cum fordidum in eo vlcus est, albi
quoq; calculi, pure concreto erumpant. Quę autem à renibus co-
piose, & crassę excernuntur, calculum fore nunciant, qui ex illis
vel hordei, vel milij instar, coherescentibus concrefcit. Vbi autem
is ex ipsis renibus in vesicę spatium depellitur, vrinās crassas, turbi-
das, rubras, aut nigras efficit, renum doloris nuntij. **MATHE**. Quid
vrinę albę & tenues cum lumborum dolore ostendunt? **GERON**, 30
Quamlibet renum obstructionem, & calculum præcipuè. Cum
minores calculi vrgent, vrina crassa, & turbida, tandemq; cruenta
profluit, maximè post validum laborem, exercitationemque. si-
cut etiam in casu, & ictu frequentes. Talis quoq; vrina vesicę cal-
culum testatur, eò quòd materia propemodum è renibus fluat: 35
quanuis etiam vesicę vitio, & imbecillitate concrefcant. nam exem-
pto quoq; calculo, senibus talis vrina sepe numero permanet. **MA-
THE**. Quales vrinę meatuum vrinariorū indices existunt? **GERON**,
Prædictis ferè similes, siue hi arenis, siue calculis infarcti, siue exul-
cerati sint: nihil tamen certi, semper indicare possunt. Atq; hæc 40
de vrinis nouisse satis est. cras reliqua indicabo.

nunc cœnæ tempus instat.

Ioan-

DE MEDICINA VETERI ET NOVA

COGNOSCENDA, COM-

MENTARII PRIMI

DIALOGVS OCTAVVS.

10 **M**ATHETES, Adsum honoratè præceptor, vt quæ
adhuc ex signis morborum sunt reliqua, fideliter per-
gas, commemorare. GERON, Hactenus ea, quæ ad vni-
uersa illorum genera pertinent, recensui: nunc singulorum pro-
pria subiiciam. Atque inter hos primùm sanè, qui in totis corpo-
15 ribus consistere solent: deinde verò eos, qui certis assignantur
partibus, explicabo. MATHET. Quod vitiorum genus in hoc or-
dine princeps est, quo totum corpus infestatur? GERON, Febris,
quæ affectus naturæ hominum inimicissimos, ab alieno cordis
calore, in totum corpus effuso, græcis πυρετός, appellatur. MATHE-
20 TES, Quem vocas alienum calorem? GERON, Naturali contra-
rium. MATHETES, Quis naturalis? GERON, Tum, qui primoge-
nio solidarum partium humori inhærescit, cœlestem sortitus ori-
ginem, primarius omnium functionum opifex: tum, qui tempe-
ratus ex moderata elementorum permistione profectus est, insiti
25 illius auxiliarius, vt quem foueat excitetq̃. MATHETES, Quid na-
turali contrarius calor agit, dum febrem gignit? GERON, Insiti ac
natiui essentiam, tanquam crudelissimus hostis semper oppug-
nat, labefactat, actionesq̃ eius interpellat: ac triplici specie com-
prehenditur. Vna quidem simplex, inde procreata, quòd calor
30 elementaris increfcens, à temperie, & mediocritate recedat, iu-
stoq̃ amplius exuperet, & sensim à natura alienetur, quæ antea
huic erat familiaris. Altera verò ex putri gignitur materia,
quanuis autem ille non adèò ardens existat, ob originis suæ con-
ditionem quam imitatur, naturæ contrarius, natiuoq̃ calori mo-
35 lestus tamen existit. Tertia exitialis est, pestifera ac venenatæ ma-
teriæ soboles, quæ non qualitatibus excessu, aut putredine, sed totius
essentiæ virulentia vitali, innatoq̃ calori aduersatur. MATHETES,
Febris igitur solus calor naturæ contrarius auctor existit? GE-
RON, Ita sentio, modò ille iam accensus, constanter perseueret.
40 aliàs enim si corpus nostrum vel æstu, vel balneis, vel exercitijs
incalescat, illis autem statim remissis, refrigeretur: certè calor iste,
neque febris, neque morbus vocari potest: imò neque ille, qui

FEBRIS prima-
rium totius cor-
poris vitium.

Naturalis calor.

Naturali con-
trarius quid agat

Alieni caloris spe-
cies tres.

Febris causa.

è iecore calidiore, cum sanguine & vapore erumpit, & palmas, inferioresq; partes pedum, quasi adurit, aut omnem quamcunque corporis regionem inuadit, febri generare non potest. MATHE-
Calor febris vnde
incendatur. TES, Qua de causa obsecro? GERON, Quia ex corde non prodijt. Nam ex hoc per arterias, simul cum spiritu effusus, vniuerso cor-
 5 pori celeriter distribui potest, & actiones omnium partium impedire, quod iecore, aut alio viscere affecto fieri nequit. MATHE-
 Calor igitur febrium, non aliunde quam ex corde accendi solet. GERON, Continuarum quidem, & primariarum ex hoc solo: inter-
 mittentiũ autem, & earum, quę secundariò gignuntur, greci *συμπλο*
μαλινὰς vocant, nō ex corde primum, sed alia ex parte incensas illud
Quid febris, &
que eius species. impetit: deinde hinc æstuans cum spiritu statim, per arterias totum corpus penetrat. MATH. Estne vnum febris genus, an plura?

GERON, Cum illa nihil aliud sit, quam externi siue alieni caloris incrementum, multa ac varia esse oportet. atque inter
 15 hæc tria sunt principalia, nempe simplex, putridum, & pestilens. Primum, quod ex naturali calore in igneum conuerso nascitur, & in tres quoque species diuiditur, nempe in diariam, continuam, & hecticam. priori, nomen latinum diarię, gręcum
ἡμερηγος, eadem ratione inditum est, quod vno ferè die desinat: altera gręcis *συνόχ*, nobis continens vocatur: tertia, quia in habitu corporis consistit, gręcè *ἐκλυή* dicitur, latino destituta nomine. MATHESES, Vnde singulę contrahuntur, ex eadẽmne, an
 diuersa materia? GERON, Diaria, ex spiritu tantum insigniter inflammato: cuius calor etiam vniuerso corpori communicatur. 25
 Continens autem, ex solo sanguine effluente, non putrido, aut alia labe infecto: cuius contagionem cor, alięq; partes corporis experiantur. Hectica, in solidarum partiũ essentia consistit, inheretq;. Sed hoc notes velim, duas eius esse differentias, vnam generalem ac summam, quę primum cordis, deinde reliquarum par-
 30 tium essentiam, ex æquo inuadat: alteram quę initio partis alicuius, vt ventriculi, aut iecoris, aut lienis, aut pulmonum essentiam, intemperie calida affectam, per se obsidet: deinde verò cordi, & singulis corporis partibus etiam impartitur. MATHESES, Quot

Putridarum species due. putridi generis febrium species existunt? GERON, Dug: continua, & intermittens. MATHESES, Quando vtraque generatur? GERON, Illa, cum in venis arterijsq; maioribus putredo, vel ipsamet, vel eius vapor cor assiduè attingit, inficitq;: hæc autem, cum illa vel est leuior, aut remotius à corde sita, vt non assiduè id queat afficere. MATHESES, Quotuplex est continua? GERON, Duplex. vna
 40 principalis, ac vera, quam humor putris, in vasis maioribus, inter alas & inguina litis, collectus accendit. secunda symptomatica quę

- quæ visceris, aut partis cuiusdam putredinem comitatur. Quæ autem exiecoris, aut lienis, aut renum, aut alterius cuiuscunque partis erysipellate, nascitur, græcè *τοφώδης*, quasi dicas adurens, nominatur: quæ verò ex earum, aut insigniorum partium, vti pulmonum, vel membranæ costarū, vel cerebri inflammatione contrahitur, *φλεγμονώδης*, hoc est, inflammatoria dicitur. Quod si verò humor in hisce visceribus coërcitus, citra eorum inflammationem statim, ac simul putrescat, acuta febris excitatur: si lentè ac paulatim, continua longa, ac diuturna, fieri solet: at species istius febris, pro humoris abundantis natura, variæ gignuntur. Nam sanguis venarum, arteriarumq̃, si cū putrescit ac incenditur, probè temperatus, & æquabiliter ex quatuor humoribus permixtus, existat, febrim continentem putridam excitat: si calidior fuerit, bilis magis quàm aliorum humorum particeps, tertianam prorsum generat: si amplum huius incendium, cor, & præcordia obsederit, vera febris ardens erit, quæ Græcis *καυστός*, nuncupatur. At si pituitosus sanguis vincat, incendaturq̃ vt putrescat, quotidiana continua: si melancholicus, quartanam febrim pariet. MATHE-
 T. Qualis est febris putrida intermittens?
- GERON, Varia, alia nanque simplex, alia composita, alia confusa appellatur. simplicis rursus tres sunt differentiæ, vt quotidiana ex pituita putri conflata, tertiana ex bile flaua, quæ extra venas maiores computrescit: quartana ex bile atra, quæ pura ac seorsum putrescit. MATHE-
 T. ES, Quam vocas febrim confusam? GERON,
 Galenus nullam sic vocat, sed sub spurijs, ac illegitimis comprehendit. Est autem ea, quæ non ex sincero humore, sed ex multis vno in loco, extra venas maiores confusis, simulq̃ putredinem expertis, exoritur. talis est tertiana spuria, ex bile & pituita simul corruptis nata. MATHE-
 T. ES, Vnde fit composita febris? GERON,
 Ex ijs quæ intermittunt, commixtis, implicatisq̃, vt tertiana duplex, quartana triplex, & semitertiana, quæ græcè *ἡμιτερτία*, dicitur, ex quotidiana continua, & tertiana intermittente. Sciendum autem varias hasce febres coniunctas, ex varijs quoque humoribus seorsum putrefactis, non vno eodemq̃ in loco confusis, pro-
 geterari. MATHE-
 T. ES, Quæ febris est pestilens? GERON, Quæ non simplici calore, sed maligno, & exitiali, nunc spiritus, nunc humores, nunc partes ipsas, inficit, & corrumpit. MATHE-
 T. ES, Repetas obsecro rem ab exordio, ac diariæ febris originem, causas, & inditia, exponas. GERON, Diariæ febris auctor est calor naturæ contrarius, in eo spiritu confidens, qui arteriarum communis, è corde in totum corpus influit, ac diffunditur. cū igitur ille, in hoc tanquam basi subsistit, reliquum cor-

Acuta.

Longa.

Tertiana continua.

Ardens vera.

Quotidiana & quartana continua.

Intermittentes. Simples. Compositæ. Confusæ.

Pestilens febris.

Diariæ febris causa.

Diariæ finis.

pus inuadit, omnesq; huius functiones remoratur, impeditque. **MATHE TES**, Cur febris diariæ tam citò finitur? **GERON**, Quia spiritus, tanquam materia adeò tenuis est, & leuis, vt faciliè dissipari queat. Quòd si longiùs protrahatur, vt in quartum quoque diem incidat, non solùm calor naturæ inimicus, spiritum, sed etiam humorem quendam vitiosum, incendioq; opportunum inuasit. unde sæpè ex diariæ, aliæ putridæ febres gigni consueuerunt. **MATHE TES**, Quæ causæ euidenter diariam excitant? **GERON**, Illæ potissimum, quarum vi & impetu, spiritus tenuis, calidus, & feruens, celerrimè incenditur. tales autem sunt, vigilia, sollicitudo, mœror, ira, æstus solis, ærisq; feruor, lassitudo, laborque vehemens, luxus, vinolentia, inedia, ciborum vitiosorum esus, adhæc euacuationes naturales, vt alui, vrinæ, quauis ex causa retentæ: nec non sudoris suppressio, ob cutis astrictionem, vel ex frigore, vel ex balneo astringente, factam. Præterea tumores glandularum & inguinum, ex labore contracti, doloresq; vehementes, qui corpus inflammant, & humores exagitant. **MATHE T**. Qui in febrem diariam maximè sunt procliuēs? **GERON**, Calidi siccique temperamento præditi, acribus recrementis pleni, & quibus sudor, vrina, aut alui, admodum sædi sunt odoris. Quòd si febris ista eodem in statu, diem vnum excesserit, sic vt nec declinet, neque vllò sudore discutiatur, metus est, ne vel in continentem, vel in putridam degeneret. Sub eo casu, si corpus vehementer siccum est, febris quoque hecetica timeri potest. quinetiam biliosum hominem negotijsq; deditum, & sæpiùs, & maiori periculo afficit. **MATHE TES**, Quæ notæ peculiæ illam produunt? **GERON**, Blandus, mitisq; totius corporis calor, qualis in iratis hominibus, aut vini plenis percipi solet, pulsus statim per initia magnus esse incipit, celer, & frequens modicè, æqualis, mollisq;, & ordinatus: vrina parum à naturali recedit: nullum cibi fastidium ipsam antecedit: nulla spontanea corporis lassitudo: nullus somnus grauior: aut nulla oscitatio, nec horror, sed derepente tota simul accedit. adhæc vbi iam inceperit, nullo grauiore incommodo molesta est, vt dolore capitis, ac ventriculi, aut nausea, aut æstu, aut corporis perturbatione. soluitur autem hæc febris interdum occultè, sine manifesta euacuatione. sæpè autem per copiosos cutis madores, aut per sudores, tum suaues, tum minùs largos. **MATHE TES**, Quæ proxima diariæ febris existit?

Diariæ causæ euidenter.

Diariæ oportuna.

Transitus diariæ in alias quando fiat.

Diariæ initia.

Synochos.

GERON, Ea, quam nos latinè superiùs continentem, putredinis expertem, græcè *συνώχνη*, appellauimus. Nam hæc etiam illius seruans naturam, corpus nimio sanguinis putrefacti feruore, infestat, rubidumq; efficit. Eadem continuè affligit, sic vt nec intendatur,

datur, neque remittat, priusquàm integrè fuerit soluta. Hinc rur-
 sus alia vicina est, & ferè similis, nisi quòd ex sanguine putredo
 originem traxerit, quam ideò continenter putridam, paulò antè *Synochos putri-*
 5 nominaui. In vtraque enim sanguis siue putredinem, siue nullam
 expertus, tanquam materia proxima in valis maioribus, inter
 alas & inguina sitis continetur. non ille quidem simplex, sed ex
 quatuor humoribus equabiliter permistis, conflatus. MATHETES,
 Quæ vtriusque sunt notæ? GERON, Consimiles, nisi quòd putri-
 10 dæ sint euidentiores: caput dolet, vel grauatur: corpus totum
 præsertim faciès, vehementer rubet caletq; somnus plenior: ar-
 teriarum in temporibus motus euident: spiratio difficilis: pulsus
 magnus plenusq; velox & frequens: totius corporis grauitas, &
 quædam quasi lassitudo. hoc autem intercedit discriminis, quòd
 in continenti putrida magis acris subsit calor, putredinis sobo-
 15 les: guttur, & vicinæ eius partes inturgescant æstuentq; sic vt lo-
 quela ægri impediatur: oculi calidis lachrymis repleantur: non-
 nullis venter intumescat, & percussus tympani modo sonet. pul-
 sus in vtraque magnus, vehemens, celer, & frequens percipitur.
 Inæqualis autem in priore non deprehenditur. vrina redditur
 20 crassa, rubra, turbida, subsidentis expers. nonnunquam etiam
 exanthemata circa totum corpus nascuntur, aliàs alio colore tin-
 cta, frequentius vel liuida, vel nigra. hoc malum ferè post quar-
 tum diem finitur: si autem continenter augeatur, vitæ pericu-
 lum affert, præsertim si iam lingua aspera nigræque existat, siquæ
 25 oculi lucem refugiant, & si vrina vini instar obscura sit. In quem
 hæc non incidunt, & febris ipsa paulatim remittit, is periculum
 euadere nullo modo potest.

Porro inter continentes, alia æquali semper impetu, toto
 eius cūriculo fertur, ac græcè *ισόνοσος*, siue *ἰσόνος*, & *ἀμαστικός* (quasi
 30 eundem seruans) tenorem vigoremq; dicitur: alia increscit, quam
 græci *ἐμμεμαστικός*: alia declinat, ac *προεμμεμαστικός* vocant. prima verò
 minùs periculosa est, quàm secunda, hæc autem magis quàm vl-
 tima. MATHETES, Dic apertius, cur synochi istæ febres, nomina
 hæc græca sortitæ sint? GERON, Primùm, quia sanguinis mate-
 35 ria, eiusq; inflammatio, vnde febris prouenit, tota vbique sui si-
 milis est, & vnā tantum ab initio, ad finem vsque accessiōnem
 habet, quantumq; eius recens inflammatur, tantundem statim
 digeritur. deinde quòd caloris plus discutiatur, quàm continuo
 incremento inualecat: tertio quòd idem calor statim à summo
 40 vigore incipiens, paulatim decrescat, quousq; restinguatur.
 MATHETES, Quinam ad synochos febres procliuēs sunt? GERON,
 Ad eam, quæ putredinem experta est, temperatī, qui tamen co-
Qui procliuēs ad synochos.

piosiore se cibo calido, & meraciore vino replerunt, & carnosius. Ad putridam autem, calido & sicco corpore præditi, vapore acri, ac copioso abundantes: nec non, in quibus sudor, vrina, & aluus sædum odorem repræsentant. Notandum verò hic est, synochum putredinis expertem, facile in putridam, & hanc rursus in tertianam continuam, transire posse. **MATHE TES**, Estne synochus quæ ex alijs etiam humoribus, quàm ex sanguine generetur? **GERON**, Indubiè: quòd etiam Ioannes Fernelius, medicus suo tempore in Gallijs excellentissimus, & summus olim meus sodalis, amicus, & coëthaneus, in libro suo de medicina scriptum reliquit. Est enim genus quoddam synochi, quod ex nimia calidorum humorum agitatione excitatur. nam si causæ manifestæ vehementiores, corpus biliosum etiam sanum infestant, non solum spiritus incenduntur: sed acres quoque humores exagitantur: ob quorum feruorem æstumq, febris sine putredine exoritur. **MATHE TES** In quo ista febris à synocho nuper dicta discrepat? **GERON**, Hæc corpori calido siccoq, ac prorsus bilioso: illa temperato, bonoq, habitu prædito, obuenire solet. **MATHE TES**, Quæ huius sunt causæ euidentes? **GERON**, Eadem propemodum, quæ diariæ, præsertim ingens dolor, labor immoderatus, æstus, balneum, ira, & id genus aliæ: pulsus, & vrina, putredinem nullam in illa indicant: os autem amarum est: cibi fastidium vrget: sitis excruciat: caput dolet: vigiliæ premunt: acris cutis aridæ calor percipitur. **MATHE TES**, Non satis intelligo, cur synochum ex sanguine putrido nasci dicas, cum nonnulli de hac dubitent? **GERON**, Scias igitur sanguinem duplici modo putrescere. primò sanè, cum dissimiles in eo partes, vi caloris alieni segregantur, bilisq, flaua ac tenuis, ab atra, terrestri, ac crassa secernitur: sed hæc separatio, corruptio potius, quàm putredo censetur. Si igitur hac ratione putrescat, indeq, febris accendatur, certè ipsa non synochus, verum aut biliosa, aut melancholica euadet. Secundò, & propriè, cum totus sanguis partibus nullis secretis, magno fœtore corrumpitur. Quemadmodum enim ille ex venis in pectus, ventriculum, intestina, aut in aliam spatiosam regionem infusus deprauatur, & quasi in venenatam essentiam conuertitur: ac in musculos incidens, tumorem naturæ contrarium, inflammationemq, progignit: ac primùm computrescit, deinde suppurat, sic ille quoq, validis ex causis, sicut ex pestilenti cœli statu, in maioribus venis, putrescit. adhæc essentia iecoris cum inflammatione tentatur: sanguis totus non solum putridus, sed aliquantò etiam purulentus existit: interdum sanguis ex magna mutatione vitatur, vt non amplius ad naturam redire habitum, nec iterum per naturam con-

Tertium genus synochi.

Fernelius.

Synochi biliosæ & sanguineæ differentia.

Causæ.

An synochus ex sanguine putrido.

Sanguis bifarius an putrescit.

re con-

- re concoctionem, ad pristinam humoris bonitatem, reuerti que-
at. Quinetiam per venæ incisionem in febris detractus, sæpe non
solum fœdus odore, sed etiam putridus adeo deprehenditur, vt
neq; sibi met cohærere, neque concreescere possit: eò quòd omnes
5 eius fibræ, ob putredinem consumptæ fuerint. atq; cum hoc mo-
do sanguis corrumpatur, synochus putrida accendi potest. Ead-
em, sicut etiam altera simplex, synochus vna constat accessione,
quæ neque antea vel leuatur, vel remittit, quam ad integritatem
veniat. *MATHESES*, Quæ febris synochon putridam sequitur? *Continua.*
- 10 *GERON*, Continua triplex, quæ nuper græcè *μωροχολή*, nomi-
nata est, ex varijs humoribus putridis orta. *MATHESES*, Estne sy-
nocho illi affinis? *GERON*, Est sanè accessionum continuatione si-
milis: in hoc autem dissimilis, quòd ipsa ab alterutra bile, vel pi-
tuita procreata sit, atque pro humorum istorum natura, & motu,
15 circuitus habeat, quibus licet non in totum desinat, tamen remit-
tit, & tempora accessionum quietiora consequitur: continens au-
tem putrida, ex putrefacto nata sanguine, nullam remissionem
habet, donec ipsa finiatur. *MATHESES*, Quæ res alia continuam
ab intermittente discernit? *GERON*, Illam neque horror aliquis,
20 neque rigor, neque frigus antecedit, sed calor è vestigio agrum
inuadit: quanuis sæpe humor corruptus præcordijs inhærens,
rigorem, aut horrorem tandiū moueat, donec totus quoque sit
à febre incensus. Porro calor totius corporis in hac febris, semper
acris existit, præsertim in illius augmento, & statu. Respiratio in
25 eadem, & pulsus inæqualis est. nam in hac eius submissio, velox:
elevatione tardior est: pulsus nunc velox, nunc tardus: modò vali-
dus, modò languidus existit: quamprimum febris accessio inci-
pit, velox & paruus: in statu; tum insigniter magnus, tum velox
apparet: vrina principio crassa, rubra, & turbida cernitur: cui ne-
30 que in summo nubecula extet, neque in medio pendeat aliquid,
neque in imo quiddam subsideat. eadem vrina interdum tenuis
quoque, & rubra, sed minimè perspicua deprehenditur. Adhæc
sudor, vrina, aluus, & quicquid aliàs ex parte aliqua vacuatur,
odore fœdum est. At continua quotidiana, quartanaq; incerta
35 propemodum, & inordinata esse solent, vt quæ alio die bis, aut
ter vrgeat, alio semel tantum, aut prorsus non incidat. Quartana
continua rarissimè, quotidiana minùs rarò obuenire consueuit.
Tertiana verò, quæ latinis ardens febris, græcis *καυστική*, appella-
tur, omnium est frequentissima. *MATHESES*, Quæ sunt eius in-
40 ditia, quibus dignoscitur? *GERON*, Quia correptus est, eius
corpus valdè inardescit, sed intus magis quàm extrinsecus. vigi-
lijs diutius cruciatur, somno grauiore interdum premitur: lingua

Continua.
Quotidiana.
Tertiana.
Quartana.

Ardens febris.

arida, crassa, aspera, & subnigra est: os amarum, spiratio difficilis, rosio stomachi, cibi fastidium, sitis vehemens, præcordiorum ardor affligit: aluus in his resoluta, in illis astrictior est: eger ipse valde inquietus, morbum non facile tolerat: delirio, frequenti sæpè vexatur. **MATHETES**, Longumne hoc febris genus existit? **GERON**, Minimè, sed quia vehemens, atque acutum, plerisque omnibus quarto die terminatur, si bona signa representet: in nullis autem post septimum perseverat. Tunc sanè vomitione, aut alui fluore, aut sudore, omni ex corporis parte erumpente, aut sanguine è naribus profluente, finitur. **MATHETES**, Qui huic febris sunt obnoxii? **GERON**, Iuvenes, sed minùs periculosè. Senes rariùs ea infestantur, ijque maiore cum periculo. Hec febris ardens, sæpiùs in pulmonis inflammationem conuertitur, verum tunc exitum portendit. **MATHETES**, Estne alia adhuc febris, quæ continuorum numero comprehenditur? **GERON**, Est utique adhuc species quædam reliqua, superioribus longè mitior, vnde etiam lenta dici solet. **MATHETES**, Vnde habet originem? **GERON**, Non ex viscerum, aut ullius partis inflammatione, sicut aliæ, sed ex occulta humorum insidentium putredine, quæ eis adeò validè adhærescit, impacta est, ut ipsa quoque plerumque labefactentur: nonnunquam etiam ex putredinis eiusdem portione, venis infusa, sanguinis permixta, progignitur. ei ferè similis, quæ vel inflammatoria, seu phlegmonodes, seu typhodes, nuncupatur: adeò est diuturna, ut reliquas continuas excedat, ut neque vigesimo, neque quadragesimo interdum solvatur. **MATHETES**, Vbi illa nascitur? **GERON**, Sæpè in ventriculo, aut in iecore: aliàs in liene, aut mesenterio: aliàs in pulmonibus, vbi putredo non in totum maligna collecta fuerit, quàm præcordiorum, & abdominis tumores indicant: nò rarò etiam ex leui pituitæ serosæ putredine, vel in malo corporis habitu, vel in pallidis virginum coloribus procreatur. At duæ sunt ipsius species, vna sanè quæ eam præcessit, ac simplex appellari potest: altera hac periculosior est, ut quæ non solum ex impacti humoris putredine, sed etiam ex visceris, cui ipsa insidet, corruptione proveniat. Quia verò cor graui expiratione in hac continuè affligitur, nonnulli eam hecticam esse opinati sunt, alijs ferè morbis succedit: nullis autem remedijs, præsertim vacuantibus tollitur, sed ijs potius exasperatur. De continuis fac multa, nunc intermittentiũ aggrediar. **MATH.** Quenam sunt illæ? **GERON**, Quæ quotidie, vel tertio, vel quarto quoque die accedunt: deinde quæ tardius, quinto aut septimo die, tanquam longiore circuitu reuertuntur: tertio, quæ inordinatis accessionibus redeunt, quas Græci *πλανήτας*, Latini vagas, atque errantes nomi-

Lenta febris.

Nota lenta febris.

Intermittentes febres.

- nominare possunt. Quæ verò quotidie redeunt, quotidianæ appellantur, ex pituita, quæ extra venas putruit, exorta: quæ tertio quoque die repetunt, tertianæ dicuntur, ex bile flaua, & ipsa putredinem experta, conflata: quæ die quarto accedunt, & circuitu reuertuntur, quartanæ vocantur, ex humore melancholico contractæ, atque hæ sunt simplicium intermittentium species. Quia verò nonnullæ ipsarum, aut sibi ipsis, aut alijs permiscuntur, complures earum differentiarum oriuntur. Nam tertianæ duplicatæ, falsam quandam quotidianam imaginem exhibent, eò quod iam singulis diebus repetant: sed periti eas ex accessionum specie, & symptomatis superuenientibus, dignoscunt. quæ à quarto die reuertuntur, si duplicentur, duabus diebus continuatis inuadunt, vnoque intermittunt. rursus, sicut quartana fortè fortuna increuerit, triplexque euaserit, è simplici, accessiones quotidianarum instar singulis diebus implet. Quinetiam interdum, quintanæ, sextanæ, septimanæ, aliæque his similes, & præterea vagæ fieri possunt. Cum enim quatuor in nobis humores existant, singuli ubi fuerint immutati, varias ipsorum species generant: cuius gratia etiam accessiones, pro quauis humoris corrupti excellentia, repetunt. MATHESES, Vnde vagæ & errantes conflantur? GERON, Ex materia quidem matura, & ad excretionem parata, greci *διορροσται*, vocant, sed inordinato cibo, nondum elaborato commiscuntur simul, & crescant. Quemadmodum autem duplicatæ inter se, febrium differentias constituunt, ita etiam mixtæ inuicem, alia febrium genera conflant. modò enim quotidiana cum tertiana, modò cum quartana: ita, vt tres coniugationes ipsarum inter se consistentes generentur, & singulæ suam pariant accessionem. MATHESES, Qua alia ratione continuæ, & intermittentes complicantur? GERON, Nonnullæ ex ipsis, quæ continuas accessiones habent, aut quotidie, cum pituita in venis corrupta computruit, aut post tertium, quando venæ bilioso humore scatent, aut quarto quoque die, quando melancholicus humor in venis consistit, cum intermittentibus iam dictis complicatæ, alias febrium differentias progignunt. Nunc enim quotidiana continua, cum eius generis intermittente, nunc cum tertiana, quæ Græcis *ἡμικτηνίτις*, nuncupatur, denique cum quartana intermittente coniungitur. Eodem modo cum quotidiana continua, aliàs tertiana, aliàs quartana, & intermittentes commiscuntur. similiter etiam continua quartana, cum tribus istis intermittentibus permiscetur: ex quibus si noueris simplices ac singulares: certè coniunctas etiam, & complicatas discernere poteris. MATHESES, Suntne aliæ huius generis febres? GERON, Sunt utique, prima græcè *ἡ πάλαι*, dici-

Febres complicatae.

Vagæ & errantes febres.

Complexus continuarum & intermittentium.

*Febris lente alia
species.*

tur: eò quòd leniter sepefaciat, non autem vehementer incendat, horror sanè in ea euidens est: sed febris succedens illi nequaquam proportionè responderet, quanquam interdum cum calor, tum horror simul conueniunt. morbi huius auctores sunt frigidi, lentiq; succi, modicè putrefacti, **MATHETES**, Quæ reliqua est species? 5

Febris lepyrias.

GERON, Græcè dicta *λεπυρίας*, quæ magno admodum cum horrore inuadit: sed euidens calor ei non succedit: vt nomen eius testatur: quod caloris defectum significat: nam humor admodum frigidus, summa sub cute contentus, in accèssionum impetu, à facultate excernendi propellitur: ob quòd horror comitatur, calor autem nullus accedit: quia neque humor iste, qui non facilè natura sua corrumpitur, putrescere potest. **MATHETES**, Cum febres ferè omnes ex humorum putredine, vt plurimum gigni soleant: exponas oro, qua ratione, & quo in loco singulæ? 10

*In quibus locis
materia febris
vni lateat.*

GERON, Aliàs in venis vel omnibus, vel maioribus, aliàs in parte quadam, idq; nunc cum inflammatione, nunc absq; illa, continua sanè in venis, & arterijs amplioribus accenditur, perseveratq; donec humores ipsius auctores, vel incendio consumpti, discussiq; fuerint, vel quouis modo euicti. Duplex autem putredinis ratio est: vna in omnes, vel certè in maximas venas æquabili 15

Putredinis ratio.

liter peruadit: altera ex vnaquapiam ducens originem, in cæteras continuatione penetrat. at quæ omnes simul venas pertransit, quanuis earum sanguinem, non tamen vniuersas ipsius partes æquè obrinet. Cum enim sanguis non omnino simplex, sed ex multis humoribus conflatus, seroq; copioso sit perfusus: putredo primum quidem portionem, illius ipsi magis obnoxiam inuadit: ab hac deinde aliam ei admistam, ac confusam, quæ minùs quàm illa sit vitiosa. Atque hoc modò paulatim obrepens, simul cum calore naturæ contrariò augetur, inualefcitq; nec antea cedit, quàm omnes sanguinis partes putredini obnoxias cōsumpserit. **MATH.** 20

Quando putredo calorq; febrilis desinit? **GERON**, Vbi omnia putredini opportuna fuerint absumpta: melior tamen sanguinis portio manet: quæ cum minùs obnoxia putredini fuerit, ab hac non inficitur: quæq; licet putridæ admisceatur: minimè tamen illius contagione computruit, sed tantum inuasit. Hoc verò modò sanguis in synocho altera putrescit: non multò aliter in febris ardenti, seu tertiana continua, & in alijs consimilibus. Non enim vniuersus sanguis in his corrumpitur, neque omnes pariter humores, ex quibus constituitur, sed is solummodo, qui omnium maxime vitiosus est. Qualis autem huius est natura: tale etiam febris continuæ genus accendit: tertianam quidem continuam, si bilis flaua vrget, quæ in sanguine continetur: quotidianam verò 35
conti-

continuum, si pituita: quartanam autem continuum similem, si melancholicus humor putrescit. *MATHESES*, Quæ altera est putredinis ratio? *GERON*, Quæ non omnes simul venas, sed ab vna quapiam (vnde forsân cepit originem) cæteras, earumq; sanguinem, & humores continuatione inuadit. *MATHESES*, Quot putredinis causæ efficientes sunt? *GERON*, Duæ. vna propria, & interior: altera exterior. Prima, qua corporis humores putrescunt, dum vitium in se continent, quod nullo naturæ beneficio emendari potest: id autem ab alimentis corruptis, & vitiosis, vt frumentis, leguminibus, piscibus, carnibus vitiatis, nec non à cibis etiam bonis, sed qui facillè corrumpuntur, & putrescunt, vt à lacte, fructibus horarijs, alijsq; vitioso succo præditis, contrahitur. Nam sanguis ex his genitus, quanuis crebrò concoctione mutatus fuerit: tamen pristinam conditionem, & eius, vnde nascitur, nonnihil etiam postea retinet. Quinetiam putredinem efficiunt, cibi intempestiue aut ordine præpostero assumpti: vt cum priore nondum elaborato, alter ingeritur, aut cum duri concoctuq; difficiles leuioribus, qui infirmæ sunt materiæ, præmittuntur: postremò humores etiam fiunt putridi, cum interiores partes, vt ventriculus, iecur omniaq; viscera, in malo sunt habitu. hic enim concoctione alimentis imprimitur, quæ etiam si optimo succo prædita sint: tamen tæbe hinc contracta vitiantur. Porro exterior putredinis causa, duplex existit. vna, qua crassi viscosiq; humores meatus corporis adeò occludunt, vt perspiratum impendant: tunc enim ipse, quia nec diffillantur, neq; refrigerantur, licet probi sint, computrescunt. Similiter, cum vasa nimium humoribus repleta obstruuntur: sicut etiam putrescunt, cum copiosiores sunt, quàm vt à viribus imbecillis, vel concoqui, vel superari possint. Quinetiam vitiosus, ac pestilens aër, halitus, vaporq; putridus, inspiratus, vel contagio scabiei, vel febris putridæ, vel luis venereæ: primum spiritus, deinde humores ipsos corrumpunt. præterea vitiosi cibi in ventriculo, alijsq; partibus computrescunt, & humores in pestilenti aëris statu, tum inspiratu, tum perspiratu deprauantur, licet corpus extrinsecus omnino adapertum sit, & pateat: omnes tamen meatus liberi sint, & aëre frigido perflentur. *MATHESES*, Vbi febris continet, quam superius conclusam appellasti, materia continetur?

GERON, In vasis maioribus. nam in his illa putrescens, aut contagionem aliquam, aut putridum vaporem, ex se continenter in cor fundit. sin autem vel in inguine, vel in remotiori loco collecta hæret, tunc neque putredinem, neq; eius vaporem, sed vnum duntaxat calorem, partium consortij lege, cordi infert: ex quo so-

Altera putredinis ratio.

Putredinis causæ.

Exterior putredinis causa duplex.

Febris conclusa vbi.

Venarum materia.

lo, vel diaria febris, vel symptomatica gignitur. MATHETES, Quæ in venis continetur materia? GERON, Sanguis, in quo (modo ex humoribus æquabiliter commixtis constat) synochus consistit. Quod si verò is à mediocritate deficiens, vel biliosus, vel pituitosus, vel melancholicus appelletur, febris putrida ex eo generatur continua. Quemadmodum igitur synochus non nisi in temperatis, multoque sanguine, ac mediocri præditis, carnosisque procreari solet: sic putrida continua ijs duntaxat accidit, qui ab hac mediocritate recedunt, ut biliosis, pituitosis, & melancholicis. MATHETES, Nunc quæso notas cuiusque febris explicare digneris. 10

Notæ febrium singularum.

Continuæ putridæ.

GERON, Putridæ continuæ, calor acris, rodens, qui tangentis manum purgat, non in accessionis initio, sed vel in augmento, vel in statu, præsertim si illa corpori diutius admota fuerit: pulsus & respiratio inæqualis adest. ille enim nunc celer, nunc tardus est: item aliàs fortis, aliàs languidus. Urina omnino cruda, 15 vel obscure concocta, præsertim per initia apparet, nempe crassa, rubra, ac turbida, in qua nihil secernitur: interdum quoque tenuis, rubra, & turbida (magnæ obstructionis gratia) frequenter acris, rodens, ac foetida deprehenditur: sicut etiam halitus, expiratus, aut sudor, grauius olet quam consuevit. MATHETES, Quomodo 20

Continuæ & intermittentes diægnosis.

continua ab intermittente dignosci potest? GERON, In continua nullus rigor, aut frigus præcedit: sed calor derepente inuadit. Sin autem aliquando rigor, horrorque, seu frigus percipiatur: non parum noxi humoris præcordia obsidet, qui corpus horrore concutit, donec ipse totus incendatur. pulsus inæqualitas magis 25 quam caloris vehementia cernitur. longius horis viginti quatuor durat, nulloque vel manifesto sudore, vel sensim interea desinit, ut intermittentes: sed eo usque perseverat, donec in totum remittatur. At in febre ardente continua, communes putredinis notæ manifesto apparent: æstus perpetuus, ac æquabilis prope 30

Ardentis febris notæ.

modum urget, non autem manifestam tertiani circuitus accessionem habet: præcordia vehementer æstuant: spiritus difficulter ducitur, adeo ut de suffocatu metus sit: corpus huc illuc iactatur, & inquietum est: vigilia & frequens delirium, sitisque vehemens premit: lingua nigricat, sicca scabraque est: os amarum. Quod 35 si ipsa viscera, & aliæ partes internæ vri videantur, & extrema simul frigeant, græcè peculiari nomine λειπυρία, appellatur: in tertiana verò continua, euidentior est remissio, sicut & accessionis impetus, nullo cum frigore, aut rigore inuadens, nulloque sudore subsequente, conquiescens. MATHETES, Quæ febris quotidianæ 40

Quotidianæ, continuæ, & quartanæ signa.

continua, aut quartanæ sunt indicia? GERON, Vtraque sine frigore, aut horrore inuadit, nulloque sudore leuatur: illa quotidie: al-

tera

tera quarto quoque die: obscura admodum putredinis habent ar-
gumenta, pullum minùs velocem, frequentem, aut inæqualem,
quàm cæteræ: vrinam non æquè flammeam, aut rubram, quan-
tuis fortè crassiore: symptomata quoque minùs grauià. Porro
5 omnis continua, quæ non tertiana est, inordinata ferè deprehen-
ditur, quæ duas aut tres, vno die, altero, aut vnam, aut nullam ac-
cessionem habet: rarò nanque vnus humor solitarius, in sanguine
putrescit: eorù varia admodum putridarum febrium signa, & sym-
ptomata existunt. Atque his notis continuæ febres primariæ, di-
10 gnosci possunt. MATHETES, Quibus ergo secundariæ, quas *συμ-
πτωματικές* appellasti? GERON, Hæ ex materia non in maioribus
venis, sed in parte quadam subsistente contrahuntur: quæ ex hu-
more, aut halitu fædo ac putrido, cordi irrepsit. Multa quoque
putridarum genera, sed vnum, idèq; rarum, quòd partium inflam-
15 mationes comitatur, existit. Quando enim illæ vel exteriores, vel
remotæ fuerint, non alia quàm diaria febris generatur: in qua fe-
bris calor, partium continuitatis ratione, cor inuadit. Cùm autem
inflammatio, aut erysipelas, interiores, & maximè principes, cor-
diq; vicinas partes infestat, sanguis, aut bilis putrida, illinc in cor
20 subit, aut fædum putremq; vaporem ipsi immittit, qui per arte-
rias cordi infusus, febri putridam parit. Ita febris fit inflam-
matoria, quæ grecis *φλεγμονώδης*, dicitur, à phrenitide, angina, pul-
mone inflammato, tabe, laterum, iecoris, lienis, & renum inflam-
matione: adurens siue ardens, grecè *τυφλώδης*, appellata, ab erysipe-
25 late. Hoc autem vnaquæque est grauior, quò partes affectæ sunt
nobiliores, cordiq; magis vicinæ. fit autem interdum, vt inflam-
matio, vnde febris ista duxit originem, per initia quasi delitescat:
febris autem illi successoria, siue symptomata, valdè fit manife-
sta. MATHETES, Quomodo hæc à primaria continua, distingui-
30 tur? GERON, Ambæ quidem sunt acutæ, & putredinis notas re-
præsentant: secundaria verò, seu symptomata, nullo certo cir-
cuitu reuertitur, nullum putredinis habet initium, nisi illa forsan
ex sede affecta irrepsit: cuius signa sunt si non statim ab initio,
non longè tamen post apparent. MATHE, Quando secundaria ista
35 febris soluitur? GERON, Rarò, vel septimo die, vel decimoquarto,
aut alijs decretorijs, omnia hisce contraria, in primaria febre con-
tinua, apparent. MATHETES, Quæ lentæ febris inditia sunt? GE-
RON, Qui ea correptus est, vix sibi ægrotare videtur: nec graue
quippiam sustinere: alimentum non sentit, sed spatio temporis
40 consumitur, atque extenuatur: & tandem ad eò infirmus reddi-
tur, vt difficulter loco moueri queat: pulsus eius frequens, velox,
& inæqualis, non autem magnus existit: vrina aliquando pu-

*Symptomata
rum febrium no-
ta.*

*Febres ex parti-
um inflamma-
tione.*

*Lentæ febris si-
gna.*

tredinem indicat: animus facilè deficit: corpus paulatim & interdum sine sensu debilitatur, tabeque emarcescit. Atque hæcenus inditia febrium habes, quarum accessiones sine intermissionibus vrgent: nunc earum notas persequar, in quibus spatia inter accessiones porriguntur. **MATHETES**, In quibus intermittentes à continuis discernuntur? **GERON**, Tum in materia, eiusque situ, tum in accessione ratione. has enim sanguis in venis maioribus ferè contentus efficit: illas autem humor semper superuacaneus, circum præcordia inhærescens: qui è iecoris sanguine separatus, proprijs conditur receptaculis, antequàm in illud deferatur. ac quotidianam sanè, si qua vera est, pituitosus muscosusque copiosus in ventriculo & intestinis collectus generat: tertianam verò, flaua bilis, ei quæ in vesicula fellis conditur, affinis: quartanam, humor melancholicus in lienem refusus. **MATHETES**, Quæ ergo propria omnium febrium materiæ sedes, ac regio existit? **GERON**, Prima corporis regio, circum ventriculum, septum transuersum, iecoris caua, lienem, omentum, mesenterium. In his nanque partibus omnis humorum colluuiæ, non in maioribus venis, & minoribus accumulatur, vt alij existimarunt: ob quòd etiàm à vera intermittentium febrium curatione, longè aberrant, dum sanguinis missione, statim peritiã vntur. **MATHE**. Qua alia in re continuè ab intermittentibus distant? **GERON**, In ea primùm, quòd ille vnã tantùm accessiõem, vsque ad finem, hæ autem plures habeant: quas frigus, vt quotidianam: aut horror, vt tertianam: aut rigor, vt quartanam antecedit, quotiescunque repetunt. Atque hæc in tensione, et remissione differunt, quanquam continuè etiàm à frigore, aut horrore, aut rigore incipiant. **MATHETES**, Quæ trium istorum frigoris, horroris, rigoris causæ existunt? **GERON**, Quanquam iam antea de his tractarim: tamen paucula quædam hic subiungere non grauabor: quòd facilius febrium materiam, eiusque sedem intelligas. ac dico eandem similemque omnium ipsorum causam esse, nempe vehementem frigoris incursum, vel alterius rei, quæ pungendo, aut quouis alio modo sit molesta, dum omnes sensiles corporis partes, cum impetu inuadit. Differunt autem illa inter se, aut copia, aut vehementia, seu acrimonia, aut motionis impetu: pituita enim aliam qualitatem, motumque, aliam bilis flaua, aliam humor melancholicus, ex putredine contrahit. **MATHETES**, Qua ratione accessio reuertitur? **GERON**, Quando febris accedet, humor proprio suo loco compræhensus, euocatur, quasi que furcens agitur, & copiosum vaporem secundum impetum, per vniuersum corpus dispergit, portionemque exigua effundit, depellitque in præcordia, & ventriculum: aliàs etiam per iecur in ve-

*Intermittentium
& continuarum
discrimina.*

*Quotidianæ fe-
bris humor pro-
prius.*

*Materia febrilis
sedes.*

*Causæ frigoris,
horroris, & ri-
goris.*

*Accessio cur re-
uertitur.*

in venas maiores: atque ea perseverat accessio, donec impetus ille remittat: & id, quod è sede sua expulsum est, calore dissipetur, aut sudoribus digeratur. Post hæc febris intermittit, quousque alia accessio nouo humoris impetu, quasiq; furore reuertatur: id

- 5 autem statò fit circuitu, nisi quod ordinem interpellat. **MATHE T.** Quomodo hoc accidit? **GERON,** Cùm accessiones, vel statum tempus præueniunt, aut tardiùs sequuntur. **MATHE TES,** Quando præueniunt? **GERON,** Cùm subiecta illarum materia au-
 10 gescit, tum ex impuro vitiosoq; cibo, tum excrementis suppres-
 sis: vel cùm sinapis, aromatum, & aliorum calidorum vsu, multò fit subtilior, vel cùm exercitatione, balneis, æstu, ira, alioq; animi
 motu exagitur. **MATHE TES,** Ob quid accessio tardiùs solito re-
 petit? **GERON,** Si illius materia contrarijs ex causis, vel minuitur,
 vel crassescit, vel ponderosior euadit. **MATHE TES,** Quando cir-
 15 cuitus accessio inordinati? **GERON,** Cùm humor, aut in alte-
 rius naturam degenerat, aut alieno generi admistis, confundi-
 tur. **MATHE TES,** Quid accessiones longas efficit? **GERON,** Hu-
 mor, eiusq; vapor copiosus, crassus, & viscosus effusus. Is nanque
 20 longo tempore inflammari, absumi q; solet: adhæc meatuum astri-
 ctio, aut virium imbecillitas, quæ dissolutionem prohibent. **MATHE TES,** Quæ reddunt breuiiores? **GERON,** Humor paucus, ac
 tenuis, meatus ampli, & vires robustæ. **MATHE TES,** Quæ singu-
 larum febrium notæ peculiare existunt?

*Accessio tardior
cur fiat.*

*Circuitus inordinis
nati ratio.*

*Accessionis longæ
causa.*

*Accessio breuior
vnde.*

- GERON,** In quotidiana, extremæ membrorum partes, præ-
 25 cipuè summi manuum ac pedum digiti, inalgescunt: inde calor le-
 uis, humidus, vaporosusq; exhalat, qui paulatim lenteq; augetur,
 vt iam in statu rodens, & acris fiat: semper autem inæqualis, sic, vt
 interdum frigoris permisti sensus adsit: cæterum dormiendi ac-
 cedit cupiditas: nulla autem sitis, neque sudor primis diebus, ne-
 30 que integritas ex toto sequitur: nonnullis, cùm accessio incipit,
 vel stomachus dolet, vel anima deficit: pulsus autem in ea paruus,
 tardus, languidus apparet, præsertim accessionis initio, & aug-
 mento: eò quod calor natiuus per humoris frigidi, crassi, visco-
 siq; agitationem valdè prematur. postea verò frequens euadit,
 35 sed minùs quàm in tertiana, aut quartana: quanquam velox simi-
 liter, vt in hac, nec non inordinatus existit, magis autem quàm in
 alijs febribus inæqualis. In sequenti accessione modicus sudor
 erumpit, stomachus assiduè dolet, vrina initio alba, tenuis, vel
 crassa, ac turbulenta: postea rubra, crassa, turbidaq; cernitur: to-
 40 tum corpus torpidum, atque graue redditur: alius liquida, cruda,
 & pituitosa deijcitur. Accessio quotidianæ, magna ex parte
 horis octodecim, eaq; modico sudore finitur, Ex illa intermittit:

*FEBRIM
notæ singularium*

*QUOTIDIANA
notæ febris signa.*

raro autem ad integritatem peruenit: at totius morbi curriculum sexaginta quatuor diebus absoluitur. paucis id genus febris, imò vix centesimo cuique obuenire solet. Nam cum quis quotidie febrim experitur, ea potius duplex tertiana censenda erit, quam quotidiana. **MATHE T.** Quisnam humor illi generandæ proprius existit? **GERON,** Pituita, quæ vel intestinis, vel mesenterio insidet, vel circum ventriculum, & cauam viscerum regionem coacta putrescit, quanquam rarissimè, & febrilem qualitatem induit, motaq; quotidie peculiarem suum vaporem, propriam accessio-
 nis materiam, in totum corpus effundit. **MATHE TES,** Quinam ad
 febrim hanc sunt procliuiiores? **GERON,** Qui copiosiore pituita
 scatent, natura, vel ætate humidi, otiosi, somnolenti, crebris bal-
 neis, vel cibo frigidiore, magisq; humido, & potu intemperan-
 tius vsi: præsertim pueri, senes, & foeminae, tempore hyberno, coe-
 lo nubilo, & pluuiis, si pituita è capite in ventriculum sæpè destil-
 lat. si, cum febris primùm inuadit, facies sit subliuida, tumidaq;
 stomachus diù imbecillis, qui cibum fastidiat, & acidum frequen-
 ter ructet. adhæc si præcordia tumescant, vel inflata sint, & inten-
 ta, siquæ initium accessio-
 nis in vesperam incidat. Hæc febris dif-
 ficulter remedijs discutitur, sedij, & periculorum plena: tutior au-
 tem illa est, in cuius exordio, pituitæ vomitus sponte prouenit, &
 in declinatione largus sudor prorumpit. His signis quotidiana,
 prima sæpè accessione dignoscitur, præsertim cum eius generis
 febres similes, publicè grassantur. **MATHE TES,** Quæ aliæ febres
 ad hoc genus referuntur? **GERON,** Epiala, in qua calor & frigus,
 hoc est, rigor, & febris, vniuersas corporis partes eodem tempore
 infestat. **MATHE TES,** Quæ huius causa esse censetur? **GERON,** Pi-
 tuita acida, vitreaq; putrida, cuius pars iam est incensa, altera verò
 nondum putredinem experta. Iam continuæ, quæ nonnunquam
 biduum, aut triduum perseverant, & qualescunque intermitten-
 tes varijs modis inuadunt, internæ, extremæq; partes sæpius ex
 horrore, atq; rigore inalgescunt, aliquando interiores frigore in-
 horrescunt, aut rigent: cum tamen exterioribus non frigus, sed
 solus calor, & æquabilis in eis deprehendatur: aliquando extrema
 frigent, interiora vruntur, adeoq; ægri sitiunt, vt etiam in horro-
 re potum quotidie desiderent: eò quòd tunc horroris materia
 acris, & salsa existat. **MATHE T.** Ex quo humore, vbiq; sito, febris
 tertiana vera nascitur: quibusque signis ab alijs distinguitur? **GE-
 RON,** Ex flaua bile putri, ac superuacanea: quæ vel in vesicula fel-
 lis, vel circum præcordia, cauamq; viscerum regionem contine-
 tur: cuius etiam portio aliqua ex illis interdum in venas influens,
 sanguini admiscetur: adhæc quando in venas cum impetu e-
 rumpit,

*Quotidiane hu-
 mor peculiaris
 quo in loco.*

*Procliues ad quo-
 tidianam.*

*EPIALA fe-
 bris.*

Epiale causa.

*TERTIANA
 vera ex quo hu-
 more nascitur, et
 quibus signis ag-
 noscitur.*

- rumpit, sicut in arquato, tertianaq; febris, & nonnunquam etiam in continua, alijsq; id genus morbis, non sanguini, sed eius sero in totum permiscetur. Nam in istis affectibus si vena incidatur, sanguis ille ex quatuor mistis humoribus conflatus, purus, atq; syncerus apparet (nisi aliunde vitiatum fuerit) aut luteo bilis colore infectus. Hoc modo bilis illa superuacua, nusquam cum sanguine videtur con crescere, vt quæ tota in serum transferatur, eiq; tanquam vehiculo insideat : nisi quòd minima eius portiuncula in spumam conuersa, summo sanguini supernatet. ob quam eius permistionem, vrinæ in his febribus admodum crassæ, atq; luteæ cernuntur. *MATHESES*, Qui huic tertianæ intermittenti sunt obnoxij? *GERON*, Iuuenes, natura calidi & sicci, graciles, quiq; media plærunque æstate, sub sole inurente inambulant, aut vigilijs, aut laboribus, aut curis, cibo parco, calido & sicco, assueti sint, ac iecore admodum calido præditi, præsertim etiam in regionibus, & cœli tempestatibus similibus. Accedit hæc febris magno cum rigore, quo totum sæpe corpus concutitur. sub eius finem bilis exagitata per vomitum reijcitur: deinde calor statim inualescens, in totum corpus diffunditur, & ad statum prope tractatædè acris & pungens, vt manum iniectam tanquam acu feriat, breui autem remittit: æger calore æstuat: adè, vt corpus nudet, & huc illucq; iactitet, spiritum difficulter trahat, siti crucietur, frigidamq; desideret, vigilijs capitisque dolore torqueatur: in iram, & furorem procliuius. *MATHESES*, Quot horis durat accessio? *GERON*, Vt plurimum duodecim: aliquando septem, aut quatuor, pro humoris crassitie, & copia, viriumq; robore, ac facili cutis perspiratur: ipsaq; nunc cum sudore calido, & vaporoso, nunc flauæ bilis vomitu, aut deiectione, nunc sanguinis è naribus profluuiio inclinatur, & pura eius sequitur integritas. *MATHESES*, Qualis pulsus in hac apparet? *GERON*, Per initia accessionis paruus, postea velocior, ac frequentior quàm in alijs, eò quòd refrigerationis maior insit vsus, nec non vehemens & validus, aliquantum verò durus, ob materiæ siccitatem, non multum inæqualis, tùm tenuis materiæ gratia, quæ faciliè accenditur, tùm quòd arteriæ eleuatio non minus refrigerare, quàm submissio putrida expellere desideret. *MATHESES*, Qualis vrina in eiusmodi febre excernitur? *GERON*, Subtenuis, flaua, aut flammea, foediq; odoris. atque hæc sanè pura, & legitima tertiana est, quæ septem circuitibus, siue diebus, vt plurimum quatuordecim finiri solet. *MATHESES*, Quare legitimam eam appellasti? *GERON*, Quia alia quædam spuria, falsaq; & illegitima deprehenditur, quæ longior est, quàm altera, neque ardores equè vehementes habet, neque sudores perinde copiosos, nec

Accessio tertianæ qualis.

Pulsus tertianæ febris legitimæ.

Vrina tertianæ legitimæ.

Tertianæ veræ circuitus.

Tertiana cur legitimæ dicitur.

admodum calidos profundit. Adhuc nullę in ea accessiones certo ordine præuertunt, aut remorantur: rigor quoque minüs in ista vehemens, sed diuturnior affligit, nec totum ex æquo corpus occupat. accessiones ipsius singulę, longiusq; horis quatuordecim perdurant: totum eius curriculum, nunquam septimo circuitu, 5 raro decimoquarto die, sæpè longiore temporis spatio soluitur. MATHETES, Vnde ista contrahitur? GERON, Ex bile, modò vitellina in ventriculo putrescente, firmitusq; affixa: modò ex bile cum pituita mixta, eorq; vtriusque humoris inditia representat. MATHETES, Quænam est quartana, & quotuplex, vndeque prouenit, ac quibus notis singulę eius species, inter se distinguuntur?

Tertiana illegitima vnde.

QUARTA. na febris.

GERON, Omnes quarto quoque die cum horrore accedunt, aliàs in æstate, aliàs in autumnno, vel in hyemis initio: in vtroque autem tempore, ex humore melancholico putrescente, aut ex flaua bile adusta procreatur: aliquando etiam ex pituita, aut sanguine perusto: quanquam rarius, idq; in omnibus, natiuo calore iam ferè destitutis. Ideo alia ex seipsa oritur, quæ tamen lienis tumori succedit, qui ex naturalis succi melancholici abundantia, natus est: alia verò ex alijs febribus vel continuis, vel intermittentibus erraticis, prouenire solet: id quod Hippocrates hisce verbis 20

» memoriae prodidit. Intermittens febris, eaq; erratica, in quartanam conuertitur, præsertim si autumnus in propinquo est. Nam humor, qui antea febrim generauit, si nondum integrè discussus fuerit, sed aduri, & crassescere inceperit, atq; bilis naturam induit, & putredinem expertus, quartanam excitat. MATHETES, Qui nam ad hanc sunt propensiores? GERON, Qui humorem melancholicum contraxerunt, utpote lienosi, & in quibus febres ardentes, vel erraticę, ad integritatem ex toto non venerunt: imò etiam illi, quibus atra bilis in mesenterio, & præcordijs abundare solet, nec non frigido, siccoq; gracili, & glabro corpore præditi, ætatis iam constantis, vel declinantis, solliciti, tristes, & melancholici: item cibus crassus, robustis, & grauib; diù vsi, præcipuè in autumnno, & regione cæliq; statu inæquali. Hæc febris cum horrore accedit: qualis magno ex frigore nasci solet. ille autem successu temporis eousque augefcit, donec in vehementem rigorem degeneret: sub quo corpus totum intremiscit, atq; concutitur: dentes strident, ipsaq; ossa quasi tunduntur, & in alto aggrauescunt. at rigore iam decedente, vomitus magna ex parte sequitur, ac corpus statim incalescit, sic vt etiam ossa intima, frigus quoddam percipiant. Calor in hac febre non adeò vehemens, vt tertianæ, 40

Ad quartanam propensiores qui.

Quartana accessio.

Frigus.

Calor.

sed ardentior quàm quotidianæ existit: neque in toto corpore æqualis, sed cum frigore quodam permixtus, sic vt artus ossaq; indole-

- dolescant. Porro capitis dolor, vigilia, & sitis, minus quàm in tertiana: magis autem quàm in quotidiana affligunt. præterea accessio quartanæ, longior quàm tertianæ & quotidianæ deprehenditur, copiosisq; sudoribus terminatur. *Pulsus.*
- 5 celsionis initio rarus, tardus, & languidus percipitur: paulò post magnus, velox, frequens: inæqualior autem quàm in alijs febribus. *Vrina quartanæ febris.* MATHETES, Qualis vrina quartanam indicat? GERON, Primis diebus tenuis, alba, & aquosa: posterioribus incerta, & essentia, & colore, & contentis: eò quod materia plerumque variet, &
- 10 huius, nunc minima portio, nunc maxima in venas irruat. MATH. *Quartana quante diu duret.* Quando totum quartanæ curriculum perseuerat? GERON, Non ultra annum, nisi virio aliquo prorogetur: sæpè mensibus sex, interdum tribus soluitur: sepiusimè ea quæ autumnò, totaq; hyeme rectè curata fuit remedijs, proximo vere desinit. quantquam autumnalis semper longior, quàm æstiuæ existat, maximè si hyems in propinquo sit. Est cum quartanas in biennium vsq; vel in quin
- 15 quennium, vel longius porrectas viderim: quæ scilicet ab humoris istius melancholici natura, degenerassent. sed hæc febres veræ, ac exquisitæ dici nequeunt, sicut neque quintanæ, aut septimanæ,
- 20 vt quæ rariores circuitus, obtineant. Nam his materia melancholica, valde crassa ac terrestris attribuitur, qualis à pituita exusta gignitur. paucæ sanè illa in parte quadam remanens diu coarctatur, vnde tardior fit accessio. Tales quartanæ ex dissimili humore, alia in sede, quàm in venis consistente, proueniunt. MATHETES,
- 25 Simplicēsne febres quartanæ, eandem semper formam, & statum seruant? GERON, Magna ex parte, sed nonnunquam variant. nam ipsæ quandoque à leui frigore exoriuntur: deinde leui calore mitius procedunt, vt sex tantum horis protendantur. Hoc autem animaduertendum est, quartanam ægris nunc esse periculosam, nunc securiorem, nunc salutarem. MATHET. Cur periculum
- 30 minatur? GERON, Quia ipsa non quiescere dicitur, nisi viscera aliqua antea vitariit. adhæc quod rarò sine lienis obstructione, vel dolore, vel duritie inuasisse aliquem visa sit. Si nanq; vel cum tumido liene infestat, vel nimium inueterascit, corpus aqua subter
- 35 cutem replet, fereq; æger his symptomatibus oppressus, interit. Et si quartana ex cruditate in quotidianam degenerauerit, magnum portendit exitium. Quinetiam, si quis à quartana conualuerit, & eo die, quo ille febricitare solebat, frigus, aut calorem, aut cruditatem, aut lassitudinem expertus fuerit, recidiva ei timenda
- 40 erit. MATHET. Quare ad secundam valetudinem præstare aliquid corpori, aut commodare potest? GERON, Quia interdum à magnis morbis tutum, liberumque reddit, qui enim quartana labo-

*Quartana curiosa
lutaris.*

rant, hi neque insania, neque melancholia, neque lepra, neque neruorum distentione, ob repletionem orta, tentantur: imò eadem hæc vitia, si antea fuere, quartanæ accessione finiri consueuerunt. Denique nullum ab ipsa extingui, nisi sua ipsius, aut curantis culpa, posse commemoratur. **MATHESES**, Si nihil aliud de simplicibus febribus intermittentibus habes: compositas, quæ & quot sint, velim interpreteris.

COMPOSITÆ
sæ febres quæ,
& quot.

CONFUSÆ.

GERON, Ex simplicibus bifariam procreantur: aliæ ex multis confusis, aliæ ex implicitis. **MATHESES**, Quæ sunt confusæ? **GERON**, Quæ sic coniunguntur, miscenturq; vt pariter tum incipiant, tum desinant. **MATH.** Vnde huiusmodi febres generantur? **GERON**, Diuersis ex humoribus, qui eadem in sede permisti, confusiq; simul computrescunt. **MATHESES**, Quibus proprijs singulæ notis dignosci possunt? **GERON**, Nullis seorsum, sed confusis, atque eiusmodi febres illæ sunt, quæ falsæ ac spurix superius à me appellantur. Quæ ex æquali confusarum mistura constant, nulli ferè certo generi ascribi possunt: quæ verò ex inæquali, ab ea quæ excellit, ac potior est, nomenclaturam acquirit. Idcirco, quæ ex am-

Tertiana illegitima.

Quotidiana spuria.

Quartana falsa.

IMPLICITÆ
quæ, & quomodo
siant.

pliore bile putrida, quàm ex reliquis humoribus constiterit, tertiana illegitima nominari debet. quæ autem ex copiosiore pituita non sincera, sed alterius quoq; putridi humoris participe conflata est, quotidiana spuria: ea verò quam humor melancholicus putridus, alijs quoque humoribus admixtus, excitauit, quartana impura, seu falsa nuncupatur. **MATHESES**, Quæ febres ex compositis, implicitæ vocantur? **GERON**, Quæ diuersis horis, & incipiunt, & desistunt. **MATHESES**, Vnde singulæ nascuntur? **GERON**, Ex sua quæque materia: quanuis nonnullæ accessionum partes, in idem tempus concurrant, diuersi tamen istas humores gignunt, propria quicq; sede essentiaq; & motu donati. **MATHE.** Quomodo continua, cum altera continua iungitur? **GERON**, Sic vt confundatur, non autem implicetur. nam humores vtriusque in venis maioribus computrescunt, ibiq; agitati permiscentur. intermittens autem cum altera intermittente, & continua, implicari solet.

INTERMITTENTIUM
differentia
sæ tres.

MATHESES, Quomodo? **GERON**, Cum tres sint vniuersæ intermittentium differentiæ, vt quotidiana, tertiana, & quartana: hæ singulæ cum altera, vel eiusdem, vel diuersi generis implicari, misceriq; possunt: ex similium quidem generum implexu: duplex quotidiana, in qua duæ accessiones quotidie sunt. quanuis autem ea valde sit rara, tamen accessionum specie, & symptomatis comitantibus discernitur. item duplex tertiana, admodum frequens, quæ etiam duas quotidie habet accessiones, sed neque pares, neque isdem horis. nam quæ diebus imparibus sunt, similes ferè

inter

inter se existunt: quæ verò indies pares incidunt, dissimiles. *MATHE-
TES, Vnde duplex ista tertia incipit? GERON, A simplici
propemodum: cui deinde altera quoque accedit, & implexarum
vna prior altera remanente finiri solet. Quartana similiter du-
plex, vel triplex, non minùs frequens est, quàm tertia: duplex
autem duobus diebus accedit, vno intermittit: triplex quotidie
accessiones, sed rarò pares habet. MATHE-
TES, Vnde vtraq; pro-
uenit? GERON, Etiam ex simplici: cui deinde aliæ duæ illis se ad-
iungunt, applicantq;. MATHE-
TES, Quomodo hæc omnes inter se
distinguantur? GERON, Typo quotidiano: eò quòd huius quidem
accessiones, sibi inuicem respondeant, harum verò inter se sint
dissimiles. Quauis autem interdum similes appareant: mouendi
tamen impetu, & signis suprà dictis internoscuntur. non enim
duplex tertia & quotidiana, neque triplex quartana simul, &
duplex tertia, aut quotidiana, easdem inter se accessiones ha-
bent: cum neque similes causæ euidentes, humoris melancholici,
neque bilis aut pituitæ abundantiam efficiant. GERON, Quando
intermittentes diuersi generis implicantur? GERON, Admodum
rarò, vt quotidiana, & tertia: hæc & quartana. sin autem ali-
quando euenerit, primis diebus ægrè deprehendi potest. inter-
dum tertiæ intermittens continuæ adiungitur: atque hæc à
tertiæ continua discrepat: quòd ista sine horrore, & rigore in-
uadat, nulloq; sudore remittat: illa verò à rigore incipiat, & cum
sudore desinat: non tamen, vt in intermittente sudorem integri-
tas, sed alterius continuatio, sequatur. MATHE-
TES, Estne alia adhuc
febris composita? GERON, Est nimirum, quam nuper semitertia-
nam vocaui, ex continua quotidiana, & intermittente tertia
prognata. ea sanè cum horrore inuadit, remittit autem cum sudo-
re: sic tamen, vt corpus ægri, ad integritatem non veniat. Quia
verò ex intermittente & continua constat, duas vno die accessio-
nes habet. in primo quidem grauius ægrum affligit, vt quæ hor-
rorem, rigorisq; aliquid bilis vomitionem, vel deiectionem, ma-
gnumq; ardorem, & madidi vaporis halitum sæpe inducat. altero
die quo frigus potius quàm horror incidit, leuius, ac neq; sitis, ne-
que ardor multum infestat. quòd si materia, intermittētis tertia-
ne, & quotidianæ cōtinuæ fuerint æquales, exquisita ac vera erit se-
mitertiana. eodem modo si quotidiana intermittens, tertiæ con-
tinuæ iungatur, semitertiana exquisita erit, & superiori alsimilis,
præsertim si vtriusq; humores fuerint æquales. sin autem altera
illorum superet, exquisita non erit, neque pura. Rarò sanè febris
illa semitertiana inuenitur, sed grauius periculum, vbi hominem
occupauerit, minari solet. MATHE-
TES, Quæ aliæ febres adhuc restant?*

*Tertia duplex
vnde.*

*Quartana com-
posita.*

*Compositarum
accessio diuersa.*

*Intermittentes
quomodo impli-
centur.*

*SEMITER-
tiana composita.*

*Semitertiana
vera.*

HECTICA
*febris.**Hectica febris*
*auctor.**Hectica febris*
*materia triplex.**De lamis.**Febris marcida*
*differentia.**Hectica qui ob-*
noxii, & quomo-
*do inuadat.**Hectica notæ pri-*
mi ordinis.

GERON, Primum ea, quæ græcis *ἐκλυή*, dicitur, caloris naturæ contrarij in corde ipso inherentis, fixi quæ soboles. MATHE T. Soline vitali principio calor iste, qui febrem talem generat, inhaerescit. GERON, Minimè, sed etiam reliquas partes similes obsidet. quia intemperies in corde concepta, reliquo statim corpori etiam im-
partitur: longè autem firmitus in eo, alijs quæ solidis partibus, quàm
vel in spiritu, vel in humoribus infixæ est. MATHE. Quis ergo ve-
rus hectice febris auctor existit? GERON, Calor elementaris supra
naturæ modum adactus, non autem diuinus (de quo antea dixi)
sic tamen, ut ille hunc, & quicquid similari parti insidet, processu
temporis absumat exhausti quæ. Constat autè febris illa triplici ma-
teria, nempe spirituali, humida, & solida. humida rursus triplici,
ut carniosa, siue humore elementari concreto, & primogenia, seu
peculiari natiui caloris essentia: in qua ille, & spiritus consistit: po-
stremò aquosa, seu elementari, qua solida materia ceu glutino
coagmentatur. Cum itaque febrilis calor hominem inuasit, tripli-
cem quasi ordinem seruare videtur: primum sanè, quo carnosam
partium similarium partem duntaxat incendit, nihil quæ adhuc ex
ipsa, aut certè exiguum dissipauit: secundum, in quo eadem iam
magis ac magis, ac tandem ex toto consumitur: tertium in quo
calor ille post carnosam materiam assumptam, humorem primo-
genium palam depascitur. atque tunc febris hectica, seu marcida,
græcis *μαρμαίδης*, appellatur. MATHE TES, Quomodo hæc, mar-
corem iam experta à prioribus discrepat? GERON, In ea calor na-
tius, ac spiritus, qui humore illo primogenio fouetur, & facultas
omnis inde prodiens elanguescit, tandem quæ emoritur, sic ut etiam
totius corporis vires, eius quæ functiones collabantur, intercidant-
que. hac laborantes nulla medicina periculo subtrahit. Quicquid
enim humidi illius primogenij, ex semine humano contracti, ab-
sumptum fuerit, nunquam restitui potest, sed homo longè antea
interire cogitur, quàm melior eius portio disperdita fuerit. MA-
THE TES, Qui ad hecticam sunt propensiores? GERON, Calidior
& siccior natura præditi, iracundi, tristes, laboribus dediti, æ-
stum, sitim, & inedia experti. MATHE TES, Quando hectica ve-
ra, & simplex inuadit? GERON, Vel statim ab initio, vel diariè suc-
cedit. nam ubi causæ iam dictæ leuiore fuerint, hanc excitant:
ubi vehementiores, illam, quàm primum solidæ partes inflam-
mantur. MATHE TES, Quæ primi ordinis, hecticæ febris notæ
existunt? GERON, Si causæ vehementes manifestò antecesserint,
& febris exacto iam triduo, aut quatrinduo æqualis, siue eximio, 40
vel augmento, vel decremento perseverat. Ideo quoque sine do-
lore inuadit, & æger vix se febricitare existimat. quanquam vires
eius

eius valdè languescant: calor exterioris corporis tangenti, primū
 mitis ac blandus, deinde acris & rodens percipitur. pulsus exigū-
 us, frequens, & languidus apparet: arteriæ autem calidiores sunt,
 quàm partes eius vicinæ, præsertim cū ille attolluntur. calor
 5 in ægro, hora vna post cibum assumptum intenditur, & pulsus
 celerior ac frequentior euadit: illo autem iam concocto, elabora-
 toq; hic ad pristinam æqualitatem reuertitur. Secundi ordinis *Secundi ordinis
 signa hectica.*
 hectica, inditia sunt præter superiora, quod cū cor siccus red-
 datur, corpus iam euidenter colliquescat, & absumatur: pulsus in
 10 eo minor, languidiorq; multò, quàm in primo: nec non durus &
 densus existat. vrinæ, pinguedo quædam araneorum telis similis
 innatat, cutis non rugosa, neque mollis, sed vt cæterę partes soli-
 dæ, arida, squalidaq; existit. Tertium deinde ordinem hectica, *Tertij ordinis in-
 ditia.*
 seu veri marcoris, oculi nimium concaui, & ossa quæ ipsos ambi-
 15 unt, prominula testantur: item palpebræ adeò sunt aridę, vix vt
 eleuari possint, crebroq; sed sine somno conuiuent: neque tamen
 is status somnus est, sed dormiendi impotentia: tempora sunt col-
 lapsa: frigidæ calidæq; aures: cutis circa frontem dura, intenta,
 aridaq; facies pallet, liuescit, & colorem viuidum decoremq; ami-
 20 sit. imò totum corpus veluti cadauerosum apparet, quod nihil
 præter ossa, membranas, & cutem ipsam, corij instar induratum ha-
 bet: capilli celeriter crescunt, & magnus pediculorum in ijs pro-
 uentus est: præcordia sursum ad thoracem conuulsa videntur:
 venterq; in totum contractus, & inanis, sic vt eo detecto, neque
 25 intestinum, neque viscus vllum superesse, censeatur. *MATHETES, Pulsus febris he-
 cticæ.*
 Qui pulsus hanc febrem indicant? *GERON, Paruus, frequens, &
 languidus: maximè verò durus. vrina instar olei per summa pin-
 guis. Corporis totius moles adeò contabescit, vt ossa extrema,
 præsertim scapulæ, veluti promineant. atque ista hectica omni-
 30 nò simplex est, nulliq; permista, quæ rarissimè incidere consuevit.*
MATHETES, Sūntne aliæ his frequentiores, magisq; consuetæ?
*GERON, Est quæ acutam ardentemq; excipit, & putredinem ha-
 bet commistam. Quando enim vehemens renum febris ardor,
 ægerq; natura calidus siccusq;, in ediam, aut sitim sustinet, nullo
 35 autem refrigerio illi succurritur, venenosa similium partium
 materia colliquatur, febrisq; illum inuadit, & breui consumit,
 quoad simplex hectica paulatim efficiatur. At succedit etiam ter-
 tia hectica species, ex partis cuiusdam vitio, vt ex iecoris, lienis,
 ventriculi, pulmonum, thoracis, renum, vel intestinorum inflam-
 40 matione non benè curata, præsertim si purulenta euaserit. hæc au-
 tem propria hectica censi non potest, sed pars symptomaticę fe-
 bris, ac lenta plerunque. *MATHET, Quorsum hoc genus, atq; alte-**

*Altera hectica
 febris species.*

*Tertia hectica
 species.*

rum præcedens referri debet: GERON, In simplicis hæcticæ genere contineri nequit: quia vtrunque natum est ex putredine, quam etiamnum diu testatur, eò quòd eius inditia in pulsu, in vrinis, in siti, & alijs symptomatis remaneant: nec non crebræ accessiones etiam sine cibo fiunt: item inæqualitates, & crebri horrores, præcipuè, quando puris facta erit collectio. MATHETES, Quid de febribus, & alijs quibusdam macilentis hominibus dicis? illine etiam febri hæctica laborant? GERON, Quemadmodum primum carnis humor, deinde primogenius, febris calore, ita quoque etatis decursu, soloque interdum senio, & naturali siccitate citra febre- 10
m, citraque dolorem absimitur, arborum vetustarum modo. MATHETES, Habésne adhuc aliquid de febribus, alijsque vitijs notatione dignum?

GERON, Habeo. sed de hoc aliàs in commentario de pestilentia tractaui: ne autem quid hoc in loco desideres, pauca ex illo 15
repetam. Dug sunt perniciosarum febrium species, siue continue, siue intermittentes, si Hippocrati credimus, vbi scriptum reliquit. Multa insuper alia febrium genera, vagabantur, tertianarum, quartanarum, nocturnarum, continuarum, & hæcticarum.

PESTILENTIA
vera nunc abs-
que febre, nunc si-
mul cum ipsa,
nunc post ipsam.

MATHETES, Quomodo peculiariter ipsæ vocantur? GERON, 20
Latinis malignæ, & pestilentes, Græcis κακοήθεις, & λοιμώδεις πυρεταί. neutra tamen veræ pestilentia nomen meretur. nam hæc etiam sine febre per initia esse potest, licet postea illam habeat subsequen-
tem. MATHETES, Quæ est maligna febris? GERON, Quæ

Maligna febris
quæ.

cor non modo calore naturæ aduersario, sed etiam venenata 25
qualitate infestat: cuius vis pernitiōsa, commutem putredinem febrium sobolem exuperat. MATHETES, Quæ est propriè febris pestilens? GERON, Quæ ex aëris corrupti veneno, cor

Febris pestilens
quæ.

Maligna febris
vnde:

primum suscitatur, deinde arterias per totum corpus inuadit. MAT- 30
HETES, Vnde maligna febris contrahitur? GERON, Ex humoribus, non solum putridis, sed etiam pernitiōsis. MATHETES, Vnde pestilens febris excitatur?

Febris pestilens
vnde.

GERON, Si ante ipsam pestilentiam inuasit, ex eadem ferè materia, qua maligna constat: si cum pesti-
lencia, aut post aduenerit, ex simili quoque causa, qua illa, progig-
niture, nempe grauis cœli, & infaustorum syderum aspiratione, 35
quæ aërem occulta quadam vi corrumpit: quanuis hic sæpius nullo vel odore grauis, vel nimio calore infectus, sed purus, tenuis, & frigidus, qualis in montosis asperisque locis & temperatis

Pestilentia si-
gna, seu causæ.

existit, morbum pestilentem etiam excitare solet. MATHETES, 40
Quæ aliæ pestilentia causæ recensentur? GERON, Praua aëris in-
temperies, non solum calida & humida, sed etiam sicca & frigida
vehementer. Nam si totius ferè anni tempestas, ob pluuias, nebu-

lasque

- lasq̃ humida, hyemis autem maxima ex parte non frigida, veris
 tepida, vt solet, æstatis calida existat: & ex ventis potissimùm Au-
 ster, isq̃ tam leniter spiret, vt vix percipiatur: idemq̃ ipse nubes
 interdum ex meridie in septentrionem polleat, tunc omnium
 5 maximè pestilens, & grauis censetur. Hippocrati eiusmodi tem-
 pestas austrina, pluuia, & à ventis silens dicitur, vt quæ humore
 suo corporis succos augeat, pro cuiusq̃ natura, & victus ratione
 procreatos: calore autem à natura alieno, illos putrefaciat, incen-
 datq̃, & quiete sua putredinem amplificet. Quò longiùs alia na-
 10 turæ contraria ab hac recesserit, tantò salubrior existimatur. ideo
 etiam non omnes anni tempestates pestilentiam, sed alios popula-
 res morbos gignunt. *MATH.* Quando fit pluuia anni tempestas, &
 humida? *GERON.* Cùm terra intus proprio calore humida, extrin-
 secus aquis, pluuijs, aut inundationibus fluminum, marisq̃ imbu-
 15 ta, à sole concalfacta, exhalationes calidas, & humidas multas con-
 tinuè expirat, nullis autem ventis perflatur. *MATHESES.* Quan-
 do item austrina? *GERON.* Cùm nulla in regione quàm meridio-
 nali, vapores calidos, & siccos, eosq̃ paucos edit. Si enim venti,
 multos halitus per aërem dispergant, tempestas pluuia, vel certè
 20 si non pluit, nubila efficitur. cùm autem ijdem venti nebulas non
 dissipant, nebulosa & caliginosa manet. *MATHESES.* Quid hæc
 anni tempestas calida, & humida in corporibus efficit? *GERON.*
 Cùm similem illis intemperiem insinuat, statim humores putre-
 facit, febrimq̃ putridam excitat: quæ ideo pestilens dicitur, quòd
 25 plurimas vno eodemq̃ tempore vehementer affligat, multisq̃
 interitum adferat. *MATHESES.* Quæ est tertia causa? *GERON.*
 Vapores impuri, cùm ex aquis & terra, vi solis, aliarumq̃ stella-
 rum sursum exhalantes, tùm ex alijs rebus putridis, & grauiter
 olentibus, quæ aërem etiam purum, vel aliàs veneno ex superio-
 30 ribus sensim vitiatum, vel alienis turbatum qualitatibus, magis
 adhuc inficiunt. *MATHESES.* Ex quibus aquarum vitij corrumpi-
 tur aër? *GERON.* Ex foetidis fluminum, amniumq̃, & riuorum,
 nec non lacuum, stagnorum, paludum (qui effluuiis carent) pisci-
 natum, & lacunarum exhalationibus. nam illæ solis ardore inca-
 35 lescentes, stando putrescunt. sic ex cloacarum, & latrinarum, luti,
 ac cœni, quæ publicis vijs aggregantur: adhæc herbarum & ole-
 rum, vt allij, cæpe, porri, bralsicæ, erucæ: arborum, vt nucis, & fi-
 cus putrescentium: item lini, canabis, & coriorum, quæ fluentis
 macerata sunt, graueolentia: insuper ex fimo, cùm aliorum ani-
 40 malium quæ domi aluntur, tum porcorum, anserum, anatium,
 columbarum, cuniculorum, præsertim si ædes angustæ sint. *Ex rerum subter-*
 Quinetiam ex subterraneo humore aër inficitur, dum is diutiùs
ranentū humore.

*Pluuia & humida
da anni tempe-
stas quando fiat.*

*Austrina tem-
pestas.*

*Tempestas calida
& humida.*

*Aër ex quibus
aquarum vitij
corrumpatur.*

Ex fimo.

in fibris, venis, & cauernis conclusus putrescit, sicut etiam ex fec-
tidis alijs locis, fodinis, barathris, speluncis, veterum ædificiorum
ruinis, pestilens expirat halitus. Quæ ratione Sardyniæ solum, mul-
tis, præsertim aduenis & peregrinis perniciosum est: sicut etiam
Britanniæ pestilentiam, quam ludorem Anglicum nominant, ad-
ferre solet. nam ex terra plerunque perniciosi morbi, quemadmo-
dum ex putridis, & mortiferis altorum scrobium spiribus, per
terræ motus expirantibus, erumpunt. quanquam aliàs solis
illæ non omnibus, sed ijs tantum, qui propius ad illorum spiracu-
la accedentes, eiusmodi vapores ac spiritus hauriunt, sint perni-
tiosæ. MATHESES, Ex quibus alijs aër vitiat, & pestilens euadit.
GERON, Ex putridis cadauerum, siue hominum, siue aliorum
animalium exhalationibus. nam illa extraneo solis calori exposi-
ta, facillè putrescunt, & sanie diffluunt: id quod in hominibus qui-
dem, post prælia commissæ, fieri solet, dum acerui militum in agris,
vel vbi complures fame, tum in oppidis, tum extra, confecti ene-
cti insepulti iacent: vel cum non pauci è naufragio, fluctibus
maris in littora proijciuntur mortui, inhumatiq; auib; & alijs
feris lacerandi, deuorandiq; relinquuntur: in reliquis autem ani-
malibus, cum innumeri equi in castris scatiuis mortui putrescunt,
sicut pisces, & bestię marinæ, ex mari ad littora eiectæ, vel propè
id in sicco relictæ, putrescunt. varijs autem modis, & temporibus
eiiciuntur: primò sanè, cum amnes terram inundantes, serpentes,
& inter hos, dracones in mare ipsum rapiunt: huius aqua falsa il-
los, cum ei non sint assueti, interimunt. quod ostiæ, cum Tyberis
Romæ supra modum exundasset, accidisse proditur. Iam loca ar-
dentia, quæ sub mari sunt, terræ motibus quassata, vapores quos-
dam aut flammæ euomunt, piscibus exitiales, sicut Auerrois eti-
am olim nigros, sulfur redolentes eiectisse commemorat. præte-
rea balenæ, & alijs magni pisces ex alto egressi, destitutiq; aqua,
& in sicco relictæ, mortui, & putrefacti, aërem foetore suo infici-
unt. idem fit, cum pisces, & aliæ bestię fluuiales, in calidis regionibus
aquis priuati, in limosis campis remanent, putrescuntq;. Sic
etiam in frigidis plagis, ex piscium cadaueribus aër vitiat, cum
illi ex aquis piscinarum maximo hyemis frigore, prorsus conglaciati,
exanimantur: deinde verno tempore, & æstiuo calore putrescunt,
quod olim in Germania accidisse legitur, quando non solum pisces,
sed multi quoque homines, & bestię grandiores, serpentesq;, ex
frigoris iniuria perirent. Non dico, quod aërex piscibus, & alijs
bestijs putridis subterraneorum lacuum, per terræ motus exhalantibus,
corrumpatur. Notum est illum quoque ex locustarum cadaueribus inquinari. nam innumerabilis interdum
etiana

Aër unde vitietur.

*Loca ardentia
sub mari prauos
vapores edunt.*

*Balenæ, & ma-
gni pisces aërem
quando inficiunt*

etiã turma per agros vagatur, ac herbis, leguminibus, fegetibus, fruticibus, arboribusq; longè lateq; depaltis, ob alimentum penuriam, aut frigus nocturnum, aliamq; ob causam, emoritur putrescitq;. *Humanorum cadaverum expirationibus nihil exitialis.*

5 Quanuis autem bestiarum istarum, aliarumq; putredinem expertarum vapores, aërem reddant pestilentem, tamen humanorum cadauerum putridorū magis, quàm aliorum animalium expirationes, hominibus sunt exitiales, vt bouum, bobus; equorum, equis infestæ. Frequenter etiã aër ex terræ & aquæ vaporibus corrumpitur, quos calidæ & humidæ anni tempestates, non solum in æstate, sed etiã in hyeme, autumnō, & vere, naturam suam non seruantibus, sicut etiã inæquales, & variæ gignunt, in quibus meridianis horis calor, nocturnis autem, matutinis, simulq; etiã vespertinis, frigus vrget, præsertim si mutationes illarum repentinæ existant. Pari modo fit ex ventis quoq;

15 inconstantibus, ad putredinem opportunis, vt Austrinis, & Subsolanis magis quàm Fauonijs, & Aquilonibus. quemadmodum ex crassis foetidisq; nebulis, & opacis nubibus. Summatim ex fœdo quarumcunq; rerum odore, primū aër, deinde homines, nō quidem subito, sed processu temporis inficiuntur. ac nihil est in

20 omni rerum humanarum numero, quod citiūs grauiusq; corpus quàm fœtor afficiat: nihil etiã celeriūs ac suauius recreet, quàm gratus odor. *Calide & humidæ anni tempestates.* MATHETES, At aër ipse putredinemne aliquando experitur? GERON, Nullam per se: quia nunquam conquiescit, nec totus, sed aliqua eius portio, idq; ex inferiorum elementorum

25 consortio: vnde fit, vt nonnulli semper etiã in sæuissimā pestilentia euadant, superstitesq; remaneant. aliās si ille vniuersus posset computrescere, omnes animantes, ad vnum vsque, non solum homines, interirent. Non itaq; tanta aëris putredo, quacunque de causa vnquam oritur, quæ sensu percipi queat, sicut in aqua & terra sæpenuerò deprehenditur, vt quæ odore fœdo innotescant.

30 MATHETES, Quid fœdi isti terræ & aquarum, aliarumque rerum vapores, & halitus sursum elati, efficiunt? GERON, Vbi aërem contaminarint infecerintq;, & nebulas nocentes, insolitasq; pepserint, omnem etiã humorem, qui ex aëre in terram defluit, insalubrem, & noxium reddunt: vnde postea fructus terræ natiuis viribus priuantur, malis autem imbuuntur, & ijs, qui illis vescuntur, maleficiū aëris participant. Quinetiam bestię, quæ in cibum expetuntur, morbosæ, & insalubres euadunt, & corporis nostri humores, pestilentię suscipiendæ opportunos accommodatosq; faciunt. Atq; hæc omnia facilius frequentiusque fieri solent, quando cœli influxus, & syderum status consentiunt. *Fœtor corpus afficit grauius.* MATHETES, Quarta pestilentię causa, quæ est? GERON, Venti, qui

Humanorum cadaverum expirationibus nihil exitialis.

Calide & humidæ anni tempestates.

Fœtor corpus afficit grauius.

Gratus odor.

aër an putrescat.

Fœdi terræ & aquarum vapores.

Syderum consentio.

Venti, causa est pestilentie.

non raro semina quædam pestifera luis, quocunque modo ortæ, ex vna aliqua regione infecta spirantes, in aliam adhuc integram perferunt: nunc Auster ex meridie in septentrionem, vt olim ex Ægypto in Atticam: nunc Subsolanus ex occasu in septentrionem, vt nostro tempore ex Anglia in Germaniam: nunc Zephyrus ex oriente in occasum. Quauis autem ventorum alij alijs salubrioribus sint, omnes tamen ex vna regione infecta spirantes, semina pestilentie in aliam, in qua aer bonus est, inuehere possunt, maximè autem Auster, deinde Subsolanus. **MATHESES.** Quid vocas

AER pestilens quid.

aërem pestilentem? **GERON,** Qui est contaminatus expirationibus, siue exhalationibus putridis (vt Galenus ait) vel putrida qualitate, vel putredine, vel pestilentie seminibus, eò quod ex his ipsa generatur, vel putrido calore, vel vaporibus calidis, vel putredine calida, quæ calidum venenum dici potest. **MATHESES.** Que est quinta causa? **GERON,** Inspiratio aeris vitiati, quem sæpè homines sani adhuc ex loco, in quo æger pestilentia correptus decumbit, præsertim ex hypocaustis Germanicis, quæ nullis patent fenestris, aut emissarijs, attrahunt: vel ægri pestilentia infecti halitus, afflatusq; aut frequens contractio, ex qua contagium per latentes corporis meatus, intro subit. Hoc autem veteribus fuit incognitum, nec hodie plerique apud nos credunt, morbum aliquem tam exitialem, ex vno in alterum absque aeris nos ambientis consensu, migrare posse. Quamquam autem in calidioribus regionibus, multò velocius hæc lues proserpat, tamen in frigidioribus etiam homines non sunt ab ea immunes, & securi. Multò minus illi persuaderi possunt, pestilentie contagionem ex ægrorum vestimentis, lectis, sellis, culcitris, puluinis, linteis, & similibus id genus rebus, in alios sanos per cutis spiracula, & odorem transmitti: cum tamen id iam dudum experientia manifestò comprobaret. Hactenus exteriores causas omnes audiisti. **MATHESES.** Cur pestilentia ex eisdem corrupti aeris causis orta, non vbique simul grassari, sed hic citius, illic tardius incipit? **GERON,** Ob regionum sortem, & aeris varietatem. Nam in planis, & calidis, vbi aer tenuis, lenis, mollisq; spirat, illa primùm infestare, postea in montosis, vbi frigidus, crassus, & validus existit, inuadere solet, nisi singularis quidam casus aliud adferat. **MATHESES.** Quænam sunt cause internæ, quas in sextum locum collocasti? **GERON,**

Contagium ex halitu.

In calidis regionibus homines facilius pestilentia consuecuntur.

Regionum conditio quæ pestilentiam promoueat.

Cause interiores pestilentie.

Pestilentia ex humoribus contagiosa.

Succi, siue humores corporis putredini obnoxij, si exigua quedam occasio ex aere ambiente accesserit. quauis autem illi etiam alijs putredinis, non pestilentibus febribus communes sint, & iidem vel copia, vel qualitate vitiosi, per viscerum obstructionem, & cutis angustiam putrescant: tamen in hoc genere eò prauitatis veniunt,

veniunt, vt perniciosæ luis seminaria inde generentur, quæ ab
 hoc ad illum transferuntur, non autem celeriter, nec longius, vt
 in ea quæ ex aëre originem habuit, sed tardè, & sola ægri contrec-
 tatione sit contagiosa. Fieri enim potest, vt aliquis febri pestilen-
 5 ti corripiatur, nemine alio in ea regione vbi degit, affecto, præ-
 fertim si aëris intemperies accedat: quia hæc similes humorum
 prauitates adauget, præcipuè in corporibus impuris, & putredi-
 ni opportunis. *MATHETES*, Vnde prauæ istæ humorum mate-
 riæ, quæ pestilentiam gignunt, prouenire solent? *GERON*, Ex no-
 10 xia victus ratione, quam vel immoderatus cibi, & potus etiam
 boni, apud nobiles & opulentos, vel continuus in salubris vitio-
 siq; apud egenos & pauperes, vsus, subministrat. hi enim (vt ni-
 hil de illorum intemperantia dicam) interdum per summam fru-
 gum inopiam, & annonæ caritatem, ordeum, auenam, secale,
 15 triticum, adorem, aliudue frumenti genus rubigine, ob cœli in-
 temperiem vitiatum, antequam maturaret, vel mucosum, vel pu-
 tridum, ex temporis diuturnitate redditum, comedere cogun-
 tur. imò quos etiam post eiusmodi frumenta per hyemem assump-
 ta, vere leguminibus, fabis, piscis, eruo, panico, cicere, & id ge-
 20 nus alijs in panificia reductis: nec non herbis viridibus, quas ne-
 mo vnquam, vt Galenus ait, ne gustandi quidem gratia assumere
 dignatus sit, radicibusq; stirpium, oleribus agrestibus qualibuf-
 cunque, & arborum, vel fruticum folijs, seminibus, ac fructibus:
 item carnibus, & piscibus putredinem expertis, vesci dura cogit
 25 necessitas: id quod anno sexagesimo secundo in pluribus Germa-
 niæ locis, & alijs sæpe in bellis accidere, consuevit. *MATHETES*,
 Ex solone vitioso cibo, tales prauis humores ad pestilentiam pro-
 cliues excitandam, generantur? *GERON*, Nequaquam, sed etiam
 ex potu vini immaturi, & corrupti, aquæ putridæ, & limosæ, cæ-
 30 nosæ, palustris, lacustris, stagnantis, vel eius per quam cloacæ, &
 latrinæ transeunt, cereuisiæ, vel alterius humoris minus salubris.
MATHETES, Quando autem eiusmodi humores putrescunt, cor-
 rumpunturq;? *GERON*, Vbi calor natiuus in alienum mutatur,
 quod ex solo aëre communiter accidit. nam is, aut vere frigidus,
 35 latentes cutis meatus coarctat, per quos corpus fuliginosa quæ-
 dam excrementa quotidie exhalare, & refrigerium caloris natiui
 attrahere consuevit: aut æstate calidus, inspiratione per asperam
 arteriam in pulmonem, & per exiguos istos meatus, in totum
 corpus ductus, cor calefacit: deinde in hoc conceptus, vndique
 40 cum spiritu, in vniuersas corporis partes per arterias diffusus, hu-
 mores putredini, aliâs ob superius dictam causam opportunos,
 statim putrefacit, vnde iterum febris putrida, ac pestilens gene-

*Humores prauis
vnde generantur*

*Vitus ratio no-
xia ad pestilen-
tiam.*

*Vinum immatu-
rum, & corrup-
tum etiam pesti-
lentiam promo-
uet.*

*Mali humores
quando putre-
scant.*

ratur. nec mirum, talem ex mali succi cibus oriri, cum id quod suis morbida egerit, pabulo immistum bobus, qui ipsum assumunt, pestilentiam facere possit: sicut ij, qui ex ventulis cadauerum ossibus contractis, medullas comederint, subito emoriuntur. MATHESES, Suntne omnes isti perniciosi humores, eiusdem generis?

Humores varij.

& naturæ? GERON, Minimè, sed hi sæui & feroces impetuosiq: vnde non ineptè à quibusdam furentes dicuntur, quos Græci ὀρυσίτας, appellant: illi verò quietiores, & maligni dici possunt, alijs quoque febribus non pestilentialibus communes. de vtriusq: Hippocrates in tertio de popularibus morbis libro, & Galenus in commentario, de bonis malisq: succis generandis, mentionem fecerunt. MATHESES, Refer primum Hippocratis verba. GERON, 19
 » Carbunculi aestate multi, ac quæ putrida vocantur, apparebant:
 » papulæ quoque magnæ, & alia serpentia vlcera: quæ autem ad
 » ventrem attinebant, multa multis incommoda attulerunt. atque 19
 » hæc de priore genere scripsit: de secundo verò in hæc verba locutus est: Aëri initio infestabantur, sopore, horrore, fastidio, febris
 » non acuta, nec magna siti, nec delirio: nares pauca stillabant, accessiones diebus paribus vrgebant: item obliuio, languor, v-
 » cisq: defectus, extremi pedes & manus frigidiores, præsertim circa 20
 » ca accessiones erant: quibus calor pedetentim, mens autem non
 » probè redibat, neque loquela: perpetuus sopor, non somnus, non
 » vigiliæ torquebant: alius plerisque eorum turbata, excrementa
 » non copiosa, sed tenuia reddebat: vrinæ multæ, & tenues excre-
 » nebantur: nihil decretorij, vel boni licebat deprehendere: non 25
 » sanguinis profluuium, non abscessum, ægri moriebantur incertò:
 » magna autem ex parte circa crises, quidam tardiùs, qui largiùs sudassent. MATHESES, Quæ sunt Galeni verba, de impetuoso ac furente humorum genere prodita? GERON, Alijs sanè vlcera per cutem erumpebant: quidam ex eis conualefcebant, quidam peribant. 30
 » MATHESES, Quid de altero genere scribit? GERON, Nonnullis nihil tale foras erumpebat, sed viscera intus obsedebat inflammatio quedam, aut febris maligna, ac omnes hoc malo correpti, interibant. MATHESES, Tunc horum auctorum sententijs fidem adhibendam esse censet? GERON, Maximè. Quemadmodum enim aer 35
 » nos ambiens, quocunque modo vitiat, humores tum prauos, tum bonos, probosq: etiam, vel spiritus, vel solidam cordis ipsius essentiam corrumpit, ita quoque duæ istæ humorum, quos iam recensui species, internæ causæ tantum, ac communes pestilentie esse iudicantur, si calor aliquis, humorq: aeris, vel contagium ac- 40
 » cesserit. MATHESES, Communes omnium pestilentie specierum causas, tum externas, quas partim etiam summas, partim inferiores

Pestilentie species non peculiaris res causæ.

res no-

res nominasti, tum interiores iam exposuisti: nunc peculiare singularum persequere?

- GERON, Quæ exanthemata, vel rubores culicum moribus, ac lenticulis similes repræsentat, primum ex aëris putredine oritur: deinde ex ægri contrectatione ad nos defertur, non tamen celeriter, nec ex fomite, nec è longinquo. atque hæc febris pestilens, sanguinem potissimum infestare solet, quod pustulæ per cutem apparentes demonstrant, & maligna à me superius appellata est. Verè autem pestilentes partim à causis externis, vt astris, aëre, inferiorum exhalationibus, & alijs modis infecto, aut ex seminarijs aliunde per aërem etiam salubrem inuectis, aut ex infectorum contagione: partim ex humorum in corpore nostro residuum putredine generantur, si aëris status, aut calidus, aut humidus, aut calidus & humidus simul accesserit, nec non ad alios conuersantes contagij ratione transferuntur. ambæ verò tam verè pestilentes, quàm malignæ febres, hoc inter se habent commune, quod etiam ex ægri anhelitus inspiratione, & fomitis contagio, per latentes meatus attracta procreentur, & spiritus officinas, aut certè subtiliores humores inquinare soleant. MATHEVS,
- Nihil amplius in causis pestilentie explicandis requiro, notas mihi nunc referas, primum, quas illæ cum alijs morbis non pestilentialibus, deinde quas inter se communes, postremò quas singulæ, sibi peculiare, habeant.

- GERON, Communes sanè alijs non pestilentibus sunt, horror totius corporis, deinde calor, grauitas, dolorq; capitis, cibi fastidium, sitis, vomitus, pulsus, & vrina sanis, plerumque similis, vt in diarijs, & quod ægri febrile se nesciant, vt hectici, idq; præsertim per initia, quando omnia placida & lenia apparent. MATHEVS,
- Quæ vniuersis pestilentie speciebus inter se communes sunt?
- GERON, Quod plurimi eodem tempore ob causam generalem, suo licet cuiq; generi peculiarem, affligantur, contagioneq; ab vno, vel paucis ad alios multos vagentur: etsi id non semper videri queat. adhuc quod omnes à reliquis febribus non pestilentibus in eo differant, quod humores magis malignos, quàm istæ habeant, & contagio astantes, vel assidentes inficiant, & plurimos, vel certè multos necent. Item quod initia ipsorum placida sæpè appareant, vt quando lues cum febre inuadit, ægri se febricitare ignorent, negentq;. imò etiam quod febris, licet processu temporis augeat, blanda tamen & lenis semper videatur, quauis ægri in angustia quadam conflictentur: item quod calor tangenti externam cutem rodens, ægro autem non tam acris, quàm morosus percipiatur. præterea quod pulsus, & vrina in plerisque

*Pestilentia sanè
guinem infestans
quæ, & vnde.*

*Malignæ febres.
Pestilentes verè.*

*NOTE Pestio
lentia.*

*Notæ communes
alijs febribus.*

Pulsus pestilentiæ.

Urina.

Aluus.

Spiratio.

Decubitus.

Febris interiora affligens.

Pestilentium febrium singularium indicia.

Morbi maligni in quo exanthemata erumpunt, notæ propriæ.

etiam sanis respondeant: quanuis peritum medicum fallere nequeant: quippe ille non citatus, non sublimis; sed pressus magis existit, vt qui vix atcollere se audeat: hæc iumentorum similis est, aut succo mali punicæ, aut tenuis, cruda, aut confusa, rubra. Diæctiones alui magna ex parte sunt liquidæ, corruptæq; & acrementis illorum consuetis, & humorum alienæ ac foetidæ. Spiratio solito longior, anhelitus peregrino quodam fetore grauis: decubitusq; supinus: dorsum perinde ac verberatum indolens; præcordia suspensa: caput graue; mens non constans. nam ægri sæpè multa, sed incompòsita loquuntur: oculi sunt leuiter rubentes, vacillantq; modò vigiliæ, modò somnus nimis vrget: lingua fordescit: vires conuelluntur. Postremò etiam pustulæ in cutè erumpunt, aut abscessus in glandulosis partibus iuxta alas, inguina, aures. Atque hæc sunt notæ pestilentia specierum communes, partim salutis, partim interitus nunciæ; ac veluti mediæ, multi enim, his quoque apparentibus, euadunt, sicut non pauci moriuntur. MATHE T. S. Quæ communiter exitium portendunt. GERON, Febris extra corpus quieta, interiùs naturam perturbans, cuius putredo altiùs sit condita: vnde omnis acrimonia, quæ foris apparere solet, multum obtunditur, & hebescit, humido copiosiore simul euaporante, & lentore magno facto. Adhæc delirium perseverans: sanguinis profluuium è naribus, quod nulla leuatio mali sequitur: vrinae retentio: copiosa alui diæctio, partim ab initio, vel per se, vel leui etiam medicamento facta: pustulæ, & abscessus siquidem eruperint, subito autem rursus delitescant, euanescentq;. MATHE T. Quæ singularum propria sunt indicia. GERON, Eius quæ ex aëre vitiatò sumit originem, & mediâ inter pestilentes verè morbos, & non pestilentes existit, eaque maligna potius, quàm pestilens appellatur, peculiare censeo, quòd iuuenes & pueros, eosq; nobiliores, vrbanos, & lautioris fortunæ magis, quàm mulieres, senes, agricolas, & pauperculos inuadat. Quia enim familiaritatem quandam, & similitudinem cum sanguine habet, quòd pustulæ rubræ per cutem apparentes demonstrant, calidiores, humidioresq; magis, quàm frigidos, siccos, carneq; densiores affestat, eò quòd hi meatus habeant apertiores, quibus aëris maior tum per nares, tum per anhelitum, sit attractio, vulgares autem tum victus frigidioris ratione, tum quòd cutem habeant laboribus indurata, siccamq;, ab hoc malo sunt tutiores. Quoniam verò eadem lues ex nullo fomite, aut seminarijs è longinquo, sed infirmi, contactu etiam ad alios transferri solet, ij qui inter homines versantur magis, quàm qui domi agunt, inficiuntur: longè tamen tardiùs, quàm in alijs. Adhæc calor in hac adeò mitis

- mitis ob sanguinem in quo consistit, percipitur, vt ægri vix medicum accersire dignentur. Etsi verò hic morbus alijs pestilentibus leuior sit, intus tamen etiam natura in eo, propter magnam putredinis euaporationem, quodammodo perturbatur, vnde
- 15 lassitudo quoque corporis, veluti in defatigatis oboritur, & vires conuelluntur, pulsus pressus, & humilis apparet: vrinæ primum exalbida, deinde rubentes, & confusæ, aut mali punici succo similes: deiectiones alui foetida, & liquida, copiosæq; ex leui etiam medicamento, præsertim primis diebus apparent: quia magna,
- 20 & latè fusa est putrefactio: ægri supini decumbunt: capite grauantur: sensus hebetes & obrutos habent: mente post quartum, aut septimum diem plerunque alienantur, multa loquuntur, & intra verba desipiunt: sitis nulla, aut certè exigua vrget: lingua est sordida: nunc vigilia, cum sanguis biliosior extiterit: nunc somnus, cum pituitosior, infestat: quarto & septimo die pustulæ in brachijs, dorso, & pectore erumpunt rubentes, sæpè puniceæ, pulicum morsibus similes, sæpè maiores, lenticulas imitata: vnde & nomen in Italia acceperunt. Status morbi nonnullis ad quartum decimum, & alijs vltra progreditur, ac natura interdum non so-
- 25 lum per cutis pustulas, sed etiam modò per sanguinis è naribus profluuium, modò per deiectionem, modò per sudorem exonerare se conatur. Excretio autem salubrior censerì debet, pustularum primum, vt ex qua multi euadant: quibus enim paucè erumpunt, aut vbi erupuerint, rursus delitescunt, ij intereunt, quia natura aut imbecillis est, aut materiæ non obedit. deinde sudoris, vt quò largius superueniente, magna pars seminariorū luis, vnà cum subtili sanguinis parte euacuetur. sanguinis autem profluuium è naribus, & alui deiectiones paucos admodum leuat: quoniam lues ista in minoribus potissimum venis, non in maioribus, aut
- 30 ventre continetur, eoq; natura sæpè frustra, id quod in illis vitiosum continetur, magno conatu expellere aggreditur. Malum etiam indicium est, cum vrina retinetur, quòd vel aquositas nimio calore absumatur, vel alio conuertatur, nempe in pustulas, aut sudorem, vel nimia redundantia humorum, aut crassities vias ob-
- 35 struxerit, vel etiam quòd vires deficiant. MATHETES, Quo pacto verè pestilentes dignoscant? GERON, Incipiunt hæ quidem ex omnibus causarum modis, vehementissimo cum horrore, vt aliæ biliosæ, contagij expertes, calore non exiguo subsequente. verum omnia quæ his superueniunt, longè sunt atrociora, quàm
- 40 in alijs etiam pestilentibus. Vbi autem venenum latius altiusq; diffusum fuerit, calor etsi aliquantò mitior tangenti, vt in alijs appareat, interius tamen ægri anguntur, conflanturq; vires eo-

Excretio salubrior que.

Note verè pestilentis morbi.

rum citissimè deficiunt, & paucissimis horis exitium imminet, præsertim cum vis pestifera spiritibus, aut cordi primum insederit. Aliquantò autem longius protrahitur malum, ubi humores primum, deinde spiritus inualerit. quanquam etiam pro humorum natura celerius, aut tardius grassetur. Pulsus rariore sunt, & humiliores, quàm ægritudo tanta poscere videatur: quia natura non audet arterias attollere, ne aditum veneno aperiat. Urinæ apparent turbidæ, aut albæ, aut sanis similes. nam vires tunc adeò imbecilles sunt, vt crassas illarum partes expellere nequeant, in quibus nubeculæ quædam pendeant. neque hoc solum in pestilentijs, sed in alijs quoque morbis videtur, quando mors in propinquo est, vel cum pestilens febris ex genere hecticarum est, aut earum quæ in spiritibus solum accenduntur, vel quia natura adeò debilis est, vt ex ea aliquid separare nequeat, ideoq; urinæ relinquitur, quasi nulla materia sit in corpore. Præter hæc deiectiones corruptissimæ, liquidæ, & fædi admodum odoris in ijs existunt. Cæterum abscessus in inguinibus, sub alis, aut iuxta aures potius, quàm pustulæ in hisce erumpunt, quia materia illarum magis furens est, quæ ab internis visceribus, iecore, corde, & cerebro foràs ad emissaria ipsorum incitatur: non solum autem ipsa furens, sed etiam quæ illi coniuncta est: quanquam interdum pustulæ quoque in vera pestilentia per cutem erumpant, præsertim cum ex sanguine habet originem. Nam hoc febres istæ verè pestilentes, cum alijs non pestilentibus commune habent, quòd nunc quotidianæ forma accedant, quando pituita: nunc vt tertiana, quando bilis: nunc vt quartana (etsi rarò) quando humor melancholicus: nunc vt continua, quando sanguis per aërem incensus, eiusq; contagio infectus est. In hoc autem non nihil ab alijs & malignis discrepant, interdum, quòd celeriores, vehementiores, et magis venenosæ, interdum tardiores, occultioresq; existant. Illo maxime ab omnibus alijs malignis non pestilentibus dissident, quòd magnis cum animi defectionibus incidant, earumq; lues virulenta quàm citissimè ad cor properet. hoc si admodum valens, & robustum fuerit, ad iecur illam propellit, si mediocriter, ad alas emit: hoc si etiam firmum existat, ad cerebrum transmittit: si mediocres vires habet, ad inguina trudit: si cerebrum facultatem suam excretitiam integram adhuc seruat, retrò aures deponit: si autem omnia viscera imbecillia fuerint, tota materia virulenta intus manet ista, ut neq; per abscessus, neq; per pustulas, neq; per profluuium ventris, aut etiam per sudorem, vt dictum est, excernatur, sed natura miserè excruciet: imò illa quanuis à natura ipsa ad extimas partes expulsa fuerit, hominem tamen, nisi ei tantam

Febres verè pestilentes, & non pestilentes quid commune habent.

Febres pestilentes & non pestilentes quomodo differant.

quam

quam crudelissimo hosti, omni remediorum genere fortiter occurras, statim iugulabit. Num autem pestifera lues, primum humores hos, aut illos, an spiritus, vel cordis ipsius essentiam infecterit, ita dignoscas.

- 5 Cum biliosos humores inuasit, maiorem hominum partem interimit: cum crassiores, ut sanguinem, vel exustum, vel purum, multos quidem, sed tardius iugulat, atque ægri cordis tantum angore conflictantur: nonnunquam sudores statim, & copiosas alui deiectiones: nonnunquam inguinum, aut glandulosarum parti-
 10 um, sub alis inflammationes, aut iuxta aures abscessus, quos Græci *μαρμαριδες*, appellant, experiuntur, vrunturque adeo, ut nihil graue, vel leue tolerare queant: omnia tegumenta abijciant: frigido in loco decumbere desiderant, cum tamen corpus extrinsecus non deprehendatur valde calidum. Rubri aliàs, aut pallidi: interdum pleni pustulis apparent, continuè vigilant: valde sitiunt: linguam habent aridam, & vruntur perpetuo calore, ut in febre continente: aquam frigidam tantum bibere, parum esse cupiunt: anhelitum grauius olentem habent: aërem continuè ob calorem, & difficilem spirationem attrahunt: deiectiones alui valde olidas,
 20 biliosas, nonnunquam aquosas, tenues, & pingues admodum excernunt: vrinam reddunt turbidam, aliquando aquosam, & tenuem, aliquando valde flauam, aliquando nigram, in qua nihil boni subsidet, vel in medio continetur, suspendeturque, sed pingue & oleosum quiddam: mente alienantur, animoque anguntur, & in-
 25 quieti sunt: sæpius conuelluntur, & tenduntur.

Pituitam quando malum inuasit.

- Cum somnus continuus vrget, lues pituitam, præsertim in cerebro obsidet: corpus torpidum est, & membra lassâ. In his etiam, sicut in alijs admonui, pustulæ rubræ, ut morsus culicum, aut maiores lenticularum instar, per totum corpus dispersæ, sanguinem lue infectum indicant. idèò adolescentes, pueri, & alij tenere nature, calidè & humidè, magis his corripuntur, quam mulieres, senes, laboribus dediti, frigido & sicco temperamento præditi, frigidisque cibis educati.

Humor melancholicus quando infectus.

- Quando melancholicus humor, pestifera contagione vitatus est, ægri tristes sunt, mœsti, solliciti præter consuetudinem, dolores, & molestias in capite sentiunt: mente alienantur, pulsum exiguum & profundum habent: abscessus, pustulæ, tumores, omnibus humoribus sunt communes, quacunque in corporis parte erumpant.

- 40 At cum putredo contagiosi aëris spiritus (quod tamen raro accidit) occupat, homo statim moritur, sicut antea dictum est: quemadmodum etiam ante viginti annos Lutetiæ Parisiorum

Spiritus contagione infecti putredo.

in Gallia vidimus, vbi homines per æstatem in plateis pestilentia correpti, subito interierunt: quidam intra viginti quatuor horas expirarunt. nam æger suffocari cogitur, nisi calor spiritus breui relinquat. atq; hæc pestilentia, feбри continuæ respondet. Calor in illa non est acris, neq; pungens, pectus tantum magis reliquo corpore calet, sed tamen tolerabiliter: pulsus non est in totum imbecillus, sed aliquantò velocior, quàm antea, non tamen adeò frequens, vt cum virus contagionis humores inuasit: vrina est naturali similis, nullus sudor erumpit, sed maior tantum in ceruice, & fronte. Lingua est permultum arida, & aspera, etsi nulla vehemens sitis vrgeat, nec singularis aliquis dolor. præterea ægri non sunt valde inquieti, nec se huc illuc iactant, eò quòd vis naturalis in totum prostrata sit: continug autem, animæ defectiones superueniunt, in his nullæ pustulæ, aut abscessus, aut papulæ exurgunt, sicut nec vllum lethale profluuium.

Cordis essentia cum pestifera lue conficitur.

Febris bestica.

At quando pestiferum virus spirituum receptacula, hoc est, cordis essentiam, & solidas partes aggreditur, febrim quasi hecticam infert, in qua calor quidem non est magnus, sed cor ipsum putrefacit, consumit, & ex toto ipsum cum omnibus ijs quæ insunt, extorrefacit. Qui ea feбри laborant, non putant se febricitare, eoq; non quærunt consilium: credunt se non indigere medico, aut alipta: sed per se posse conualescere. Pulsus eorum mediocris est, naturali propemodum similis: sed paulò frequentior imbecilliorq;: vrina item naturali serè respondet, colore, essentia, & eò, quod subidet. virus autem illud adeò cor ipsum obsidet, prostermit, & debilitat, vt nihil ampliùs noxium à se queat propellere. Ideo omnes qui tali feбри correpti sunt, intereunt: quanuis mente consent, nullo fastidio laborent, sed edant, bibant, nec vllò etiam sudore, dolore, profluuiò, abscessibus, pustulis, aut papulis grauentur. Atque hæc sunt peculiarìa, singularum pestilentia specierum, siue ab exterioribus, siue ab interioribus, siue ab vtriusq; causis ortarum indicia summatim comprehensa: vulgus sua habet communia, quibus hominem pestilentia correptum, ex quacunque causa cognoscit. MATHETES, Quænam illa sunt, nam aliquando etiam olitor opportuna locutus?

Communia pestilentia signa, quibus vulgus aliquem illa correptum cognoscit.

GERON, Grauitas totius corporis, lassitudo, & veluti defatigatio: nec non sollicitudo, & tristitia præter consuetudinem: difficilis respiratio: item magna ad somnum propensio, aut continuæ vigiliæ: dolores & molestiæ in capite, aut mentis alienatio: adhæc si extremum corpus frigidum, internum ardens: forma faciei horrida, & peregrino more peruersa. præterea cibi fastidium: immodica sitis: os aridum, & amarum: continuus vomitus: pulsus

fus exiguus, & pressus: vrina turbida, crassa, foetida, veluti iumentorum (quanquam sæpè clara cernatur) postremò abscessus & tumores retrò aures, sub alis, inter inguina: vel ardentès pustulæ alijs in locis, & exanthemata citra vllam manifestam occasionem,

*Signa salutiferæ
pestilentia.*

5 *exorta.* Ex his autem signis, quædam sunt communia alijs febribus, vt grauitas, lassitudoq; corporis, dolor capitis, mentis alienatio, fastidium cibi, magna sitis, oris siccitas, amaritudo & ariditas: reliquæ notæ sunt pestilentia: propriæ, inter quas abscessus, tumores, pustulæ, exanthemata, & sudores, spem salutis portendunt. Subitus autem acrepentinus solius cordis calor: crebræ animi defectiones: sudor niuis modò frigidus: inuistratus faciei color, qui statim mutatur: continua materia: nigræ, viridis, flauæ, aut ceruleæ vomitio: vrina plumbea, nigra, foetens: aluus atra, cineritia, pinguis, tenuis: dysenteria, lienteria, colica, conuulsio, apoplexia, epilepsia, laterum punctiones acres, tussis valida, tumores, pustulæq; mirabiliter coloratæ, ægrum in malis esse nunciant. *MATHETES,* Causas, notasq; pestilentia: omnes, iam memoria tenere mihi videor: reliquum est, vt declares, qua ratione & modo, singulæ ipsius species, ex illis generentur?

20 *GERON,* Intemperies aëris diuturna, & putredo ex aqua, terræ, aliarumque rerum exhalationibus orta, pestilentiam gignunt, dum pulmo quidem illas aspiratione attrahit, cordiq; vicino, cum distenditur, communicat: nares autem cerebro, & latentes meatus vniuerso corpori. Quòd si tota lues in cordis essentiam

Quomodo aër infectus vaporibus pestilentiam gignet.

25 deferatur, eam accendit, & febrem pestilentem hecticam procreat. sin ad humores qui in ventriculos ipsius per cauam venam influunt, deducatur, putrefacit eos, accenditq; & febrem putridam pestilentem excitat. Quemadmodum autem hectica pestilentia: expers, & putrida gigni solet, ita etiam pestilens hectica ex eadem

Pestilens hectica

30 nasci potest, vbi æger venenatum aërem attraxerit. Rursus sicut hectica non pestilens vehementissima, ex vigilijs, grauiq; sollicitudine, ac summo metu, ac horrore prouenire solet, ita etiam pestilens ex diaria, quæ ex similibus causis oritur, & procreari consuevit. In vtraque febri, homines grauius, & vehementius, quàm

35 in alijs affliguntur. nam illa tandem omnes, hæc plurimos tollit è medio. *MATHETES,* Tandiu ne pestilens ista hectica, sicut non pestilens perseverat? *GERON,* Nequaquam, sed vno sæpè die occidit. *MATHETES,* Ergo diaria est, quæ græcis *ἡφίμα* dicitur?

Pestilens hectica quando durat.

GERON, Etsi tam paucis horis ægrum interimat, non tamen rectè hoc nomen vsurpare potest. *MATHETES,* Qua ratione illi pestilentia corripuntur, qui in sincero puroq; aëre degentes, ægro tantum astant, vel assident, siue curant, aut vti res ipsius, potissi-

Pestilentia materia quam partem corporis primum inuadat.

num lintea, culcitra, stragula, & puluinos attingunt, contrstantur. GERON, Ex ægri anhelitu contagium per asperam arteriam, illis autem tanquam fomitibus inhærens, per externos corporis meatus, vbi incaluerint, facile attrahunt. MATHE T. Quam corporis partem pestilentia materia initio inuadit. GERON, Spiritum vitalem genuina sua temperie exuit: deinde naturalem, & animale inficit: postea cordis humores, vnde spirituum materia suppeditatur, alieno calore, qui putredinis auctor est, accendit, putrefacitque: tandem vbi ardorem in totum corpus attulerit, febres pestilentes, lethaliaque tubercula gignit. MATHE T. Quid inde sequitur. GERON, Vbi temperatio spirituum labefacta est, putredoque humorum cordis officinam inuasit, facultates omnes robore suo destitutæ conuellantur, & ad actiones peragendas languent. succi autem corporis efferuntur, quod subtile in ipso est, discutitur, quod crassum & graue, contumaciter hæret. 5
Cum iam venenum, quod nusquam non pertingit, impetum in principes partes fecerit, hæc, quia illud tolerare nequeunt, ad sua quæque emissaria protrudunt, ibi autem conclusum impactumque confitetur, & quia sic non diffatur, deterius euadit, aliosque subinde, & alios humores, non minus ac ipsum malignos allicit, vnde carbunculi, herpes, phlegmone, erysipelas, & gangrenæ fiunt. 10
MATHE T. Cur pestilentia virus cor, inter principes partes primum aggreditur. GERON, Quia has se facile deuicturum confidit, si illius veluti propugnaculi, & arcis, antea potitum fuerit. quando enim natura cum humore, tum essentia, tum vitiosis 15
qualitatibus infecto, conflictatur, cor id cerramen etiam multos dies pro illius copia, & prauitate sustinet, donec aut nimis eo grauatum, in corporis habitum se exoneret, vnde ceruleæ, nigre virides, aut rubræ pustulæ passim erumpunt: aut victum concidat, ac æger emoriatur. MATHE T. Vnde cognoscam, vtrum febris 20
putrida pestilens, de qua superius egisti, continua sit, quæ Græcis συνεχής, an continens, quæ συνεχής vocatur. GERON, Ex vrinis, aluo, corporis totius habitu, tempore, calore, pulsu, & alijs: tum ex accessionibus, nam illa, postquam semel accessit, continuè inhæret, donec calor prorsus remittatur: hæc quanquam non nihil ex 25
calore suo remittat, tamen reliquias quasdam retinet, donec altera fiat accessio. adhæc si continens, num quotidiana, an tertiana, an quartana sit, ex interuallo accessionum colligi potest. MATHE. Solentne omnibus pestilentia speciebus, alij morbi coniungi, & symptomata superuenire. 30
GERON, In ea, quæ ex intemperie aeris prouenit, si flaua bilis putrida iecori, vel ventriculo communicatur, febris ardens exci-

Venenum in principes partes receptum, quomodo pellatur.

Continua vel continens pestilentialis febris.

MORBI qui continentur in pestilentiali febre.

- excitatur: sin ad caput feratur, phrenitidem habet sociam: sin ad fauces, tubercula: sin ad linguam, inflammationem: sin ad gingi-
 uas, abscessus superueniunt, sicut etiam cum pituita redundat: vel
 cum hæc, & bilis permiscetur, quod si bilis è corpore erumpat,
 5 erysipelas cum inflammatione, aut herpes: & quidem vterq; tu-
 mor cum febris, vel ante, vel post eam comitatur. sin atra bilis ex
 sanguine adusto nata, putrida emergat, carbunculi apparent. si
 pituita putrida è capite in pulmonem destillet, tabem parit: sin in
 os, aphtas: si verò in oculos, lippitudinem: si in palpebras, sicum:
 10 si in cutem, pustulas grandes, altius è cute erumpentes: nec non
 humiles pueris obueniunt, hæ tenuioris humoris, illæ crassioris
 soboles: adhæc alię pustulæ varis similes, quarto, vel septimo ple-
 runque die, in brachijs, femoribus, pectore, & dorso cernuntur.
 Non solum autem in hisce pestiferis febribus, sed etiam in alijs
 15 morbis vulgaribus superueniunt, culicum, aut pulicum morfi-
 bus (vt dixi) aut varis, aut lenticulis rubore similes. MATHE. Cur
 rubre apparent? GERON. Quia ex sanguine putrido, & calefacto
 generantur, sicut etiam humiles ex tenui, multæ ex cute laxa, pau-
 cæ ex densa: vix autem apparent sub cute latentes, quia vis putre
 20 dinis expultrix debilitata est. MATHE. Solentne in hac pestilentig
 specie, alię pustulę, aut tumores corpus infestare? GERON. Nullæ,
 atq; ideo plerunq; periculosior est, læuitas autem intestinorum,
 exulceratio, & tormina vrgent. MATHT. Qua de causa? GERON.
 Quia in hac primùm ventriculus recenteris facultatis imbecilli-
 25 tate laborat, quam humor interno lateri illius infarctus parit: de-
 inde, quia acris ac rodens humor biliosus putridus, ex visceribus
 in aluum confluens, intestina pungit, & vlcerat, dysenteriamq; gi-
 gnit: tertio, quia flaua bilis, vel atra rectum intestinum affligit:
 quauis salsa pituita in hoc pestilenti aëris habitu crebrius id effi-
 30 ciat: quando febres non tantum continuæ, sed etiam intermit-
 tentes cuiusq; generis, vt quotidianę, tertianę, & quartanę oriun-
 tur. MATHE. Quæ alia eiusmodi, ardenti febris laborantibus eue-
 nire deprehendisti? GERON. Per initia soporem: eò quod talis aë-
 ris status, caput humore pituitoso repleuerit: nec non animi an-
 35 gorem, quod prauis humores os ventriculi rodant: adhæc horro-
 rem, quia excrementa acris per accessiones cutem æqualiter tur-
 bant, & concutunt: præterea ægri non sitiunt in tanto febris ar-
 dore, quia humor pituitosus è capite in gulam destillat: vocem
 non emittunt, quia idem humor in guttur defluit: non esuriunt,
 40 quia is ipse in ventriculum decidit, & appetentiam imminuit:
 non magnam mentis alienationem sustinent, quia idem ipse hu-
 mor, partim in capite manet cum bile permiscus: vbi verò ille

*lentia, si ex ina-
 temperie aëris,
 & flaua bile pua-
 trida orta sit.*

*Pustule quando
 & cur rubra.*

*Alia accidentia
 pestilentis febris,
 ex aëre intempe-
 rato, & humoris
 bus putridis.*

*Accessiones febris
um pestilentium
quando fiant, &
quales.*

*Excrementa fe-
bri verè pestilen-
ti correptorium.*

*Morbi pestilen-
tiam ex putredine
exhalatio-
nem ortam, con-
citantes.*

*Humores singu-
larum partium
quas in partes
propellantur.*

*Carbunculus in
qua parte erum-
pat.*

*Inflammatio ex
quibus humoribus
oriatur.*

non adest, vigiliæ cum dolore excruciant. **MATHESES**, Acutane est febris ista pestilens, cum ardentem eam esse dixeris. **GERON**, Rarius. nam talis cæli tempestas, copiosum humorem serosum in corpore producit. **MATHESES**, Quales, & quando fiunt accessiones? **GERON**, Non adeo vehementes, sed plarumque diebus paribus, in quibus ægri redduntur obliuiosi, & vocem amittunt, omniâq; membra, tanquam resoluta, proijciunt: extremi eorum pedes, & manus frigescunt, quanquam tardius, non tamen probe recalescunt: memoria quoq; & loquela quorundam, si admoneantur, redit. **MATHE**, Qualia reddunt excrementa? **GERON**, Se-10
rosa ex vasis vel nimis copiosa, vel tam acria, ut tolerare nequeant, per aluum, sicut alia tenuia multa deijciunt: aut per vrinas excernunt: aut in cutem per sudores emittunt: nec non eadem quæ phrenetici experiuntur: cum ipsi quoque febris ardente laborent. In hoc autem inter se differunt, quod illi magna siti, hi nulla tor-15
queantur, idq; duplici de causa. prima quod pituita in ore ventriculi redundet: altera, quod appetitoria stomachi facultas langue-
scat. præterea hi etiam adeo stupefcunt animo, ut quid eis acci-
dat, non intelligant. Quauis autem mens illorum non omnino sit alienata, ut phreneticorum, quod serosus humor flaua bili sit 20
permixtus, tamen valde est perturbata. **MATHESES**, Qui morbi pestilentiam ex vaporum putredine contractam comitantur? **GE-
RON**, Inflammationes sæpè glandularum, carbunculi, phrenitis, licet rarius. præterea interiorum faucium, & viscerum inflam-
matio, vel carbunculus latitans. Etenim cum externa putredo 25
cordis humores obsedit, id illam per venas in glandulas sub aliis
fitas exonerat: cum in cerebrum penetrauit, & hoc satis validum
est: in glandes sub auribus, aut in ipsam ceruicem deponit: sin au-
tem imbecillum fuerit, virulentos istos humores expellere non
potest, vnde postea phrenitis, vel in ipso, vel in eius membranis 30
oritur, quæ pro illius partibus, sua singulis propria symptomata
adducit. **MATHE**, Quod propellitur venenosa putredinis mate-
ria, si secur ea infectum est? **GERON**, Si robustum, ad inguina: sin
imbecillum, nusquam. sed ipsummet inflammatione obsidetur.
MATHESES, In qua parte carbunculus erumpere consuevit? **GE-
RON**, In omnibus, præsertim autem in pectore, pustula nigra, vel
liuida, vel pallido rubore tincta: subtus autem cum sanie con-
tinet, nigra. **MATHESES**, Inflammatio ex quibus humoribus con-
trahitur? **GERON**, Ex varijs sæpè. si enim ex pallido rubens est, ex
sanguine, flaua bile misto: si nigricat, ex humore melancholico: sin 40
albescit, ex pituita. Carbunculus autem cum inueterascit, atræ bi-
lis soboles est: interdum in medio inflammationis nascitur: atque
ita

ita duo diuersi sunt tumores. MATHETES, Quos tumores pestilens febris hectica representat? GERON, Nullos, sicut neque putrida, vbi natura tam imbecillis est, vt noxiam illius materiam nequeat excernere. MATHETES, Quæ mala huic morbo super-

Febris pestilens habitum occipitans.

5 ueniunt? GERON, Capitis dolor, vigilæ, mentis alienatio, cordis angor, ventriculi dolor, fastidium cibi, nausea, vomitus, tensio præcordiorum, spirandi difficultas, sitis, gutturis ardor: linguæ scabrities, nigritiesque, fœtor anhelitus, crebræ alui deiectiones, sanguinis profluuium è naribus. MATHETES, Multos casus ac

Causæ symptomatum pestis.

10 symptomata recensuisti, causas illorum mihi deinceps exponas, ac dicito cur in hac pestilentia caput dolere soleat? GERON, Quia vapores in ea ad caput feruntur, magis autem, si hoc inflammatione siue intus, siue extra, maximè si carbunculo, laboret. MATHETES, Vnde vigilæ oriuntur, & mens alienatur? GERON, Ex ipsdem

Vigilantium: Mentis alienatæ Angoris cordis.

15 vaporibus. MATHETES, Qua ex causa cor angitur? GERON, Ex pestilenti putredine, quæ vel corpus ipsius, vel humores in ventriculis eius contentos inficit, & interiores pectoris partes ardore suo vrit. MATHETES, Quid cibi fastidium hîc excitat? GERON,

Fastidij cibi. Doloris ventriculi.

20 Calor febrilis, vel humor putridus in ventriculum delapsus, nam vterque temperamenta ipsius immutat. MATHETES, Cur ventriculus dolore, vel nausea, vel vomitu, vel singultu hîc afficitur, vel animus deficit? GERON, Quia humor vitiosus, & putridus vapor quasi rodens illum infestat. MATHETES, Vnde præcordia tenduntur, & sequitur spirandi difficultas? GERON, Ex humoribus,

Nauseæ. Vomitus. Singultus. Animi defectio nis. Tensionis præcordiorum. Spirandi difficultatis. Sitis. Ardoris.

25 qui in visceribus subditis continentur. MATHETES, Quid sitim, gutturis ardorem, linguæ scabritiem, nigritiemque efficit? GERON, Calor febrilis, & vapor internus putridus, aliæque causa similis os inficiens. MATHETES, Quid fœtorem animæ, & crebras alui deiectiones excitat? GERON, Putridi humores: sed has intestinorum,

Fœtoris halitus. Alui deiectionum. Sanguinis profluuij.

30 illum ventriculi, aut pectoris. MATHETES, Quare sanguis profluat è naribus? GERON, Quia ille tenuis nimium, aut biliosus existit. MATHETES, Satis assequor quomodo pestilentia, tum ex diuturna aëris intemperie, tum ex putridis inferiorum exhalationibus procreetur, quosque singulæ morbos habeant coniunctos, & quæ

35 eis supercruent: nunc etiam discere cupio, qualis sit ex prauo cibo potuque contracta, & quæ illam symptomata subsequantur.

Pestilentia ex prauo cibo potuque contracta, & eius symptomata.

GERON, Huius generis pestilentia nunc peracuta, nunc longa & contagiosa, sed minùs quàm prior: verno tempore multis pernitiola. MATHETES, Quos morbos habet adiunctos? GERON, Plærunque vehementes febres, & malignas, visceris alicuius inflammationem, extrinsecus vlcera, quæ respondent illi, aut erysipelati, aut herpeti, aut impetigini, aut scabiei, aut lepræ, su-

peruenit in hoc morbo mentis alienatio, modò cum vigilijs, modò cum sopore, pro humorum varietate, qui in corpore abundant. *MATHEŒS*, Intellectis iam varijs pestilentie specierum causis, notisque, tum omnium inter se communibus, tum singularum proprijs, discere etiam abs te cupio, vnde illas aut futuras, aut presentes cognoscere liceat.

Pestilentia præsentis aut future indicia.
Ex aëris intemperie.

GERON, Ex superioribus quidem causis, præsertim stellarum maleficijs, & aëris intemperie, pestilentiam futuram præsumimus, si inexpectatus repentinusque languor complurimos eadem in ciuitate, eisdem ædibus, eodem die, eodemque tempore inuadat. adhæc si multi simul in regionibus frigidis, altis, montanis, vento expositis, spirante Aquilone, sicco & frigido cœlo, pereant: qui autem humilibus in locis, ab Aquilone auersis, cœlo crasso, & tepido habitant, superstites & salui maneant. Præterea aëri fertur accepta pestilentia, si anni tempora naturam suam non seruent, hoc est, si æstas non sit calida, & sicca: hyems frigida, & humida, ver temperatum: autumnus vesperi & mane frigidus, meridie tantum calidus, magis etiam totus siccus, quam humidus, qualis natura esse debet: sed vniuersus annus humidus calidusque, si non semper, certe aliquando tepidus, frigidus autem raro, aut nunquam. Quinetiam pestilentia comitari solet, quando talis aëris habitus præcedit, & cœlum hyeme, vt aliàs non consuevit, tonitru concutitur, fulgetrum emittit, fulmen iacit, atque id quoque vere & æstate accidat. *MATHEŒS*, Vnde pestilentia ex inferioribus causis orta, cognoscitur? *GERON*, Si variæ cometarum species in summa aëris regione, ignesque in cœlo, flammæ, lampades, torres, trabes, & capræ cernuntur, stellæque discurrunt, in illis locis vbi apparent, pestilentiam ex sicca terræ exhalatione grassaturam indicant. Pari modo multa tubercula, insoliti capitis dolores, defluxiones, inflammationes colli, abscessus, febres malignæ, pustulæ, carbunculi, erysipelata, exanthemata in senibus, quæ aliàs puerorum propria sunt, dysenteria, abortus, & grauidarum interitus, futuram, aut præsentem iam pestiferam luem, nuntiant. Magnus autem murium, ranuncolorum temporariorum rubetas imitantium, muscarum specie differentium, culicum, papilionum, araneorum, erucarum, cimum, ricinorum, buprestium, locustarum, scarabeorum, aliarumque bestiarum inutilium proventus, quæ arboribus, herbis, fructibus sint perniciosæ: adhæc communes brutorum morbi, quibus plæraque ipsorum intereunt, vt equorum, vacarum, ouium, porcorum: item quod canes complures rabie infestentur, pisces in aquis moriantur, & aues pullos suos cum nidis deserant, aut ex aëre decendant. Sic etiam quando vestes,

stes, lintea, culcitrae, panificia, quæuis obsonia, sub dio, vel in conclauibus apertis deposita, situm mucoremque, vt aliàs in cellis non repurgatis, & opacis contrahunt, præsertim in autumnno, aëris humida exhalatione, corrupti indicium est. At fames prægressa,

Aëris corrupti inditia.

5 annonaque caritas, & bonorum ciborum, potionumque salubrium inopia, vere, & æstate orituram: autumnno autem, & hyeme grafaturam indicant. MATHETES, Quæ signa pestilentia habes, tum ex superioribus, tum ex inferioribus causis procreata? GERON,

10 Multiplicia, sed ea in singulis earum speciebus iam satis sunt explicata. MATHETES, Quomodo singula illa inuadere, & quantum durare solent? GERON, Ex longa aëris intemperie nata, hyeme tantum eos occidit, quos tabes male habet, & diutius affligit, vt quæ nonnullos secundo, vel etiam tertio mense necet. Ex putridis autem orta vaporibus, in multos annos perseverat, nempe

Pestilentia species quomodo singula inuadere, & quantum durare soleant.

Ex aëris intemperie orta.

Ex inferioribus nata.

15 tres, vel quatuor, vel quindecim, vel plures etiam, & nullo non anni tempore plerisque omnes correptos perdere consuevit. Quæ ex prauis cibi, potusque usu, ob famem, vni cuidam regioni, vel pluribus communem, prognata est, plurimum vere & æstate inuadit, in illisque durat. Quæ ex pluribus causis coniunctis oborta

Ex cibo potuque procreata.

20 est, pro illarum ratione, & inuadit, & perseverat. MATHETES, Nondum mihi omnia, quæ ad pestilentia cognitionem pertinent, assecutus videor, nisi etiam intellexero, qui nam potissimum magis alijs, ad eam suscipiendam procliues sint, qui rursus tutiores ab ipsa, & securi censeantur.

25 GERON, Rectè sentis: nam corporum nostrorum status, alij alijs ad illam accommodatiores sunt, nullaque causa efficiens siue superior, siue inferior præstare quicquam potest, nisi illa his occasionem prebeant. hac de causa aëris maleficium, si materiam aliquam in illis reperiat, multum ea offendit: si nullam, parum, aut

Corporum status magis ad pestilentiam procliues.

30 nihil omnino. Hinc etiam est quod aer siue intemperatus, siue putridis exhalationibus vitiatus, non omnes offendat, nec offensus, infectisque omnibus interitum adferat, licet nemo non eo fruatur. adhæc quod è multis qui in eodem versantur, alij pestilentia corripiantur, alij tutò, & securi maneant. MATHE. Qui ergo in

35 diuturno aëris statu, calido & humido præcipue, huic exitiali morbo sunt obnoxij? GERON, Calidi & humidi temperamento. nam cum similia similibus in morbis noceant, hi neutra qualitate aëri præsentis resistunt: adhæc calidi, qui tamen sicci & humidi sunt temperatè: sic humidi quidem, calore autem et frigido temperati,

40 eò quod vtrique altera qualitate aëris statui non aduersentur, illi calore, hi humore: altera nec aduersi, nec similes existant, eoque minus quam calidi, & humidi offenduntur. MATHETES, Qui alij

tali aëris halitu læduntur. GERON, Calidi & sicci, nec non frigidi
 & humidi. quia vtrique altera qualitate aduersantur, altera con-
 ueniunt. nam illi siccitate aëri humido resistunt, calore autem ip-
 sius, calori non aduersantur: hi verò frigido aëris statui obfistunt,
 humore autem suo illius humido non renituntur. Nam vt similia
 similibus in morborum curationibus obsunt, ita contraria con-
 trarijs profunt. MATHESES, Qui præter hos pestilentia ex aëris
 intemperato statui, obnoxij sunt. GERON, Temperati calore, fri-
 gore, humido, & sicco. Nam vt nulla qualitate ei similes sunt, ita
 nulla contrarij. hæc autem pestilentia minùs attingit siccos, mo-
 dò calore & frigore temperati sint. Sic quoque frigidi hoc statu
 infestantur, modò humido, & sicco temperati sint: quia vtrique
 alteram qualitatem habent contrariam, illi siccam, hi frigidam: al-
 teram nec similem, nec contrariam. MATHESES, Qui sunt ab isto
 aëris statu securi. GERON, Frigidi & sicci, non solum tuti sunt, sed
 etiam ab eo adiuuantur. MATHESES, Quæ ætas huius status aëris
 incommodis subiecta est. GERON, Puerorum, & adolescentum
 maximè, quod calido & humido sint temperamento præditi: vi-
 rorum minùs, quod calidi & sicci altera qualitate, nempe sicca hu-
 midæ renitatur. Senium autem, temperamento frigido & sicco, 01
 remedio est. MATHESES, Ideo senes ab hac pestilentia sunt liberi.
 GERON, Sunt vtrique, magis quàm ab illa quæ ex aëre, putridis ex-
 halationibus infecto, contrahitur. Nam hanc illis quoque necem
 attulisse proditum est, & Hippocrates ex ea sexagenarios, erysipe-
 late peiore laborasse scripsit. MATHESES, Quales humores gignit,
 calidum & humidum corporis temperamentum, in tali cœli sta-
 tu intemperato. GERON, Calidum & humidum, sanguinem alijs
 humoribus mixtum: sicut calidum & siccum, bilem flauam &
 atram: frigidum & humidum, pituitam. Atque isti humores, si re-
 dundent, externo aëris calore putrescunt, febrémque pestilentem
 putridam procreant. MATHESES, Quinam promptius pestilen-
 tia corripuntur, quæ ex aëre, putridis exhalationibus inquinato,
 contrahitur. GERON, Quorum modò cordis essentia, modò hu-
 mores in ventriculis ipsius contenti, caloris illius putredini susci-
 piendæ magis accommodati sunt. MATHESES, Quomodo cor ad
 hanc recipiendam fit procliuius. GERON, Si incalescat, aut inca-
 luerit, humores autem in eo collecti, crudi, frigidi, & pituitosi fue-
 rint, putredinem nondum experiunt. MATHESES, Quomodo
 humores ad eam aptiores euadunt. GERON, Si putredini sunt
 obnoxij, cordis autem essentia nec incalescat, nec incaluerit. MA-
 THESES, Vnde ista incalescit. GERON, Vel à spiritibus, vbi quis
 in diariam febrim incidit: vel ab humoribus, vbi in putridam.

MATHE-

*Ætas quæ pesti-
lentia obnoxia.*

*Senes à pestilen-
tia liberi.*

*Humores quales
temperamenta
singula gignant.*

*Pestilentia ex
putridis exhalat-
ionibus orta ob-
noxia.*

*Cor ad pestem
quomodo fiat
promptius.*

- MATHETES, Quando autem incaluisse dicitur? GERON, Cùm febrilis calor per totum ipsum penetrauit, habitumque acquisiuit.
- MATHE T. Quare cor facilius quàm humores, putredinem aëris admittit, vbi ex diaria febre incaluit: vbi verò ex putrida, non
- 5 item? GERON, Quia illi tunc non solum ad putredinem suscipiendam idonei fiunt, sed iam putrescunt, eoque pestilens putrida febris, aliam putridam comitatur. MATHETES, Cur diaria correptus, vbi pestiferum aërem inspirarit, mox in hecticam pestilentem incidit? GERON, Quoniam illa ex ardore solis, frigore, lassitu-
- 10 dine, vigilijs, ebrietate, inflammationibus glandularum, ira, furore, moerore, timore, alijsque animi curis, & perturbationibus excitatur, & febris aliàs hectica, non tantum ex putrida, sed etiam ex diaria febre oriri solet. pari modo cùm non pestilens hectica ex vehementissima ira, & vigilijs, graui sollicitudini coniunctis, nasci possit: meritò etiam pestilens hectica, ex diaria oriri dicitur,
- 15 præsertim cùm homines eo tempore in maximo vitæ periculo versentur. MATHETES, Quando putridus aëris calor, cordis humores putrefacit, febrémq; putridam pestilentem accendit? GERON, Vbi corpora varijs excrementis, putredini per se obnoxijis,
- 20 repleta fuerint, sanguis redundarit, viscerum ora & vasa, humoribus condensatis sint obstructa, vt illa hos nec euellere, nec viam eis dare queant: adhæc vbi cibus succusque non probè concoctus, conuersusque in sanguinem fuerit, quæ cruditas appellatur. MATHETES, Sûntne omnia excrementa corporis ad putredinem
- 25 procliuia? GERON, Nequaquam, sed quædam vt flaua bilis, & atra, pituitaque, reliqua non item. MATHETES, Quæ copiam istorum humorum producant? GERON, Partim cibi, & potiones mali succi, partim crebræ cruditates, partim viscerum quæ eos gignunt, intemperies. MATHETES, Vnde autem vitiositas humorum in corporibus contrahitur? GERON, Inde, quòd cùm aliàs
- 30 halituosum, & optimum quippiam expirare soleat, nunc id obstrictos, oculosque cutis meatus, exhalare nequeat. MATHE T. Quid sanguinis, succique lentis, crassi, & condensati abundantiam parit? GERON, Viscerum vasa, oraque obstructa. MATHE T. Quid cruditates? GERON, Cibi potusque immoderatio, rei que venere
- 35 intemperantia, in ijs maxime qui in otio degunt. Crudi autem humores, si non poterunt concoqui, conuertique in sanguinem, sicut etiam reliqui humores, vbi calidis in locis diutius inhæserint, putrescunt. MATHETES, Si ergo ij, quorum modò facta est
- 40 mentio, soli pestilentiae expurrido aëris calore fiunt opportuni, certè illi quorum corpora neque succis vitiatæ, neque sanguine abundant, neque vasa, oraque viscerum habent obstructa, ab hac

Diaria in hecticam pestilentem quando incidat.

Febris pestilens putrida vnde.

Excrementa an procliuia ad putredinem.

Humorum vitiositas vnde.

Cruditatis cause

*Cur pueri pesti-
lencia, ex putre-
dine aëris, corri-
piantur.*

Adolescentes.

Iuuenes.

*Viri.
Senes.*

*Pestilentiae ex
contagione ob-
noxij.*

*Ex prauo cibo,
potuque orta,
obnoxij.*

*MORBI quomo-
do finiri solcant.*

*CRISIS quibus
notis praenuntie-
tur.*

lue sunt immunes: sicut etiam qui cibum potumque modicum assumunt, venere moderata vtuntur, & probè se exercent? GERON, Rectè colligis, atque id etiam confirmari inde potest, quòd pueri, adolescentes, & iuuenes potissimum, hac lue inficiantur. pueri, quia ad vnum omnes nimis immoderatè, tum cibo, tum potioni citra iudicium indulgent, eoq; non parum succi crudi congregant: alteri verò, quòd plerique deteriorem victus rationem, quam illi sequantur, vnde crudorum humorum copia suppeditatur: postremi, quòd flaua bilis ex praua victus ratione multis succrescit: quibusdam succus crudus. Reliqui autem tum adolescentes, tum iuuenes etiam faciliè, putrida febris pestilente infestantur, quòd sanguis quidem ex bono victu copiosus eis nascatur, sed is, propter obstructos cutis meatus, latente perspiratu non diffatur, vnde plenitudo, quæ Græcis *πληθὺς*, dicitur, subsequitur. MATHESES, Quid de viris & senibus hic dicis? GERON, Hi quidem minùs, quàm cæteri, pestilentia corripuntur, si optimam victus rationem obseruent: si non, neutri ab illa tuti sunt, quòd vtrique succum crudum colligunt: illi præterea non rarò atrum, hi melancholicum. MATHESES, Quos potissimum pestilentia ex contagione inuadere solet? GERON, Eos, qui prauis humoribus, vel sanguine scatent, vel obstructionibus, vel cruditatibus, ob causas nuper dictas, laborant. Qui verò superfluis carent, & meatus habent liberos, nullam pernitiem experiuntur. MATHESES, Quòsnam pestilentia ex prauo cibo, potuque orta, magis affligere consuevit? GERON, Omnes, qui illis vsi sunt, nam sanguis optimus, in deterrimum conuertitur, vnde postea calore externo accedente, malum grassari incipit. MATHESES, Pleniùs iam de omnibus febrium generibus speciebusque dignoscendis instituisti, quàm optare ausus sim: nondum autem intelligo, omnesne eodem modo, an singulæ peculiari finiri soleant. GERON, Cùm vnaquæque ex proprio humore procreetur, non vna ratione terminari possunt. aliæ enim per sanguinis eruptionem è naribus, aliæ per vomitum, aliæ per alui deiectionem, aliæ per sudores largos soluantur. Græci has solutiones *κρίσεις*, vocant, quasi dicas, iudicationes: quæ olim incidebant die tertio, quinto, septimo, nono, vndecimo, decimo quarto, vno & vigesimo, ita vt summa potentia septimo, deinde quattodecimo, postea vno & vigesimo daretur: qui, quòd de ægris quasi iudicarent, *κρίσμοι*, nominabantur. MATHESES, Quæ signa crìsim prænuntiant? GERON, Dolor capitis, ceruicis, stomachi, præcordiorum, aliarumque partium: nec non vertigo, sopor, rerum obliuio, delirium, & terror. adhæc aurium sonitus, splendores falsi oculis obuer-

obuersantes, lachrymæ nolentium, crebra nausea, æstus, ac sitis vehementior quàm antea, pulsus inordinatus, & inæqualis subitò, vrina suppressa, ventris sonus insolens. Inter hæc etiam totus ipse æger conflictatur, omnemque in partem corporis, variè se iactat, & vociferatur: interdum furiosi instar è cibili exilit. **MATH.** Quando id accidit? **GERON.** In ipsa febris accessione: quæ tunc vehementissima est, & priorem horæ spatio propemodum auertit. cum qua etiam ingens horror insolitus inuadit: post hunc modò bona futura sit iudicatio, multus sudor effunditur, aut sanguis nimius è naribus erumpit, aut vomitus humoris plenior superuenit, aut aluus multùm resoluatur. atque post hac febris in totum desinere incipit. nonnulla ex his signis superiori nocte apparent, cum posteriore febris per crism soluetur: idem in die accidit, cum morbus proxima nocte finietur. nam hæc grauior esse debet, quæ eum diem antecedit, quo futura est accessio, & de morbo in totum iudicabitur. Hoc autem animaduertendum est, indicia noctu sæuiora, quàm interdiu obuenire: atque alia ex his ipsis iudicationes, siue crises duntaxat ostendere, alia harum notas, & causas æstimari: his sudores, vomitus, alui deiectiones, vrinarum, & sanguinis profluvia, comprehenduntur: illis deliria, vigilia, sopores, lachrymæ, & id genus similia. **MATHETES.** Quid vtraque signa pollicentur? **GERON.** Post concoctionis notas, salutem: si cruditas subest, pernitiem: ac ideo bona illa esse nequeunt, nisi cum morbus est in statu, nempe cum humores maturuerunt. hinc quoque fit, vt crises siue iudicationes, post concoctiones absolutas celerius fore, indicetur. At eadem signa in morbi initio, pernitiem omnino portendunt: in augmento autem illius, eoque maligni, mortem quoque præfagiunt: sed in leuioris morbi incremento, crism imperfectam fore nunciant. nam corporis natura, vbi quis ex morbo in totum conualecet, non antea de eò iudicat, quàm materiæ ipsius concoctio fuerit absoluta. **MATHETES.** Quid si morbus ægrum superaturus sit? **GERON.** Tunc natura multò antè, crism aggredi conatur, manifestaque eius præbet indicia. tantum valet semper concoctio, vt certam promittat salutem. Crisis autem notæ non satis firmæ existunt: sed pro cruda, aut concocta morbi materia, diuersa ab eis & indicantur, & efficiuntur. **MATHETES.** Quo euacuationis genere, & ratione, febris crism habitura est?

GERON. Si illa acuta fuerit, & primis circuitibus ob celerrimam materiæ concoctionem, de ea fiat iudicium, tunc certè quædam potius materiæ excretio, quàm abscessus, expectari debet. **MATHETES.** Quomodo sanguinis è naribus profluvium fore te.

*Signa salutis ac
mortis per crisi-
sim.*

*Febris quo ena-
cuationis genere
soluetur.*

Crisis febris acuta.

Crisis per sanguinis eruptionem.

prænoscam? GERON, Si præcordia dextra, vel sinistra, citra dolorem intenduntur, spiritusque simul difficilis trahitur, caput autem ardescit, & arteriæ eius cum dolore circa frontem intentæ mouentur: item si facies tota, præsertim oculi, nares acutæ, ac maxillæ rubescunt, pruriuntque, visus obscuratur, splendorisque falsi ei obuersantur, aurium tinnitus, vel surditas, lacrymæ subitæ percipiuntur: nec non arteriarum in temporibus vehementes motus, grauésque cervicis, faciei, & temporum dolor, pulsus autem vndosus, MATHETES, Quibus morbis huiusmodi eueniunt? GERON, Febribus ardentibus, phrenitidi, alijsque acutis morbis, & continuis, vel capitis doloribus febris expertibus, maxime si hi frontem & tempora fatigent: nec non omnibus calidis, acutisque inflammationibus, quæ sub præcordijs vrgent, præsertim iocinoris, & lienis: idque potissimum, si æstate inciderint, & æger nondum quintum & trigessimum annum excesserit. MATHETES, Sanguinis profusio è naribus, alijsne etiam vitijs accidere in crisi eius solet? GERON, Acutis quidem, & phrenitidi peculiariter: vterno, aut pulmonis inflammationi minimè. pleuritis inter hos morbos media existit, vt quæ sanguinis fluori minus quam priores: magis verò quàm posteriores sit obnoxia. MATHETES, In quibus vomitus incidit?

Crisis per vomitum.

GERON, In quibus totum caput graue est, & vertiginosum, oculi caligant, stomachus rofionem sentit, nausea crebro premitur, sic vt os eius ferè amaritudinem experiatur, & copiosam, tenuemque saliuam expuat, & labrum inferius tremat: adhuc si præcordia priore in parte veluti suspensa tendantur, spiritumque premant, & pulsus contractus ac durus existat. Quinetiam vomitus certior erit nota, si febris tertiana vrget, ægerque trigessimum quintum ætatis annum superauit, & anni tempus æstiuum est, horroreque incidit, & partes sub præcordijs sitæ, simul refrigescant.

Crisis per alui deiectionem.

At aluus in crisi profluet, si humor ad interiora versus feratur, non tamen vomitus aliquis sequatur, aut vrina copiosior reddatur: præcipue si aluus tunc & biliosior, & fusior, quàm ante crisin extiterit. item si æger rarò sanguinem in secunda valetudine è naribus profuderit, raròque sudarit, aluum autem sæpè citam habuerit, & aquam frigidam bibere consueuerit. At si alui deiectio propinqua est, venter sonum quendam edit, rugit, & pungitur, mox grauatur, aut intus dolet. nam si præcordia per febres cum dolore sonum edant, & lumborum dolor superuenerit, aluus plerunque humida esse consueuit, vt res ipsa, & Hippocrates testatur. MATH. Quando crisis per sudorem futura cognoscitur?

GERON,

- GERON, Cùm aluus & vrina supprimuntur, sic tamen, vt *Crisis per sudorem futura non*
vires egri constant, & nullum vomitus indicium antecesserit. *ta.*
autem hoc appareat, tunc crisis & per ipsum vomitum, & per sudores perficietur, id què certius, si accessio increfcens cum notis
5 superioribus delirium intulerit, summæquè corporis partes magis incalèscant, rubeantque, & vaporem quendam calidum, qui antea non fuit, emittant. Quin & pulsus simul vndosus, mollisque insigniter, nec non vrina crassior, & planè biliosa, crism per sudorem fore testatur, id què manifestius, si æger ante hanc per insomnia se balneis proluui existimet. Porro sudores omnibus febribus sunt familiares, præsertim acutis, ardentibus, nec non phrenitidi: utique si boni existant. MATHE. Quinam tales sunt? GERON, Qui ex capite copiosi, & calidi effunduntur, sic vt reliquum corpus simul insudet. Quin & omnis acuta inflammatio, sub præcordiis
15 consistens, sudoribus plerumque resoluitur. MATHESES, Vnde licebit deprehendere, num vel hæmorrhoidibus, vel menstruis emanantibus, crisis futura sit? GERON, Ex proprijs vtriusque affectus indicijs. MATHESES, Possuntne febres etiam alio modo, quàm crisi finiri, solique?
20 GERON, Possunt utique, etiam abscessu iam generato: quando autem is generabitur, hæc ferè incidere solent: morbus diu trahit, non soluitur paulatim, sed in eodem febris ac doloris statu permanet, sic tamen, vt alia signa salutaria adsint, quæ nihil de ægri vita periculi testentur. adhæc abscessus futuri nota est, quòd
25 nulla euident facta sit euacuatio, quòdque concoctiones differantur, dolor subito oboritur: nec non, quòd partis alicuius obscuræ lassitudo, imbecillitas, sudorque incidat: item quòd morbus ipse non mortiferus tardius moueatur, diemque vigesimum iam egressus sit: denique quòd pulsus sit bonus, virèsq; robustæ. At
30 certior abscessus futuri nota est, quòd vrina diu cruda tenuisque reddatur. si ipsa copiosa, crassa, & alba appareat, in qua subsidentia abundant, nullus abscessus deprehenditur: quia tunc malum paulatim concoctionis beneficio soluitur, & tandem sine alia euacuatione euidenti, siue abscessu terminatur, MATHESES, In quibus corporis partibus abscessus plerumque solent erumpere?
35 GERON, In ea, quæ iuxta aurem est, sub alis, in inguinibus, & alijs nonnullis. primus, qui græcè *παρὼς*, dicitur, hisce indicijs cognoscitur: spiritus subito difficilis, non tamen diu trahitur: hinc grauitas capitis statim sequitur, nec non dolor soporquè altus, & furdis. hic casus febribus acutis, non autem valde longis frequens est, aliquando etiam in veternum, & phrenitidem, similiacq; capitis vitia, crisi finiuntur. Si verò morbus inueteuerit, & abscessus

Crisis per hæmorrhoides, & menstrua.

Febrim per abscessum solutio.

Abscessus futuri nota.

Abscessus in qua parte erumpet.

certas ob causas expectetur, non autem parotidis notæ adsint, quæ tunc ferè nunquam incidit, sed dolor aliquis, vel grauitas, vel tensio, vel ardor inferiores corporis partes obsideat, certè abscessus hisce in locis, iuxta articulum orietur, tunc sanè suspectum ipsum habere oportet, quamprimum febris vigesimum diem excesserit: idquæ magis hyeme fieri, ac tardius desinere, minusque reuerti solet. *MATHESES*, Quibus abscessus frequentius exoriuntur. *GERON*, Iunioribus, nondum annos triginta natis: senioribus autem rarius, idq; sub febre diuturniore, quibus quartana potius, in eiusmodi casu imminere consuevit: vtique si quæ vrget non continua, sed vago, & incerto circuitu intermitat, diu ad autumnum vsque protrahens. at febris licet diuturna, quæ tamen ab horrore incipit, & sudore soluitur, veluti tertiana, aut quartana, rarò in abscessum desinit, eò quod eius materia in accessionibus singulis expurgetur. *MATHESES*, Sùntne abscessus vbique sibi similes. *GERON*, Nequaquam. nam qui inferiore corporis parte lentam, longamque febrim sequuntur, minus adferunt periculi, quàm qui in superiori iuxta aures erumpunt, tales enim ferè proprii morbis acutioribus existunt. *MATHESES*, Quid si post ortum abscessum febris quædam remaneat, isque foràs non resoluatur. *GERON*, Hic non ante diem vigesimum, sed totus intra eum, & sexagesimum suppurari solet. at si idem, remorante etiam febris solita, subsederit, priusquam suppuret, periculum adfert, primum furoris, deinde interitus: maximè si iuxta aures consistat. nullum autem periculum ille ostendit, qui inferiores corporis partes obsidens, longissimè à loco affecto, vitæque officina distat: nec non amplo comprehensus loco, vniuersam morbi materiam continet, foràsque tendens facillè erumpit: quoniam talis priorem morbum reuerti minimè permittit. Benè etiam de eo sperandum est, qui in acumen tendit, & fastigiatur, maturescitque æqualiter, quique deorsum vergit, non durus, neque bifariam diuisus: valdè periculosus est, qui introrsum vergit, sic vt nullus hinc color cuti externæ accedat. adhæc periculi plenus est, qui foràs quoque prodit, si amplissimus, & valdè planus apparet. *MATHESES*, Quæ alia crisin periculosiorem, aut bonam efficiunt. *GERON*, Animi affectus, nam metus alui deiectionem, aut vomitum, aut vrinam facillè excitat: è contrario, gaudium ac lætitia sudores magis effundunt. *MATHESES*, Vnane an pluribus euacuationibus crisis perficitur. *GERON*, Non vna, sed sepe etiam pluribus: veluti si quæ fors in febre adente sanguinis è naribus profusio fieri cœperit, eam statim sudores prorumpentes perficiant. *MATHESES*, Quæ tandem est crisis perfecta.

GERON,

- GERON, Fida, certa, periculi expers, & manifesta, quæque *Crisis perfecta*
 prius à die contemplatorio, siue indice fuerit prænuntiata, & *quæ.*
 quæ bonam salutis spem repræsentat. hanc enim concoctiones
 comitantur, diésque decretorius efficax: excretio manifesta, mor-
 5 bo conueniens: pulsus inæquales paulum eam antecedunt, plu-
 resque magni, celeres, moderati, vehementesque, quam parui,
 tardi, crebri, & languidi: qui simul rythmos pares, moderatos, &
 celeres habeant. Porro crisi iam absoluta, æger fit speciosior, co-
 lorator, spiritum facilius trahit, corpusque expeditius conuer-
 10 tit, leuatque: pullum edit mediocriter æqualem, ordinatumque.
 MAT. Quod aliud morbi genus bonam crism indicat? GERON,
 Quod sæpius promptiusque per crism finitur, vt febris ardens,
 tertiana, aliæque similia. MATHE T. Quæ notæ crism futuram o-
 15 stendunt? GERON, Morbi magnitudo, & accessiones eius semper
 multumque præuertentes, incrementesque: item natura inter hæc
 valentior, expedita morbi materiæ concoctio, ætas ægri, tempe-
 ramentumque, & anni tempus, morbi que genus conueniens: &
 quanto hæc sunt efficaciora, tanto illa citius absolvitur. MATHE T.
 Quid magnus morbus malignusque infirmo corpori incidens,
 20 eiusque materia diu cruda, significat? GERON, Naturam opprimi,
 mortemque sine crisi esse secuturam: sic autem accidit, vt quando
 crisis indicia adfuerint, ipsam quoque siue bonam, siue malam fie-
 ri oporteat. MATHE TES, Quænam illa sunt? GERON, Quæ paulo
 ante illam apparent. MATHE TES, Quid sibi vult, quod cum crisi
 25 signa adfunt, ipsa tamen non statim sequatur? GERON, Vel quod
 hæc inster difficillima, vel quod homo sit interiturus. MATHE T.
 Qualia crisis futuræ signa esse solent? GERON, Bonæ, magna ex
 parte certiora: malæ, non æquæ firma, vtriusque in acutis morbis
 30 semper sunt ambigua, dubiæque. MATHE TES, Quo morbi tem-
 pore signis istis magis fidendum est? GERON, Bonis in statu: ma-
 lis non item: nisi corpus sit imbecillum. MATHE TES, Quid com-
 modi crisis præstat in ægris? GERON, Nemo acutum sine illa eua-
 dit: complures autem repente sine hac intereunt. MATHE TES,
 Quo morbi tempore salutaris crisis incidit? GERON, In eius statu.
 35 MATHE T. Quando perniciofa? GERON, Cum in principio, tum
 in augmento, tum in statu: nullus autem vnquam in mali cuius-
 cunque declinatione interijt, aut crism expertus est. MATHE TES,
 Quamobrem? GERON, Quia morbus, qui semel statum suum ex-
 cesserit, is sine crisi permanet, & paulatim, nisi quid erratum fuerit,
 40 soluitur. Interdum aliquis incipiente febris accessione moritur, si
 cut in pestiferis internarum partium inflammationibus, febribus
 que ex crassa pituita contractis, natiuo calore intrus relictis.

nam ubi sic æger refrigeratus, non recalescit, pulsus vermiculans redditur, totusque deficit, & æger alto pressus somno exanimatur. nonnunquam etiam in accessione augmento, licet rariùs, interit. sæpissimè autem in eiusdem statu, quando morbus naturam superat. Cæterùm eo tempore eger delirat, ac intra verba desipit, 5 & violenter quædam manu facit: ex cubili impetu exilit, maximoque feruore æstuat: atque his malis victus, ubi tandem etiam animo defecerit, viresque amiserit, extinguitur. **MATHESES**, Moriturus aliquis etiam in febris declinatione? **GERON**, Rarò. si tamen id contigerit, anima prius deficit: deinde totus naturæ calor vnà cum febrili expirat: ac tandem æger pauco ac viscoso sudore orto, exurgens, vel conquiescens protinus emoritur. **MATHESES**, In quibus diebus de morbis iudicatur, siue (vt alij dicunt) crisis fieri solet? **GERON**, In tertio, quinto, septimo, nono, vndecimo, quatuodecimo, septimodecimo, & vigesimo. hi tres septimanas efficiunt, sic vt dies octauus, secundæ principium quartusdecimus, secundæ terminus, exordiumq; terciæ existat, si Hippocrati credimus. **MAT**, Quomodo septenarij isti dies digeruntur? **GERON**, Per quaterniones: sic vt primi quartus dies sit postremus: & secundi primus: tertij initiũ, septimus, & finis, vndecimus. Quartus hinc incipiens quaternio, quatuodecimo die absoluitur. idem hic dies, quinti quaternionis exordium est, ac decimuseptimus eiusdem finis. Sextus autem quaternio, ab hoc decimoseptimo auspicatur, & vigesimo definit: atque ita vigesimus ipse, tum sexti quaternionis, tum tertij septernionis vltimus existit. **MAT**, Quæ proportio dierum decretoriorum, à vigesimo ad quadragesimum seruatur? **GERON**, Eadem quæ fuit in priori vicenario. **MATH**, Quæ autem à die quadragesimo exacto? **GERON**, Sicut tunc morbi non amplius sunt acuti, ita neque crisis diebus imparibus, siue quaternarijs, siue septenarijs, sed omninò paribus, absoluitur. **MATHESES**, Quos vocas singulos vicenarios? **GERON**, Sexagesimum, octuagesimum, centesimum. **MATHESES**, Eandemne omnes dies decretorij vim obtinent? **GERON**, Non. quia septenarij omnium sunt potentissimi: deinde quaternarij, quos singuli septenarij proprios habent: postea illi, qui in amborum medio collocati sunt: quos medici intercurrentes vocant. **MATHESES**, Qui dies decretorij sunt optimi? **GERON**, Septimus, quartus decimus, nonus, vndecimus, vigesimus, septimus decimus, quintus, quartus, tertius. **MATHESES**, Qui infastis sunt, & parum tuti, minimèque decretorij? **GERON**, Sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextus decimus, vnde vigesimus: tertius decimus, inter bonos & malos medius existit. **MATHESES**, Qui de inacutis morbis possunt

Mors in febris declinatione.

Crisis in quibus diebus fieri solent.

Dierum decretoriorum ratio.

Singuli vicenarij qui.

Dierum decretoriorum vis, an eadem.

Optimi dies decretorij.

possunt

possunt dijudicare? GERON, Omnes impares, qui primis viginti diebus continentur, eò quòd hoc temporis spatio morbus vehementius moueatur, postea autem magis remittat, mitescatque: vnde fit, vt in secundo vicenario dierum numero, nulli ferè dies
 5 præter septenarios, hoc est, vigesimum septimum, trigesimum quartum, & quadragesimum, decernere aliquid possint.

Dies de morbis acutis qui dijudicare possint.

Hoc quoque de diebus decretorijs te admonitum velim, alios aliorum esse indices, quos Hippocrates ideo *deapheides*, quasi contemplatorios vocat, quòd ipsi, quid proximis decretorijs e-
 10 uenturum sit, certis notis antea prænuncient. Quartus igitur septimi index est: vndecimus quarti decimi, & vigesimi septimus decimus. Proinde si acuta febris statim sine vlla periculi suspitione accedit, & euident concoctionis nota in vrina apparet, crisis vltra diem quartum prorogari nequit. è contrario, si multa pri-
 15 mo statim die interitus signa verisimilia concurrant, æger intra quartum diem opprimetur: si crisis septimo die futura est, vrina rubram nubeculam quarto repræsentat: ac reliqua bona indicia pro ratione sequuntur, nisi error aliquis vel medici, vel ægri crissim remoretur. tunc enim in nonum diem, vel vndecimum inci-
 20 det, quia crisis in morbo quidem tutiore, ob errorem differtur: in pernicioso autem, statum diem præuertit. si vndecimo die nihil de illo iudicatum fuerit, crisis ante diem vigesimum fieri non potest: si moderatior morbus ad septimum vsque perue niat, potest. At qui ad decimum quartum vsque omninò crudus existit, tar-
 25 deque admodum mouetur, non ante quadragesimum crisi finitur. nam sicut dies decretorij primi, semper posterioribus sunt potentiores, sic & contemplatorii, siue indices appellati. Hoc quoque aduertendum est, magnos morborum impetus, ad decimum quartum vsque: minores his, à quarto decimo ad vigesimum exi-
 30 stère: illos verò qui hinc ad quadragesimum differuntur, pedetentim vim omnem remittere: qui verò quadragesimum superarunt, prorsus elanguescere, diuturnaque potius concoctione, vel abscessu, quam crisi solui posse. Post diem centesimum, alios morbos septem mensibus, alios totidem annis, alios duabus annorum
 35 septimanis, vel tribus conuiescere, Hippocrates docuit. MATH. Cùm de omnibus febrium generibus pleraque recensueris, cupio vt si quid adhuc sit reliquum, pergas absolvere.

Dies contemplatorii, siue indices

GERON, Nulla febrium species est, cui non casus aut alij plærunque morbi obuenire soleant: sed nunc leues, nunc gra-
 40 ues. MATHETES, Quales huiusmodi existunt? GERON, Leues signis tantum respondent, eisque annumerantur: graues ægros, æquè ac febres infestant, viresque resoluunt. Illi diligenter, &

Febrium quæ sunt peruenire solent.

*Symptomata fe-
brium grauiora.*

accuratè obseruari debent, ex febrine tanquam ei proprii inci-
dant, an ex alio morbo, qui febris sit implicitus, & ex peculiari cau-
sa prognatus. MATHE T. Quid symptomata reddit grauiora? GE-
RON, Humoris situs, aut partis imbecillitas. Si enim febris mate-
ria non æquabiliter in totum corpus est diffusa, sed magis partem
aliquam occupauit, symptomata pro illius natura, & conditione
progignit. similiter, cum pars quædam corporis ante febrem vel
natura, vel humoris alicuius, siue mali inueterati, vitio debilitata
fuit, quanuis corporis affectio existat æqualis, tamen illa iam du-
dum offensa, prima omnium, detrimentum, incommodumque
præsentit: & si quod olim vsquam in corpore vitium delituerit, id
statim cum febris prodit. MATHE TES, Quæ febrium symptoma-
ta grauiissima dicuntur? GERON, Omnium virium resolutio, ani-
mi defectio, aut oppressio, spiritus difficultas, capitis dolor: vigi-
liæ, delirium, corporis iactatio, & veluti eius contusio: ardor im-
modicus, sitis, linguæ ariditas, & scabrities, deuorandi difficultas:
gustus deprauatus, cibi fastidium, nausea, singultus, vomitio, alui
profluuium: lumborum dolor, lassitudo corporis, membrorum
grauitas, & dolores artuum, in febris autem intermittente, horror
vehemens, sudor ingens. MATHE TES, Vnde prouenit virium re-
solutio?

*Symptomata fe-
brium grauiissi-
ma.*

GERON, Ex grauibz febrium symptomatis, vt vigilijs, do-
lore, timore, euacuatione immodica, subitoque facta, victu tenui,
& parciore. MATHE TES, Quæ pariunt ista iam dicta symptoma-
ta? GERON, Ventriculi ferè, aut præcordiorum offensa, quas vel
bilis acerrima, vel alius quilibet humor putridus, aut venenatus,
in eas partes vehementius irruens, aut vaporem minùs gratum
exhalans, concitat. Quæ verò hinc non sunt profecta, originem
ex alio quodam peculiari morbo trahunt. MATHE TES, Quid ani-
mi defectionem parit?

*Resolutionis vi-
rium causa.*

GERON, Nunc humor perniciosus, qui pestilentem febrem
induxit: nunc bilis æruginosa, aut porracea, aut atra, quæ os ven-
triculi, aut præcordiorum membranas acriter pungit, vellicat-
que: multò autem magis vbi furens hæc materia è venis in cor-
dis officinam irruerit: idque largiter, & subito. MATHE TES, Vn-
de æger premitur, veluti que strangulatur?

*Animi defeccio-
nis causa.*

GERON, Modò ex bilis porraceæ, vel æruginosæ ardore,
qui circa cor, vt in febris ardente subsistit: modò ex copia humo-
ris, qui in præcordijs, aut visceribus infixus est: idque non rariùs
in febris intermittente, quàm in continua, sic vt etiam illa ferè di-
stendantur, doleantque, dum attinguntur: grauiissimè autem egri
premuntur, vbi inflammatio, vel iecur, vel lienem exercet. MA-
THE TES, Quid præcordiorum offensa parit?

*Cause oppressio-
nis, & strangu-
latus.*

GERON, Modò ex bilis porraceæ, vel æruginosæ ardore,
qui circa cor, vt in febris ardente subsistit: modò ex copia humo-
ris, qui in præcordijs, aut visceribus infixus est: idque non rariùs
in febris intermittente, quàm in continua, sic vt etiam illa ferè di-
stendantur, doleantque, dum attinguntur: grauiissimè autem egri
premuntur, vbi inflammatio, vel iecur, vel lienem exercet. MA-
THE TES, Quid ventriculi offensa parit?

THETES, Vnde spiritus difficultas in febribus gignitur?

Spirandi difficultatis causa.

GERON, Plærunque ex præcordiorum oppressione: aliàs ex cordis, & pulmonum ardore, cum bilis, vt in ardente febris, & putredo, circum eas partes incenditur, aut furens in venis materia, cum impetu eò decumbit. MATHETES, Vnde capitis dolor in febris excitatur?

GERON, Ex partium illi subiacentium, & maxime præcordiorum consensu. nam inde humor exæstuans, vaporem copiosum de se in caput, per intermedias regiones emittit: qui dum vel
30 calore & acrimonia, cerebri membranas, & eam quæ caluariam ambit, ferit, vel copia distendit, dolore cruciat: aliquando ex sanguine tenuiore, qui temporum venas arteriasque maiores pulsando agit. Quicumque autem ex febris genitus est, vel tempora, vel frontem, vel certè priorem capitis regionem infestat: qui verò
35 occipitium, aut verticem, aut circum aures affligit, peculiarem in capite causam obtrinet: non autem febris symptoma est, licet cum febris increseat, intendaturque. nam vetus sæpè dolor, hisce in locis quasi conquiescens, humoris motu cum febris excitatur. MATHETES, Quis vigiliarum auctor existit?

GERON, Quicumque somnum & quietem interpellat, vt dolor, æstus, oppressio, sitis, & quæcunque alia ægros nimium infestant, grauântque. Quinetiam nullus somnus accedere potest, cum calidus & acris vapor, cerebrum ipsum potius quam membranas eius terit, spiritusque nimium attenuat, & multifariam dispergit. adhæc pernitiola qualitas cor offendens, citra magnum ardorem ægrum vigilia cruciare solet. MATHETES, Quomodo accidit febricitantibus delirium?

VIGILIARVM causa.

GERON, Si causæ iam relatæ vehementiores occurrant, aut bilis feruida in cerebrum irrumpat: sic vt urinæ interdum
30 ant puriores, mens perturbetur, & portentosa rerum simulacra, sensibus & animo succurrant, mens statim à ratione declinat, atque hic affectus terroris potius, quam periculi plenus est. sin autem diutius perseueret, cerebrum adeò offenditur, vt non modò nerui, sed etiam ipsi artus, præsertim manus ac brachia, alio quodam, quàm tremoris motu, sine voluntate iactentur: quod interitus ferè est indicium. MATHETES, Quomodo imminens delirium prænoskitur? GERON, Aut loquacitate intempestiua, aut gestu ineptiore, seu impudenti. Vbi autem humor ille calidus deferbuerit, delirium reprimitur, & grauis altusque sopor superuenit. MATHETES, Qua de causa corpus sæpè nunc in hoc, vel illud
40 latus iactatur, nunc in pedes deuoluitur?

DELIRII causa.

GERON, Ex lumborū & artuum dolore æstuque, aut à fu-

IACTATIONis corporis causa.

rente in venis materia, vel à praua occultâque qualitate, cor sicut
Æstus immodi- in febris pestifera, obsidente. *MATHESES*, Vnde æstus immodi-
 5 *cus.* cus febris superuenit. *GERON*, Ex calida cordis, & humorum in-
 10 *Sitis.* temperie, quæ omnes partes corporis perurit. *MATHESES*, Quæ
 sitim in febris accendunt. *GERON*, Interior ventriculi tunica, vel
 ardore exiccata, vel humore nitroso, acri, & calido imbuta, illa sa-
 nè potu restinguitur: hæc autem minimè. quanuis totus venter
 humore madeat, sæpè enim os quoque madens siti conflictatur:
 solus autem corporis ardor, nisi hæc interueniant, raro siti excru-
 ciat. Nam interdum corpus febris citra sitim exardescit, non quòd
 frigida cerebri destillatio ventriculum alluat, sed quòd ardoris
 causa longius à ventriculo distet. Interdum lingua sine siti in fe-
 bri inarescit, sicut in ijs, qui per sanitatem ore hiant obdormi-
 unt: aliàs etiam ab immodico æstu, & calido acrique vapore, in
 fauces, os, & palatum exhalante, sicca redditur. *MATHESES*, Vn-
 15 *Scabrities lin-* de linguæ scabrities gignitur. *GERON*, Ex eodem illo vapore, cu-
 20 *gue.* ius tanta est potentia, vt illam exasperet: interdum ipsam quoque
 findat: sin spissior ipse existat, aut pituita è ventriculo in os regur-
 gitet, aut è cerebro destillet, caloris vi crassescens indurescensque,
 plerunque linguam, dentes, gulamque totam, viscoso lentore
 obducit. *MATHESES*, Quæ causæ deuorandi difficultatem pariunt.
 25 *Deuorandi diffi-* *GERON*, Hæc ipse, quas modo retuli, cum fauces, stomachi-
 30 *cultas.* que initium occupant, & cibi iter, vel siccitate, vel lentore coar-
 ctant. quanuis nunquam fauces ex illis tantum præcludantur.
Gustus depraua- *MATHESES*, Qua ratione gustus deprauatur. *GERON*, Cum lin-
 35 *tio.* gua siue os, vel bilis perfusione amarescit, vel corrupti humoris
 materia, aut vapore inquinatur: licet integra nonnunquam cibi
 cupiditas sub hoc vitio remaneat. *MATHESES*, Quando cibi fa-
 stidium oritur.
Fastidium cibi. *GERON*, Vel ante, vel post febrem, idque multiplici ex cau-
 40 fa. sola nanque corporis perturbatio, & quilibet humor: qui ip-
 sum, aut quasi saturat, aut cibi desiderium aliena qualitate obtun-
 dit, toti ventriculo inhærens: nec non prauus vapor quacunque
 ex parte in os illius exhalans: aut sola infesta qualitas, illi se insinu-
 ans, cupiditatem cibi tollit. *MATHESES*, Quid nauseam & vomiti-
 45 *Nausea & vo-* tionem generat. *GERON*, Aut humor, aut vapor, aut qualitas: que
 50 *mitio.* aliàs nimium relaxat, emollitque, vt pituita dulcis: aliàs vini ex-
 pultricem, vel abundantia, vel acrimonia incitat, vt omnia bilis
 genera: aliàs pernitiæ robur eiusdem facultatis aut infestat, aut re-
 soluit, sicuti in febris maligna, & pestilenti. Vbi igitur aliqua ex
 his causis, vel in ore ventriculi, vel in tunicis eius, adeò validè ad-
 hærescit, infixâque est, vt minimè excuti possit, ventriculo qui-
 dem

dem adhuc inani, nauseam solum: potione autem, aut cibo repleto, vomitionem excitat. Quòd si verò nulla causa vsquam infixata fuerit, sed in sinu ventriculi innatet, vel aliunde in eum defluat, humorem modò biliosum, modò pituitosum vomitu eiecit.

5 MATHETES, Quando, & vnde alius profluere in febris solet? GERON, *Alii profundi.*

Cùm ventriculus humorum vaporumque copia, vel acrimonia, vel prauitate adeò irritatur, vt cibum neque amplecti, neque conficere possit. Idem præstat interdium, etiam immodica intempestiuâque frigide aque potio: maximè si ventriculus medicamento purgante sollicitatus fuerit. MAT. Vnde singultus accidere solet? GERON, Ex inanitione, vel repletionem, vt Hippocrates

Singultus causa.

memoriæ prodidit. in febribus autem acutis, illisque malignis, ex prauo humoris acrimonia, eiusdemque prauitate ac pernitie, ventriculi tunicis aliis inserta, contrahitur: sicut etiam vomitio, & sæpè animi defectio. MATHETES, Vnde lumbi dolent grauaturque? GERON, Ex vitiosa materia, quæ in venam cauam, aut in maiorem illorum arteriam, vt plurimum elabitur: quæ si vehementius simul incendatur, renum ac lumborum ardores excitat.

Lumborum dolor.

MATHETES, Quæ lassitudinem corporis, membrorum grauitatem, & dolores artuum? GERON, Eiusdem materiæ portio, quæ in venas subtiles, per cutem corporis excurrentes, in musculos pertingit. MATHETES, Vnde horror febrem antecedit? GERON, *Lassitudo corporis, membrorum grauitas.*

Horror.

Ex causis nuper commemoratis. quanquam autem febrium intermittentium proprius existat: tamen in alijs etiam aliquando, vt in continua incidit, qui immutari illam aut solui indicat. MAT. Vnde tandem sudor febribus superuenit? GER. Ex humore, vel copioso, vel qualitate vitiato: quem natura ceu recrementum quoddam ingens, per cutis meatus, euidenter, aut vi adacta, aut voluntario, proprioque impetu expellit. MAT. Quibus morbis superuenire solet? GER. Non modò febribus intermittentibus: sed etiam

SUDORIS in febribus causa.

continuis, & alijs quibusdam morbis cõmuniter, non similis autem ac idè semper percipitur, sed pro humoris qui ipsum excitauit, genere: nunc calidus, aut frigidus: nunc mitis, aut acris: nunc tenuis, aut crassus viscosusque: nunc boni: nunc mali odoris. Notari etiam debet, eum, qui in febris intermittentis decessione, quique in continuarum febrium crisi largius effunditur, naturalem existere: contrarium autem, & accessorium, qui quouis modo, siue alio morbi tempore prorumpit. atque hic primùm à capite incipit: deinde à reliquis etiam partibus paulatim subsequitur. MAT.

40 THETES, Quinam vtilior, & naturæ magis familiaris censeretur debet? GERON, Qui aluo expurgatæ succedit, & in quo crassiore morbi materia euacuata, reliqua tenuis per extremam corporis

cutem digeritur, dissipaturque. MATHETES, Qui contra naturæ statum emanat? GERON, Qui vel per initia morbi, vel alio eius tempore, vel ante concoctionem, vel ante crîsim prodierit. post talem enim nullus morbus tutò soluitur. At qui in virium resolutione græcè *συνκοπή*, dicitur, siue calidus, siue frigidus erit: mador 5 potius, quàm sudor appellari debet. MATH. Superfuntne alij adhuc corporis affectus, qui præter febres totis corporibus ascribuntur?

GERON, Ita. inter quos vnus Græcis *ἀρεσφία*, dicitur: sub quo æger, etiam si alimentum assumat, id tamen non sentit, sed admodum emacrescit: sic vt corpus eius sensim, & sine causis eui- 10 dentibus arefcat. Hoc malum imprimis est graue: & quia vires vehementer imminuit, ægrum tandem è medio tollere solet, nisi ei occurratur. Iungitur ferè hoc malum hecticæ feбри, cordis affectibus, pulmonis exulcerationi, grauibus, iisque calidis ventriculi, iocinoris, aur lienis vitijis. Idem ille morbus, & hectica in cor- 15 poris marcorem facîle transeunt. qui vbi inciderit, nullis remedijs sanescere potest. Eodem modo corpus non benè alitur in alio vitio, quod Græci *κακεία*, nos malum habitum appellamus. In hoc nanque illud subtumidum, laxum, molle, graue, & tardum existit, sani coloris expers, ex viridi albicans: ipsumque adeò im- 20 becille est, vt crura interdum eundo vacillent. Vbi morbus iste in cœperit, cibi concoctio vitiat: & quanuis eius cupiditas integra remaneat, processu tamē temporis, etiam amittitur. Spiritus in hoc malo ægrè, & rarò trahitur: aluus varia & inæqualis existit. His notis ea mali habitus species indicatur, quæ ab humore abun-

*HABITUS Malus
aii/que note, &
origo.*

*Malus habitus
crudus.*

*Ad malum habi-
tum procliuēs.*

*Malus habitus
ex sanguine cor-
rupto.*

dante, cruda, siue pituitosa nuncupatur: eius aquæ subter cutem generis, quod græcè *λακκοπλεγμασία*, dicitur, nuncia. MATHETES, Qui ad malum habitum sunt procliuēs? GERON, Pueri & senes: adolescentes autem, & iuuenes rariùs, citiùs autem restituntur. ex valetudinarijs illi huic malo sunt oportuniore, qui ex longo 30 morbo conualescunt, præsertim si tunc tumor durus in aliquo eorum viscere, vt iecore, aut liene assurgit, quem Græci *οκίσρον*, vocant: nec non ij, qui longa tormina, intestinorum leuitatem, sanguinis venarum in ano extantium profluvia (que Græci *αιμωρροϊδαι* nomiant) experti sunt: itē foemine, quibus menstrua nimium aut 35 fluunt, aut supprimuntur. MATHETES, Ex aliõne etiam humore, quàm pituitoso ac crudo habitus iste contrahitur? GERON, Vtique ex sanguine corrupto, & tunc melancholicus dicitur, qui elephantiasin minatur. Cùm igitur cibi tum natura vitiosi, tum in- 40 tus corrupti, morbum hunc generent, fit vt spiritus & os, aluique

lora-

- loratis, pallidis, et albidis apparet. in quibusdam cutis pustulis, & *virginum mor-*
 vlceribus exasperatur. vniuersum autem corpus inualidum est, *bus.*
 quibusdámque in partibus tubera extant. MATHETES, Differt
 ne malus habitus ab alimenti frustratione, & inopia? GERON, *Malus habitus*
 Plurimum, in hac corpus extenuatum tabescit: in illo ampliore *quid ab atrophis*
 molem seruat. rursus in alimenti penuria, id quod in venis con- *differat.*
 tinetur, neque coit, neque parti adhærescit, vt sanguis vix dici
 debeat. in malo habitu, quanuis humor ille in venis pituitosus,
 aut melancholicus, aut aliter viciatus existat, tamen sanguis ap-
 pellari meretur. Vtrumq; vitium, tum alimenti defectio, tum ma-
 lus habitus, id inter se habet commune, quod corpus in illa nullo
 prorsus modo, in hoc vitiosè alatur. Notandum, aliud quoque *Malus habitus*
 mali habitus genus, ex perniciosabilis atræ corruptione gigni: *ex bilis atræ cor-*
 quæ extra lienem in vniuersum corpus diffunditur, & totum e- *ruptione.*
 ius habitum deprauat. MATHETES, Quæ eius sunt indicia? GE-
 RON, Oris, eiúsque halitus fœtor, gingiuarum putredo, color ipsa-
 rum subliuidus, & nonnunquam subater: quæ digito etiam leui-
 ter pressæ, atrum cruorem emittunt: tam laxæ autem existunt, vt
 à dentibus recedant, & faciliè quoque interdum omnes eximi pos-
 sint. In hoc affectu simul, capitis & præcordiorum dolor, cibique fa-
 stidium vrget, & lien maior efficitur, cum autem morbus crescit, *Notæ mali habi-*
 hæc quoque augentur. Cæterum liuidæ quædam maculæ, in bra- *tus atræ bilarij.*
 chijs, coxis, cruribus, & alijs corporis partibus apparent, ac sepius
 per corporis vniuersi cutem adeo erumpunt, vt hæc quasi arqua-
 to nigro infecta videatur. Aegri in hoc valde fiunt imbecilles, in
 cruribus potissimum, quorum compages fiunt inualidæ. Quibus
 præsertim iunioribus, sanguis crebrò é naribus erumpit: sin-
 minus, maculæ istæ quas dixi, & interdum vlcera in cruribus sub
 oriuntur. MATHETES, Qui morbo huic sunt obnoxij? GERON, *Ad malum habi-*
 Qui humorem melancholicum copiosum colligerunt, humidio- *tum præ oculis.*
 ribusque in regionibus atque palustribus habitant, qualis est Ger-
 mania inferior, & id genus aliæ, quicque alimentis crassè valētisque ma-
 teriæ vti sunt, hoc malum omnis ætatis homines, & quouis anni
 tempore, grauius senes, frequentius iuuenes infestat: alibi pueros
 crebrius, idque autumno. vulgo apud Batauos, & vicinos popu-
 los Schöbbeck nominatur. MATHETES, Quis alius totius corpo-
 ris morbus ex humore melancholico, præter iam dictum restat?
 GERON, Is, quem *ἰλεψαισία* seu *ἰλεψαίσιον*, Græci, Latinobar-
 bari, lepram vocant, inde quod eo laborantes, cutem habeant ele- *ELEPHAN-*
 phantorum modo inæqualiter crassam, tenuem, duram mol- *TIA, vulgo le-*
 lémq; quasi squamulis quibusdam exasperatam, præsertim in fa- *pra.*
 cie, manibus, & pedibus ac longis vitis annu geratur. MAT. Que

est morbi huius natura? GERON. Veneni plena, quæ totum corpus immutat. MATHE Ex quo humore gignitur? GERON, Ex crasso ac melancholico, venenata qualitate imbuto, quæ non solum visceribus, sed etiam alijs omnibus partibus impartitur. Eadem autem viscera sic infecta, terrestrem quædam, & melancholicum succum, ex purissimis licet alimentis, eiusdem veneni participem gignunt. atque hoc partes nutritæ, similem naturam temporis spatio consequuntur. Quia igitur praua morbi qualitas, in iecore & liene potissimum resident, omniacque impuro aluntur sanguine, non tantum summa corporis regio: sed etiam intima, ipsaque ossa vitiantur. Notandum autem elephantiam triplici ratione procreari: prima hæreditario, altera contagio, tertia sua sponte MATHE TES, Quinam hæreditario? GERON, Qui ex utriusque parentis, morbo hoc laborantis, aut alterius similiter affecto semine procreati sunt. Tantum potest seminis intemperati, ac prorsus im puri vis gignendi, ut corporis partes ex vitiosa materia efformet fingatque. Si verò aliquis cum liberis dat operam, nondum fuerit elephantia infectus, sed ad eam tantum propensior, tunc proles ea ætate, qua parens, elephantia si corripietur, sicut etiam illa, quæ menstruis instantibus, aut potius iam profluentibus concepta est, morbo huic obnoxia nasci commemoratur. MATHE TES, Quomodo ex contagio hic morbus contrahitur? GERON, Per concubitum, aut assiduam vitæ consuetudinem: qua pernitiōsa qualitas, simul cum humore in vicinum corpus transfertur, & paulatim omnes eius partes inficit. MATHE TES, Quando elephantia ista sua sponte, vel proprio corporis vitio infertur? GERON, Cum bilis atra plurimum abundat, quæ processu temporis venenata lue, sponte in nobis genita, contaminatur. Tunc autem ea abundat, cum vel sanguis, vel humor melancholicus, vel aut bilis flaua, plus iusto torretur. MATHE. Qui potissimum ad hoc morbi genus sunt propensiores? GERON, Quibus varices, aut hæmorrhoides veteres curatæ sunt, quique cibis crassis, glutinosis, & valentis materiæ, ut carne bubula, suilla, ceruina & similibus frequenter vsi. adhæc illi, qui iecur nimis calidum habent, & ex victu calidiore, bilem pleniorē colligerunt: quæ retenta diutius, in atram degenerarit. Hæc autem cum in florente ætate, aut etiam in prouectiore incidere soleant, pueri & adolescentes, ab hoc vitio sunt immunes. MATHE. Quæ propriè eius sunt indicia? GERON, Pro temporis ratione variant. Cum enim morbus incipit, summa pars corporis, præsertim iuxta faciem, & mentum, maculas subnigras, subflauas & subalbidas crebrosque tumores habet: ac rubor earum paulatim in atrum colorem conuertitur: id quæ non

Elephantia, triplici ratione procreatur.

Elephantia si ex contagio.

Elephantia si ex proprio corporis vitio.

Ad Elephantiam si ex humore melancholico propensius.

Elephantia si propria indicia.

- non solum in facie, sed etiam in manibus, & pedibus. Quantum ad animi mores hac lue infectorum attinet, astuti sunt, & callidi: insomnia habent melancholicis familiaria: nonnulli etiam singulari sese opinantes, cum impetu expurgiscuntur exiliuntque: non pauci veneris usum valde appetunt. Quando morbus increscit, hæc ipsa quoque augescunt, & corpus male coloratum emacrescit: os suræ, & pedes intumescunt. Cum morbus inueterascit plurimæ etiam verrucæ, non solum in manibus: sed etiam in facie, & reliquo corpore succrescunt: propriæ verò ad lingue radicem, subpalpebris, & post aures. adhæc varia liuidi coloris tubercula, in manibus, pedibus, & facie, præsertim in malis eminent: narium cartilago media eroditur, tandemque partibus quibusdam corrupta decedit. Illæ ipsæ resimæ fiunt, & alarum crassamento obstruuntur: ac per has sic impeditas, spiritus ipse, & vox loquentis ægri, ferri videtur. Quinetiam crustulæ nigræ, ac cruentæ, per nares disruptas excutiuntur: labra crassa sunt, & inuersa: oculi iuxta interiorem angulum rotundiores apparent: & quod candidum in eis esse debet, flauescit, crassescitque, & veluti vngue obducitur. Pili venenata qualitate infecti ex supercilijs præduris, ac ferè callosis, palpebrisque, & mento decidunt: ut horrendæ inde faciei, deformitas qualis in Satyricis cernatur: quanquam alij interdum in horum vicem multò rariore, ac subtiliores, quam antea suboriantur. Aures quoque per ea ferè tempora fiunt acutæ, gracilescent, & eroduntur. adhæc manuum pedumque digitum, nimia ariditate dehiscunt, attolunturque adeò nonnunquam, ut sub tumore condantur. cutis denique totius corporis siccescit, scædæque ac arida scabie exasperatur, sic ut interdum etiam pruriat. Caro totius corporis, præsertim iuxta pollicem absumitur, & paulatim liquescit. In omnibus ferè partibus sensus adeò intercidit, ut nulla acicula, vel aliud, quod acutissimum etiam dolorem mouere possit, aut ut aqua feruens superinfusa vrere percipiatur. quanuis motus in illis seruetur, vsque ad extremum ferè integer: pedes tamen perpetuò frigidi deprehenduntur. *MATH.* Qualis vrina horum existit? *GERON.* lumentorum similis, crassa & turbida, sed notæ, quæ ex his & sanguine oriuntur, incertæ sunt, & fallaces: Hoc autem aduertendum est, non omnia ubique signa, sed alia in alijs esse obseruanda. Interitum in propinquo esse ostendit, vox rauca, spiratio difficilior, halitus, odorque totius corporis grauiter olens, viru lenta, fordida, & putrida manuum, pedum, aliarumque partium complurium vlcera. postremò febriculam, quæ totius malis obruitur hominem (ut ait ille) tollit è medio. Id quoque sciendum, suis singulas elephantinæ species signis indicari, *MAT.* Quis tandem post hos duos morbos, toti corpori communes, reliquus adhuc existit?

Morbi inueterasti nota.

Vrina elephantinorum.

MORBUS
GALLICUS.

L'ESVENECA.

Signa venere-
luis in naturali-
bus.

Contagio luis ve-
nerica.

GERON, Horrendus quidam & nouus similiter, & contagio-
sus, & longus, qui primùm vix ante ætatem nostram ex infami &
meretricio concubitu traxit originem: infausto quodam huc in-
clinante sydere, olim vulgo lues Gallica, siue, Neapolitana siue Hi-
spanica appellari inde cœpit: quòd miles Gallicus cum nobili Hi-
spania scorto illicitam, venerem exercuisset. Nunc autem cùm a-
lia quoque gentes, hoc execrabili vitio inficiantur: non immeritò
à recentioribus medicis, hodie lues Venerea appellatur. MATHE-
TES, Solèntne labes ista hodierno tempore solo concubitu sicut o-
lim, contrahi? GERON, Non, sed etiam hæreditariò à parentibus,
eam expertis: nec non ab insectorum corporum, citra veneris v-
sum contactu, & commercio. MATHE TES, Quo igitur pacto di-
gnosceret licebit, quæ pars primùm infecta fuerit? GERON, Si con-
cubitu, naturalia: si accubitu contactuque summa cutis: si infans
antèa fuerit infectus, nutricum mammæ: si nutrices luem contra-
xerint, infantis os, & fauces, offenduntur. MATHE TES, Quod in
naturalibus partibus vitij venerei, inditium apparet? GERON, Pu-
stulæ, praua vlcera, virulenti seminis profluuium, & venenati in-
guinum bubones. hæc autem omnia nisi penitus ad viscera per-
ueniant, morbum nondum venisse, sed in propinquo esse testan-
tur: sicut in virulentarum bestiarum ictibus, & alijs contagiosis
affectibus. MATHE T, Quæ efficiens huius mali causa potissimùm
existit? GERON, Venenata prauaque qualitas, & labes pernitiola:
quæ quancunq; corporis partem primùm infecerit, eam corrumpit,
ac deinde in totum corpus disseminat. Ex paruulo autem ini-
tio, & quasi fomite profecta, paulatim inualefcit, propagaturque,
donec non solum spiritus & humores: sed etiam carnem, omnesque
partes solidas peruagetur. Tanta est eius prauitas, vt partium &
temperamenta, & essentiam similiter peruertat: vnde nulla dein-
de probo puroque alimento perfrui possit. MATHE T, Quomodo
igitur vitium hoc in alium transire solet? GERON, Non qualitate
simplici, sed insita humori, qui ex ea deprauatus, in alterius corpo-
ris partes defertur, sic vt purus ab impuro, vel impurus ab alio im-
purior: non autem à simili, aut à minus impuro contaminetur.
At ij qui pariter impuri sunt, sine periculo possunt concumbere:
alter autem impurus, alium puriorem labefactat. Verùm lues ista
non ex cute solum iudicari debet: eò quòd sæpè eius præsertim in
ueteratæ fomentum, intus sit reconditum. ob quod interdum ali-
quis à non infecto, si exteriora spectes, etiam inficiatur. MATHE T,
Estne lues illa semper sui similis, & eadem in omnibus? GERON, 40
Totius quidem essentia ratione, eadem existit: prauitatis autem,
varijs distinguitur ordinibus, sic vt alia leuior, alia sit grauior: nec
non

Species luis venereæ.

non corpora, quibus illa incidit, valdè inuicem differunt. ob quas causas, lues alia leuioribus, alia grauioribus symptomatis ægrum exercet: atq; hoc modo species aliquot numerari poterunt. Prima eaque leuissima, est, cum caput ac mentum pilos solum remittunt: cætera autem benè habent. nam virus huius in vapore quodam tenui, per corporis summa ad radices illorum effunditur. Altera paulò grauior est, qua extima corporis pars vniuersa, crebris maculis lentiginis instar exilibus, nunc rubris, nunc flauis infecta est: quæ non nisi post morbum finitum tolluntur. atq; ista, venenum in tenuissimo sanguine habet, quam nulla sæuiora symptomata sequuntur. Hac maior adhuc est lues, vbi maligne pustule, rubræ aut flauæ, tumoresq; in fronte, temporibus, post aures, nec non in capite, tandemque toto in corpore erumpunt, rotundæ, siccæ, puris expertes, quæ sua sponte absque medicamento sanescunt, iterumque passim suboriuntur. Quod si negligentius tractentur, in circuitum ambiunt, cutemque excuant, adedò, vt vlcus virulentum ac sordidum inde fiat. at tenere partes ad nares, & fauces, nec non ad anum sitæ, primò exulcerari solent: præsertim cum iecur iam ipsum, sanguisq; & humores labefactantur: vnde carnosæ protinus mollesque partes offenduntur. Tunc etiam ferè palatum & intima eius regio, nigris ac foetidis pustulis infestatur, cauaturq; vlceribus, vt potus per nares reddatur: quod non per initia morbi, sed potius vbi sit vetustior, aut bis terue reuersus fuerit, incidere solet. Præterea hoc tempore caput valdè grauari incipit, ceruicem, humerosque dolor urget: qui tempore interposito, ad brachia & crura descendit, noctuque magis quam interdiu affligit: præsertim ab hora noctis tertia, vsque ad nonam. ad hæc artus medios penitiùs excruciat, in quibus tumores sæpè exoriuntur, qui difficulter vel resolui, vel superari possunt. hi interdum etiam in tophaciam duritiem conuertuntur, præsertim in fronte, capite, iuguli osse, medio humero, cubiti radio, priori tibiæ parte, & in alijs nonnunquam locis: qui ex prauissimis inde ortis vlceribus corrumpuntur. MATHETES, Quamobrem? GERON, Quia ossa, eorumque ligamenta, membranæ, nerui, aliæq; partes solidæ labefactantur, & ex maligno humore coeunte, crudelissimos cruciatus maximè noctu experiuntur: quibus ægri plurimum molestati, vigiliisq; cum febris admixtis, exhausti, sæpius intereunt. Atque hæc sunt cuiusque luis venereæ indicia, vnde dignosci ac percipi possit: sub quacunque verò corpus emarcescit, aut spiritus ægrè trahitur, vitæ periculum ostenditur. MATHETES, Solentne omnes hoc contagioso morbo æquè faciliè corrumpi? GERON, Non. sed mulieres magis quam viri: atque ex his calida humidaque na-

Proclines ad lues veneream.

Articularius & luis venereæ dolor.

tura præditi, vt adolescentes, & iuuenes. MATHETES, Quantum dolores isti differunt ab articulario? GERON, Plurimum: quia hic in breui exiguoque tempore, ex subita defluxione, in articulum facta exoritur: qui verò luem veneream comitantur, paulatim ac longo tempore, ab eo excremento procedunt, quòd pars malè affecta sensim collegit. Præterea articularius dolor, vel in articulo, vel circa hunc subsistit, ex lue verò ortus, nō articulos, sed medios artus occupat: in quibus etiam tophi plærunque con crescunt, sicut superius recensui. Fuerunt olim medici, qui morbis hiscē omnia insanix genera, neruorum resolutionem, morbum veterno-
sum, comitiale, attonitum, cardiacum, regium, & aquam inter cutem, adiungenda putarint. posteriores, illos certis sedibus assignarunt: quorum doctrinæ ego quoque subscribo. MATHETES, Rogo igitur te, mi præceptor, vt cum hæcenus eos morbos ordine percensueris, qui in totis corporibus consistere solent: nunc
similiter illos enumeres, qui in partibus eorum oriuntur.

MORBI qui in partibus oriuntur.

Vena morborum cognitio ex ratione anatomica.

GERON, Faciam quod petis. nam id antea tibi promisi, & doctrinæ ordo postulat. Primum autem interiorum omnium partium, mox exteriorum vitia, consuetis veterum nominibus explicabo, causasque singulorum & inditia, siue symptomata subiungam. at ne putes vllum te morbum verè posse cognoscere, nisi antea ex anatomica corporis humani ratione didiceris, quæ partes primario affectu, quæ verò ex consensu aliarum laborent. quare tu, quæ superius hac de retractaui, diligenter in memoriam reuoccs.

DE DOLORE capitis.

Dolor capitis quo modo contrahatur.

Dolorum capitis notæ. Ex calore.

Dolor ex humoribus.

In capite tres doloris species generantur, quæ symptomata potius, quàm morbi existunt: Græcis κεφαλαλγία, κεφαλαία, & ημικρανία nominantur. omnes in cerebri tunicis accurato sensu præditis, ac membrana caluariæ circumdata, consistunt. MATH. Quo pacto dolores isti contrahuntur? GERON, Si illud vel æstu, vel frigore, vel ictu, vel odore graui, alioue modo extrinsecus offendatur: vel si intus intemperie quadam, vel ex humore abundante afficiatur. MATHETES, Quæ vniuscuiusque notæ sunt? GERON, Si calor dolorem peperit, caput multa vestimenta ferre nequit: si frigus, potest. atque ita dolentes à causis similibus offenduntur: à contrarijs adiuuantur. Pari modo si à siccitate dolor capitis pro uenerit, vigilia comitatur: quia somnus non accedit. si ab humido generetur, somnus plenior, & qui non facile expugnatur, succedit. MAT. Qualis dolor in capite ex humoribus procreatur? GERON, Si calidi superent, inflammatorius, & qualis in igne sacro deprehenditur. si mediocres, grauis, acutusque percipitur, & facies in eorubet, oculi pallidi, aut cruenti, pro vinctis humoris calore apparent.

apparent. Contrà ex frigida humorum materia contractus dolor
 grauat magis caput, quàm ex cruciet: facies aegri turgida est, &
 ex pallido albescit, praesertim si humida etiam qualitas accesserit.
 Ex sicca, facies squalet, vigiliæ & imaginationes quædam tumultuosæ
 5 vrgent: animus abijcitur, præcipue si humor fuerit melancholicus: cui si flaua bilis admisceatur, amaritudo oris & feritas
 deprehenditur. Sicut iam caput proprio affectu, vel ex intemperie,
 vel ex humoribus prædictis indolescit: ita quoque ex simili-
 10 um, ventriculo reliquisque visceribus impactorum exhalationibus,
 confortij lege infestatur, affligiturque. MATHETES, Quantum ex oratione tua colligere possum, qualiscunque doloris species
 in capite percipiatur, talis antea intemperies, vel humor in eo
 substitit, vel à præcordijs in illud ascendit. GERON, Rectè sentis,
 nam acris & acutus dolor ab humore bilioso, aut vapore, qui
 15 membranas feriendo quasi perforare videtur, excitari consuevit.
 grauans autem, ex frigidorum pituitosorumque copia. is verò
 quo membranae distenduntur, à flatibus, aut à lenioribus humoribus,
 iisque copiosis generatur: qui inter caluariam, & eius membranam,
 20 græcè dictam *μενιγγιον*, vel inter illam & tunicam cerebri
 crassiore se insinuant, easque ab osse diducunt. Pulsatorius
 dolor à bilioso, tenuique sanguine, vel à spiritu abundante pro-
 creatur, quo arteriæ turgentes distentæque, vehementius pulsant,
 & membranas concutiunt. Eadem ratione omnis alius dolor gignitur,
 qui statis horis quotidie, siue cum febris, siue citra illam re-
 25 uertitur. MATHETES, Cum igitur singuli capitis dolores, ob varias
 ipsorum causas differant, quomodo externus ab interiore
 dignoscitur?

Dolor Capitis ex consensu.

Doloris cuiusque propria causa.

Dolor pulsatorius.

Doloris externi & interni differentia.

GERON, Ille, si caput attingatur prematurque, ob membranam
 caluariæ subiectam, intenditur: hic autem remittitur, ac sem-
 30 per ad oculorum radices pertingit: quanquam ille quoque sæpius
 eodem etiam pertingat, eò quod caluariæ membranam, cui insidet,
 oculorum sinus succingat. MATHETES, Quomodo species
 dolorum capitis nuper enumeratae, inter se distinguuntur. GERON,
 Quæ græcè *κεφαλαία*, dicta est, ea totum caput, aut pars eius
 35 maxima, multos annos ac crebro, leuique occasione infestari consuevit,
 idque proprio affectu. Quæ verò *ημικεφαλία*, appellatur, alteram
 capitis partem duntaxat affligit: ex ventriculi, ac subditorum
 viscerum consensu nouo primario incidit, & à temporum pul-
 satione propemodum trahit originem. vterque porro dolor, & qui
 40 liber alius siue ex febris, siue ex solis ardore, siue ex iacraioris vini
 potu, siue ex alia quauis causa euidente concitatus, sub generali
 isto nomine græco, *κεφαλαλγία* comprehenditur. MATH. Quæ

CEPHALEA.

HEMICRANIA.

*Dolores capitis
que præſagiant.*

ex capitis doloribus præſagia indicantur: GERON, Si iſs qui continuo excruciant, ſomnũque tollunt, vomitus etiam æruginoſus & ſurditas accedat, inſaniæ metus eſt. Si diſtentione neruorum, aut inflammatio iuxta oculos, ſiue aliam corporis partem, aut illorum inflatio, aut ſubuerſio comitetur: ſummum vitæ diſcrimen indicatur. Vehemens capitis dolor, qui curatione magis exaſperatur, quàm ſaneſcit, & aſiduè ægrum exercet, periculum inſaniæ in febrĩ futurum minatur: ſine hac autem tum eam ipſam inſaniam, tum magis cecitatem fore, portendit. In acuto capitis dolore, ſi aurium ſonitus ſine febrĩ, vertigõque incidit, & ſermo hominis non explicatur, atque manus torpent, vel morbus attonitus, vel comitialis, vel veternoſus prænunciatur. Vetuſtus capitis dolor, nuper græcè καὶ Παλαιά, dictus, ex frigido humore natus, difficillimè, præſertim in ſenibus, conſaneſcit. Si verò caput aliqua ex parte, aut vndique doleat, nec non puſ, vel aqua, vel ſanguis è naribus, aut ore, aut auribus profluat: mali ſolutio ſperanda eſt.

*INSANIE
genera triplicia.*

DELIRIUM.

MATHEſES, Quæ alia capitis vitia incidere ſolent: GERON, Inſaniæ, ſeu dementiæ genera, eaque triplicia. primum vocatur nobis delirium, ſiue mentis alienatio, græcis πνευματικὴ φρεσίνῃ, qua principis animæ facultatis functio deprauatur, terribilis magis quàm periculofa. MATHEſES, Quando hominem inuadit: GERON, Plærunque in acutarum vehementiũque febrium acceſſionibus: tunc enim ægri deſipiunt, & aliena loquuntur, cogitantque, qualia nunquam ſiunt, aut longè aliter eueniunt. leuato illarum impetu, protinus ipſi ad ſe reuertuntur: eodem iam ſerè repreſſo, graui alioque ſomno opprimuntur. MATHEſES, Quæ hanc inſaniæ partem imminere ſignificant: GERON, Sermo expeditior, quàm ſani fuit, ſubitæque loquacitas, & impudentior, ſolitòque audacior: rarus & vehemens ſpiritus: pulſus concitatus, oculorum frequens motus, & in capitis dolore offuſæ oculis tenebræ: vel nullo dolore ſubſtante, ſomnus ereptus, continuatæque nocte & die vigilia, vel proſtratum contra conſuetudinem corpus in ventrem, ſic vt alui dolor id non coëgerit: item robuſto adhuc corpore, inſolitus dentium ſtridor.

PHRENITIS.

Alterum inſaniæ genus, multò ſuperiore terribilius eſt, & periculorum pleniffimum, græcè Φρενίτις, appellatur: ac tum demum ſic dicitur, cum continua dementia eſſe incipit: aut cum eger quanuis adhuc ſapiat, quaſdam tamen vanas imagines accipit, perfectæ eſt, vbi mens illius imaginibus addiſta eſt. Sub hoc vitio animæ functiones, modò hæ, modò illæ vitiatæ cognoscuntur: atque æger viciffim nunc vigilia, nunc ſomno difficili, turbulentòque impeditus, ſic ut interrupta quiete, ſtatim cum impetu è cu-

- ē cubili profiliat, vociferetur, ac violenta quædam agat: aliās plo-
 ret, aliās cantet, verbāque sine sensu ac ordine certo proferat, & si
 ab alio interrogetur, aliena respondeat. oculi ipsius præter con-
 suetudinem mouentur, cruenti, flammeique & squalidi apparent,
 5 quos æger perfricat modò siccos, modò lacryma perfusos: lingua
 aspera & nigra est, dentes strident, sanguisque ē naribus profluit:
 est cum posteriora capitis dolent: æger vehementer sitit, mani-
 bus tremit, digitisque floccos in veste & ē stragulis legit. Hoc
 infantiæ genus longè est acutius, & magis mortiferum: vigilia in
 10 co torquet: aluus & vrina suppressa est: aut hæc prius valde fit co-
 lorata, deinde alba, & tenuis apparet: crura difficulter extendun-
 tur, contrahunturque, & vires resoluuntur. Plures huius species
 existunt, ac ex phreniticis alij hilares, alij tristes sunt, alij facilius
 continentur, & intra verba desipiunt: alij confurgunt, & violent-
 15 ter quædam manu faciunt, atque ex his ipsis alij nihil nisi impetu
 peccant, alij artes adhibent. *MATHESES, Quæ causæ vtriusque* *Dementiae cans*
 huius dementiae existunt? *GERON, Feruentissimus humor, aut* *sa.*
 vapor in cerebrum eiusque sinus contractus, cuius agitatione
 mens in falsas imaginationes incidit. Porro dementia nunc cum
 20 febre vt phrenitis, aut delirium: nunc sine illa consistit: *MATHE-*
TES, Quomodo illa duo inter se differunt? *GERON, Delirium* *Delirium et*
 simplex ex bile, aut tenui sanguine per cerebrum diffusio, aut ex *phrenitis quomo*
 calidorum humorum ventriculi, aliorumque viscerum exhalatio *do differant.*
 ne, vt in acutissimarum febrium statu, excitatur. Phrenitis autem
 25 ex inflammatione, aut erysipelate, tanquam proprio cerebri affe-
 ctu generatur. adhæc delirium plerunque febri, aut grauiori mor-
 bo superuenit: phrenitis autem non comitatur febrem, sed hanc ef-
 ficat. præterea delirium valde frequenter: phrenitis admodum
 rarò incidit: ac materia illorum ex dementiae proprietate cogno-
 30 scitur. nam quæ cum risu contingit, ex sanguine abundante: quæ
 serio, ex bile acri gignitur: eoque illa mitior, hæc ferocior existit.
MATHESES, Qualis dementia absque febri esse solet, & vnde pro-
 uenit? *GERON, Vel simplex, ac leuis, vel melancholica. atque illa,* *Dementia absq*
 modò ex cerebri inanitione, & principis animæ facultatis imbe- *febri qualis exia*
 35 cillitate, quæ ab immodico sanguinis profluuio, & ex nimia vigi-
 lia accidere consuevit: modò ex cerebro vehementius perculso,
 impulsioque, vnde tum spiritus animalis, tum mens ipsa pertur-
 batur, sicut ex capitis ictu contingit: modò ex larga vini potione
 citra febrem, vbi caput sanguinis, ac vaporis nimium feruentis
 40 abundantia incalcescit, celeriusque agitur.

MATHESES, Quod tertium dementiae genus est? *GERON, MELANCH-*
 Græcis vocatur *μελαγχολία*, sub qua mens diuina robusto corpore *olia.*

alienata est, sic tamen ut vita ipsa non impediatur. Variæ eius sunt species, quibus laborantes aliena absurdæque, vel cogitant, vel loquuntur, vel agunt. Inter hos, alij tristitia, metu, atque vigilia vrgentur: alij solitudinem amant, societatem, consuetudinemque hominum fugiunt: alij ad mortuorum sepulchra, aut ad abditas terræ speluncas, aut ad sylvas, aut littora maris se conferunt: idque perpetuò cum luctu, atque lacrymis. alij sæpè oculis humi defixis, veluti stupidi consistunt, subitoque falsis imaginat-ionibus leuati, celeriter cum suspirio procedunt: plerique abiecto, demisso, desperatòque sunt animo, ut vel acerbam amarâque si bi vitam, vel prorsus abreptam esse putent: eoque omnem cibum ac portionem auerfantur. quanuis mortem valdè pertimescant: sæpè tamen à seipsis desperati, illam sibi consciscant: alij ne loquendum quidem sibi existimant, sed omnem vitam cum silentio, Pythagorico more transigendam opinantur: alij se pecudes esse im- ginantur: sic ut voce illas, lupos ululatu, equos hinnitu imiten- tur: alij fictilia se esse, eoque occurrentibus cedunt, metuentes ne confringantur: alij se orbem, aut montem aliquem humeris gesta re putant: alij cum hilaritate insaniant, ac magnos se reges esse, ac amplas arces possidere, vel à pulcherrimis puellis, siue principi- bus mulieribus amari. His omnibus melancholicis, caput, oculi, totaque facies calida existit: ac somnus, uti valdè eis necessarius est, sic difficulter accedit. Quæ hætenus species dementiæ melancholicæ sunt enumeratæ, originem ex frigidiore humore, reli- quæ omnes à calido traxerunt.

*Dementia me-
lancholica specis
grum cause.*

*MELANCHOLIA
Hypochondri-
aca.*

His alia species accedit, quæ Græcis *καταχολία*, vocatur, nobis flatuosa seu flatulenta, vel præcordiorum. MATHETES, Vnde vitium hoc contrahitur? GERON, Ex iecoris affectu, magis autem lienis: id quod ipsius, aut mesenterij tumor renitens, ac dolorificus testatur: tunc autem perniciosius esse solet, cum velexigua atræ bilis adustæ pernitiolæ portio, halitu suo omnia labefactat. MATHET. Quæ eius notæ sunt? GERON, Eadem ferè quæ priorem melancholiam indicant. MATHETES, Quomodo ergo hæc ab illa differt? GERON, Sub hac præcordia sursum conuelluntur, grauanturque, & interdum æstu feruent, arteriæque vehementer, & cum molestia pullant: vertigo, sonitus aurium, cruditas, ructus acidus, copiosus, tenuis, saluæ sputum vrgent: eoque nulla sitis adest: pituitæ autem vomitus, nunc bili permixtus, nunc acidus insequitur: quo dentes etiam stupent: dolor medijs in scapulis, dum cibus in stomacho concoquitur, accedit: eo autem iam concocto, statim remittit: aluus sæpè compressa est, & ventre intorto, creber intus ex spiritu sonus est: nec non cor subinde palpitat, & quo-

- & quodammodo strangulatur. per cruditatem morbus iste incre-
 scit: per concoctionem valdè leuatur, longèque iam recitato leui-
 or existit. *MATHESES*, Symptomata affectus huius, cùm ex infe-
 rioribus initium sumit, narraſti: quæ superueniunt, cùm mali hu-
 5 ius vis cerebrum occuparit? *GERON*, Ægri in furem, & febrem
 hecticæ conſimilem, & marcorem ſtatim aguntur. *MATHESES*,
Melancholie ob
noxia.
 Quinam huic vitio magis ſunt opportuni? *GERON*, Si ætatem
 ſpectes, iuuenes, ac conſiſtentes, ſenèſque: inter hos autem fœmi-
 næ grauìus illo affligi ſolent. Præſagire in hoc morbo licet, quòd
 10 tumor lienis, hæmorrhoides, aut varices, aut aqua inter cutim co-
 mitari illum ſoleant: atque hac ſuperueniente plærunque ſolui.
 ſit etiam vt melancholia hæc, in morbum caducum, & hic ruruſus
 in illam conuertatur. Si recens malum eſt, non difficillimè cura-
 tur: inueteratum vix vllis remedijs ſubtrahitur. *MATHESES*, Re-
 15 ſtâtne alia dementiæ ſpecies? *GERON*, Ea quæ nobis inſania ſeu
 furor rabièſue, græcis *μανία*, vocatur. *MATHESES*, Quo indicio
INſANIA.
ſeu furor.
 hæc ab alijs ſpeciebus dignoſcitur? *GERON*, Eo, quòd hac labo-
 rantes, perinde quidem vt alij melancholici delirent: non autem
 adèò violenter ſe gerant, effrenati, iracundi, torui, ac terribiles. At
 20 pro humorum qui in illis abundant varietate, inter ſe differunt:
 nam in quibus ſub hoc malo plus ſanguinis ineſt, riſus continuus
 & diſſolutus oritur: in quibus autem bilis vincit, ægri temerarij,
 atque crudeles nimium exiſtunt: ſin atra copioſior fuerit, triſtes
 ſunt. Omnes hoc morbo laborantes, magna ex parte febris exper-
 25 tes ſunt. quanquam ea etiam accedat, præſertim vbi bilis illa pu-
 tredinem experta fuerit. Sunt qui huic furoris vitio adiungant,
 miſerrimum genus morbi, aquæ timorem, qui Græcis *ὕδρωφοβία*
HYDROPHOBIA.
 appellatur, ex rabioſi canis morſu contracta. *MATHESES*, Quæ
 eius notæ ſunt? *GERON*, Ægri rabie, ſiti, & aquæ metu crucian-
 30 tur: initio quidem moderatè: poſtea verò dolores intenduntur:
 mens alienari incipit, ægri moroſiores fiunt, feroces & iracundi:
 multa ſecum obmurmurant, qualiſq; ab alijs interrogati, frequen-
 ter ſibi iſtis reſpondent: deinde aquam conſpicere metuunt, & ca-
 nem in ea occultari exiſtimantes: metuentèſque vociferantur, in
 35 horreſcuntque. tanta eſt eorum obliuio, vt ne familiares quidem
 cognoſcant. tandè adèò rabioſi fiunt, vt alios morſu ferarum mo-
 do impetant: alij veluti canes occurrentes quoſq; allatrant: alij ci-
 tra veneris deſiderium ſemè emittunt: alij potu ſuffocati moriun-
 tur. At omnibus accedunt ſomnia tumultuoſa, neruorum diſten-
 40 tio, ſingultus, ſitis vehemens, ſudor frigidus, virium reſolutio.
MATHESES, Quando iſta hoc morbo laborantibus euenire ſo-
 ent? *GERON*, Poſt quartum decimum à canis morſu diem, ali-

quando post quadragesimum, aliquando post sextum, aliquando post mensem septimum, aliquando post tempus multò longius. Sed de his iam satis dictum esse puto.

Affectus ex frigida morbi intemperie, & humore pituitoso.

MATHESES, Qui contrarij his calidis morbis affectus existunt? GERON, Qui ex frigida cerebri intemperie, aut humoribus pituitosis contrahuntur, vt est stultitia, infirma mentis functio, Græcis *μαρώσις*, siue *μαρία*, dicitur: item amentia, quæ illis *ἀνοια*, vocatur, sub qua imaginatio est abolita. Huc accedit memoriæ & recordationis amissio, qua res in obliuionem veniunt. At non solum frigida cerebri intemperies vitia ista progenerat: sed etiam ipsius, vel temporum vehemens ex ictu, aut vulnere, concussio. Qui verò ab ipso natali die, & prima origine stolidi, amentisque nati sunt: ijs cerebrum malè fuit ab initio conformatum, aut nimis exiguum, quale Homerus Thersitis caput depinxit. In quibus humor frigidus pituitosusque abundat, plærunque non somno simplici, sed grauiore, aut lethargo infestantur. MATHESES, Quem vocas grauiorem? GERON, Naturali maiorem. MATHESES, Quæ sub vtroque eueniunt? GERON, Sub naturali somno cerebrum, & facultas animalis à functionibus suis conquiescunt, spiritus ac vires reficiuntur, quæ vigilijs, & exercitijs, fuerant dissipata. vnde corpori iam inanito, defatigatoque, somnus plærunque arctior, dulciórque superuenit: sub illo, qui vltra naturam vrget, cerebrum vapore quodam halituoso, sicuti post balnea, post cibum, vinumque largiùs assumptum, vel post alium superpressam, vel ex humore abundante, neque calido, neque frigido, vehementer repletum est. Nam is cerebro cuiusque sinibus insertus, grauiorem somnum inducit, aut etiam lethargum.

LETHARGUS.
gus.
Veterans.

MATHESES, Quod vitium est Lethargus? GERON, Eiusmodi affectus, quem latini Veternum vocant, sub quo memoria, & ratiocinatio aboletur, imaginatioque infirmatur, & quasi deficit: cui etiam superuenit, marcor, & penè inexpugnabilis dormiendi necessitas, febrisque lenta sine calore acri: nec non dementia, tantæque rerum omnium obliuio, vt dum oscitant ægri, hianti ore aliquandiu persistant, tanquam id claudere sint obliti: etsi ad vrinam reddendam incitentur, matulæque ipsis porrigatur, hanc se manu continere, nesciant: si violenter ab assidentibus excitati à somno expergiscuntur, rursus statim soporantur, idque sæpiùs tam grauius, vt etiam pilis euulsis non doleant, sed truncorum instar, stupentes decumbant. Corpus illorum vniuersum pigrum graueque est, & inprimis caput: aliquando etiam singultire incipiunt: pulsus habent magnos, mollésque, vt in pulmonum inflammationibus, quamquam tardiores, rariores, minus inæquales, magis au-

gis autem intermittentes, quàm intercurrentes: aliquando bis
ferientes, semper autem vndosos: respirationem raram, & imbecillem habent: aluum magna ex parte liquidiorē, nonnulli coactam magis, quando valde exigua vitæ spes superest: vrinam iu-
5 mentotum modo turbidam reddunt: supini decumbunt, & cùm ab alijs in latus vertuntur, ipsi rursus in dorsum reuoluuntur. Hoc malum acutum est, & nisi ei tempestiuè succurratur, celeriter iugulat, nempe diebus septem: Tremor, frigidusque circum
caput sudor, in statu ipsius superueniens, magnum periculunt in-
10 dicant. Quod si quis ex hoc morbo conualecat, huic ferè suppuratio in pectore fieri, sæpè abscessu iuxta aures oborto finiri soluique solet. MATHESES, Vnde omnia ista symptomata provenire putas? GERON, Ex frigido humidoque humore, nempe pituita putrida, in cerebro abundante: quæ principem animæ partem
15 humectarit, imbueritque, siue inflammationem aliquam siue nullam experta sit. MATHESES, Quis huic morbo veternoso proximus est? GERON, Is qui Græcis *καρ*, Mauritanis Subech vocatur, latino destitutus nomine. in hoc omnes principes animi functiones, ita offenduntur: vt eo laborans neque sentire, neque moueri,
20 neque intelligere, neque meminisse possit, sic tamen, vt respirationem referuet liberam. quanuis hæc quoque interdum quodammodo vitietur, vbi affectus ipse magnus euaserit. MATHESES, Quam partem corporis hoc vitium occupare dicis? GERON, Maxime cerebri sinus, eiusque priorem potiùs, quàm posteriorem regionem. MATHESES, Quibus notis malum hoc dignoscitur? GERON, Ægri oculos semper clausos habent, somnòque altissimo premuntur, vt dum punguntur, sentiant quidem, sed non loquantur, neque oculos aperiant. MATHESES, Hac ratione affectus iste Lethargo similis esse videtur? GERON, Non per omnia: Lethargici
30 enim interrogati respondent, & non in totum sine voce decumbunt: adhæc Carum febris, eaque vehementior præcedit: Lethargum verò ignauior subsequitur. In eo autem Carus & Lethargus conueniunt, quod ambo frigidam in sinibus cerebri intemperiem, potissimum ex simili humore crasso, aut prorsus viscoso ortam, comitentur, quòdque non derepente accedant. Id autem obseruandum est, quòd humor putredinis experts Carum, putridus autem Lethargum procreare soleat: propter quod etiam hic ab illo differt. Hoc rursus discriminis inter affectos istos accedit, quòd Carus etiam alijs cerebri affectibus, alijsque causis, à quibus Lethar-
40 gus gigni non potest, superueniat: vt in musculis temporum oblæsis, ac nonnullis morbis acutis, nec non cum medius cerebri ventriculus, osse quodam terebra perforato atroxitus fuerit, quem-

*Causæ sympto-
matum.*

CARVS.

Partis affecta.

Note Cari.

*Cari & Lethargi
differentia.*

*Carus quibus suis
perueniat.*

admodum etiam si quis, dum caluariæ os negligentius, ac vltra debitum perforat, membranam cerebri premendo lamina, quæ Græcis *μυρωσφόλαξ*, id est, membranæ custos dicitur, violauerit. Item ubi os caluariæ vehementer attritum, sinus cerebri, præsertim medium comprimit: nec non cum dolores vehementes infestant, sic ut spiritus animalis debilitetur: postremò etiam cerebri contusionibus, siue ictu, siue casu, & febrium morbi que comitialis accessionibus succedit. At cum variæ causæ hunc affectum progignant, cerebrum ipsum non vno semper modo, sed multifariam affici, rationi est consentaneum.

CATALEPSIS
sive Catache.

His similes ferè sunt affectus, qui Græcis *καταληψις*, hoc est, subita tum animi, tum corporis detensio, comprehensioque. nam quocunque in habitu quis illa correptus fuerit, in eo perseverat, siue sedens, siue cubans, sic ut quandoque videas ægrum, qui loquebatur, os apertum retinere, & nunc loqui non posse: oculos clausos, vel apertos servare, & nunc non videre, omnesque illas partes in eodem statu comprehendi, in quo corripuntur, sic ut putes ipsum stupore quodam pressum esse. Hoc igitur vitio laborans: subito mente, sensu, motuque destituitur: nisi etiam maturè curetur, stupidus, ac velut frigore quodam effectus, moritur. unde malum hoc Latinobarbaris congelatio, non prorsus ineptè appellatur. alij Græci etiam *ἀρεπνον καίμα*, hoc est, soporem vigilantem nuncupant, quia mens sensusque omnes subito affectu isto correpti, vigilantis licet formam retineant: omnis tamen eorum functio est abolita. MATHETES, Quæ pars corporis huic vitio patet, quæque causa illud efficit? GERON, Posterior cerebri, sicut in Caro prior: ac in illa principes functiones animales, & propriæ imaginationes resoluuntur. quanquam etiam reliquæ animæ functiones in eo viciuntur, sicut ex eiusdem indicij depræhendi potest: quanvis naturalis spiratio, in Caro, servetur incolumis. Porro sanguinis minus frigidi, quam in Lethargo: magis autem humidi, aut minus calidi, quam in phrenitide, abundantia, malum hoc in cerebro ipso generat: sicut etiam melancholicus cerebrum ipsum occupans, & moror. is enim ad caput defluens, obstructionem parit. MATHETES, Quæ signa hunc morbum testantur? GERON, Ægri oculos veluti defixos, ac palpebras penitus immobiles habent: aliquando ipsi dem apertis, aut nictitant, aut intentè vident, adeò ut neque oculos claudant, si quis manus ipsis obtendat: vocis ac sensus sunt expertes, neque audiunt, neque respondent: manus suas modò ad caput, modò ad oculos, modò ad nares, admouent, veluti qui validè vellicentur: verùm hoc non sentiunt. Lethargicorum pulsum

Pars affecta.

Causa catalepti-
cis.

Cataleptis, si-
gua.

sum quodammodo & æqualem, non tamen ita languidum, neque mollem, neque æqualem obtinent: respirationem verò aliàs crebram, aliàs raram, & per interualla quædam magnam: alius & vrina, in his propter sensuum stuporem supprimuntur. MATHE-
 5 TES, Habesne exempla eorum, qui hoc vitio laborarunt? GERON, Galenus de confodali suo, in hunc modum scriptum reliquit, iacebat ligni instar omnino inflexus, rigidus, atque extensus, vide-
 10 baturque oculis apertis astantes ita intueri, vt ne conniueret quidem, sed nihil tamen loquebatur: quæ autem illi proferebant, au-
 15 dire se dicebat, quanuis non euidenter ac clarè: nonnulla etiam memoria tenens referebat, omnesque presentes sese conspiceret: sic vt quorundam actiones recordatus exponeret, sed neque se loqui, neque membrum vllum mouere posse, vbi conualuisset fatebatur. Talis autem, magna sanguinis per nares eruptione li-
 20 beratus fuit. MATHESES, Cui morbo malum hoc superuenit? *Causa.* GERON, Frigidæ ac siccæ cerebri intemperaturæ, ex frigidiore, sicciorèque materia procreatæ, si Galeno fidem adhibemus. Ego quoque olim Meti medicamentarium vidi, qui cum ex profecti-
 25 one longa, per solis æstum domum reuersus, refrigeria quæreretur, præsertim capite nudato, in similem morbum inciderat. Sunt, qui ex mœrore & tristitia eodem laborare soleant, & per interualla rursus conualecant: deinde iterum si eadem causa occurrat, in illum morbum incident.

Simile ferè malum est, quod Hippocrati καῖμα, Galeno κατὰ *COMA sine*
 25 *ΣΟΡΑ*, nobis sopor siue grauis somnus, aut in eum propensio, appel- *SOPOR.* latur. hoc laborantes, vigilantium munera obire nequeunt: vt qui oculos non apertos, sed conniuentes habeant, palpebrasque claudere, & somno indulgere cupiant: interdum autem quidam ex eis, licet palpebras clausas habeant, non tamẽ dormire possunt,
 30 sed plurimùm vigilant: quidam verò statim pleno somno, eoque diu, premuntur: cuius rei gratia, duæ soporis species ex Hippocra- *Duæ soporis species.* tis, & Galeni sententia numerantur: quæ hoc inter se habent commune, quod ægri oculos eleuare nequeant, sed mox grauentur, & obdormire velint. quanquàm sopor siue cataphora, somno magis
 35 familiaris fuerit, & naturæ eius assimilis. Ea soporis species, quæ ægri protinus dormiunt plenè, & diu: veteres soporem, seu in somnum propensionem, nunc simpliciter, nunc cum appendice, somnolentam, ob causam designatam nuncupant, illa verò in qua ægri oculis non apertis, sed palpebris clausis, somni conciliandi
 40 gratia, detinentur (quanuis obdormire nequeunt, sed plurimùm vigilant) non amplius absolutè sopor, neque cum hac additione, somnolentus, sed vigil siue insomnis vocatur, qui olim à veteri- *Vigil sopor.*

Sopor vigil duplex.

bus græcè καλὸς & βλάτος, dicebatur. Idem rursus sopor vigil duplex est Hippocrati. primus proprio, ac somnolentus: alter generis nomine appellatur. In utroque commune est, quod ægri & loquantur, & delirent. MATHETES, In qua corporis parte diu ista vitia consistunt? GERON, In cerebro. atque ex animalium functionum, præsertim imaginationis offensione, proueniunt. MATHETES, Quibus notis singulæ soporis species dignoscuntur? GERON, Somnolento sopore laborantes, non solum graui somno grauantur: sed etiam difficulter expergiscuntur: ipsi mox, plenè, & diu obdormiunt, sicut lethargici peculiariter, & semper solent: motus & vocis expertes iacent: eis, qui arcè dormitant, assimiles, vigili sopore pressi, infomnes, & versuti sunt: cùm vocem & sonum audiunt, facile surgunt. si quis corporis eorum partem attigerit, aut illos alloquatur, illic ipsi oculos attollunt, & illum intuentur: cùm in somnum grauem inciderint, vel manum, vel crus, vel corpus totum mouent, citràque rationem subito è cubili desipientium modo exiliunt: nec non aliena quædam loquuntur. hic affectus inter lethargum & phrenitidem medius consistit. Pigro sopore oppressi, assurgentes magis sapiunt, non multum mouentur. MATH. Vnâ ne soporum causa, an diuersæ existunt? GERON, Cùm omnes soporosi, aut graui somno, aut leui, aut vigilia premantur: cerebrum diuersis modis affici necesse est. nam vbi id immodicè humore irrigatum, sicut in ebrijs fuerit, sopor sequitur. Nonnunquam ille ex solis vaporibus calidis & humidis, dum in febribus, à præcordijs ad caput exhalant, ipsumque replent, contrahitur. Sæpè ex sola frigida cerebri intemperie oritur: aliquando ex humida & frigida, in qua grauior somnus existit: sicut leuior ex frigida tantum, vel humida cerebri intemperie prouenit. Est cùm idem affectus ex virium imbecillitate nascatur, in qua palpebræ apertæ seruari nequeunt. nam vbi ægri oculis conuiuere cœperint: aut multum, aut parum dormiunt: quanuis autem vigilant, palpebras tamen attollere non possunt. In his etiam pulsus parui, tardi, rari, & languidissimi apparent. atque hac ratione sopor ille ab eo differt, quem humida & frigida intemperies excitauit. MATHETES, Quæ vigilem soporem gignunt? GERON, Tam biliosus quàm pituitosus humor, cerebro molestus, eoque mixta ipsius affectio permanet. interdum sopor tum somnolentus, tum vigilans ex copia sanguinis, cui bilis acris ac rodens permista sit efficitur, sic vt cerebri facultas à sanguine quidem abundante grauetur: à bile verò adeò irriteretur, vt somnus impediatur. Fiunt præterea soporosi affectus, vbi cerebrum ictu, vel casu vehementius fuerit concussum, nulla enim actio spiritibus ageratis, commotisque ediposcit:

Nota soporis.

Soporis cause.

Vigilis soporis causa.

est, sed tunc æger quasi attonitus subsistit, quemadmodum illi, qui aut timore, aut verecundia obstupescunt. Quòd si caluaria violenter contusa, impetúque fracta, aut depressa, cerebrum ipsum, eiúsque membranas comprimat, æger sensus sermonisque expers, stupefcit. At cùm cerebrum ipsum effractum est, aut nerui inde prodeuntes quodammodo diuulsi, grauissimus sopor oritur, de quo parum spei salutis superest: id quod Hippocrates hisce verbis testatur. à capitis ictu stupor, malum est. item quibus cerebrum aliqua ex causa concussum est, eos subito mutescere oportet. MATHETES, Qualia de singulis præfagia existunt? GERON, Quod ex virium imbecillitate provenit, exitiosissimum est: quod cum calidis & siccis morbis, insignem cerebri refrigerationem obtinet, non minùs periculosum habetur: quod autem ex frigida & humida cerebri intemperie provenit, minùs periculosum: quod ex contrarijs, magis. MATHETES, Principis animæ facultatis offensas percensuisti: nunc quæ motus sensûsque noxæ sint, sicut cætera, edocere ordine digneris.

GERON, Cùm caput, & omnia quæ cernuntur, circumagi videntur, sic vt æger huiusmodi symptomata expertus, corruat, nisi exteriore adminiculo sustineatur: græcè modò *ἄλγξ*, modò *δύω*, modò *σκόλοδυω*, Latinis vertigo, vel tenebricosa vertigo, vulgaribus scotonia nuncupatur, qui prædicta duo idem significare putant: etsi non tantùm appellatione, sed etiam re ipsa discrepent. Cùm enim aliquis caput circumferri imaginatur, tunc nobis vertigo dicitur. quando autem repentinè oculis tenebræ obuersantur, tenebricosa vertigo vocatur: ab accidente nomē sortita. Nam aliud est purare caput solum circumagi: aliud visionem tenebricosam simul cum ea apparere. etenim in illa caput duntaxat circumagi videtur: in hac oculi, tenebris simul offundi, & caput circumferri putatur. MATHE. Vbi & vnde similia ista vitia generantur? GERON, In cerebro, ex inordinata spiritus flatuosi motione, qui vel in ipsomet provenit, vel sursum ex inferioribus partibus exhalat. In utroque symptomate animales functiones oblesce videtur: quavis non omnino eodem, nec eodem modo. nam in vertigine simplicis, imaginatio deprauatur, ac visio imminuitur, vel interdum etiam vitatur: in tenebricosa quidem imaginatio corrumpitur, et visio aboletur, nec non omnia circumagi apparent, sensûsque videntur amittitur. siquidem egri tenebris oculos offundi putant, adeò vt interdum concidant. Vertigo igitur generali noxæ functionum tum imaginationis, tum visionis superuenit. tenebricosa autem non modò imaginationi falsæ, sed etiam visioni, & nonnquam motrici facultati abolitæ succedit. MATHET. Quomodo

*Causæ quibus
differant affectio-
nes vertiginis.*

affectiones istæ inter se differunt: GERON, Quod hæc magis, illa
minùs functiones prædictas infestet. MATHETES, Cur non idem
illas esse dicis? GERON, Quia licet imaginatrix facultas in vtrif-
que sit deprauata, tamen in vertiginosis sensus videndi non inter-
rit, sicut in scotomaticis, nec ægri concidunt, vbi affectio mitior
fuerit. in his enim, cum caput vehementer afficiatur, videndi sensus
tam subito amittitur, vt ipsi interdum collabantur, præsertim
vbi in orbem aguntur. id nanque ipsis ob vnam causam euenit,
quod cæteris à plurimis accidere solet. siquidem alij idem perpetiuntur,
siue rotam, siue vertices in aquis, siue simile quiddam circumuerti
viderint. Quinetiam idem sine circuitione fieri vide-

Quomodo vertigo à comitali differat.

mus, quod in circumductione frequenter accidit. Differt autem
vertigo à comitali, de quo statim agemus, quod illa ægros neque
sensibus priuet, vt in hoc, neque distentione afficiat. MATHETES,
Quot modis vtraque vertiginis species generari solet? GERON, 15
Bisariam: nempe si cerebrum, vel primariò affectum est, vel con-

*Modus duplex
vertiginis.*

sortij lege. MATHETES, Quæ sunt inditia primarij illius affectus?
GERON, Vehemens capitis dolor, grauitasque præcedens, aurium
sonitus, odoratus læsus, & alius quisque sensus, qui à capite
trahit originem. MATHETES, Quæ secundarij? GERON, 20
Nausea,

Notæ primarij.

Secundarij.

cibi fastidium, stomachi rosio, quæ Græcis *καθάρσις*, dicitur, &
oris amaror, & si quæ pars alia mali huius initium fecerit, ipsa
quoque affecta, notas suas habebit: verbi gratia, si vertigo ab occipitio
orta fuerit, pars eius minima indolescit, etiamsi blandissime attingatur:
humor concitatus, vaporem in sensus omnes expirat, quo statim offusi detinentur. MATHETES, Quæ vertiginis
causa proxima existit? GERON, Tenuis calidusque vapor, per ar-

*Vertiginis causa
proxima.*

*Quæ vertiginis
accessionem moueant.*

terias cerebri exhalans: qui dum spiritus humoresque in plexu reticulari
exagitat, & variè impellit, sensus motusque turbulentos efficit. At vapor
iste, ex humore vitioso conflatus, non continenter & assidue, sed per circuitus,
& quoties euidentium causarum vi, & impetu cietur, efflari consuevit. MATHETES, Quæ causæ
evidentes, vertigini obnoxij accessiōem mouent? GERON, Solus æstus,
exercitatio immodica, & quæcunque humores calefaciunt, exagitant,
aut cerebrum concutiunt: nec non rotarum, & vorticum modo in aquis
circumagitant. MATHETES, Quid affectiones istæ vertiginum portendunt?

Præsignia.

GERON, Sicut initio illarum leuius symptoma est suffusio, qua duntaxat fumi, nubes, nausæ,
aliæque his similia, ob oculos volitare putantur: ita postremò eis
superueniunt, morbus comitalis, & attonitus. in medio autem illarum
affectus obueniunt, tum qui periculo vacant, tum perniciosi. Nam vt
vertigo simplex, ita & tenebricosa, in perniciosiss-

ciōsissimos affectus conuerti potest, vtpote illis proximos, præ-
fertim ad comitalem & attonitum. Si ægri ea, quæ oculis ob-
uersantur, cruenta magis esse putant, insanix futuræ metus est: in
qua non tantum imaginatio, sed ratio quoque læsa est. si purpu-
rea, morbi comitalis. *MATHE TES*, Quo anni tempore vertigi-
nola, siue scotomatica affectio vehementior inuadit? *GERON*, Per
hyemem, aut uerni temporis initio: quo sæpè comitalem mor-
bum futurum denunciat: veteres eum paruum comitalem ap-
pellarunt. *MATHE T*, Quis alius præter hunc affectum superuenit?

*Vertiginis com-
uersio in comi-
talem.*

*Vertiginis vema-
pus.*

GERON, Symptoma quoddam, quo quis per somnum gran-
dissima mole opprimi, vel ab alio tanquam hoste inuadi, vel ab
alio ad concubitum violenter vrgeri, vel ab alio pectori suo in-
sidente, suffocari imaginatur. vnde ei græcum nomen est inditum
ἐπιδάκνυς, hoc est, insultor, siue incubus, vel *πυρρὰ δάκνυς*, & *πυρρὰ δάκνυς*, lati-
nè suffocatio nocturna, quæ respirationem offendit, vocem-
que intercipit. *MATHE T*, In qua corporis parte vitium hoc pro-
uenit? *GERON*, In cerebro, vt cuius tum principes, tum mo-
uendi sentiendique functiones, sub eo sint offensæ. Nam neque
facile sentit, neque mouetur, neque vocem metu suffocationis,
aut saltem incertam admodum, exilèmq; ac benè discretam
edere potest: tandem autem vehementer anxius, somno interrup-
pto, repente expergiscitur. *MATHE TES*, Quæ mali huius causa
est? *GERON*, Crassus, ac frigidus vapor, pituitosi ac melancholici
humoris soboles: quæ à præcordiis ad cerebrum delata, ventri-
culos ipsius obstruxerit. Qua ratione fit, vt crapulæ ac continuæ
stomachi cruditates, vnde illæ exhalant, hoc malum præcedant,
hinc septum transuersum pulmonèsque premuntur. *MATHE TES*,
Quo tempore noctis affectus hic inuadere solet? *GERON*, Per
somni initia, quando calor innatus à vigiliis, per quas vapores dis-
sipantur, quiescit, intròque se conuertit, illis generandis incum-
bens, eisque cerebrum opplens: præsertim eo tempore, quo ali-
menta elaborat: non tamen absolute euincit. *MATHE TES*, Qui
huic vitio magis sunt obnoxij? *GERON*, Luxui & crapulæ de-
diti, & qui in magna cruditate sæpe esse, & supini, non in latus
decumbere consueuerunt, grauius malum est, cum vigilantibus
etiam superuenit, pessimum est, vbi per somnum inualerit, &
ægris iam experrectis, frigidi sudores tremorèsque cordis oriun-
tur. *MATHE TES*, Quid de solutione eius sperandum est? *GE-
RON*, Si non statim per initia discutiatur, sed diu & frequenter
infestet, tandem in vertiginem, in morbum tum attonitum, tum
comitalem, insaniam, neruorum distentionem, aut subitam
mortem delabitur. quippe hoc modo pleriq; etiam in ipso cubili

EPHIALTES.

Incubus.

Parti offensa

Causa ephialtæ.

*Tempus ephial-
tæ.*

*Ephialtes præfas-
ta.*

*DISTENTIO,
SPAS MVS.*

Rigor neruorum.

Rigorum signa.

*Sedes in rigori-
bus affecta.*

mortui deprehenduntur. *MATHET.* Quis affectus hunc sequitur?

GERON. Is, quo nerui musculique ad originem suam contra hominis voluntatem distenduntur, & Græcis *αρασις*, Latinis distentio, vulgo conuulsio appellatur: nihilque ferè à naturali, tum corporis, tum partium eius motu differt, nisi quòd citra arbitrium nostrum fiat. Sicut enim voluntas hominis sani in cerebro, iuxta neruorum originem constituta, motionis principium primis neruis, ac per ipsos, musculis suppeditat: ita in eodem affectu muscoli, citra huiusmodi principii ad capita sua retrahi, & membra, quibus illorum tendines inseruntur, simul & adduci, & contrahi coguntur: nec non figuram suam naturam mutant, doloreque nunc grauiore, nunc leuiore torquentur, & vires ipsorum subinde languescunt. Morbus hic est quidem rarus & insolens, sed tamen acutus, qui breui iugulet. Idem aliàs vni membro, vt oculo, cuti frontis, linguæ radici, maxillæ, labris, orî, vt in risu Sardinio, brachio, manui, cruri, pedumque digitis molestus est: ceruicibus autè grauisimus, aliàs omnibus partibus capiti subiectis, aliàs totis corporibus incidit. Priora ex his duo genera, Latini rigores neruorum, Græci *νίαινος* vocant. *MATHE.* Quod tertium illorum genus est? *GERON.* Sub quo, cum caput quoque laboret, tum mens, cum sensus vnâ vitiantur: idque non continuè, vt in alijs, sed per temporum interualla recurrit. *MATHE.* Quid ceruix, vel corpus in rigore perpetitur? *GERON.* Flecti non potest, sed vel recta intenditur, vel in priorem partem incuruescit, sic vt mentum pectori annectatur: vel in posterio- ra abducitur, vt caput scapulis adiungatur. prior græcis *τετανοειδής* altera *κυνεοειδής*, vltima *εμοδοειδής*, appellatur. *MATHET.* Quibus alijs notis affectus iam dicti internoscuntur? *GERON.* In rigore recta tendente, facies rubet, dolètque: maxillæ quasi lignæ obrigent: os vix aperitur, oculi distorti illachrymantur, dorsum riget, crura atque manus vix contrahuntur. In eo rigore, qui ad posteriora vergit, æger vociferatur, ingentique dolore excruciat: hoc augescente, è cubili exilit, & plurimum nugatur: finiente verò, ad mentem reuertitur, & conquiescit: idem pugnum comprimit: crura autem non contrahit, neque manus extendit. In accessione morbi, nonnunquam etiam vocis vsum amittit, facitque omnia furiosi hominis similia. quando certum imminet exitium viribus destituito, & defudanti, potumque per nares reijcienti. *MATHE.* Quæ sedes hæc affectionum primario affecta est? *GERON.* Interim cerebrum ipsum, interim spinalis medullæ initium: aliàs neruus quidam, aut musculus singulari motioni dicatus. *MATHE.* Quomodo id dignoscam? *GERON.* Facile, nam si muscoli fa-

cici

- 5 ciei etiam cum toto corpore distenduntur, indubiè cerebrum ipsum affectum esse indicatur: sin autem faciei musculi incolumes permanent, spinæ initium lēsum est. At si pars quædam distendatur, neruus, aut musculus motioni eius inseruiens, offendi notatur. **MATHE TES**, Quid si tres istæ distentionum species in certa vna parte, non autem in corpore toto constiterint? **GERON**, Tunc id tantum discernendum erit, num capitis & faciei partes læsæ sint, an saluæ permanserint. Si nanque primario modo hoc vitium euenerit, cerebrum ipsum affici: si secundo, non cerebrum, sed spinalis medullæ initium, ex toto, aut partim oblæsum esse constat. **MATHE TES**, Vnde certa quædam pars distendi cognoscetur? **GERON**, Ex ipsius confectionis anatomicæ notitia. **MATHE TES**, Quot sunt causæ distentionis neruorum. **GERON**, Variæ, quæ tamen omnes Hippocrati duæ tantum numerantur, nempe exinanitio, & plenitudo: illa ab ardente feбри, vel à purgatione, siue veratro, siue alio medicamento tentata: vel à grauissimis vulneribus: vel ab alia quauis sanguinis profusione: vel à neruorum puncturis: vel ab immoderatis vigilijs: vel ab inædijs: vel à labore immodico, concitata. hæc ab inflammatione, vel à luxu, & tumulentia, vel à vacuationis necessariæ suppressione, vel ab exercitatione intermissa, prouenit. Atque hæc distentiones ex contrarijs istis causis procreatæ, sic inuicem discernuntur, quòd plenitudini dicata, subito generari sine vllis signis præcurrentibus solet, factòque bilis vomitu statim conquiescat: eòque ad stomachi affectum magis quàm ad febrim pertinet: exinanitioni verò propria, sensim, longòque temporis cursu prouenit. Notandum autem, si neruorū distentio ex repletione comitata fuerit, causam eius esse, aut cerebri, initijue spinalis medullæ, seu alterius partis neruosæ inflammationem, aut succorum copiam, partibus modò dictis adhærescentem. sin autem ex humorum abundantia duntaxat excitata fuerit, inquiri debet, vnusne absolutè humor, an plures inter se mixti, ex æquo increuerint. **MATHE TES**, Quæ alia præter has distentionis neruorum, musculorumque species restant? **GERON**, Vna quædam leuis, & flatuosa, græcè *φυσώδης*, distentio: eò quòd maximum licet dolorem, perbreuem tamen, & vix horæ spatio durantem indicat: vt quæ sola frictione mitescat. **MATHE TES**, Quas partes infestare solet? **GERON**, Plerunque manuum pedumque digitos: nonnunquam etiam crura, summo ipsa cruciati extendens, vel in sese contrahens. **MATHE TES**, Quis huius mali auctor est? **GERON**, Crassus lentusque vapor, neruorum propaginis infertus, qui illas veluti lixæ chordam replet, contrahitque. **MATHE TES**, Quæ alia distentionis generandæ ra-

Causæ distentionis.

Distentio flatuosa.

Distentionis flatulenta pars alia.

Distentio ex con-
sensu.

tio superest: GERON, Quæ consortij lege, non autem ex nervosa-
rum partium plenitudine, neque ex inanitione, sed potius ex qua-
litate quadam fieri solet, quæ illas ordine continuato immutat: it
eoque ad cerebrum ascendat, aut spiritu quodam ipsas accedente,
aut veluti leui aura ad nervorum originem exhalante infecerit.

Causa distentio-
nis ex consensu.

MATHE TES, Qualis igitur huius causa existit? GERON, Non mo-
do exterior, nempe scorpionum, aut phalangiorum, aut alterius
venenosi animalis ictus, verum alia etiam interior materia subna-
scens, ex qua simile generari potest, nulla exteriore causa acceden-
te. Contingit enim, vt si os ventriculi ab humore æruginoso, aut
potius ab ipsa ærugine rodatur, totius corporis distentio super-
ueniat. vbi autem illa per vomitum euacuata fuerit, hæc statim
vt febris, cessat. MATHE TES, Estne alius adhuc motus vitiatus?
GERON, Est sanè, quo membra contra voluntatem concutiu-
tur, latinis tremor, græcis τρέμος, appellatur. MATHE TES, Quis hu-
ius auctor est? GERON, Facultatis motorix, ac nervorum imbe-
cillitas: ob quam membra suapte natura graui, attolli nequeant,
sed dilabi coguntur. nam tunc facultas cum membris veluti pu-
gnans, grauitati ipsorum resistit, ac tantum illa in sublime eleuat,
quantum ipsa pondere suo deorsum feruntur. MATHE TES, Vnde
de imbecillitas nervorum, & facultatis mouendi contrahitur?
GERON, Vel ex ætate senili, vel ex morbo longo ac graui: vel ex
immodica intempestiuâque venere: vel ex timore, siue alio animi
affectu, vel ex illis, quæ tota natura nervis aduersantur, qualis est
immoderatus argenti viui vapor: vel ex his, quæ nervos acrius
feriunt, ac replent: cuius generis est liberalior vini meracioris v-
sus: adhæc lentis, crassique humores nervos obstruentes. quanuis
hæc causa leuior quàm in stupore & resolutione existat. MA-
THE TES, Quales sunt isti humores? GERON, Pituita, nec non fla-
ua bilis: ob quam tremor sæpius ante morborum acutorum fi-
nem, suboriri consuevit. MATHE TES, Quid est morbus comitialis?

TREMOR.

Imbecillitas ner-
uorum vnde.

COMITIA.
lis morbus.

Epilepsia.

Herculeus mors
bus.

GERON, Crebra totius corporis distentio, non tamen per-
petua, vti vera, quæ in ceruicis rigoribus apparet: sed quæ per
temporum intervalla accedit, græcis Πιληΐα dicitur: Hippocrati
aliquando πῦρ δὲ τῶν αἰσθητικῶν, quali puerilis morbus, quod pueri, præ-
sertim humidiores eo sæpius corripiantur. Nam horum ætas ob
nervosi generis infirmitatem, distentionibus est opportuna:
Aristoreli Hercules, quod non facile superari euincique possit:
Celfo maior, quod homo ob eius grauitatem prolaboratur: alijs Lu-
naticus, quod lunæ cursus ratione, & nascatur, & propellatur:
vel quod interlunio editi, eo ferè corripì soleant: alijs aliter no-
minatur. MATHE TES, Quæ pars in hoc malo potissimum affe-
cta est?

ita est: GERON, Cerebrum: vt eius proprię functiones principes, sensiles, & motrices oblaesę testantur. Nam sub hoc malo homo statim concidit: mens ac sensus omnes incercipiuntur, sic vt ille neque audiat, neque videat, neque pręteritorum meminerit.

Morbus comitialis vbi potissimum consistat.

5 Tres autem sunt morbi istius differentię: in quibus omnibus cerebrum communiter est offensum. vna ex primario ipsius affectu: altera ex ventriculi consensu: tertia ex remotioris partis, vt pedis, aut vteri, aut manus, aut similis cuiusdam consortij lege, contrahitur. MATHETES, Totumne cerebrum, an aliqua eius re-

Differentia tres comitialis morbi.

10 gio offenditur: GERON, Medius sinus, vel postremus. MATHETES, Quę illarum causę: GERON, Primę, humor crassus, pituitosus, aut melancholicus, viscosus, copiosior in medio cerebri, vel postremo ventriculo collectus, qui spiritum animalempedit, ne in totum corpus distribuatur: non autem intemperies, vt qui-

Causę comitialis morbi.

15 dam autumant. MATHETES, Quare: GERON, Quia sinuum cerebri obstructio, ex crassis humoribus, & subito generatur, & statim soluitur. At non solum noxię eiusmodi humoris copia, sed etiam venenata qualitas, cerebro ipsi plurimum aduersaria, hunc morbum procreat, siue calida, siue frigida: dum illa hoc ipsum fe-

Morbus comitialis vbi potissimum consistat.

Morbus comitialis vbi potissimum consistat.

Note comitialis morbi primę speciei.

20 rit: id vicissim, eius qualitati tanquam hosti singulari certamine repugnat. nec non cerebri abscessus, aliās corrupta membranę cerebri portio caluarię adhærens, summo cum dolore eum gignit: vnde noxius humor in cerebri sinus penetrat. MATHETES,

25 Quid secundam speciem excitat: GERON, Materia vitiosa, aut vapor in ventriculo natus, qui ad cerebrum exhalat. quod vitium illud ex oris ventriculi consensu experiri dicitur, sicut oculos suffusionem. MATHETES, Quid tertiam: GERON, Qualitas, vel spiritalis quędam materia, ab inferioribus partibus primario affectis, vt a pedum manuumque digitis: vel a crure: vel ab vtero, si

30 mulier grauida est, per abditos meatus: vel a summo capitis vertice, in cerebrum transmittitur. MATHETES, Quibus notis singulę species dignoscuntur: GERON, Prima laborantes, antequam morbo tenentur, capite grauantur, & dolent, præcipue cum iracundia permoti fuerint, facies pallet, oculi obscurantur, caligant-

35 que: mens & sensus stupent, horrenda infestant insomnia: spiritus difficulter trahitur: venter flatibus vehementer intumescit: vrina præter consuetudinem tenuis & cruda apparet, in accessione autem vehementem disentionem experiuntur: vocem obscuram edunt: linguam inordinate mouent: eamque loquendo

40 mordent: stertunt, circumaguntur, tremunt: ne: spumę ex ore mouentur: deinde interposito tempore ægri ad se redeunt: perque seipsos consurgunt, interdum musculis resolutis, vrinam, vel

*Secundæ speciei
signa.*

*Tertiæ speciei
signa.*

*Morbus comitia-
lis quando gra-
uissimus.*

*Morbo comitiali
obnoxij.*

Prognosticum.

*Quandiu mor-
bus comitialis
perseueret.*

*In gravida mor-
bus comitialis
quando solua-
tur.*

*Comitialis à par-
te aliqua.*

alui excrementum, vel semen præter solitum emittunt. MATHE-
TES, Quæ secundam speciem indicant: GERON, Eius accessio-
nem præcedunt ventriculi dolor, distentio, rosio: ægri difficul-
ter inediam sustinent, & cum accessio in propinquo est, nausea,
cordis dolore, aut animi defectione torquentur: vbi verò illa des-
ierit, vomitio nunc pituitæ, nunc bilis comitatur. MATHESES,
Quæ tertiam speciem notant: GERON, Frigidior quædam quasi
aura, per continuatas partes in cerebrum ferri ab ægro percipi-
tur, sic vt à pede, vel crure initium capiat: inde per femur, lum-
bos, & latera, ad ceruicem vsque recta ascendat, donec ad caput
perueniat. Eodem modo in ictu scorpionis, aut alterius virulente
bestie accidere consuevit. MATH. Quando comitialis morbus est
grauissimus: GERON, Tunc, quando continenter recurrit, breui-
simâque accessionum habet interualla, diu autem, vbi inuasit, im-
moratur, præsertim si magna simul vertigo vrgeat, nec non spiratio
difficilis, agitatio corporis vehemens, & longa: post hanc gra-
uis sopor, καλοῦσι, similis: sub quo homo quasi vitam amisisse credi-
tur: adhæc æger in summo versatur periculo, vbi spuma ab ore
deterfa, sæpius reuertitur. MATHESES, Qui huic malo sunt magis
obnoxij: GERON, Viri potius, quam feminae: pueri nuper nati,
quàm adultiores: minimè autem senes, & ætate confecti. MA-
THESES, Quid de morbi huius solutione sentis: GERON, Diu
admodum perseuerare consuevit, si per initia neglectus fuerit, in-
terdum crebris, & vehementissimis accessionibus veluti peracutus
redditus, ægrum ilicò iugulat. At si neque pubertate, neque
menstruorum initio, aut puerperio discussus fuerit, sed post id
temporis remanserit, tunc ipse ad mortis diem vsque prorogatur:
nisi accuratam medicus ei curationem adhibuerit. Qui post vige-
simum quintum annum vitio isto correptus est, difficillimè, aut
nunquam conalescit, per totam vitam illi obnoxius, præsertim
si ex parentibus huic malo opportunis natus, aut à femina men-
struali conceptus fuerit. Quòd si morbus ille prægnanti mulieri
obuenit, foetu eliso finitur: & si quid inde vitij hic contraxit, id
magna ex parte tollitur, vbi ipse in lucem editus, statim multum
excrementi aquosi vomitu reiecerit: sin minùs, morbus remanet.
Quinetiam alphas albi coloris in capite natus, & crustosa puero-
rum scabies, morbi remouendi spem aliquam faciunt, maximè si
is non est inueteratus, & ex victu tantum immoderato secutus:
aut si futura accessio ab vna corporis parte, nempe à manu, vel pe-
de magis, quàm à lateribus, aut ab ipso capite percipiat. At si
malum istud è contrario simul corpus afficiat, non autem à parte
aliqua accedat: sed homo quacunque in ætate subito concidat,
vix

vix ei succurritur: sicut neque cum mens læsa est, & neruorum facta resolutio, cumque longa febris, & præcipue quartana illi superuenit, nulli cedit remedio.

- Proximum huic malo vitium est, quo corpus & mens stu-
 5 pet: hoc est, in quo omnium corporis partium, cum morus, tum sensus, principisque animæ functiones impediuntur, sola respiratione superstite. vnde ægri, quibus illud accidit, subito tanquam fulminis ictu percussi concidunt: vnde Latinis attoniti nominantur, sicut casus ipse Græcis *ἁπλοῦς*. *MATHETES*, In quo cor-
 10 poris loco origo, morbi huius consistit. *GERON*, In vtraque cerebri sede, priore scilicet & posteriore, sicut etiam morbus comitialis. *MATHETES*, Cum ergo in vtroque affectu, tum cerebrum, tum principes eius sinus, hoc est prior, & posterior ventriculus offendantur, quid inter illos discriminis habetur? *GERON*, Cere-
 15 brum in hac magis, quam sinus ipsius, vnâq; & pariter afficitur. *MATHET*. Quis mali huius auctor esse dicitur? *GERON*, Frigidus, crassus, & viscosus humor, siue pituitosus, siue melancholicus, aut inflammatoria quædam cerebri affectio, vt phlegmone, erysipelas, abscessusque, ventriculos illius obstruentes: sicut etiam immo-
 20 dici vini, aut cibi, quanuis optimi ex valenti materia vsus, aut cruditas, aut aeris admodum frigidi occursum, aut casus, aut capitis ictus: vnde sinus cerebri oblaeduntur, & spiritus seu facultas animalis ad idoneas partes transire impeditur. *MATHETES*, Quæ communia sunt attonitorum signa? & quæ singularum eorum
 25 causarum propria? *GERON*, Si humores morbi auctores sunt, subitus ferè capitis, acutissq; dolor, vertigo, oculorum caligo, dentium in somno stridor, totiusque corporis, maximè exterioris frigus percipitur. In accessione verò, homo malo hoc correptus, subito cum clamore prolabitur: mox clausis oculis stertit, & magna
 30 spiritus difficultate orta, propemodum suffocatur: pectus tanquam vinculo quodam astrictum attolli prohibetur, sic vt à solo spiritu vitæ spes pendeat. Nam cum hic difficulter trahitur, aut prorsus intermittitur, apoplexia magna & pestifera dicitur, quæ
 35 aut leuior vocatur: quæ licet remedijs cedat, tamen difficillimè, idq; cum lateris resolutione. Si verò hoc primis diebus quatuor non fiat, hominem opprimit. Est cum aliqui adeò leuiter hoc affectu laborent, vt solo ore distorto, nulla autem neruorum resolutione oborta, sensu motuque licet amisso, neque spumam emit-
 40 tant, neque stertant, sed remedijs curati, rursus conlescant. Hodie omnium mali huius specierum sanatio præmittitur. *MATHETES*, Quibus vitium hoc magis familiare est? *GERON*, Natura

APOPLEXIA.

Attoniti.

Sedes apoplexiæ

Auctor & causa apoplexiæ.

Attonitorum signa.

Apoplexia magna.

Parua.

*Ad apoplexiam
proclines.*

*Quæ anni tem-
pestas, & ætas
hominis apople-
xie oportuna.*

*Apoplectica cor-
pora mortuis si-
milis, quomodo
dignoscantur.*

*Qui morbi atto-
nito respondeant*

*Comitialis quo-
modo differat ab
attonito.*

Paraplegia.

*Sopor, & vteri
strangulatus, in
quo ab attonito
differat.*

*Vteri strangula-
tus & syncope,
in quibus discre-
pent ab attonito.*

frigidis, crebraque capitis gravitate, sopore, oculorum caligine laborantibus, breui & angusta ceruice præditis, otiosis, liberaliori potui & cibo indulgentibus: præsertim si iam annum quadragessimum, nondum autem sexagesimum exceßerint. Interdum etiam adolescentes, ipsique grandiores, & alij. sed non nisi maximis ex causis illo infestantur, præsertim tempore æstiuo; nam sub his ferè mors consequitur. Hyems aliàs huic affectui opportunior est, maximè si venti perfrigidi spirent, & dies sint nebulosi, ac frigidi. Hinc etiam frigora in corporibus, & torpores nihil boni portendunt: sudoresque in accessione erumpentes mortiferi, propter spiritum impeditum existunt. In eodem casu corpus sæpè extinctum apparet, quod adhuc viuit, præcipuè foeminarum, & eiusmodi virorum, quorum natura est frigidior: MATHETES, Quomodo hoc dignoscere poterò? GERON, Si pluma naribus admota, aut in ore suspensa dispergatur, aliqua spes vitæ: si immota manet, nulla superest: similiter, vbi vasculum aquæ plenum pectori superimpositum, moueri aliquantum videtur, vitam adesse notat: si prorsus immotum persistat, amissam esse testatur. sicut etiam in sano homine aliquando accidere Hippocrates prodidit: vt, qui subito dolore capitis correptus, mutus euadit, sterilitque intra septimum diem intereat: seruetur autem, si ante id tempus febris superueniat. MATHETES, Qui alij affectus attonito respondent, & quibus notis inuicem distinguuntur? GERON, Comitialis, grauisque sopor, de quibus antea tractatum est: item syncope, & vteri strangulatus: de quibus postea agetur. Attonito igitur remedijs finito, partis cuiusdam corporis resolutio succedit, quæ Græcis *παραληγία*, seu *πάρλυσις*, dicitur: comitiali non item: quia in hoc vniuersi corporis distentio, quæ vulgo conuulsio vocatur, non autem resolutio, vt in illo exoriri solet: sub qua functio animalis in totum amissa est. In sopore graui, & vteri strangulatu respiratio facilis, & libera ferè seruetur: in hoc autem propemodum tollitur. Rursus in sopore priores cerebri partes opprimuntur, & sensus ab his prodeuntes obtunduntur: posteriores autem saluæ permanent: sic vt spiritus, quod satis est, neruis motioni dicatis, ad hanc conseruandam infundant, & maximè respirationem, quæ ad vitam tuendam in primis est necessaria, asserant. in attonito, motus omnis respiratioque tollitur: ob quod etiam potissimum homo suffocatur. Porro in vteri strangulatu, cum cerebrum toto vapore feriat, respiratio multò minus impeditur, nisi fauces obrurentur. In syncope, nullus arteriarum pulsus, aut valdè obscurus deprehenditur, sicut aliàs audies: in attonitis plenus & vehemens, nisi cum mors in propinquo est. At in leuiore apople-

apoplexiæ vitio, interdum sensus quidem, aut motus superest, sed stupidus admodum, & incertus, sub quo tunc ferè pars altera corporis resoluta ingrauescit. *MATHETES*, Cùm iam resolutionis paulò ante memineras, dic obsecro, quidnam verè illa existit?

Resolutio vera quid sit.

GERON, Cerebri offensio, qua motus & sensus intercidit, idquè in altero corporis latere, vel dextro, vel sinistro, vel in singulari quodam membro. si alteri lateri, nunc dextro, nunc sinistro accidat, inde nomen habet: si membrum aliquod infestet, nempe manum vel crus, illius affectus talis esse dicetur. quanquam cùm motus

Dextri aut sinistri lateris resolutio.

10 solus præcipuè, aut sensus interit, etiam quodammodo resolutio, licet non absolutè, dici potest. Siue igitur sensus, siue motus, siue vterque amittatur: tamen resolutio vocari solet. *MATHETES*, Quare in hoc neruorum vitio interim sensus, motu incolumi, interim motus, sensu saluo, interdum vterque amittitur? *GERON*,

Cur nunc sensus, nunc motus, altero saluo amittatur: cur vterque.

15 Quia duplex neruorum natura est, & ex his quidam mouendi, quidam sentiendi vim, à facultate animali recipiunt: ea autem destituti, neutram actionem obire possunt. Est porro resolutio quodam perfecta, quædam imperfecta: illa totius corporis, quæ apoplexia dicitur: hæc vnius cuiusdam partis propria est: quæ nunc

Resolutio perfecta.

20 sensum tollit, motu superstiti: nunc motum, sensu incolumi. potest enim alterutrum altero manente nonnunquam interire. Est cùm in hac eadem resolutione. sensus motusque torpeat, & stupefcat: sicut nonnunquam in remulenti accidere solet, motu illæso. Adhæc resolutio, aliàs ex morbo attonito leuiori, aliàs ex stupore

Imperfecta.

25 sensim aucto prouenit, qui illam denunciare solet. *MATHETES*, Quibus membris incidit resolutio, quæ attonito morbo succedit? *GERON*, Modo toti corpori, quod capite inferius est: modo alteri eius lateri duntaxat. *MATHETES*, Quid si nullo morbo antecedente incipiat? *GERON*, Tunc aliàs membra nuper compre-

Resolutio ex apoplexia nata, cui obueniat.

30 hensa occupat: aliàs vnam quandam partem, vt linguam, oculos, malas, labra, brachia, crura, pedes, & similia. atque hanc futuram, in vna illarum semper prænunciat, vt ex qua sensim augescente, illa procreatur. *MATHETES*, Vtra ex supradictis duabus resolutionibus grauior, periculosiôrque existit? *GERON*, Prior, eoque sæpè in attonitum morbum, vnde prodijt, reuertitur: posterior,

Quando singularem partem innadat.

35 licet æquè ferè diuturna, longè tamen mitior esse solet. *MATHETES*, Quid in vtraque commune reperitur? *GERON*, Quòd nunc sensus interiat saluo motu: nunc motus aboleatur, sensu incolumi: sæpè etiam quòd vterque periat. adhæc quòd pars resoluta protinus refrigerat, grauescatque: & si attollatur, rursus mole sua de-

Resolutio totius corporis periculosa.

40 cidat, laxa molliorque: & cum malum in veritatem incidit, ipsa alimenti penuria contabescat: facies autem in aduersam partem

Quid commune in vtraque resolutione.

Resolutionis sedes. sanam detorqueatur. MATHETES, Quæ prima resolutionis sedes existit? GERON, Sicut attoniti morbi origo, in toto cerebro consistit: ita lateris dextri, vel sinistri resolution, ex dimidio quoque cerebro originem habet. Nam faciei partes dextræ, vel sinistræ cum similibus quoque corporis membris, resoluntur. MATHET. 5
Sensus partis faciei unde aboletur. Ob quid partis alicuius faciei sensus aboletur? GERON, Ob nervos, qui à tertio cerebri pari prodeunt, offensos. MATHET. Ob quid motus? GERON, Propter primas spinæ vertebrae oblesas. MATHET. 10
Motus unde pereat. A quo omnium partium resolution contrahitur? GERON, A totius spinæ initio affecto. MATHETES, Vbi hemiplegiæ causa existit? GERON, Non in tota spinâ, sed in altera duntaxat ipsius regione. 15
Vnde omnes partes resoluantur. MATHET. Vbi alterius cruris, aut vtriusque resolutionis origo? GERON, Infra lumbos. omnes autem subditæ partes, tum dextræ, tum sinistræ, resolutionē experiuntur, cum tota spinæ medulla, in transuersum est affecta: quæ verò è regione offensionis duntaxat sita sunt, ex altera medullæ parte læsa resoluntur. Proinde in quavis parte resoluta descendum est, in eandem sola vitium, an in illius nervo inhæreat: adhæc sciri debet, num in toto nervi processu, an in parte eius aliqua, nūmq̃ue in origine solum, an in ipso cerebro, aut in spinæ medulla consistat. Sin autem facie dempta, vna quædam ex prædictis, sensus motusque expers euaserit, affectus ipsorum ex primo spinæ processu, originem ducit. MATHETES, Quo in loco noxa subsistit, cum inferiora facie membra resolutionem experta sunt? GERON, In eodem spinæ initio affecto, quæ tanquam communis omnium nervorum, qui sub facie habentur, origo existit: sic tamen, vt spinâ ipsa non leui, sed ingenti affectione laboret, offensaque sit. Porro si quæ pars singularis duntaxat resoluta fuerit, illa, vnde nervos accepit, inuestigari debet, vt iam dudum in confectione didicisti. quemadmodum si ipsamet quoque spinæ medulla, non in eius initio, sed propè inferiores partes, ac vertebrae offendatur, subiecti quoque loci noxam sentiunt: si magnam, omnes: si exiguam, & paulatim, illi qui è directo subiectæ sunt, afficiuntur. Cùm igitur quælibet resolution ob penuriam animalis facultatis generetur (vt dixi) non immerito cerebrum ipsum, aut spinæ medulla, seu nervi quidam singulares illic orti, denique sentiendi mouendique instrumenta affecta esse solent: in quæ vis illa animalis, ex superioribus membris delegatur. Quomodo autem dignoscas, num vna, vel altera pars primario afficiatur, superius est explicatum. MATHETES, Quæ sunt resolutionis cuiusque indicia? GERON, Nulla alia, nisi quòd membrum ei obnoxium sensus motusque expers, deprehendatur. MATHETES, Quæ ergo causa ipsius existit? GERON, Non vnum ipsa morbo-

- morborum genus, sed varium sectari consuevit. interdum enim
 intemperiem plus iusto frigidam, cum similium etiam humorum
 viscosorum, & insigniter crassorum abundantia, vel sine ea. Ma-
 gis autem ferè est crassior pituita, neruo tenaciter impacta, quæ
 5 spiritum animale impedit, & parti, in quam neruus propaga-
 tur, influit, distribuiturque. Quinetiam alius quiuis humor, spi-
 nali medullæ infixus, resolutionem excitare potest: sæpè quoque
 flaua bilis hanc inducit, vbi sub febrium intermittentium finem,
 10 in spinam dorsi, & in neruorum origines effunditur. Adhæc in-
 flammatio, aut scirrhus, aut quiuis alius tumor naturæ contrari-
 us, in parte aliqua prædicta, aut ei vicina subortus, dum neruum
 aut medullam constringit, resolutionem parit. quinetiam vitium
 hoc gignitur, cum nerui ipsi à re quadam dura, extrinsecus acce-
 dente comprimuntur: vel vbi laqueo, aut manibus constringun-
 15 tur: sicut etiam cum iidem nerui contusi ex casu, vel ictu fuerint:
 vel cum ex luxatis, siue fractis spinæ vertebreis, aut alijs ossibus ar-
 tiores euaserint. Pari modo resolutio ista aliquando fieri solet,
 vbi vulneratum, seu vlceratum cerebrum, aut spinæ medulla, aut
 alius quidam singularis neruus fuerit. MATHETES, Vnde cogno-
 20 scam, à quibus causis singulæ resolutiones proueniant? GERON,
 Proprijs ex signis facile deprehendes: sin autem exterior eius cau-
 sa fuerit, ex ægro, vel assistentibus. MATHETES, Quid de hoc
 morbo sperandum, aut metuendum censes? GERON, Qui per
 omnia membra, vehementer resoluti sunt (vt ait ille) celeriter ra-
 25 piuntur: ac si corrupti non sunt, diutiùs quidem viuunt: sed rarò
 tamen ad sanitatem perueniunt, & plerumque miserum spiritum
 trahunt, memoria quoque amissa. In partibus verò nunquam
 acutus, sæpè longus, & ferè sanabilis est. quanquam hodie vtrun-
 que ferè eius genus sanari posse credatur, vt postea in altero com-
 30 mentario audies. Quæ ex rupto neruo, aut transuersim inciso
 contracta est: nulla medicina ægrum, si febris, aut tremor ei acce-
 dat, liberare potest. MATHETES, Post sensus motusque vitia, qui
 corporis affectus, adhuc sunt reliqui?
 GERON, Qui ex cerebri recremento proueniunt, in subie-
 35 ctas corporis partes defluente. MATHETES, Quid est illius excre-
 mentum? GERON, Superflua alimenti ipsius materia, naturæ ei-
 dem respondens, vt pote tenuis, aquosa, & per initia quidem dul-
 cis: processu autem temporis, si diutiùs hærescat, plerumque vel
 falsa, vel acris: aliàs ipsa moderata: aliàs plus æquo copiosa existit:
 40 præsertim si ipsummet cerebrum insigniter frigidum, humidum
 que, aut alia ratione imbecillum sit: siquæ alimentum, vel libera-
 lius, vel minùs idoneum ei suggeratur. MATHETES, In quam par-
 EE

*Causæ resolutionis.**Pituita crassior.**Flaua bilis.**Inflammati-
o, scirrhus, vel ali-
us tumor.**Nerui compres-
si, vel constricti,
vel coarctati.**Cerebri vulnus,
vel vlcus, vel spi-
næ medullæ, vel
nerui singularis.**Præsentia.**Celsus.**RECREMEN-
torum cerebri
morbis.*

Cerebri excrementa ubi continentur, & quomodo sinus eius repurgentur.

tem capitis, excrementum reconditur. GERON, Moderatius in priores illius sinus omninò: immoderatum extrinsecus circa cerebrum, eiusque membranas diffluit, quò interiores venæ oris pertinent. MAT. Per quæ emissaria sinus cerebri expurgari solent. GERON, Per palatum: sicut reliqua eius portio etiam per idipsum, tum per nares, perque aures, & oculos. MATHETES, Nulquamne alijs in locis, quam supradictis excrementum cerebri congregatur. GERON, Indubiè etiam in externis, præsertim sub cute verticis: in quam venæ per faciem, & tempora in caput excurrentes pertingunt. Quando enim hæ, serosa materia ampliter repleta sunt, superfluam alimenti partem sub cutem expellunt: quæ vix ob eius crassitiem, & densitatem exhalare foras potest. vnde nonnunquam insignis tumor, ceræ instar mollis extuberat, qui cutem densat, plurimumque eam à caluaria separat. hinc quodlibet capitis excrementum, in extimas corporis partes, præcipuè in malas, dentes, ceruicem, scapulas, brachia, latera, dorsum, lumbos, coxas, crura, & artus tandem vniuersos destillat: vnde articularij quoque, & alij dolores omnes generantur. MATHETES, Quomodo affectus appellantur, qui ex cerebri sinuum recrementis, in partes subiectas defluentibus, proueniunt?

Capitis excrementa quomodo in partes inferiores destillant.

Affectus ex recrementis cerebri quomodo appellantur.
DESTILLATIONES.

CATHARRVS

Grauedo.

Partes corporis destillationibus obnoxie.

Destillationum causæ.

GERON, Communi quidem nomine latino, destillationes, græco κατάρροι, vel κατάρρευσις: siue humores à capite ad pulmones, per asperam arteriam, siue ad inferiora per venas defluant: proprio autem pro inferiorum partium, in quas delabuntur ratione, vt si tenuis pituita è cerebro in os fluat, nobis destillatio, Græcis κατάρροϛ vocetur: si in nares, grauedo latinis, illis κόρυζα: si in fauces, ac asperam arteriam, nobis raucitas, græcis βρόγχος, vel ἀσπνεανών, nuncupetur. Notandum autem hæc, alias quoque partes, iam dictis vicinas, tum interiores, tum exteriores, sicut etiam ventriculum, & intestina, excrementitijs cerebri humoribus infestari. MATHETES, Quæ partes corporis in hisce vitijs potissimum offensæ dicuntur. GERON, Primariò cerebrum ipsum, idque in destillatione, ac grauedine, vt stomachus in cruditate. ex consensu autem nares, in grauedine: item os, ac nonnunquam fauces in destillatione: adhæc guttur, seu aspera arteria, aut ipsæ quoque fauces, si immodico humore sint imbutæ. MATHETES, Quot, & quæ causæ cerebro huiusmodi vitia inducunt. GERON, Admodum frigida humidæque, vel calida intemperies, ob quam illa morbi propriè vocari possunt: item plenius, minúsque idoneum alimentum, ipsum grauens, oneransque. quamobrem symptomata seu casus merito appellantur. MATHETES, Nullæne aliæ causæ destillationum existunt. GERON, Si Arabum familiæ credimus, vapores,

pores, qui ex calidiore iecore in caput elati, ac deinde cerebri frigore in aquam conuerſi decidunt, perinde vt terræ exhalatus, in nebulas concreſcunt, ac ſtatim in imbrem, ſiue aquam liquantur, fundunturque. At ſi rem accuratiùs expendamus, minima excrementi portio, hac ratione colligi poteſt. nam deſtillationes etiam in iſis, qui vel temperamento, vel frigidiore iecore ſunt præditi, fieri conſueuerunt. Quare non à calidis iecoris vaporibus ſolùm, ſed à cerebri imbecillitate, ex intemperie frigida, aut calida magis contrahuntur. quoniam hæ inter omnes cauſas frequentiffimæ ſunt, & efficaciffimæ. In ſumma, omnium capitis ſymptomatum, interiores ſerè cauſæ ſunt, intemperies ſimplex, & vitium humoris excrementitijs, qui vel intra, vel extra caluariam conſiſtit. MATHE-
 TET. In quibus autem illius partibus GERON, Vel in cerebro ipſo, vel in eius membranis, vel in prioribus meatibus continetur,
 ac ex illis in partes ſubditas deſluit. MATHESES, Quæ frigidam intemperiem notant? GERON, Excrementa copioſa, & minimè acria, caput, & frons vndique diſtenta, meatus narium colatorij adeò clauſi, vt vox obtundatur: frigidior victus ratio antecedens, talèque hinc temperamentum, præcipuè cerebri, ac ſimilis ætas, anni tempus, regio: nec non talis aëris tempeſtas, & aquilonia. huiuſmodi enim intemperies, dum caput cogit validiùs, & quodammodo comprimit, cerebrum excrementa ipſius, ad inferiora capitis loca prolabi ſinit: cùmque illud, id, quod alimenti gratia ad ipſum fertur, frigoris ſui cauſa concoquere nequeat: hoc veluti excrementum iam redditum, rursus ad inferiora deſcendit, eò quod nullo modo contineri ab illo poſſit. Quinetiam vapores ab inferioribus partibus ad cerebrum educiti, cùm ab illo diſcuti nequeunt, auctiores, craſſioresque redduntur: atque rursus ad inferiora delegantur. ſiquidem frigus nullam humoris abundantiam, in quauis corporis parte diſcutit, ſed illum quodammodo adauget. Hinc etiam cerebrum caſu ob frigidam intemperiem repletur, ac veluti inſtrumentum copia inſeſtatur: id num ex frigidis humoribus eueniat, per capitis tum diſtentionem, tum grauedinem dignoſces: præſertim ſi oculi caloris & acrimoniæ, ac facies ruboris, expertes appareant, MATHESES, Qui potiſſimum hiſce morbis ſunt opportuniore? GERON, Primùm, qui capite imbecilli natura conſtant, nec non ſubiectis infrà viſceribus nimium calidis, vt corde, iecinore, vel renibus: deinde qui pleniore cibo & potu, præcipuè frigido ſe replent, aut in quibus cruditate ſæpiùs ſubſtante, alius non deſcitur: adhæc qui febrim experti, ab ea colliquantur. MATHESES, Quo modo partes corporis habent, quando calida intemperies deſtillationes parit?

Vbi deſluxionis materia continetur.

Frigida intemperies notæ.

Vapores partium inferiorum elati.

Deſluxionibus obnoxij.

Destillationis ex calida intemperie nota.

GERON, Arteriæ in capite multum concitantur, febris magna ex parte oritur: sed malum nihil ex ea leuatur: facies, aliæque particulae, quæ fluxionem sustinent, rubescunt: humor acris, salus, tenuisque, tum per nares, tum per os destillat: aures sonant: nares tumidae sunt, & nonnunquam ipsæ, aliæque partes fluxione laborantes, exulcerantur, quando illa acrior fuerit. frons & caput admodum calere manu admota deprehenduntur, idque certius, si calida ætas antecesserit: nec non simile temperamentum, habitus, anni tempus, regio, æris tempestas. adhuc vehementes cibi fastidium vrget. MATHETES. Quia ratione calida cerebri intemperies deflu-

Calida intemperies quo pacto de fluxiones excitet.

GERON, Quia humores extenuat, dissoluitque, non uti frigida cogit, ac constringit. dum autem ipsa attrahit, per se quoque caput replet: præcipue ubi vinum copiosius, meraciusque assumptum fuerit, aut cibi pleniores, calidique: item si balneæ calidiores, siue largior capitis ex aqua calida profusio, antecesserit. nam hæc quoque, sicut austri, & in his pluuiæ, aliæque omnia quorum natura calida, & humida est, manifestè caput humoribus replent. postremo etiam leuis capitis dolor & grauitas, euidentisque caloris sensus, calidam esse intemperiem ostendunt

Destillationi ex causis externis oportuni.

MATHETES, Qui procliuus ab externis causis in destillationes incidunt: GERON, Calida natura capite præditi: sicut frigido, ab internis facilius ad illas inclinant. MATHETES, Quibus indicij singularum partium destillationes distinguuntur? GERON, Si materia in nares fertur, eaque frigida, & ignaua est, tenuis per has pituita stillat: caput leuiter dolet, sed multum grauatur: oculi ex

Destillationum singularum dignotio.

somno caligant: sternutamenta sunt crebra: extimæ nares frigent: grauedo sæpè illarum meatus adeò obstruit, præsertim in frigida intemperie, ut vox obtundatur. inter hæc ferè vrina cruda, atque turbida apparet. Si materia humoris excrementitij in fauces, asperamque arteriam defluat, raucitas, & tussicula mouetur: si in pulmonem, grauis tussis, ac spirandi difficultas: quæ si non intra vigesimum diem spuito expurgetur, in anhelationem transit. Sæpè etiam laterum inflammationis (quæ græcis *anagitis* dicitur) metus est: præsertim si is quoque morbus tunc in vulgus grassetur. Quod si humor excrementitius in fauces, asperamque arteriam prosiliat, cum tussicula & raucitatem mouet, tunc loca illa exasperat at si in pulmonem humor ille destillet, corporis adest grauitas, crebra sternutamenta, tussisque difficilis, sitis, lassitudo, æstus, vrina biliosa. MATH. Quid de destillationum generibus præ-

Præfagia ex destillationibus quæ.

sagire licet? GER. Si in nares defluant, leue est vitium: si in fauces, perius: si in pulmonem, pessimum: si in asperam arteriam deterius, quam si in fauces: non tamen ita pessimum, quam si in pulmonem destillet

destillet. vt autem reliquæ omnes destillationum species breues :
 ita si neglectæ fuerint, longè esse consueuerunt, nulla autem magis
 pestifera est, quàm quæ pulmonem exulcerauit : vnde grauis ta-
 bes oritur: quæ hominem spatio consumit: eam vel adesse, vel iam
 5 instare, vrina oleacea significat. quanquam neque ex toto salu-
 bris sit, curatûque facilis, si asperæ arteriæ caput, aut ea ipsa ex de-
 stillatione exulceretur, maximè si ad cartilaginis ipsius orbes vs-
 que peruaserit. Magis autem hoc vitium timeri debet, si vetus
 iam destillatio corpus gracile occupet. Non caret periculo, vbi
 10 humor ille superfluous loca sub septum transuersum sita, nempe
 ventriculorum, infestat. quoniam sæpè eius appetentiam, concocti-
 onemque subuertit, & quæ illi ingesta sunt, corrumpit. adhæc
 cum is humor acris est, tunicas ventriculi erodit, aluique proflu-
 uium excitat, interdum venas quoque meseraicas, & intestinum
 15 colon conuellit. Sed hæc de destillationibus satis dictum sit: nunc
 ad oculorum morbos digrediar.

Cum igitur oculi ingentibus, & varijs casibus pateant, pau-
 cis ipforum naturam indicabo. Habent itaque summas tunicas,
 ex quibus superior à cornu *κερατοειδής*, vocatur. inferior huic adium
 20 cta est media parte, qua pupilla est, modico foramine concava, cir-
 ca, tenuis : vterioribus partibus ipsa quoque plenior, græcis ab
 vugacino *παρυειδής*, dicitur. infra rursus tenuissima tunica subsistit,
 reti, seu telæ araneæ similis : vnde græcis *ἀμφιφληστροειδής*, vel
ἀεγχυνοειδής, nominatur. Atque hæc tres membranæ oculos custodi-
 25 unt. Est adhuc alia quarta numero, non tamen propria, vt quæ
 neque ex cerebro, neque ex aliqua eius membrana, sed ex illa, quæ
 caluariam foris ambit, pericranio dicta, originem ducat, Græcè
ἐπιπρωκώς nuncupatur: quod alijs tunicis, quæ oculum ipsum
 constituunt, extrinsecus agnata sit, ossaque circumdata toti oculo,
 30 alliget, simulque musculos ipsum mouentes contegat. MATHE-
 TES, Sunt ne hæc tunicæ omnes oculi partes, quæ vsum visus præ-
 stent? GERON, Non solæ, sed etiam tres humores. primus à gla-
 cie *κρυσταλλοειδής* græcè nominatur: qui eam facultatem obtinet, vn-
 de visio perfectè absoluitur. reliqui duo, vsui eius præsumt: atque
 35 ex his prior ab oui albo *ὀδαλωδής*: alter à vitri similitudine *ὕαλωδής*
 vocatur. MATHE TES, Quot modis visio lædi solet? GERON, Tri-
 bus. primò, cum humor crystalloides, principale sensus instru-
 mentum noxam aliquam sustinet: secundò, cum pars aliqua ex ijs
 quæ principali sentiendi instrumento inseruiunt, affecta est. ter-
 40 tiò, cum ipsa sentiendi facultas, quæ à cerebro per neruum in o-
 culum ipsum descendente procedit, quocunque modo fuerit
 impedita. Quæcunque enim pars, ex iam dictis oblæsa fuerit, vi-

OCULORVM
affectus.

Oculorum humo-
res.

Visiois lesio
quot modis fiat.

Interiora visionis vitia, ubi consistant

flo, vel deprauari, vel in totum aboleri solet. **MATHESES**, In quibus partibus interiora visionis vitia, consistunt? **GERON**, Alia in spiritu, alia in nervo visioni dicato, alia in humore crystalloide. nam ut in bono corporis statu, spiritus copiosus, & æthereus, acutè distinctèque cernit: ita copiosus quidem, sed crassus, longinqualicet, & vicina etiam videat, vix tamen ea discernit. modicus autem & æthereus lusciosos efficit, qui propinqua planè distinguunt, distantia verò non cernit. paucus, & crassus, hebetes reddit, qui neque longinqua, neque vicina discernit, quod senum ferè proprium est vitium. **MATHESES**, Quæ mala cerebro, vel nervo

Intemperies.

Obstructio nervi visorii.

Crystalloides humoris deturbatio

Notæ lesæ visionis & causæ in cerebro.

Obstructionis vel astrictiois nervi visorii indicia.

Ruptionis nervi visorii, notæ.

Humoris crystalloidis à propria sede motio.

visorio, vel humori crystalloidi attribuantur? **GERON**, Cæcitas, obscuritas, omnisque videndi imbecillitas. **MATHESES**, Quod cerebri vitium est? **GERON**, Intemperies, aut simplex, aut ex humore. **MATHESES**, Quis nervi visorii affectus est? **GERON**, Obstructio ex humoris crassioris influxu contracta, vel coarctatio ex tabe, aut tumor naturæ contrarius, aut eiusdem nervi ruptio, per exteriores causas facta. **MATHESES**, Quod peculiare crystallini humoris vitium est? **GERON**, Ipsius ex sede propria deturbatio, quæ vel casu, vel ictu accidit, quibus oculus vehementer concussus est. **MATHESES**, Quibus notis certò cognoscantur, læsæ visionis vitium, & causam esse in cerebro? **GERON**, Si non modò videndi, sed etiam alij sensus sunt imbecilli: num verò ex simplici intemperie, an ex humore vitium sit inductum, ex signis cerebri affecti, supra commemoratis, deprehendere licet. si autem causa vitiatæ visionis in cerebro non reperiatur, in nervis visui addictis, aut infra etiam hos consistit. si verò cæcitas subito, brevique tempore inuaserit, humor qui oculis influxit, eam excitavit: si paulatim longoque tempore oborta fuerit, aut intemperiei, aut astrictioni fertur accepta. **MATHESES**, Vnde intelligi potest, quantum nervus visorius obstructus, vel astrictus fuerit? **GERON**, Si pupilla, dum æger oculum sanum claudit, altero videre conatur, dilatescat, non nihil adhuc spiritus per nervum influentis est reliquum. si autem illa eandem etiamnum figuram, similemque magnitudinem referuet, nihil planè spiritus transmittitur, ut cui iter sit interclusum. **MATHESES**, Ex qua re nervus visorius, ruptionem expertus, & crystalloides, è suo loco motus esse intelligitur? **GERON**, Ex ictu, vel casu, vel alia quavis causa evidenti, violentaque. Interdum nervus idem citra hanc, ex solo materiæ acrioris influxu, subito rumpi, cum intolerabili dolore, & humor crystalloides, è propria sede moveri, pupillaque dilatari solet. **MATHESES**, In quem locum ille moveri consuevit? **GERON**, Aut in vtrumlibet oculi angulum, aut sursum deorsumue. cum autem hoc sit, ægro quæcunque

que cernuntur, gemina apparent. MATHETES, Quomodo affectus ex vitata cernendi functione contracti, distinguuntur? GE. Alij interiores, alij sunt externi. MATHET. Qui sunt interiores.

*Visionis affectus
duplex.
Interni.*

GERON, Suffusio, quæ Græcis *ὑψιχρυσία*, siue *ὑψιχρυσία*, Arabi- *SVFFVSIO.*

bus, aqua, Latinobarbaris cataracta nominatur, qua humor pupillam adeò offendit, vt eam aut omnino obcæcet, aut impediat, ne clarè, & perspicuè cernat. nō solū autem pupilla sed etiam membrana rhagoides, interdum liquor crystalloides afficitur. MATH.

Quæ caulauitium istud gignit? GER. Humor crassius, & lentus ex cerebro per neruum visorium pupillæ infusus, isquæ copiosior, quàm natura postulat. MATH. Estne vna tantū suffusionis species? GER. Non vtique, sed duplex. prima sanè propria, quæ per se videndi actionem lædit: altera oculis nulla peculiari affectione, sed consortij lege infestatis, accidit: dum materia quædam, præfer-

Suffusionis causa.

*Species duplex,
Propria.*

tim non satis concocta, ex ventriculo ad caput exhalat. quanuis oculi interim adeò perfecta sinceræque visione sint præditi, vt vel minimum quodque cernere possint. MATHETES, Quæ de causa hoc accidit? GERON, Quia humor crystalloides, & præcipuè tenuis, aquosusquæ, purior existit: & symptomata semper in eis, pro vi-

Accessoria.

trij magnitudine respondent. MATHETES, Quomodo illa, quæ à ventriculo proueniunt, suffusorum similia, ab his differunt, quæ in veris suffusionibus apparent? GERON, Quæ ex humorum ventriculo in hærentium vitio contrahuntur, vtrique oculo, tum simul tum æqualiter occurrunt. quæ verò ob peculiarem illorum

*Cur minima quæ
que cernant oculi.*

affectum superueniunt, ea alteri tantū illorum obuersantur, non autem simul in vtroque, neq; similiter. Iam ex tempore quoque species istæ suffusionis, distinguuntur. nam si illius symptomata tribus, aut quatuor, siue pluribus mensibus durarint, propria oculi existit affectio. si verò non adeò multum temporis interces-

*Suffusio vera &
secundaria quomodo differant.*

serit, æger autem per interualla conualuisse videtur, à ventriculo malum prouenisse suspicio est, præsertim si nullum visum suffusione laboranti, cibo benè concocto, apparet: multò adhuc magis, si cūm visa apparuerint, æger ex rosione oris ventriculi doleat: maximè verò si symptomata remiserint. vbi res acris, quæ stomacho in hæsit, vomitu fuerit reiecta, aut medicamento dialoës per aluum expurgata: vel si illa inualecant, vbi ventriculus in cruditate est, aut nausea premitur, aut os illius dolet. MATHETES, Semperne morbus hic eadem symptomata, & notas eorum repræsentat? GERON, Non certè, sed per initia, cūm tenuis adeò humor ip-

sus est, vix vt depræhendi possit, fumi & vapores, deinde etiam veluti muscæ, & culices quidam exigui, caliginesque ante oculos sæpe obuersantur: nunc pilis, nunc lanarum, aut aranearum fila-

Suffusionis temporum notæ differentes.

*Signa principij
suffusionis.*

Augmenti.

mentis similia, nunc circa lucernas circuli apparent. Cum morbus processu temporis augeſcit, & humor manifestè crassius, concretusque, & albus euaserit, eadem symptomata, paulò antè dicta etiam augentur. Interdum pupilla ipsa pura videtur, qui minùs accuratè ipsam intuentur: interdum illa colorem aquæ marinæ refert. Vbi verò tandem suffusio expleta est, æger non videt, pupillæque color ad albedinem vergit, & omnino non transluceat.

*Status.**Suffusionis colores.*

MATHESES, Sûntne plures suffusionis colores? GERON, Vtique. nam quidam eius aërem, quidam vitrum refert: alij cærulei: alij cæsi. qualiscunque autem suffusorum color fuerit, omnes tamen illi lucem aut multam, aut paucam vident: atque hoc discrimine ab ipsis, qui hebetudine & glaucomate laborant, separantur, cò quòd hi nullam prorsus cernant. Cæterùm si totum rhagoidis membranæ foramen, crassa illic substantia materia obtenebratum sit, facultas certè videndi prohibetur. si verò illud non totum ob-

Hebetudo & glaucoma à suffusione differunt. Rhagoidis membranæ foramen obtenebratum.

scuratum fuerit, sed pars eius aliqua pura adhuc remaneat, singula quæ extrinsecus occurrunt, per se sola, illius ope, nihilo deterius, quàm antè cernuntur: quanquam non similiter vt prius, vno tempore multa: quia visus acies angustior, quàm aliàs euasit. MATHESES, Quid si exigua suffusio in pupilla media constiterit, sic vt reliquæ ambientes partes puræ existant? GERON, Omnibus sic affectis, tanquam fenestras se habere videtur, quando id quod in modio situm est, non cernitur, sed veluti excisum apparet. At in quibus crassæ materiæ, circa pupillam consistentes diuulsæ, minùsque inuicem coniunctæ sunt, & tenui in humore fluitant, ij veluti culices quosdam, sibi ante oculos foris occurrere putant: sepe etiam ipsi ex crassiore humore, simulacrum aliquod, oculis apparere imaginantur, præsertim à somno: & pueris, largòque vini potu vsis, & pleno capite præditis: licet casus superius recitati, & alij quidam ex tenui humore superueniant, si is à naturali colore recesserit. MATHESES, Quæ suffusio spem, aut desperationem ostendit? GERON, In quibus altero oculo conuiuentibus, altera pupilla dilatescit: in ipsis si acus admoueat, visus recipiendi spes est. in quibus autem nō dilatatur, nulla, etiamsi acus omnino cum dolore, sed commodissimè administrata fuerit. Quemadmodum verò recens suffusio sanari medicina, ita inueterata nulla, nisi manu potest. nam ipsa interdum oculi potentiæ qua cernit, se opponit. nonnunquam per initia certis obseruationibus discutitur. Ad cæsum vergens colorem suffusio, insanabilis est, quòd hæc ex humore crasso, iuxta pupillam valde concreto, exiccatòque, procreata sit. MATHESES, Quis oculorum morbus huic proximus est.

*Prognosticon.**MYDRIASIS.*

GERON, Qui græcis *μυδριασις*, vocatur, in quo pupilla quatuor mo-

ruor modis à naturali statu immutari solet, nempe cū vel dilatur, aciesq; eius hebescit: vel cū imminuitur: vel cū rumpitur: vel cū in aliam partē detorquetur diuelliturq;. MAT. Quid singuli isti casus mali adferunt? GER. Dilatio siue ab origine, siue
 5 postea proueniens, semper visui incommodat, imminutio autem, quæ à natiuitate incepta, acutissimum visum generat: quæ verò postea superuenit, hebetem, reliqui duo siue à natali, siue post hūc inciderint, nihil propemodum visioni officiunt. MAT. Quid autem propriè est Mydriasis? GER. Pupillæ effusio, seu dilatio, cū
 10 scilicet illa colore quidē nihil euariat, multò verò latior efficitur, quàm naturalis status postulat, vt interdum ad iridis circulum accedat. MATH. Oculi ne in hoc affectu totus vitiatus est? GERON. Non, sed iuxta pupillam: quia hæc à naturali statu recessit, & quanto id magis efficitur, tanto etiam plus visio ipsa offenditur. Interdum cū valde naturalem mediocritatem excedit, visus in totum
 15 impeditur: interdum verò ægri vident, sed obscurè, & omnia quæ videntur ab ipsis, minora quàm sint, esse putantur: eò quòd spiritus visorius in eis diffundatur. Quamobrem pupilla, siue à natali die, siue post eum laxior euaserit, totus illam spiritus implere nequit, vnde ipse diffundi dissipariq; cogitur, eoque tum natua, tum accessoria pupillæ dilatio, vitiosa existit: imminutio autem non item: quare amplitudo siue dilatio pupillæ, integræ vi
 20 sioni semper detrimentum adfert. MATHETES, Dic quæso quæ causa dilatationem istam efficit? GERON. Humor excrementiti-
 25 us, qui aut vniuersim, aut paulatim affluit, & tunicam rhagoïdem latenter distendit, pupillamque magis dilatat, MATHETES, Quibus hoc malum potissimum obuenire solet? GERON. Pueris magis, ob tunicarum debilitatem: atque illis qui oculos natura nigros habent: quibus magnæ plerunque pupillæ insunt, ob quas
 30 facile in hoc malum dilabuntur. MATHETES, Quid de hoc vitio prænosci potest? GERON. Natiuum insanabile prorsus est. quod postea successit, difficillimè penè eliditur. nam cū tunica rhagoïdes membranosa existat, vbi semel distenta fuerit, indurefcit, neque facile postea contrahi potest. nonnulli interdum cū aliquandiu nihil viderint, repentina profusione alui lumen recipiunt, ex qua omnis noxia materia, ad inferiora depellitur.

Quemadmodum iam pupilla dilatescit, vt diximus, ita etiam interdum imminuitur, sic vt angustior, obscurior, & rugosior euadat, græcis *Φθίσις*, Latini tabem, vulgus constrictionem pupillæ nominant. MATHE. Quæ pars in hoc vitio affecta est? GERON. Pupilla dumtaxat, quæ ita imminuitur, vt ceratoïdes tunica priuatim nihil sentiat incommodi. nulli autem non manifestum est,

Dilatationis causa.

Dilatationi obnoxij.

Præsigna.

TABES OCULORUM.

eò quòd alteri tantum oculorum magna ex parte accidat, quòd-
 que sanus oculus, qui in propinquo est, affecti vitium prodat.
 Verum licet malum hoc cognitu sit facile, adeò, vt neminem me-
 dicorum latere possit, si oculus sanus cum offenso conferatur: ex
 eo tamen deprehendi potest, quòd tabe ista laborantibus, maiora
 quam naturaliter esse solent, appareant, quæ ab ipsis ob pupillæ
 angustiam videntur. *MATHESES*, Vnde hoc malum oriri putas?
GERON, Ex pupillæ densatione, quæ siccitatis soboles est: non-
 nunquam ex periculosa imbecillitate, aut ingenti capitis dolore.
 Hoc autem notandum, pupillæ tabem, ab oculi macie, & affectu
 quo alimentum non sentit (*græcis ἀρεσφία* dicitur) differre. nam
 illa pupillam tantum angustiozem, minoremque efficit: hæc au-
 tem totum oculi orbem minorem & humiliozẽ reddit, eoque du-
 plex causa, pupillam morbi vitio minorem facit: vna, tunice rha-
 goïdis ratione duntaxat: altera humoris tenuis, oui albo similis,
 vitio, qui medius inter tunicam rhagoïdem, & humorem crystal-
 loïdem effusus, subsistit. *MATHESES*, Possuntne contraria pupil-
 læ vitia, tum dilatatio, tum imminutio, ab eadem causa excitari?
GERON, Minimè, sed tunice rhagoïdis tensio, quæ exiccationem
 sequitur, pupillam dilatat: eiusdem verò relaxatio, quæ hu-
 mectationi succedit, illam imminuit. At non simplex pupillæ
 paruitas, siue imminutio, sed quæ vitiosos iam dictos affectus se-
 quitur, deteriozem visum parit. nam si pupilla ob tunice rhagoï-
 dis extensionem, relaxationemque imminuitur, certè vitium hoc
 non pupillæ angustia efficiet, vt oculus deterius cernat. Quòd si
 eadem tunica ob humoris, oui albo similis, inopiam contracta, ru-
 garumque in se ipsam concidat, imminuatque pupillam, non ideo
 quòd hæc minor euaserit, sed quòd humor crystalloïdes, humo-
 ris oui albo similis, à quo ipse largiter fouebatur, penuria siccior
 euadat, & tunica rhagoïdes in se concidens, spacium, quod in-
 ter ipsam & crystallinum humorem intercedit, angustius efficiat.
 Quare idem humor crystalloïdes commercium paruo interstitio
 cum externo splendore habere cogitur. sustinere autem ipsum sine
 offensa nequit, si vno ex munimentis ipsius, putà humore tenui,
 sit destitutus. nam quandiu hic adhuc adest, crystalloïdes humor
 splendorem sustinere potest. *MATHESES*, Hæc ergo causa est, cur
 imminutus pupillæ humor visum deteriozem, & tunice rhagoï-
 dis foramen minus efficiat? *GERON*, Procul dubio: sicut tunica rha-
 goïdes, si ceu pars similis tendatur, pupillam dilatare poterit,
 atque hanc dilationem rhagoïdis ipsius tunice tensio ex siccita-
 te facta producat. *MATHESES*, Solusne humor pupillæ imminu-
 tus, visum deteriozem reddit? *GERON*, Non is solus, sed etiam par-
 cior spiritus

*Tabis pupillæ
 causa.*

*Tabis & atro-
 phie differentia.*

tior spiritus à cerebro ad pupillam afflatus, vnde ipsa corrugatur & in etate prouectis, summòque senio confectis videre licet: quam uis etiam tunica ceratoïdes rugosa interdum in ipsis appareat: ob quàm affecti vel malè, vel nullo prorsus modo cernant. Hinc constat, vniuersum spacium, quod humori crystalloïdi succedit, spiritui simul, & humore tenui assiduè, necessariòque repleti. adhuc quòd humor reliquis in partibus: spiritus autem pupillæ potissimum, isque copiosus insit. MATHESES, Qua ratione dignoscam, num pupillæ imminutio ex humoris tenuis, an ex spiritus inopia, 10 velex tunicæ rhagoïdis laxitate ob humorem facta, procreata sit? GERON, Si, quæ oculis apparent, ægri ætatem, temperamentum, superuenientem vitæ rationem, & reliqua perpendas. MATHESES. Quæ in hoc oculorum vitio prænosci possunt? GERON, Pupillæ exilitatem non semper esse vitiosam. nam quæ natura talis 15 est, tanquam bona commendatur: eò quòd in ea spiritus colligatur, constringatur, ac densetur: id quod oculo ad sensus integritatem conducit. Sin autem pupilla morbi, non naturæ vitio minor euaserit, mala portendit, ac multò deteriora, quàm mediocris: eò quòd multò grauiores affectus comitetur. maximè vero insanabilis est, si ex tenuis humoris penuria gignatur, minus periculū inest pupillæ, si propter tunicæ rhagoïdis humorem, minor euaserit. Difficilius enim est humorem, cui libet parti similari siccatæ restituere, quàm humectatam desiccare. MATHESES, Quæ alia interiora oculorum vitia restant?

25 GERON, Imbecillitas, ex qua quidam interdū satis, sole occiduo, obscurius, noctu nihil penitus cernunt: vnde etiam græci affectum hunc *νοκιδλονα* vocant: nonnulli cæcitatem nocturnam. Plinius eo affectos lusciosos appellat. MATHESES, Quæ pars in hoc malo est offensa? GERON, Oculus ipse, cum cernēdi functio in 30 eò sit vitiosa, non enim fieri potest, vt illa oblædatur, oculo prorsus incolumi. MATHESES, Vnde malum hoc prouenit? GERON, Ex capitis ipsius, magnaque spiritus visorij debilitate, ingenti tristitia, & diuturno morbo antecedente, neruis visioni proprijs collapsis, vel utique corrugatis: nec nō ex humorum oculi, ac tunica 35 rum crassitie: ex quibus causis hebetudo quoque oculorum progignitur. MATHESES, Quibus vitium hoc superuenit? GERON, Plerisque omnibus, malis humoribus præditis: sed in sceminam benè respondentibus menstruis, non cadit.

Præter hanc affectionem obscuritas, caligatio oculis nullo 40 modo grauatis accidit. in qua cernēdi facultas aboletur, aut prorsus impeditur, sic vt pupilla integra ac pura appareat: Græci vocant *ἀμαρυγων*, recentiores latinobarbari guttam serenam nomi-

*Præsgia tabis.**IMBECILLITAS oculi.**Cæcitas nocturna.**Pars offensa.**OBSCURITAS.**CALIGATIO.*

Causa.

nant. Ab hoc malo differt hebetudo visus, seu obtusio, quæ græcis ἀμβλυωπία dicitur: in hoc enim visio non in totum aufertur, sed manifestò minor euadit. MATHETES, Vnde ista cernendi obscuritas prodit? GERON, Ex causâ quadam latenti. MATHET. Quomodo igitur hæ affectiones inter se differunt? GERON, Prout graui- 8
ores, aut leuiiores existunt. noxa enim actionis increfcit quatenus declinat, ac affectus intenditur. MATHETES, Eadẽ ne ratione constantur? GERON, Non, sed prior affectus alijs paulatim ac sensim, alijs simul incidit. MATHETES. Quid si per interualla generetur? GERON, Tunc oculus offenditur: quanuis non euidenter. 10

Partes læsæ.

MATHETES, Quæ potissimum eius partes leduntur? GERON, Aut spiritus visorius, dum incrassescit: aut humores, cum crassissimi aut viscosi fuerint: aut tunica, cum densantur, & crassescunt. Interdum cernendi spiritus imminuitur, debilitaturque, & nervi à visione græcis ὀφθαλμοὶ dicti, ac tunica, vt in senibus, corrugantur 15

Ex quo genere morborum sit obsecritas.

MATHETES, Quid si affectio ista vna vice simul incidat? GERON, Oculi effusionem in nervis visorij experitur. MATHETES, Sub quo genere mali, symptoma hoc continetur? GERON, Sub noxa functionis sensibilis visoriæ: quæ plurimum sit abolita: interdum insigniter imminuta. Non autem hæc offensio ex vno solum 20 morborum genere, sed ex quolibet, vt ex intemperie, vitiosa partium oculi compositione, aut earum vnionis solutione, potest generari.

Signa causarum.

MATHETES, Quæ notæ indicant affectionum illarum causas? GERON, Capitis grauitas, nervos humoribus crassis viscosisque copiosis repletos: maxime iuxta oculorum radices, affectionem hanc peperisse, testatur. Si oculus tardè, aut prorsus non moueatur, eorundem neruorum resolutionem præcessisse argumentum est. Si verò oculus primum sit prominentior, deinde verò cauatur, & non sentit alimentum: oculus ex casu à cerebri connexu diuulsum, ruptumue esse in hoc malo ostenditur. MATHETES, 30

Caligationis indicia.

Quæ indicia caligationem, seu obscuritatem oculorum significant? GERON, Si cruditates assiduæ præcesserint, aut meri potio, aut sol inurens caput, aut corporis perfrectio, aut assidua secundum cibum lectio, aut balnea similiter post illud tentata, vomitus, concubitus intempestiuus ac immodicus, spiritus violenter retentus. Hæc omnia eisque similia, dum fiunt, moderatè hebetem visum, cum immoderatè, caligationem: sicut interdum fortes capitis ictus, aut casus ex alto, pariunt: sic vt aliàs neruus visioni peculiaris resolutus sit, aliàs humorum copia, præter vehementem concussionem irruat, neruumque visorium obstruat. atque hæc ex ægris ipsis, vel assistentibus deprehendi, & signis prædictis faciliè distingui possunt. MATHETES, Qualis 40

TES, Qualis

- Qualis vtriusque caligationis curatio speranda est: GERON, Eius quæ paulatim contrahitur, sicut etiam hebetudinis, non admodum difficilis, nisi senioribus accidat: quoniam à moderatis, non ab immoderatis causis trahit originem. illius autem, quam vna simul vice, nempe ob validos capitis ictus, aut casus ex alto prouenisse dixi, inter difficillimas habetur. Expeditissima verò contraria, quæ ex humoribus copiosis, ob vehementem concussionem influentibus, neruumque visorium obstruentibus conflata fuit. Hactenus morbi interiores sunt expositi, nunc exteriores subsequuntur. MATHETES, Quinam illi sunt?
- GERON, Qui ceratoïdi, & agnatæ membranæ insident, idque vel in morbo, vel sine hoc, in senectute, aliæue imbecillitate: quales etiam cum alijs, tum caligo. Interdum eidem membranæ tenuis humor inhæret, ob quem æger veluti per nebulam, aut vaporem, aut fumum, res omnes intuetur. At cum idem humor sensim in tunica iam dicta crassescit, tandem albuginem generat: vt quæ nihil aliud sit, quàm crassus albusque humor, in ceratoïde: & super hanc adeò concretus densatusque est, vt totam sæpè aciem oculorum perstringat. Hæc sanè duo vitia sensim succrescunt, ac sepius ex lippitudine, humorèque influente: nonnunquam etiam ex proprio, eoque lento, qui ex spatijs inter membranam adhærentem, & ceratoïdem positus, ad pupillam effunditur.

Exteriores oculorum morbi

Caligo.
Nubecula.

Albugo, seu leucoma.

Causa.

- I AM aliud vitium ex tunica illa ipsa, alieno colore imbuta, prouenit: quo etiam foris omnia tincta cernuntur, vt in morbo, regio, lutea: in suggillatu, & inflammatione, rubra: id malum hallucinatio Latinis, παρόρασις Græcis dicitur. Interdum eadem membrana rumpitur, vel eroditur: ac vitium hoc Græcis ρήξις vocatur, in quo per initia, humor albo oui similis emanat, & oculus multò minor euadit: deinde pars ipsius tunicæ procidit, aut ingens eius inflammatio tanto impetu erumpit, vt oculum sua sede propellat: quod vitium Græci ἀπώσιν nominant. Cum id nondum creuit, à muscæ capitis figura, recentioribus græcis μυοκέφαλος: vbi verò auctior euaserit, ab vucæ acino στυφύλωμα nuncupatur. Si adhuc maior facta fuerit, & palpebras excedat, græcè μήλον, à mali similitudine dicitur. Diuersa ab hac est oculi confusio, in qua humores ex ictu, citra eruptionem vllam permisti, confusi que existunt. At callosa in albo oculi tubercula, extra palpebras egressa, à figuræ similitudine, latinis clauī, Græcis ἑλαιοι vocantur. In hoc affectu non omnes oculi partes, sed ceratoïdes ragoidesque tunica obfessa est: illa quidē per erosionem, vel ruguram: hæc autem per situm alienum, totiusque oculi figuram. Porro alia mala oculis insidere solent, quæ Latinè pustulæ, Græcè φλυκταῖναι ap-

HALLUCINATIO.

RVPATIO.

Proptosis.
Myocephalos.Staphyloma.
Melon.

CONFUSIO.

CLAVI.

pellantur, à procidentia illorum diuersa . nam sub illis pupilla a-
uulsa omninò est, sic vt ipsa non appareat, vel alieno in situ figu-
ráque subsistat: nec non ceratoïdis tunica: erosæ labra, nigra, aut
cœrulea, aut circa partis prolapsæ fundum alba existant: pustule
autem vndique similiter nigrae sint, quanuis non euidenter. his
ruptis varia manent vlcuscula, sordidissimo pure repleta. quine-
tiam huic tunicae inflammationes, carbunculi, & carcinomata,
quanuis rarissimè superueniunt. **MATHE TES**, Possuntne vitia ha-
Præsignum. ctenus recitata emendari? **GERON**, Procidentia quacunque ex
causa euenerint, medicamentis rectè adhibitis, sicut etiam staphy-
lomata recentia, quæ verò alborem, aut callum contraxerint, nul-
lis cedunt remedijs, **MATHE TES**, Ceratoïdis tunica: oculorum
morbos exposuisti: qui sunt adherenti, siue agnatæ?

VNGUIS.

GERON, Vnguis, *ἄλγυς* Græcis vocatur, barbaris vngula.
Est autem membranula neruosa, ab angulo maiore vt plurimum
rariùs à paruo, rarissimè à superna, vel inferiore palpebra oriens:
sæpiùs à narium, interdum etiam à temporum partibus nascitur:
nonnunquam ad pupillam quoque peruenit, eamque offendit,
& vbi arctior euaserit, obtegit. atque id ratione primaria, non ca-
su efficit, ita vt visus aciem aut vitiosam reddat, aut prorsus abo-
leat. **MATHE TES**, Quæ pars oculi in hoc malo afficitur? **GERON**,
Pars oblesæ. Non solum tunica agnata, sed etiam ceratoïdes, & vbi plurimum
increuerit, pupilla quoque obscuratur, visusque impeditur: vnde
constat plures oculi partes, in eo oblædi. primùm tunicam adhæ-
rentem, deinde ceratoïdem, postea pupillam. **MATHE T.** Quibus
Signa. signis hoc vitium deprehenditur? **GERON**, Etsi nullis indigeat,
cum sensui euidenter pateat: tamen album in oculo magis au-
gescit, aut caro ex scabra quadam lippitudine, aut ex assidujs len-
torum humorum defluxionibus, supercrescit. **MATHE TES**, Quid
de hoc vitio curando prænosci potest? **GERON**, Recentius & me-
Prænotio. diocre, cuiusmodi tertius & album est, curationem admittit: inue-
teratum solam manum postulat. **MATHE TES**, Quæ reliqua ad-
hærentis membranæ vitia restant?

EPIPHORA.

GERON, Humor tenuis cursus, lacrymarum modo ocu-
los infestans, græcis *ἐπιφωρᾶ* nominatur. Est autem is humor aliàs
frigidus, planèq; aquosus, qui sine ardore, aut rubore influit: ali-
às acris, aut salus, qui adeò rodendo excruciat, vt etiam palpebras
exulceret. **MATHE TES**, Vnde fluxio ista oritur? **GERON**, Ex inci-
pite ferè, & summo capitis vertice, vbi humor extra caluariam,
& super cutie colligi consuevit, & postea per membranam cal-
uariam ambientem, in adhærentem destillat, tandèmq; foràs
per oculos excidit, sicut etiam destillationes, ex eadem regi-
one,

one, modo in dentes, modo in malas & maxillam fieri constat.

Similiter inflammationem ex oculorum angulis, totam ad hærentem membranam, seu osi capitis ac caluariæ circumdatam, sepius obsidere notum est: quæ Latinis lippitudo, Græcis ὀφθαλ-

5 *μία* dicitur. MATH. Quæ pars in hoc malo afficitur? GERON, Non so *LIPPITUDO.*
lum oculus ipse, sed etiam tunica adhærens? MATHETES, Quæ *Pars affecta.*

lippitudinis sunt indicia? GERON, Oculus in ea valdè dolet, ipsi- *Lippitudinis signa.*
usque adhærens membrana rubescit, intenditur, adeoque inter-

10 dum intumescit, vt quæ oculo circumdata sunt, ad malas vsque si-
mul attollantur. interdum etiam oculus tanquam acu, aut spina in
fixa pungitur. Idem feruente lacryma impletur, sequiturque pitui-
ta, modò paucior, modò largior: nec non sordes etiam quædam

maiori oculi angulo inhærescunt: arteriæ vehementer vndique
pulsant: anguli oculorum ad totam adhærentem membranam

15 vsque laborant: tenues oculi venæ turgent. atque illæ, quæ per
sanitatem in oculi albo fuerant obscuræ, conspicuæ redduntur. Id
autem quod in toto oculo album ferè esse debebat, rubescit. At
non semper sibi similis est lippitudo, sed variare solet. nam aliàs *Lippitudinis species.*

20 turbatio: altera Græcis χημωσις vocatur: Latini Græcos imita-
ti etiam chemosin appellant: tertia vera lippitudo, Græcis ὀφθαλ-
μία propriè dicitur. MATHETES, Quot communes omnium lip- *Causæ lippitudinis communes.*
pitudinis specierum causæ, existunt? GERON, Duæ: scilicet interio- *Interiores.*

res & exteriores. sub internis comprehenditur, nunc sanguinei

25 humoris in toto corpore abundantia: nunc humorum influenti-
um acrimonia, vehemensque erosio: nunc extensio, quam crassus
succus, seu flatuosus spiritus excitat. MATHETES, Quæ sangui-
neum humorem abundare significant? GERON, Non solum tunica

adhærescens, sed etiam facies rubens & humida: veng ampliores:

Sanguinis in lippitudine abundantis signum.

30 membra grauida, pigraque ad actiones consuetas: lacryma calida,
sed non acris, præsertim si ægri temperamentum, ætas, regio, an-
ni tempus, & præcedens victus ratio, humori sanguineo largiori

respondeat. MATHETES, Vnde rodens acrisque humor nosci-
tur? GERON, Ex vitioso corporis succo abundante, lacryma ro-
denti & acri: à quibus non solum oculorum anguli, sed etiam ma-

Humoris acris rodentisque nota.

35 le vehementer roduntur, exulceranturque: idque si tristitia, curæ,
insolatus, & ira antecesserint: ægrique natura biliosa, & ætas sit iu-
uenilis. MATHETES, Quæ pituitam lippitudinis effectricem esse

Pituita nota.

notant? GERON, Corporis grauitas, calor, aut rubor tunicæ ad-

40 hærentis exiguus: qualis etiam in facie apparet: adhæc quæ præ-
cesserunt, comitanturque. At spiritum flatuosum qui distendit,
dolorémque mouet, lippitudinis opificem esse constat, si adhæ-

Spiritus signum.

rens membrana neque seruire, neque rosione, neque vehementi grauitate vrgente, extendatur, adeò vt videatur rumpi, doleatque, & lacrymæ nullæ, aut paucae appareant, licet interdum eadem tunica rubra cernatur. MATHESES, Quæ causæ sunt exteriores? GERON, Sol, fumus, puluis, & oleum: quæ ab ægris ipsis, aut eorum familiaribus, qui eis adesse solent, cognosci possunt. MAT. Quæ peculiares vniuscuiusque lippitudinis speciei, tum notæ, tum causæ existunt? GERON, Prioris, quam perturbationem vocauimus, causa est externa: ac in ea oculus, calidus, humidusq; & ruber contra naturam apparet, alterius interior, & magnus in illa ardor, dolorq; vehemens oculos obsidens: adeò vt utræq; palpebræ inuertantur, oculûsq; ab ipsis vix contegatur, & album eius sublimius euadat, rubrumq; ferè magna ex parte nigrum occupet. MAT. Quæ verè lippitudinis causa est? GERON, Tum interior, tum exterior. MATHE, Quando morbus iste futurus cognoscitur? GERON, Quando tempora capitis in secunda valetudine sæpè dolent, corporaq; noctu insudant, & frons prurit. ac principium morbi esse ostenditur, vbi tenuis ex oculo pituita ferri incipit: incrementum autem, quando illa crassescit albescitque. statum verò iam adesse constat, vbi tota pituita crassa multaq; est reddita, & oculos veluti glutine per somnum oblinat. Declinatio morbi significatur, vbi & pituita, & signa morbo propria minuuntur. MAT. Vnde colligere poterò, quid tutò, vel periculosè, in hoc vitio euenturum sit? GER. Ex his quæ sequuntur. vbi lacryma, tumor, & pituita crassa esse ceperint, eaq; lacrymæ calide mista, albæq; & tumor non durus, longæ valetudinis metus non est. At si lacryma multa & calida, pituitæ paulum, tumor modicus, isq; in vno oculo, longum id vitium, sed sine periculo futurum est, atque hoc lippitudinis genus minimè cum dolore est, sed vix ante vigesimum diem tollitur: nonnuncq; per duos menses aut ad diem quadragesimum durat: quibusdam ad sexagesimum vsq; protenditur: quandoque citius finitur. Adhæc si pituita alba & mollis esse incipiat, lacrymæ quæ misceantur: aut si simul hæc utrunq; oculû inuasent, potest esse breuior, sed periculum vlcus est. sicca autem pituita & arida, dolorem quidè mouet, sed maturius desinit: nisi quid exulcerarit. At tumor magnus, si sine dolore, & siccus sine vilo periculo est: si siccus quidem, sed cum dolore fuerit, ferè exulcerat, & nonnunquam ex eo casu fit, vt palpebra cum oculo glutinetur. Eadè exulceratio in palpebris pupillisq; timenda est, vbi super magnû dolorem, lacrymæ salæ, & calidæ: aut etiam, si tumore finito, lacryma diu cum pituita profluit. Peius etiam est, vbi pituita calida, aut liuida, nec, nō lacryma calida, aut multa destillat, caputq; calet, & dolor à temporibus

Causæ exteriores.

Causæ peculiares vniuscuiusque lippitudinis notæ.

Vera lippitudinis causa & notæ.

Præsignia.

Lippitudo quæ breuior. Lenior & longior.

Periculosior & breuior. Tutior. Exulceratio palpebrarum. Deterior.

poribus ad oculos pergit, vigiliæque nocturnavrgēt. MATH. Cur hoc deterius est? GERON, Quia oculus sub his plærunque rumpitur, oprandūque est, ne tandem vlceretur: quòd si foràs ruptus procidat, sine auxilio est: si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. sin asperum & crassum est, etiam post curationem, vestigium aliquod relinquit. si lippitudine affecti, alui profluuiū corripiantur, bonū est indicium. Si lippientibus caput assidue, longoque tempore dolet, futurę cæcitaris testimonium est. Cū in curatione lippitudinis error aliquis incidit, quidam ægrè confusęque videre: temporis autem processu, suffusione, vel nimia pupillæ dilatatione, vel tabe, vel corrugatione: idque medicamentorum præsertim stupefacientium vsu, laborare solent. MATH. Quo tempore lippitudo oriri consuevit? GERON, Hyeme sicca & aquilonia: vere autem pluuioso & austrino. æstate verò mulieribus, & viris natura humidioribus. porrò in regionibus meridianis, frequentius gignitur, statimque remouetur: in frigidis autem plagis, sicuti etiam in similibus anni temporibus, rarius excitatur. Similitudo quædam huic vitio est, cū humorum cursu in oculos facto quàm epiphoram appellaui. hoc autem inter vtraque discrimen est, quòd in lippitudine oculi album, in epiphora, solum palpebræ cilium rubescat.

Aliud vitium sequitur quod Latinis suggillatio, græcis ὑπώμνωσις: recentioribus ἐκχυμωσις, vel ἐκχυμωσις τοῦ φάλλου, & τοῦ φάρυγγος, barbaris oculi macula nominatur. Fit autem cū sanguis tenuibus circa cutem vasis, potissimum ruptis, aut contusis, in spatia illis circumdata effunditur: qui per initia cruentus, postea liuidus apparet. MATHETES, Quæ pars in hoc malo offenditur? GERON, Pars affecta. Totus quidem oculus ipse, sigillatim verò tunica agnata, siue ceratoïdes. Et si vitium hoc visionem impediāt, plus oculo inesse materiæ, quàm debeat, intelligitur: si verò illum non ledat, symptomatum generi ascribendum est. MATHETES, Quibus signis agnoscitur? GERON, Per initia oculi cruenti cernuntur: dein de liuidi, aut nigri. atque hoc malo affecti, omnia quæ aspiciunt, rubra esse putant. MATHETES, Quæ suggillationis huius causa existit? GERON, Externa, potissimum ex ictu, aliquando etiam interna, licet raro: qualis vel insignis vasorum ipsorum repletio, aut nimius sanguinis venarum feruor. MATH. Vnde causas istas internoscam? GERON, Exteriores ex egro, aut ipsius familiaribus: interiores ex tuo pte ingenio. MATH. Quid de hoc vitio sperandum est? GERON, Nisi curationem eius aggredieris priusquam nigrescat, parum in illo proficies. nam vbi sanguis in grumos coërit, difficillimè discuti potest, & oculus tandem liuidescit, nigrescitque,

Desperata lippitudo.

Lippitudinis sortitio ex alui profluuiio.

Cæcitaris future nota.

Lippitudinis originis tempus.

SYGGILLATIO.

Suggillationis signa.

Cause.

Prognosticum.

DOLORES
oculorum.

His iam dictis morbis, graues pleriq; dolores, ac cruciatus succedere solent, ex humorum acrium influxu: ex ardore in lippitudine: ex flatibus, qui tunicas oculorum distendunt: ex inflammatione: ex carbūculo, & carcinomate, inde contractis: quanquam ex pustulis & vlceribus cerato idem infestatibus, nullus dolor, aut ad modū leuis superueniet. Atq; hi sunt morbi, qui intra oculos oriuntur: restāt adhuc, qui extrinsecus palpebras & angulos exercent.

ABSCESSES
exiguus oculorum.

Exiguus igitur abscessus, seu parua fistula, per quam pituita assidue destillat, in oculi angulo, qui naribus propior est, ex vitio aliquo nasci solet: quæ si aperta fuerit Græcis *αἰγὼν* vocatur: vbi autem nondum eruperit, *αἰγχιλῶν*. Id vitium assidue malè habet oculum: nonnunquam etiā ex cō offe, vsq; ad nares penetrat: interdum etiā carcinomatis naturam habet. vbi intentæ venæ recuruatæ sunt, color illius pallet, cutis dura est, & leui tactu irritatur, inflammationēque in eas partes, quæ coniunctæ sunt, euocat. Atque sic vitium istud, primū ex praua compositione, deinde ex intemperie: postea ex continui diuortio confatur.

Causa suggillatus.

quæ autem pars in eo afficiatur, ex descriptione eius, & sensu patet. **MATHESES**, Ex qua causa progignitur? **GERON**, Ex tenui biliosoque sanguine, qui vel à toto corpore, vel à temporum, frontis, facieiq; venis ad locum quem dixi defluerit. **MATHESES**, Quid de curatione huius mali præfagis? **GERON**, Eorum qui quasi carcinoma habent coniunctum, periculosa est. nam mortem quoque ea res maturat: illorum verò quibus ad nares tendit, superuacua, eò quòd non sanescant. Quibus in angulo vitium est, ijs difficulter succurri potest, & quantò foramen id, angulo propius est, tantò difficilius.

Prognosticon.

SINUS.

Post hos affectus malè curatos, sequitur etiam sinus, qui Græcis *κόλπ*, & fistula, quæ *σύνγχι* ab illis nominatur. Nam cum *αἰγχιλῶν* non maturè aperitur, aut cum pus non liberè effluens, cute adhuc integra longius impeditur, foramina efficit, ac partibus vicinis tādē exesit, sinum parat: in quo illud copiosius coaceruatur. hinc ad os vsque subiectum penetrat, & iter in nares proximas aperit: ex quibus pus fœdi odoris exilit. At si idem in angulū maiorem viam capeffat, fistulam sibi excauat. nam illuuiēs illa in sinu collecta, angulo compresso, per fistulam illius emanat, tumor que tunc subsidet, donec nouæ materiæ influxu repleatur.

RYAS.

Iam vitium aliud his malis ferè superuenit, in quo caruncula, ex angulo maiore abscinditur, vel imminuitur. vnde etiam angulus latior euadit. ideo si illa abscissa est, foramen patescit: per quod postea semper humor descendit, Græci *ρύαδα* vocant. Fit hoc malum etiam alijs de causis, vt pote ab humoribus medicamentis, que rodenribus.

Contra-

Contrarium huic malo vitium est, in quo ipsa caruncula excuratione, vngue parum exciso, nimium in angulo excrescit: aut tuberculum nascitur, quod palpebras parum diduci patitur, *ENKAN-THIS.*

κγνθς Græcè nominantur.

5 Euenit etiam, vt oculi velambo, vel singuli minores fiant, quàm esse naturaliter debeant: idque & acer pituitæ cursus in lippitudine efficit, & continuati fletus, & ictus parum benè curati, sicut Celsus vetustus auctor prodidit. *OCYLLI* *humini*

Laborant etiam sæpius palpebræ, scabiosa & arida lippitidine: ex qua prior *ψωροφθαλμία*: altera *ξηροφθαλμία* nuncupatur: illa ex calido, & acri humore constat, cilia potissimum obsidens: hæc ex humore falso, atque nitroso pruritus excitat. *MATHE-THES.* Quæ supersunt adhuc palpebrarum vitia?

GERON, Vnum superioris palpebræ, quod parum descendit, *PALPEBRARUM* *vitia.* *Superioris.* *Interioris.* ideoque oculum non contegit: alterum inferioris, & parum sursum attollitur, sed pendet hiátque, neq; potest cum superiore committi. Atque id quoq; euenit interdum ex simili vitio curationis: interdum etiam senectute: greci *εκτροπία* vocant, quasi inuersionem, qua pars eius interior rubra prominere. Gignitur autem vel ob cicatricem, vel ob subditæ carnis excrescentiam, qualis sæpè exchemosi oriri solet.

In eadem palpebra super pilorum locum, tuberculum paruum nasci Celsus refert, quod à similitudine ordei, à Græcis *κρίθη* nominatur: est quiddam tunica compræhensum, quod difficile 25 ter maturescit.

Nascuntur alia quoque in palpebris huic non dissimilia: quædam non eandem figuram repræsentant. mobilia autem sunt simulatque digito huc vel illuc impelluntur: prius in abscessum ferè definit.

30 Quinetiam pili, qui in palpebris sunt, oculum irritare duabus de causis solent. nam modo palpebræ summa cutis relaxatur, & procidit, eoque pili eius ad oculum ipsum conuertuntur: quia non simul cartilago se remittit: modo alius ordo pilorum sub ordine naturali succrescit, qui protinus intus ad oculum tendit. 35 rursus pili ex cilijs atque supercilijs fluunt: atque hoc vitium *περὶ δόκωσις* Græcè appellatur.

Genus quoque vitij est, quo pediculi, inter pilos palpebrarum nascuntur, id Græci *Φθειρίασι* vocant. *MATHE-THES.* Cum ha *PEDICULLI* *palpebrarum.* stenus de oculis satis egisse videaris: nunc ad aures transcas?

GERON, Rectè mones. harum nanque vsum proximum à luminibus natura nobis dedit. quanquam in his aliquanto maius sit periculum, nam vitia eulorum intra ip-

AVRIUM DO
 lor. **fos nocent;** interdum etiam ad dementiam mortemque præcipi-
 tant. **MATHESES,** Quæ nam sunt istæ? **GERON,** Præcipue aurium
 dolor, qui Græcis proprie *ἰσχυρία* vocatur. quanquam etiam quo
 libet affectuum genere infestentur. **MATHESES,** Quæ partes in
 dolore offenduntur? **GERON,** Tum nervus auditus, sensui propri
 us: qui meatui huius non longè à cerebro dilatatus inseritur: tum
 alia, quæ vsum ei prestant. Potest igitur aurium doloris nomen,
 de eo affectu usurpari, qui in qualibet earum parte, quavisque de
 causa excitatus fuerit: potissimum autem de eo, qui in alto excru-
 ciat. **MATHE.** Vnde internoscam, num sola cutis meatum audito-
 rium ambiens, seu ipsemet in alto, aut exteriores auriculæ indole-
 scant? **GER.** Ex ipso doloris sensu eiusque vehementia. nam aliàs au-
 rium dolor, eodem modo quo ceteri habet: aliàs pro causarum ra-
 tione variat. Nam in eo qui ab insolatu, seu estu, aut à vêtis calidis,
 aut fontibus medicatis, siue ad delitias, siue ad corporis commodi-
 tatem adhibitis provenerit, ardor locum offensum exercet. si in-
 flammatio ex sanguinis calidi influxu illum pepererit, egri feruo-
 rem, punctionem pulsationemque sine gravitate ac tēsiōe sentiunt.
 si caput aurisque gravitatem percipit, doloris illius causa est frigida
 intemperies, ex ventis in itinere perceptis frigidis, & humidiori-
 bus, aut ex balneis similibus contracta: vel crassiores viscosioresque
 humores obstructi: quos cibi & potus, succis frigidioribus, humi-
 dioribusque generādis idonei, antea assumpti procrearint. Quod si
 distētiō, sine capitis, vel aurium gravitate oborta fuerit, spiritus flatu-
 osus & crassus, qui nō habeat exitum, dolorem excitasse censetur:
 Sin gravitas simul & distētiō, calor & pulsatilis cruciatus percipi-
 atur, in flammatio dolores aurium commouisse dicetur. Interdum
 saniosi humores in auribus nati, sicut etiam acres foris illapsi confi-
 miles dolores, pariunt. Sunt autem acerbissimi, gravissimi que, qui
 ex inflammatione, aut ex flatulēto spiritu proveniunt: quia in pri-
 oribus acris, & valdè tenuis sanguis, inter crassiorem cerebri mem-
 branam, & eam quæ auditorio meatui obtenditur, collectus, has
 ob humoris acrimoniam pungit stimulatque: in reliquis autem,
 ex spiritu natis membranæ plus æquo tenduntur ab ossēque di-
 uelluntur. nullus in ea tumor, nullusque rubor apparet, nisi exter-
 ne etiam partes consortij lege afficiantur. Multò leuior dolor exi-
 stit, quem frigidus crassusque humor, interiori auris regioni im-
 pactus, & citra ardorem, gravitatem, & distentionem alit̃ fixus ef-
 ficat: euidens pituitæ redundantis fomentum. **MATH.** Quæ cau-
 sas doloris aurium comitari solent? **GERON,** Putris materiæ iam
 maturatæ excretio, quæ membrana aurium vel rupta, vel rarefa-
 cta, vel erosa per ipsarum, anfractum fieri solet. Quibus cerebrum
 imbecil-

imbecillum est, excrementisq; plenum, ex eorum auribus aut pus album, aut sanies liquidior emanat. Interdum pus, aut aliud sordidum genus, citra inflammationem effluit, dū copiosa cerebri colluies per eam partē, viam sibi, & exitum molitur. Quin & vlcus
 5 sordidum ex hisce causis sæpe generatur, cum vel pus, vel humor influens summa constat acrimonia. Adhuc caro in vlcere humido excrescit, quæ auris meatum obstruit, auditumque peruertit. Preterea sordes copiosæ, vel concretæ, vel obduratæ: nec non calculi & alia nobis imprudentibus in aurem illapsa, meatum illum ob-
 10 turant: item puris ac saniei obstructio, supressioque diuturna, & vlcus sordidum, vermes progignit. *MATHESES*, Quomodo & quando aurium dolores finiuntur? *GERON*, Qui cum febris continua ac vehementi inuasit, non facile tolluntur. delirij namq; & mortis periculū in ea imminet. ægri natu minores septimo die,
 15 aut citius opprimuntur: maiores autem longè tardius: vt quos febris & delirium minùs infestet. Quod si doloris aurium recidua eueniat, plurimos occidit: iuniores verò priusquam suppurentur aures, è medio tollit.

Aliud vitij genus est, vbi aures intra seipsas sonant. atq; hoc
 20 quoque fit, ne externum sonum accipiant. Græci *ἡχώ* appellant: latini sonitum aurium intra seipsas: vulgares tum sonitum, tum tinnitum, tum sibilum, tum strepitum communiter vocant. Est autem propriè sonitus sensus cuiusdam intra aures ipsas, externum sonum impediens, ne ab ipsis accipiat. *MATHE-*
 25 *TES*, Quæ pars in hoc affectu oblata est? *GERON*, Meatus auditorius, vbi potissimū ipse terminatur, & neruum dilatatum attingit, cum & ipse sensus audiēdi, qui in parte (quàm dixi) absoluitur, affectus existat. *MATHESES*, Quid autem ipse est? *GERON*,
 30 Symptoma, quo functio sentiendi vitatur, id enim facultas audiendi sentit, quod sentire non debet, eoque actio eius deprauata dici potest. *MATHESES*, Quot vitij huius causæ esse dicuntur? *GERON*, Complures: nunc flatuosus spiritus: nunc acutus sensus vaporum, ex ore ventriculi ad aures ipsas exhalantium: nunc humor crassus obstructus: nunc aurium ipsarum imbecillitas, vt in
 35 ijs, qui ex morbo se recolligunt euenire solet: nunc etiam crisis, vt in nonnullis febribus vsu venit. Externæ autem, capitis ictus, vel hic, aut ille morbus, vel cruditas, seu larga vini potio, vel multus violentiusque vomitus, vel medicamentorum auricularium vsus. vt igitur artificiosa quadam cōiectura dignoscas, vnde mor-
 40 bus prodierit, cum certò non possis, ægri quoque temperatura, habitus, & superioris victus ratio in memoriam reuocari debet: adhuc obseruari, num sonitus per intervalla ac sensim, an simul

*Prognosticum**SPRUDITAS en-
rium.**Pars lesa.**Quid sonitus.**Causæ sonitus.**Interna.*

vnôq; tempore obucnerit. præterea vtrum malum hoc paulatim repetat, an continuè perseueret. *MATH.* Vnde sonitus prouenit, si nunc excitatur, nunc cessat, & tempore interposito reuertatur?

SONITVS

*nunc exorietur,
nunc cessans, nunc
reuertens vnde.*

GERON, Ex spiritu flatulento, cui facilis exitus non patet, præsertim si æger antea cibis vsus fuerit, qui flatus generare solent. siq; multæ cruditates præcesserint. *MATHETES,* Quid si eundem sonitum, ex flatu ventoso intercluso, procreatum esse suspicer, eoq; siccantibus, extenuantibus, & discutientibus, saluamque per os educetibus remedijs vsus, & ratione totius capitis habita, nihil profecero? *GER.* Tunc sanè ob subtilem audiendi facultatem

*Sonitus ex subtili
facultate.*

*Causæ sonitus
paulatim orti.*

illum prouenisse, coniecturandum est: maximè si æger acuto audiendi sensu præditus videatur. *MATH.* Quæ causæ eius sonitus esse possunt, qui non repente oritur, sed paulatim increscit? *GERON,* Humores crassi, & viscosi, præsertim si grauitas capitis percipiatur, & cruditates, balneorumque intempestiuorum, & aliorum, quæ crudos succos procreare solent, vsus antecesserit. At sonitus qui ægris à morbis se recolligentibus obtingere consueverunt, ob locorum imbecillitatem oriuntur. In febribus autem & earum crisi bus depræhensi, iisdem ex causis trahunt originem. Quod si externæ sonitum aurium excitarint, eas ex egris, & ipsorum

Sonitus perpetui.

Per intervalla repetentium causæ.

familiaribus cognoscet. Porro sonitus, qui perpetuò continuatur, ex ipsismet auribus affectis proueniunt: qui verò per intervalla repetunt, ex aliarum partium consensu, vt interim desinant, deinde rursus excitentur, nèpe à corpore repleto, aut exinanito, aut à motu, aut à vehemèti calore, vel à frigore. atq; sic omnes sonitus superius dicti, ex motu & agitatione eorum, qui intimam aurem occupant, sicut etiam vitiosa auditio, nascuntur: singulæ autem priuatim

Sonitus species

*vnde peculiari-
ter prodeunt sin-
gule*

hoc modo. Sonitus quidem ex crassiore flatu plenius erumpet: si bilis ex tenui leuiter elabète: strepitus ex valido impulsu. At nihil horum auditu percipitur, si interior ipsius causa, quæcunq; ea sit, coquiescat. Perpetuò autem sonitus, aut strepitus perseuerat, vbi vlcus ab inflammatione, vel abscessu, multoq; pure madidum, non probè coalescit. Quâuis enim nullus flatus nature contrarius subsit: tamen spiritus per arterias violenter impulsus, auditionem legam offendit. *MAT.* Præuísne auditus etiam salua aure generatur?

*Quando sonitus
aut strepitus sem-
per durent.*

GERON, Vtique. interdum ex capitis consensu, vt qui per omnes eius arterias effundi percipiatur: sicut ferè tum in summo febrium æstu, tum extra illas accidit: quando calida amplaque exspiratio ad caput effertur. Nam arteriæ tum hac exhalatione, tum spiritu flatuloso distentæ vehementius pulsant, & multum calidi spiritus, in cerebrum & aures effundunt. ab his autem sanus alioquin audiendi sensus, perturbata consulaque vitiose per-

*MALVS AV-
ditus.*

cipit

cipit. MATHETES, Quid de vniuscuiusque sonitus habitu, & natura profers? GERON, Lenis est, qui ex grauedine contrahitur: peior, qui ex morbis, capitisque longis doloribus incidit: pessimus, qui magnis morbis venientibus, maximèque comitiali prouenit.

Præfatio.

Cum autem sonitus aurium, visusque hebetudo, & grauitas narium, in ardente febris accidit, ægri more melancholico, mente mouentur. MATHETES, Quæ præterea auditus vitia existunt?

GERON, Vnum, quo grauius seu difficilius aliquis audire incipit, Græcis βαρυνξία vel δυσηξία, Latinis grauis seu difficilis auditus vocatur. eo laborantes surdastrī, vel grauius, difficultèque audientes nominantur. Alterum vitium, surditas nobis, *AVDITVS vitiorum species.*

Græcè dicitur: vbi auditus ad eò offensus est, vt ægri neque magnas, neque exiguas voces percipiant. MATHETES, Quæ pars in ipsis afficitur? GERON, Vel cerebrum, vel primum audiendi instrumentum, vel auris anfractus, nunc lesus, nunc impeditus. *SPURDITAS.*

MATHETES, Quæ causæ partes istas infestare solent? GERON, Aut simplex intemperies calida, aut humoris vitium: præsertim calidi ac biliosi, aut frigidi, crassi, aut pituitosi. Biliosa nanque alius quando sistitur, surditas excitari consuevit: quando illa deijcitur, hæc finitur, vt Hippocrates ait. pituitosus autem vehementer impactus, & conuiescens, omnium partium sensus, functionesque obtundere colit. præterea inflammatio, vel abscessus, vel vlcus, surditatem gignere possunt. MATHETES, Quæ aures impediunt? *Pars affecta in surditate.*

GERON, Quæ anfractum ipsius obturant, vt pus, sordes concretæ, tuberculum, callus, scirrhus, & alia in ipsas illapsa. MATHETES, Vnde grauis auditio prodijt, quæ à prima natali die in vetustatem incidit? GERON, A structuræ vitio, quo aut figura adest deprauata, aut instrumentum aliquod deest. MATHETES, Quæ biliosos humores surditatis auctores esse indicant? GERON, Si illa repente

exoritur, & potissimum in febribus, ægrique natura, ætas, ac habitus, calidus & siccus fuerit, victusque ratio talis antecesserit, & simile anni tempus, regio, & aeris status adsit. MATHETES, Quæ crassos humores ad aures decumbere testantur? GERON, Tum illarum, tum capitis grauitas, nec non quæ pituitam abundare no-

tant. MATHETES, Quomodo affectus isti finiuntur? GERON, Quæcunque surditates à prima hominis origine, vel paulò post ortæ, tandiu perdurant, donec absoluantur, nullo remedio discutuntur. Quæ verò non absoluntur, tandiu tamen perseverant, etiam nullam curationem, aut certè difficillimam recipiunt. Surditas quoque, morbos acutos & turbulentos subseruita, periculosa est quæ ex biliosi humoris ad superiora impetu procreatur, ea illius euacuatione medicamento purgante facta tollitur: quidam

Impedimenta aurium.

Gravis auditio ab infantibus.

Prognostica.

Prognostica.

Prognostica.

Prognostica.

Prognostica.

etiam bile sua sponte inferius descendente, surditate liberantur. alijs sanguis e naribus erumpens, aut alius turbata affectum hunc discutit. Grauis auditus etiam periculo subiectus est: quia paulatim augescens, temporis processu surditatem perfectam inducit. MATHESES, Quid præterea auribus incidere solet?

PAROTIS.

GERON, Nihil. verum sub illis, modò in secunda valetudine, ibi inflammatione orta, modò post longas febres, morbi impetu illuc conuerso, abscessus quidam interdum oboritur, qui græcè *παρωτίς* dicitur. MATHESES, Quæ pars huic malo obnoxia est?

Partes affectæ.

GERON, Glandulæ circa aures sitæ: affectus autem ipse, partim inflammationum, partim ex intemperiei & diuortij vnionis generi annumeratur. MATHESES, Quot sunt eius causæ? GERON, Non

Causæ parotidum.

yna, sed plures, nam interdum sanguis abundans, isq; non admodum crassus illam gignit: id quod tumores magni, rubrique, dolores continui, atque vehementes grauantésque: nec non temperamentum, ætas, & habitus sanguineus, præcedens victus ratio, quæ multum sanguinis gignere potest, & reliqua id genus alia indicant. adhæc eiusdem vitij auctor est biliosus sanguis & tenuis: quod tumor rubicundior citra grauitatem, ac igneus Erysipelati per similes, demonstrat. ægri in eo tanquam ardere videntur, vt tangentes eos manifestum calorem percipiant: similiter, quæ præcesserunt, ac simul comitantur, vt corporis habitus, ætas, temperamentum, victus ratio, & reliqua ostendent. At si melancholicus sanguis parotidas excitarit, neque rubor, neque dolor aderit: sed tumor quidam scirrhusus, veluti si pituitosus sanguis illas generauerit, laxus, qui *οιδημα* Græcè dicitur, in quo nihil sentitur doloris, aut aliquis renixus: adhæc quæ præcesserunt, sanguinem melancholicum, aut pituitosum etiam, procreare potuerunt. Deniq; omnes ex equo parotides, nunc ex humoribus capiti impactis, atque inde ad partes iam citatas transmissis: nunc citra capitis affectum generantur: maximè in febribus, quando natura humores superfluos, ex vasis ad regionem inter cutem, & subiectas partes per crissim deponit: & glandulæ portionem humorum effusorum sibi vendicant, affectuq; iam dicto laborant. Copia igitur & qualitas materiæ quæ influxit, parotidasque excitauit, accuratè obseruari debet. nonnullæ enim ipsarum, per crissim concoctione apparente fiunt, quæ non prauæ, sed curatu faciles existunt, multosque magnis periculis liberant: nonnullæ ex copia cruda, naturam grauantem simul & irritantem, contrahuntur. Qua de causa processu temporis etiam periculose sunt, & medicis varia tentantibus vix suppurantur, aut concoquuntur.

Prognosticum.

Post aurium affectus, proximi sunt, narium & odoratus vitia, in

tia, in quibus ipse, vel in totum aboletur, vel deprauatur. MATHE.

Quæ partes in his læduntur? GERON, Meatus priorum cerebri ventriculorum, aut ij, qui à colando Græcè *ἡθμοειδής* appellantur. nam odoris sensus in prioribus cerebri sinibus perficitur, *NARITIM*
Ex odoratus.
Vitia.

5 dum vapores, ad ipsos per foramina meatuum illorum exhalant. MATHE T. Quibus notis illas dignoscant? GERON, Si odorandi fa-

cultas læsa est, vox autem manet incolumis, priores cerebri sinus laborant. sin autem vox quoque mali consors fuerit, difficilior quo *Partis effectus s*
gna.

10 bet: præsertim in sarcomate, vel polypo, vel inflammatione, vel grauedine. MAT. Quo affectu priores cerebri ventriculi afficiuntur, si odoratus vitium in eis heret? GER, Intemperie sola, aut etiam humo-

rum abundantia: sicut, vbi ethmoïdibus meatibus insistit, obstru-

ctio eorum tantummodo non intemperatura duntaxat, illud gene-

Intemperie na
rium.

15 rat. MATHE T. Quomodo odoratus offensio, ex obturatis meatibus colatorijs, orta esse depræhenditur? GERON, Ex narium excre-

mentis contra consuetudinem retentis, sic vt mucus, ac destilla-

tio sæpius antecesserit. quanquam ijdem meatus, ex putridis eti-

20 am quibusdam materijs superfluis, obstrui possint, sinûsq; cerebri

oppleri, ac intemperie quadam infestari: vnde etiam fœdus odor

excitari solet. MATHE TES, Quid de finiendo isto malo spei ha-

bes? GERON, Quod si diligens ei cura adhibeatur, siue intemperies, siue excrementorum copia priores cerebri ventriculos obside-

Prognosticum.

25 at, nō ita difficulter soluetur: sin autem negligatur, periculum erit

30 morbi comitalis, aut apoplexiæ: præsertim si humores in ventriculis cerebri, non solum prioribus, sed etiam in medio, & postero

re simul abundant: sicut euenire solet, cum illis repleti, supini tota nocte decumbimus. adhuc non parum discriminis imminet, cum

odorandi functio est vitata, præsertim in morbis acutis: & si putris quidam odor, ac fœdus, percipiatur. MATHE TES, Qui alij

35 morbi narium præter enumeratos existunt? GERON, Vlcus, quod per initia neque dolore, neque acrimonia vrget, eoque diu sæpè occultatur, donec sordibus oppleatur

VLCVS NA
rium.

& tenera ossa exedat. recens autem inde depræhenditur, quod na-

35 res ipsæ, sanguine crebro madeant, præsertim cum aut attinguntur, aut irritantur, crustasq; & odorem fœdum habent. Inueteratum iam, ac putre, *ὀζαίνα* Græcè nominatur, è quo crusta sordidior,

Ozæna.

atque etiam fœdi odoris mucus excidit. hoc vitium ideò vniouis diuortium, siue solutio dici potest. MATHE T. Vnde nascitur? GER-

40 RON, Ex acriū putriūmq; humorum influxu. nam 1. vt similes narium alas, aut earum interstitia, aut tenera cartilagineæque ipsarum ossa depascitur, magnæque deformitate putrefacit. sæpè pa-

latum penetrat, præsertim ubi carcinomatis formam repræsentat, aut à lue Hispanica prouenit. differt autem ab alijs, quæ ab acribus, non autem fœdis contrahuntur. **MATHESES**, Potest ne huic vitio succurri? **GERON**, Quanquam difficulter, tamen aliquid tentandum est.

HYPER-SARCOMA. Aliud vitium est carunculae excrementia, modò alba, modò subrubra, quæ narium ossi inhæret, ac Græcis *ὑπερσάρκωσις* appellatur. hæc ad eò plerumque increfcit, vt foras ad labra vsque pendeat, naresque impleat, polypodi marino similis: vnde Græcè *πολύπους* dicitur, sæpe mollis, rarò dura. est cum retrò per idforamen, tendat quo spiritus à naribus ad fauces descendit, augeturque ad eò, vti post vnam conspici possit: ac vitium hoc ferè *καρκινώδες* est, naribus peculiare, spiritum magis impedit, nares dilatat: eoque hominem tandem, maximè aulstro, aut euro flante strangulat. **MATHESES**, Quæ eius est causa? **GERON**, Humor crassus, viscosus, que, vt palàm cognosci potest: id circo malum hoc ferro curari solet. quanquam interdum medicamentis quibusdam adurentibus inarescat. **MATHESES**, Estne alia adhuc affectio, quæ præter superiores naribus accidere consuevit?

SANGVINIS profluium. **GERON**, Interdum sanguis inde exit, vel ex ea parte aliqua, vel rupta, vel ore alicuius venæ patefacta: interdum ob sanguinis ipsius qualitatem, vel ob excretricem naturæ facultatem. **MATHESES**, Quomodo autem habent vasa, ex quibus ille profluit? **GERON**, Nimis sunt mollia, vel dura, tenuiãue naturaliter: aut propter causam aliquam superuenientem extrinsecus vitiata. **MATHESES**, Quando sanguinis qualitas fluorem eius concitat? **GERON**, Cum ille vasa quibus continetur, erodit, vel ad eò abundat, vt ab illis contineri nequeat, sed ea, modò disrumpat, modò ora ipsorum patefaciat. **MATHESES**, Quando ob facultatem excretricem sanguis è naribus erumpit? **GERON**, Cum illamet ora vasorum aperit. **MATHESES**, Ergò sanguis ob vnam saltem ex prædictis causam, è naribus profluit? **GERON**, Vtiq; nam modò venarum, aut arteriarum ora aperta sunt: modò tunicæ ipsarum diuise vel rarefactæ: modò sanguis ipse vitiatus existit: aut facultas, quæ ora vasorum eo tempore aperit, quo aliena ipsiq; molesta excernit. **MATHESES**, Quæ res vasa ipsa adaperiunt, patefaciuntque? **GERON**, Nunc imbecillitas, nunc sanguinis ad ora illorum ruentis copia: nunc acris quædam illius extrinsecus incidens qualitas. **MATHESES**, A quibus vasa diuiduntur? **GERON**, A vulnere, aut contusione, aut ruptura, aut erosione. **MATHESES**, Vnde illorum fit adaptio? **GERON**, Ex tunica rarefacta, & sanguine attenuato: quanquam etiam ex gracilium vasorum oris patefactis fieri possit. **MATHESES**, Quomodo dignoscantur sanguinis

sanguinis profluuium ex vasis aliquo modo affectis, ortum esse?

GER. Facile, siue interior siue exterior causa extiterit. non enim aderunt illius, vel abundantis vel vitiosi profluentis indicia, neque malus corporis habitus apparebit, neque sanguis tempore crisis

Sanguinis fluor ex vasis.

5 per acutos morbos erumpet. MATHE TES, Quo pacto percipiam num sanguis in naribus, ob causam exteriorem euenerit? GERON, Si ob casum aliquem ex alto, aut ob ictum, aut ob vehemens exercitium, aut ob insolatum, aut ob id genus similia profluxerit, ex egro, eiusue familiaribus cognosces. MATHE T. Quid si nulla exterior causa aderit?

10 GERON, Interior inquiri debet, num scilicet vasa sint molliuscula: id quod ex humore copiosiore deprehenditur, sicut cum duriora existunt, ab ariditate. MATHE. Quid si vasa non ob exteriorem causam affecta, sanguinem fundant, sed eo quod molliora euaserint, aut duriora? GERON, Prioris, humor copio-

Interior causa sanguinis profluentis.

15 sus, alterius, ariditas inditium est. At sanguinis fluor ob vasa rupta, aut ad aperta factus, ex tenuitate ipsorum, ob inædiam, aut naturalem structuram prouenisse, ostenditur. MATHE TES, Quæ nota est sanguinis ex vasis ruptura, aut ad apertione erumpentis? GERON, Copiæ, aut vitiositatis index: nam illa, vasa rumpit, hæc, id

20 est qualitas acris, erodit: sicut prima in pleni corporis, altera in vitiosi statu cernatur. MATHE TES, Quæ facultatem expultricem sanguinis fluorem excitasse testantur? GERON, Non vasorum neque illius vitia, sed morbus quidam acutus, qui eius profluuium antecesserit. Idque nunc cum functionis alicuius noxa, nunc

25 viribus ipsis firmis: quanuis eiusmodi fluxus naturæ omnino, excretæ materiæ ratione, aduersetur. MATHE TES, Quid vocas naturæ aduersari? GERON, Quod non tempestiuè seu in tempore expurgatur. MATHE TES, Quid sanguinis per nares exitus præsa-

Præsagium.

30 git. GERON, Si immoderatus est, & longo tempore perseverat, periculum est, ne animus deficiat, aut iecur debilitetur, refrigereturque, & tandem malus corporis habitus, & aqua subter cutem sequatur. In his, corporis color, pallidus, liuidus, aut subuiridis efficitur, extremæque vehementer refrigescunt, & syncope, mortis proxima nuncia succedit. Adhæc si cum exiguis sudoribus sanguis è

Quid in sanguinis fluore bonum vel malum.

35 naribus effluat, periculosum est: sicut etiam, cum nigra, aut rubra per aluum, post illius eruptionem deiciuntur. Iis verò qui rubicundi sunt, capitæque habent robusta, prodest, nec non si quarto die sanguis per febres è naribus largiter emanat, bonum est indicium, præsertim in minoribus, qui nondum trigesi-

40 mum annum attigerunt, eo quod ille, in ea ætate abundantior, facultas robustior, & calor efficacior existat: si primum exeat, perniciosum, testatur: quia aut copiam materiæ, quæ ferri nequit, aut na-

turæ imbecillitatem indicat : quæ superflua quidem excernere aggreditur, sed nihil promouit, porro sanguis ex contraria regione crumpens, malum, vt in liene magno, si ex dextra nare fluat, aut in iocinoris inflammatione, si ex sinistra. *MATHETES*, Quid notat sanguis, si crebrò è naribus feratur? *GERON*, Aut lienis tumor, aut capitis dolorem, aut caligines oculorum, suffusionè sc̃p fieri. *MATHET*. Quid indicat, si in pueris sanguis è naribus profluxerit: deinde processu temporis fluere desierit? *GERON*, Vel grauem articularum exulcerationem, vel debilitatem, ex morbo aliquo tandem eis superuenturam. *MATH*. Quæ faciei, & oris sunt vitia?

*Continuus san-
guinis fluxus quid
portendat.*

*FACIEI vitia
& oris.*

*PUSTULÆ.
RUBOR faciei.*

VARUS.

Lentigo.

APHTA.

*Aphtharum vlce-
rum causa.*

GERON, Primùm pustulæ ardentes, tum in naribus, tum in reliqua facie, magna feritate extuberantes, quas tenuis biliosusque sanguis immodicus excitat, qui præter solitum fuerit suppressus. hic enim cutem raram, atq; tenuè, sædo colore inficit. Huius generis est etiam rubor, qui vniuersam faciem sine pustulis, supra modum occupare consuevit, ex feruidiore sanguine contractus. Is, si per interualla repetat, solus vapor eò sublatus, aut tenuis humor, nondum infixus, auctor eius existit. Interdum quoq; luteus, albicans, liuidus, aut alius sædus color, & cutis scabrities, faciem infestat, quales morbus regius, hydropisque species, leucophlegmatias, & quilibet malus habitus excitare solet: qui ex humorum vitio, corporis ac viscerum impuritate, trahunt originem. Est cum tumor exiguus & durus, qui Latinis varus dicitur, faciem defædat, ex frigido crassoque humore, quasi in callum concretus: aliàs fulua macula, aut subnigra obsidet: quæ, quia lenticulæ tum colorem, tum magnitudinè refert nomen, etiam inde accepit, & Græci *φακόν* appellant: vulgo lentigo dicitur. Porro in summa oris parte, interim vlcera quædam serpentina, non admodum caua exoriuntur: quæ Græcis vocantur *ἀφθα*, vulgo alcolæ: infantes, tenerosque adhuc pueros infestare solent. à gingiuis incipiunt, deinde palatum, totumque os occupant: tum ad os, faucesque descendunt: item lingue latera, eiusq; palatum inuadunt. causa eorū non vna tantum existit. nam si pueris lactantibus superueniant, vt plurimum fieri solet, vitiosū nutricis lac ipsa excitat: quia id, vim habet absterforiam, quam summæ oris partes, lactantium puerorum, ob mollietē ipsarum tolerare nequeunt. sin autem lac non fuerit vitio sum, tunc vlcera idè talia sunt, quòd lactantes pueri ipsum non probè concoquant. *MATHET*. Vnde adultioribus aphthæ istæ proueniunt? *GERON*, Non solum ex eorum quæ assumuntur acrimonia, sed etiam ex humoribus vitiatiss, ad os defluentibus: ex calidiorie iecoris halitu, & bilis feruore per gulam, aut latentes meatus in os exhalante: interdum ex salsa capitis pituita in os destillante. at-

5

10

15

20

25

30

35

40

lante, atque hæ frequentes in febribus, aliquando sine illis obori-
antur: quales sæpè etiam in menstruis suppressis obueniunt. *MAT-*
HETES, Vnde aphthæ ex acribus cibis natæ cognoscuntur? *GE-*
RON, Ab ægro, eique assistentibus. *MATHESES*, Vndereliquæ?

Notæ aphtharum.

5 *GERON*, Ex diuerso ipsarum colore. nam cum fuerint rubicun-
diores, humorem sanguineum vincere significant: cum flauiores,
amaram bilem: in quibus etiam tactu, immodicus calor perci-
pitur, quanuis multò maior in flauioribus, & ex bile procreatis
deprehendatur. Quòd si albidæ appareant, pituitam superare: si

10 liuescant et nigricent, atram bilem ostendunt. has vtrasq; si con-
tingas, minimè vehementer calidas offendes. Magis eas cogno-
sces ex corporum temperamento, ætate, habitu, & victus ratione
antecedente. *MATHESES*, Quæ spem vel metum prænunciant?

Præsagia.

GERON, Quæ in pueris lactantibus extant, ijs similes, quæ in lue-
15 venerea ex hydrargyri vnguento natæ sunt, facillè curantur: idque
etiam plurimùm, ætatis ratione, illæ verò quæ perfectam ætatem
agentibus attingunt, non ita facillè, præsertim ex vitioforum hu-
morum influxu excitatæ. *MATHESES*, Cur puerorum aphthæ

promptiùs curationem recipiunt? *GERON*, Quia ijs, quæ modicè
20 astringunt, discutiuntur, vtpote mitiores, & leniore ex causa ortæ:
in proecltoribus fieri nequit, aut certè rarò. quanuis pueri eti-
am etatis ratione faciliùs, quàm viri ab ijsdem consumantur, sic vt
in illis quoque periculosiores esse dicantur: veluti si ab humoris
vitiosi influxu generatæ fuerint, id quod sæpiùs adultioribus acci-
25 dit, semper cacoëthes euadunt. Hoc autem notari debet, eas aph-
thas esse periculosissimas, quas malignus atræ bilis humor peperit:
quæ verò inueterascunt, & putridum quidpiam processu tempo-
ris acquirunt, ægrè soluuntur. Græci has, nomas, quasi depascen-
tia vlcera nominant: quia malum hoc semper latius serpit, &

30 nullis cedit remedijs. *MATHESES*, Quæ post hæc oris vitia restant?

GERON, Dentium dolor, qui ipse quoque maximis tor-
mentis annumerari potest, Græcis *odontalgia* vocatur: quanuis au-
tem omnia ossa doloris sint expertia, tamen dentes non solum

DENTIUM dolor.

35 tío pari distributus, omnibus dentibus ad radices ipsorum subij-
citur: interdum ob gingiuarum inflammationem, dolore afficiun-
tur. *MATH.* Quomodo autem dens affligi per se cognoscitur? *GE-*
RON, Si æger dolorem in alto sentire se affirmet, sic vt nullum in

gingiuis signum inflammationis existat, neruus autem ille, qui
40 radici dentis subiacet, infestatur: quāuis is confusam, aut indistin-
ctam, incertamq; doloris imaginationem plerisq; exhibeat. vide-
tur enim ac si ipsemet dens indolescat, peculiariter ac per se affe-

ctus, id quod ex vehementissimo cruciatu cognosci potest, quem ægri in alto valdè percipiunt. præterea dentes non liuidi, aut alio modo mutati cernuntur, sicut neq; gingivæ: & cùm illi exempti fuerint, exiguus dolor ad huc remanet, quòd is inde tantùm lenior euaserit. At si dolor ab inflammatis dentium gingivis proveniat, facile id ipsis inspectis, animaduerti potest. MAT. Quæ causa dentium doloris esse censetur? GERON, Vel inæqualis intemperies, vel coniuncta ei tenuium capitis humorum, siue calidorum, siue frigidorum, nunc in malarum membranam, nunc in dentium nervos, nunc in illos ipsos facta destillatio, quæ ex capitis vertice, per tempora in malas, vel in maxillam decumbit: & si quis dens exesus est, adeò, vt foramine patefeat, in eum maximè illorum defluxio tendit. MATH. Vnde calida intemperies dignoscitur? GERON, Ex acriori dolore, subrussa ægri facie, calido totius corporis temperamento, ætatis flore, anni tempore, & regione, aërisque statu, calidavictus ratione antecedente. MAT. Quid dolorem ex humore natum indicat? GERON, Primùm totius corporis, deinde eiam capitis status humidior, si eger lautiorem victus rationem secutus fuerit, idq; in locis humidioribus, tēpestare humida, & vere: item si quæ aëris tempestas, & anni tempus simile fuerit, quo dentes vnà cum partibus eis adhærentibus, laxiores, mobilesque necessariò fiunt: quemadmodum etiã ex humorū acrium erodentiũque influxu roduntur, perforanturq;. Quanquam autem laxi mobilesque dētes ex humore facti, nullum dolorem experiantur: tamen copia illius grauati ipsi, & proximæ eorum partes nonnunquam indolitant. MATHETES, Vnde sicca intemperies, doloris causa esse depræhenditur? GERON, Ex ipsius vehementia: nec non ex corporis totius, maximè verò capitis temperamento, siti continua, nisi frigus siccitati fuerit coniunctum (tunc enim ægri parum expuunt) & autumnalis tempestas, vitæq; laboriosa, & victus tenuis, in regione sicca, similisque aëris status antecefferit. MAT. Quæ notæ intemperiem compositam dolorē excitasse declarant? GER. Consimile corporis vniuersi temperamentum, & caput, quod huiusmodi humore facile repleatur, pilosum & subruffum, idq; in regione calida & humida, verno anni tempore: in simili etiã aëris statu, nempe austrino, ad eundem quoq; modum calida & sicca, aut frigida & sicca, aut frigida & humida intemperies. MAT. Quibus indicijis humorum copia, prædictis qualitativis coniuncta dolorem efficiens, cognoscitur? GER. Dolē is ipsius natura, nam si punctorius est, bili flaue, & calori ascribitur: si partes dentibus vicinas distēdit, pituite & frigori: si altè quēdā partes constringantur, atq; bili: si grauis existat, omnibus humoribus ex æquo redundantibus, adhæc si tenuis, & calida ma-

Causæ doloris dentium.

Note causa.

Note intemperaturæ compositione.

Humorum copię qualitatum indicia.

lida materia molestat, dolor est acerbior acriorque: sin autem tenuis ac frigida infestat, leuior, & malarum tumor sæpè comitatur.

MATHETES, Ex alijs ne signis præterea doloris auctor comperiri potest? GERON, Indubiè, ex sapore humoris. nam ama-

Signa ex sapore.

5 ror eius bilem testatur: salsedo pituitam: acor nigram bilem. interdum etiam ex inflammatione partium, dentibus ipsis adhærescentium, qualis carnosus alijs accidere solet. Sicut autem dentes ex nimia alimenti copia, sæpè inflammantur, ita ex inopia ipsius

Ex inflammatione.

extenuati afficiuntur. MATHETES, Quid dentes exedit, putrescit, aut alueolis expellitur? GERON, Crebra seu repetens sæpius humo-

Quæ dentes exedant putresciant & expellantur.

10 rorum in eos defluxio. MATHETES, Vnde præterea exeruntur, aut longius prominent, aut atteruntur? GERON, Vel mandendo, vel exteriorum causarum violentia. MATHETES, Cur stupefunt?

GERON, Frigidioris humoris, & acerbiorum crudorumque fr-

Dentium stupor. Nigior, & sadius lentior.

15 ctuum esu. MATHETES, Ob quid nigrescunt, aut fœdo lentore obducuntur? GERON, Eò quòd minùs diligenter deter-

gantur: vel ob dulcium calidorumque ciborum esum: vel ex crudorum, & plus satis ingestorum: vel ex vitioforum humo-

20 rum, ob viscerum præsertim lienis impuritatem, à quartana reli-

ctam exhalationibus, & vnguentis hydrargyricis. MATHETES, Ex qua causa dentes sæpè vacillant, suntque mobiles? GERON,

Ex ictu, vel quòd radix eorum, multo interdum madore scateat, eoque alueoli eorum laxescant. MATHETES, Quare tandem den-

25 tes exeduntur, perforanturque? GERON, Humor acrim, ro-

dentiumque influxu, sicut etiam gingivæ, quæ nonnunquam adeò

GINGIVARUM affectus.

excresecunt, vt dentes ferè integant, præsertim in ijs quibus mol-

les sunt, & spongiosæ: quicque in humidioribus locis habitant. MATHETES, Ob quid hæc flauescunt, & eroduntur? GERON, Ob a-

crioris & falsi humoris commercium, & vlcuscula, quæ dentium

30 radices detegunt. MATHETES, Quo alio affectu gingivæ affligi solent? GERON, Inflammatione manifesta, quæ Græcis *πρωυλὶς* ap-

pellatur. hæc ad dentium radices, intus & foris, adeò prominet, vt partes vicinæ etiam disturbentur, rubescant, calecant, dole-

35 antque. Eadem ex maiore oculorum angulo ad malas: ex venis

autem desinentibus ad maxillam per tempora procumbere, & tandem abscessus fieri consuevit: cuius pus non ad faciei cutem,

MAXILLÆ affectus.

sed ad dentium radices, tenui velamento tectas irrumpere. quòd si vlcus malè curatum fuerit, caruncula eminet, quæ Græcis

40 *πρωυλὶς* dicitur. MATHETES, Quo morbo vltimæ faciei pars ma-

que ipsam reddit immobilem, sic vt in loco dolor sentiatur, durusque tumor, & manifestus appareat. **MATHESES**, Cuius partis oris morbus iam sequitur?

LINGVÆ vitia.
RANUNCULUS

Muti ac bleffi
quomodo fiant.

Gustatus vnde
offendatur.

TONSILLÆ.

GERON, Mollis ac laxæ, quæ linguæ subiacer tumor, qui interdum inflammationem, sæpius cedema refert; Græcis ob rang figuram *Βάρεα* appellatur; interdum lingua vel stupefcit vel re soluta est, adeo vt sermo hominis non explicetur, aut saltem non articulatè: quod nunc ex morbo, nunc per se accidit: modò vna, modò altera ipsius pars, nempe dextra, aut sinistra, gustu saluo, re soluitur. Quod si tota resolutionem experiatur, apoplexiæ grauis periculum imminet: sæpè etiam hæc illi, quanuis inueterata non succedit. Omnes consummata linguæ resolutione laborantes obmutescunt: quidam à natali die muti ex figuræ linguæ vitio permanent: interdum aliquis ex defluxione capitis, diebus aliquot loqui non potest, motu aliarum partium, & sensu integro: li quore verò diaphoretico assumpto, vocem recipit. **MATHESES**, Cur blæsi, aut balbi sermonem articulatè explere nequeunt? **GERON**, Vel ob linguæ breuitatem, vel ob nimiam eius crassitiem: vel ob aliud structuræ naturalis vitium: vel ob humoris ei affluentis copiam: vel ob cerebrum humidius: vel ob ebrietatem: vel quod lingua sicior existat, quàm naturaliter esse debet. **MATHESES**, Quid efficit, vt lingua, vel nihil gustare possit, vel minùs quàm oportet, vel id ipsum vitiosè? **GERON**, Molliores cerebri nerui, qui à tertio coniugio prodeunt, plus æquo refrigerati, aut aliquantum obstructi, aut earum origo offensa. **MATHESES**, Quid alienum saporem gignit? **GERON**, Ipsamet lingua, aut membrana eam ambiens, vitioso ac prauo humore infecta, qui aut per se, aut cibo potuque imbutus, in illam, neruòsque molliores penetrat, & hos vitijs suis corrumpit: vnde aut salus, aut amarus, aut acidus, aut alius vitiatu sapor deprehenditur, ceu ab esculentis poculentisque impressus. Idem humor crebrò etiam ab inferioribus partibus ascendit, gulamque & linguam inficit: aliàs è cerebro ad has destillat. **MATHESES**, Quæ partes oris præter linguam afficiuntur? **GERON**, Tonsillæ, quæ Græcis *μειόδωρα* vocantur, frigida destillatione, sub malis intumescens: id quod contingi cernique intus potest. Est autem tumor illarum ceu tuberculum quoddam, quod faucibus inhærescens, mole sua ipsas premit, impeditque, ne cibus, potus, & saliuæ faciliè deuorentur. Quilibet hoc in loco rubor, sed nullus ardor, & sitis adesse solet. sæpè is tumor in inflammationem coniunctam habet: nec nō dolorem, ardorem, ruboremque ampliorem, & sitim: ex quibus nihil in superiore vitio animaduert-

animaduertitur: concocto ruptoque abscessu, materia puris in os & fauces emanat, oriturque vlcus sordidum: cuius putrido halitu, spiritus quoque fædi odoris percipitur. Tale vlcus non raro absque inflammatione, ex humore falso vel acri gignitur, qui tonsillas molles, humidas, & squalidas, in totū exedit. Nonnunquam eiusmodi vlcus, etiam incipiente morbo Neapolitano, ex contagionis labe familiare existit.

Quinetiam caruncula quædam insummo palato, tanquam vocis plectrum dependet, si quis linguam toto ore plurimum adaptato deprimat, conspicua: ea, si laxior, longiorque facta, in fauces, & gulæ caput descendat, sæpè molesta est, & titillatione quadam vexat, adeo, vt suffocatus sit periculum. *MATHESES*, Quo nomine veteres hanc appellant? *GERON*, Græci nunc γαργαρίωνα, Latini gurgulionem, nunc κίωνα, quasi columnam: posteriores medici omnes κιονίδα, hoc est columellam vocarunt. non refert, an nonnulli ipsam Græcè σφιλήν, quasi vuam nuncuparint. non enim particula ipsa, sed quædam eius affectio, σφιλή nomina natur, eò quod summa gurgulionum pars, vuæ acino similis appareat. hæc quoque sola illius inflammationis species, Hippocrati vuæ dicitur. *MATHESES*, Quando hæc afficitur? *GERON*, Cum pituita ex capite ad gurgulionem descendit, & hic præceps pendet, euaditque rubicundus: temporis autem processu nigrescit, idem aliàs fieri dicitur, cum summa gurgulionis pars aqua repletur, sitque rotunda ac pellucida, & spiritum intercipit. Rariùs hæc affectio collumellam iuuadit: sæpiùs autem inflammatur: sicut etiam ea, quæ eorum dicitur gurgulioni obuenit, cum scilicet ipse ex ardore nimio gracilescit, & loco similis propendit. vtrumque, nomen à similitudine impositum est, nam si longior, tenuisque gurgulio fuerit, columella appellatur: si verò crassior in rotunditatem creuerit, deorsumque feratur, vuæ dicitur. In summa hoc vitium est inflammatio, eaque ex dolore, tumore, & rubore ipsius columellæ cum febris, ac deuorandi difficultate digno scitur. *MATHESES*, Quæ causa illam excitat? *GERON*, Cum aliorum humorum, tum sanguinis ex capite ad gurgulionem defluxio *MATHESES*, Quibus remedijs gurgulio inflammatus, tumidusque, curari, extenuarique poterit? *GERON*, Omnibus alijs præterquam manu, nam quandiu rubescit, magnusque existit sectio, & scarificatio periculosa est, eò quod illam sanguinis fluor, & inflammatio comitetur: præsertim si corpus succis plenum fuerit. Rarò hic morbus si ab initio rectè curari capit, hominem tollit, at quibus columella confecta est, ijs pulmo facile læditur, ferèque tabes ægros ita curatos, perdit.

Gurgulio, columella, aut columella, vuæ.

Vuæ affectus vuæ,

Columella & vuæ nominum differentia.

*ANGINA &
eius species.*

*Angina ex inter-
nis gutturis mus-
culis inflamma-
tis.*

Guttur.

*Anginae speciem
indicia com-
munia.*

*Anginae indicia
propria*

*Gutturis muscu-
lorum inflamma-
tionis nota.*

*Faucium inflama-
tionum signa.*

*Quo pacto exte-
riores faucium
partes affecto no-
scentur.*

*Signa gutturis
laborantis.*

Aliud morbi genus est pestiferum acutumque, sub quo fauces, hoc est extremae gutturis, gulæque partes, inflammari solent: nostri anginam vocant, Græci *κυνάγχη* & *συνάγχη*, inde quod homines strangulet. Quatuor ipsius differentie apud Græcos numerantur: pro ut quatuor partes in eo affligi consueuerunt. Gutturis quidem interioribus musculis inflammatis, *κυνάγχη* appellatur: externis verò *περὶ κυνάγχη*. Similiter faucium interioribus musculis inflammationem expertis *συνάγχη*, exterioribus *περὶ συνάγχη*. MATHE. Quid faucium nomine intelligis? GERON, Interioris oris regionem, ubi gulæ, & gutturis partes extremae conueniunt. MATHE. 10 Quid gutturis voce significas? GERON, Eam asperæ arteriæ partem, quæ veluti caput ipsius existit. MATHE TES, Quæ sunt communia omnium anginae specierum indicia? GERON, Ager non cibum deuorare, non potionem potest: spiritus oris quocunque modo deterius eliditur: quanuis thorax, aut pulmo sit incolumis. MATH. Quomodo partes affectæ inuicem discerni possunt? GERON, In eo quod hæc maiorem, illa minorem deuorandi, siue spirandi difficultatem, aut incommoda pariant. MATH. Quæ propria sunt cuiusque anginae signa? GERON, In ea specie, ubi inflammatio interiores musculos gutturis exercet, neque color, neque calor, neque tumor, siue in ceruice, siue in faucibus apparet. Spirandi autem difficultas adeò augetur, ut spiritus non nisi recta ceruice trahi possit. pectoris angustia, dolorque multus in gutture, & febris non lenis percipitur: item vox cum spiratione læditur. MATHE TES, Quæ gutturis exteriores musculos inflammari testantur? GERON, Omnia quæ prædiximus, sed remissiora. non enim angustia, neque dolor, quanuis circa guttur adsint, adeò vehementes deprehenduntur: similiter neque spirandi difficultas. MATHE TES, Quæ fauces inflammatione offensas ostendunt? GERON, Dolor prædictis alsimilis, rubor, tumorque, quæ ore adap- 30 perto, linguæque depressa conspectui patent: item quod æger non adeò difficulter spiret, linguæque simul cum faucibus interdum simili modo afficiatur. MATHE TES, Quibus signis exteriores faucium partes affectæ dignoscuntur? GERON. Si non solum fauces, sed etiam ceruix, & pectus rubescant, ægerque non vehementer doleat, neque difficulter spiret, & partes faucibus vicinæ inflammatae extrinsecus apparent. Præter has peculiare notas, & communes superius recitatas, aliæ quædam in qualibet anginae differentia incidere solent. Vbi gutturis partes laborant, interim ægri ore conuiuent, interim ad- 40 aperto aërem trahunt: aliquando potio assumpta ad nares regurgitat: dolorque inuadit. aliquando cum nimium vrget inflammatio-

flammatio, tum lingua, tum fauces in tumorem attolluntur. MAT.

Quis morbi istius multiplicis, acuti periculosique auctor existit?

GER. Humor capitis ad partes supra citatas defluxio: non solum autem calidi, acris, & tenuis, quales sunt biliosi, quanuis hi

*Cause angine.
Calidi tenues &
atres humores*

5 præcipue, sed etiam frigidi, pituitosi, crassi, ac glutinosi. MATHE-
TES, Cur tenues, & acres humorum materias potissimum anginas excitare dicis? GERON, Eò quòd huiusmodi per angustiores

venas, quæ guttur ambiunt, facile penetrent, & in illud decum-

*Frigidi, crassi &
scosi*

10 gnere possunt. GERON, Quia hi, cum vniuersas venas admodum angustas non ingrediantur: in capacioribus autem, quales in faucibus extant, magis quàm in gutture retenti, ipsas in tumorem na-

Sanguinis notæ.

turæ contrarium eleuant. MATH. Quæ sanguinem, anginam peperisse notant? GERON, Maxima spirandi, deuorandiq; difficultas, in

Bilis signa.

15 gens angustia, & pectoris grauitas, febrisq; non exigua, corpus totum, ac caput sanguine repletum, adhæc simile egri temperamentum habitus, ætas, anni tempus, regio, aëris status, & antecedens victus ratio. MATHE TES, Quæ bilem huius mali causam esse indicant? GERON, Non adeò vehemens spirandi, & deuorandi cibi

20 difficultas, angustiaque: nulla ferè grauitas, sed multus dolor, ardorque circa guttur intolerabilis: ægri rosionem, & acrimoniam, orisque amaritudinem percipiunt, sitiuntque, & acuta febris laborant. nec non bilem testantur, calidum eorum temperamentum similisque ætas, habitus, & antecedens victus ratio. At si reliqui

25 humores circa fauces decumbant, maior erit tumor, calorque, & color diuersus. minor enim tumor, maior autem calor, ruborque flauescens, bilem abundare testantur: quemadmodum amplior tumor, calor minutus, color leuiter nigricans, sanguinem ad partes affectas decumbere nunciant. MATH. Quid si ambo isti humores,

30 bilis & sanguis mixti, anginam procrearint? GERON, Diuersa etiam erunt indicia, & pro vt alter alterum magis, aut minus superauerit, ita vnius quoque signa, alterius vincent. MATHE TES, Quibus notis frigidus, crassusque sanguis, ad fauces potissimum confluere ostenditur? GERON, Si paruus dolor eas exerceat, & tumor ferè

Indicia sanguinis frigidi ad fauces confluentis.

35 citra ruborem, aut cum exiguo, obscuroque laxior quodammodo appareat: quanuis interdum ex crassiore humore durus existat, & febris nulla adsit, aut fortè exigua lentaque: adhæc corpus totum, præsertim caput pituitoso sanguine plenum: nec non frigidum temperamentum, ætas, habitus, anni tempus, antecedens

40 victus ratio, aliæque morbum ex frigido ac pituito sanguine ortum demonstrant. In summa omnium quatuor angine specierum communes causæ sunt, biliosus humor, aut sanguineus, ex vena-

Cause communes omnium angine specierum.

rum iugularium ramis ad fauces defluentes: qui vel inflammatio-
nem, vel erysipelas generant. At inter euidentes earum causas,
frigus potius quàm calor existit: ictus: piscium ossa imprudenter
deuorata, per mediâsque tonsillas penetrantia, frigida quæ potio,
& cum se quis nimium vino, aut cibo repleat. *MATHE TES*, Quid

Prefagia.

de angina finienda præfagi? *GERON*, Cum morbus sit acutissi-
mus, & subito mortem inferat, acceleranda est matura ipsius cura
tio. *MATHE TES*, Quæ inter omnes eius species est grauissima?

*Angina periculo-
sissima.*

GERON, Quæ nihil conspicuum, vel in ceruice, vel in faucibus ob-
tinet, vt quæ egrotantem etiam eodem die tollat è medio. Cum e-
nim nihil nature cõtrarium, extrinsecus apparet, inflammationis,
vnde ægri strangulantur, guttur intus exercentis suspicio est. At

quæ similem dolorem superiori inducit, tumorem autem & rubo-
rem in faucibus excitat, ea quoque admodum exitiosa est, sed paulò
diuturnior, quàm modò commemorata. Porro in qua fauces &
ceruix rubent, hæc longius trahit: minimè verò periculosa est, in
qua ceruix & pectus ruborem contraxit: erysipelas autè ad interio-
ra non reuertitur: sic vt humorum fluxio guttur quidem non affli-
gat, sed aut in ceruicem, aut in hæc vtraque decumbat. Omnium

Leuissima angina

autem leuissima est, in qua rubor forâs maximè tendit: si verò ma-
teria in pulmonem vergit, dementia sequitur: atque inde plurimum
fiunt purulenti, nisi illa subinde tussi educatur. Qui ab angina libe-
rantur, ait Hippocrates, & fluxiones ad pulmonem ferri sentiunt,
n̄ intra diès septē pereunt: si verò non ad illum tendunt, suppuran-
tur. Cæterum quæ ad cutem erumpunt, aut per initia sic deferun-
tur, n̄s quæ in altum decumbunt, multò leuiores existunt. Pueri ra-
rò tali affectu laborant, nisi quando affectus ceruicis vertebræ loco
excidunt. Atque hi cum seruari non possint, curatio quoque eorum
non est tentanda: iuuenibus verò malum hoc familiarius est. Atque
hæc quatuor enumeratæ anginæ species, verè ac legitime dicuntur.

*Qui angina la-
bonare soleant.*

30
35
40

*ANGINA fal-
sa.*

Alia quandoque ex pituitosa in fauces, & ceruicis muscu-
los destillatione conicitatur, ac spuria seu falsa nuncupatur. In ea
tumor quidem apparet, sed sine rubore, ardore, & febris: quan-
quam dolor quoque excruciet, acutis tamen morbis annumera-
ri non potest. quanto autem longior existit, tantò minus pericu-
losa. Alia quoque huic vicina est: quam casus, aut ictus antece-
dens peperit, quo ceruicis vertebræ, in partem interiorem luxatæ
sunt, vel humor naturæ contrarius, qui vertebrarum ligamenta
resoluit, vel nimia copia ipsas è sede sua propulit. In hac locus, vn-
de vertebræ exciderunt, cauus cernitur: cumque is extrinsecus at-
tingitur, indolescit: item lingua etiam propria è sede recedit, eò
quod ipsam vertebra luxata, iuxta radicem eius extruserit: adhæc

spirandi

spirandi difficultas magis affligit. vnde ægri aperto ore semper
hiare, aëremque attrahere coguntur, & metu strangulatus diffi-
culter deuorant, doloreque afficiuntur, præsertim cum potus per
nares regurgitet. Atque hæcenus de angina. **MATHETES**, Per-
gas igitur ad alia, honorate præceptor, si tibi visum fuerit.

GERON, Nunc ad pectoris vitia me conuertam: in quo-
rum numero continetur etiam tussis, quæ Græcis *βήχ* appellatur.

Tussis.

MATHETES, Quæ sunt spiritus instrumenta? **GERON**, Fauces, aspera ar-
teria, pulmones, & quicquid thorace comprehenditur. **MATHE-**
TES, Quæ eiusmodi instrumentis sunt infesta? **GERON**, Nunc hu-
mores naturæ contrarij: qui ex capite in illam, & pulmonem de-
fluxerunt: sic ut quædam ceu titillatio in faucibus percipiatur, &

*Spiritus instru-
menta.*

ardor sæpe molestus sit, spiritusque difficulter trahatur: & si tenu-
is humor fuerit, nihil, vel saltem minimum in ea elidatur. **MATH.**
Quot sunt tussis genera? **GERON**, Duo præcipua. vnū vehemens, quod

Tussis genera.

spiritus ad exteriora motio est, siue efflatio: è qua ille copiosior cœ-
lesterrimè forâserumpens impetu suo excrementa meatus ipsius ob-
struentia extundit, adeò ut si prior efflatio, ea quæ molesta sunt, e-

adit malarum.

moliri nequeat, non grauetur iterum & tertio in illa irumpere.
MAT. Qua ratione, & quando tussis hæc generatur? **GERON**, Cum
musculi præsertim intercostales efflationem moluntur. ut autem

ea excitetur, thorax omni ex parte admodum vehementer com-

primitur: quò valentius id, quod in vijs spiritus residet, expel-
latur. **MATHETES**, Vnde motus in tussientibus incipit? **GER-**
RON, A facultate thoracem mouente. violenta autem huius con-

tractio, spiritum vehementer forâs elidit: hinc materia in fistulis
pulmonis, quæ asperæ sunt arteriæ, expellitur. **MATHETES**,

Quid ergo vocas propriè hanc tussim? **GERON**, Motum arbitra-
rium, quo natura semper conatur expellere, quicquid spiritum in-
terceperit, siue humor id fuerit, qui è capite defluerit, ut in de-

*Quid tussis pro-
priè.*

stillationibus apparet, siue aliquid asperis arterijs inhæserit, ut in
pulmonis, & laterum inflammatione accidit. atque ideo hic ca-

sus morbum comitari solet, qui ex spiritus meatuum obstructio-
ne prouenerit. **MATHE**, Quod secundum tussis genus est? **GE-**
RON, Quod ex instrumentorum respirationi seruientium intem-
perie oritur. hæc laborantes nihil inter tussendum expuunt. ea

neq; violèta, neq; coacta est, sed adeo exigua, ut vel in totum, vel

aliqua ex parte, suppressi, & ne eueniat, prohiberi possit. Eadē
verò non modò spiritus cohibitione fieri impeditur, sed etiam le-
uatur, si non sit admodum magna. Nam calor spiritum in ipsis in-

HH

strumentis cohibito augetur, & hic à pectore violenter pressus,
 compulſusque omnes meatus permeat. quibus vtrisque peractis
 omnia ad temperamenti æquabilitatem rediguntur, præſertim ſi
 refrigeratis respirandi instrumentis procreata fuerit. MATHE-
 TES, Sub quo vitio hæc tuſſis continetur, & qua ratione gigni-
 tur, quæque partes in ea afficiuntur, & quibus è cauſis oritur?
 GERON, Certè ſub eodem genere, quo rigores & horrores, in hoc
 autem differt, quòd ipſa celerius percipitur: cùm respirandi in-
 ſtrumēta nunquam conquieſcāt. Itaq; hæc etiam præcipuè autem
 thoracis muſculi, in tuſſi iſta ſunt affecti. MATHE. Quibus actio-
 nibus corporis obſeſis hæc tuſſis accidit? GERON, Naturalibus, præ-
 ſertim excretice: non autem animalibus: quia muſculi, vt ea expel-
 lant, quæ moleſta ſunt, cōcutiuntur, tuſſimq; excitant, non autem
 vehementer pulmonibus incumbunt, vt multam celeremq; effla-
 tionem concitent. Atq; totus hic ferè motus, vti rigor naturali fa-
 cultati attribuendus eſt MATHESES, Quibus notis hoc tuſſis ge-
 nus à priore dignoſcitur? GERON, Primum validum, vehemens, ac
 violentum eſt: quod impediri proſus nequit, ne eueniat: thorax
 valdè in eo comprimitur, vt multā eandemq; plenam efflationē
 excitet. Nemo enim citra vehemētē thoracis conſtrictionē, ſub
 miſſionemq; tuſſire poteſt. Ægri inter tuſſiēdum ſemper aliquid
 expuunt, niſi illa, quæ ſpiritus vias obſtruunt, valde ſint aquoſa, &
 lenta, ſeu viſcoſa. ferè autē antecedit tuſſim exiguus ad illam exci-
 tandam impetus, qui græcè *νεγξος*, dicitur, ſicut nauſeę vomitiōes.
 Vt autem in nonnullis vomitus nauſeam nō ſequitur, ita neq; im-
 petum illum tuſſis comitatur, idque propter cauſæ prauitatem
 vt interim ex parua faucium aſpredine, interim ex tenui aliquo,
 exiguoque humore contingit. MATHESES, Quæ pars corporis
 in tuſſi afficitur? GERON, Cùm ſpiritus ab humore è capite de-
 fluente intercipiatur, aſpera ipſa arteria. MATHESES, Qualis hu-
 mor ille eſt, qui vias ſpiritus obſtruit? GERON, Ex qualitate de-
 ſtillationis antecedentis: percipi poteſt: nec non ex ipſa eſſentia
 & diuerſa qualitate eius, quod per tuſſim ex cernitur, inueſtigari.
 Iam ea quæ ex capite defluunt, illis reſpondent, quæ inter eden-
 dum, bibendūque in guttur, & aſperas arterias deſtillant. Id au-
 tem conſtabit ex eo, qui ſic affectus eſt, & ex ſermone aſſistenti-
 um. Accidit interdum etiam, vt excrementum aliquod in aſperis
 arterijs, ac thoracis ſinu collectum ſit, eoque vehemens tuſſis exci-
 tetur, vt in laterum dolore & thoracis vomica, pulmonis inflam-
 matione, ac tabe euenire conſuevit. Quæ verò tuſſis cum parti-
 tum ticillatione ab utraque palati regione euenit, deſluxum à capi-
 te ad aſperam arteriam, & pulmonem ferri oſtendit: quam mali-
 gnā,

- gnam & contumacem appellant. Alterum tussis genus diuersa habet signa, quàm superius sunt recitata. nō est validum, violentum sed exiguum, & imbecille, vt cohiberi, vincique, vel in totum, vel aliqua ex parte possit. *MATHESES, Quæ causæ huiusmodi tussim generant?* *GERON, Spirituum instrumentorum refrigeratio, & aliæ intemperies. nam tussis non maligna, ac arida, quæ parum, aut leuiter irritat, ob faucium, seu arteriæ asperitatem, aut ob spiritus instrumentorum intemperiem aliquando frigidam, vt sub ventis aquilonaribus, oritur. Etenim valde frigidus aer inspiratus interdum faucium, & asperæ arteriæ regionem exasperat, refrigeratque: interdum etiam toti pulmōni pectorisq; intemperiem inducit. Plerumque ambo quoque hæc eueniunt: ob quæ arida, ac paruula tussis molestat. id indicat, quod pulmō, cum spiritum attrahit, ad tussim prouocetur, præsertim cum multus aer subito, dum ægri loquuntur, oscitant, ac spiritum ore ducunt, ingressus fuerit. Quod si quispiam aerem per nares attrahat, & externum in ædibus suis calefecerit, tunc certè parum, aut nequaquam tussit. Quapropter tussis hæc, tum ob aerem exteriorem frigidum, eumque copiosum, quando membris prius refrigeratis exasperatisque obuius occurrit, tum ob æstum vehementem, nimiamque ariditatem, ab aere circumfuso generatur. Nam ipsa, cum spiritus instrumenta intemperie laborant, partēque nuper dictæ exasperatæ sunt, quod in febribus sæpe accidit, ab utraque intemperie excitari potest. In hac autem tussi ægri frigidum aerem respirare desiderant, eoque iuuantur, & faciem habent rubicundam, sitiq; cruciantur. *MATHESES, Potest ne tussis ex sola humida intemperie prouenire?* *GERON, Nequaquam. quia aeris adeo non est, vt motum hunc excitare, ac inæqualem intemperiem efficere queat. *MATH. Potest ne à sicca?* *GERON, Opinor. quanquam citra calorem, aut frigus, eam omnino fieri nunquam dixerō. Bona igitur ratione exigua hæc tussicula, ex calida aut frigida intemperie, nunc sola, nunc cum siccitate coniuncta excitatur. *MAT. Vnde hæc tussis arida, ac leuis, in qua nihil expuitur, prouenit?* *GERON, Aliàs ex puluere, fumo, cibis & potionibus, quæ fauces exasperant. aliàs ex lumbicis stomachū infestantibus, acrisq; humore, qui ipsum perturbat. Quinetiā eadē aliquādo iocinore, liene, ac alijs quibusdā partibus affectis excitatur: id quod ex proprijs illarum indicijs dignoscere licebit. *MATH. Est ne hæc tua sententia, quod hæc tussis ex inæquali instrumentorū intemperie, non autē ex meatuū obstructione proueniat?* *GERON, Est utiq; *MAT. Quot modis igitur tussis arida leuiter irritas oriri cōsuevit?* *GER. Tribus, nempe, aut ob spirandi instrumentorū intemperiem,******

*Causæ secundæ
tussis.*

Tussis ex aere inspirato frigido & ex æstu vehementi quando fiat.

An tussis ex sola intemperie humida.

Tussis arida.

*Tussis arida quot
modis fiat, & ex
quibus*

Prognosticum.

*Tussis species ma
ligna.*

*Sanguinis spu
tum post tussim.*

*SPIRANDI
difficultas.*

aut ob faucium asperitatem, aut ob tenuem aliquem, & modicum humorem destillantem. At si eadem inde generetur, quod crassi lenticque succi circulis cartilagineis asperæ arteriæ firmiter infixi sint, vel quod humor è capite ad asperam arteriam destillans, aq̃ue modo tenuis existat, non amplius exigua leuisque, sed valida, & magna excitabitur. Sunt, qui duas tantum tussis species enumerent, humidam nempe, & aridam. MATHETES, Quid de illis curandis sperare licet? GERON, Quæ ex humore capitis ad subiectas partes destillante oriuntur, vel ex viscerum spirationi familiarum cuiusdam vlcere, aut ex quodam illorum abscessu, aut pure in eis collecto: omnes sunt malignæ, & contumaces, eoque periculosæ: Hippocrati ferinæ appellantur. reliquæ autem tussis species tam prauæ non sunt, neque periculum minantur, sed curatu faciles sunt. MATHE. Quo tempore homines frequentius tussunt? GERON, In statu aëris aquilonari. hoc autem obseruari debet, quod sanguinis sputum validæ tussi inueteratæ ob vehementem thoracis motum superuenire soleat. quamuis autem ipsa ob faucium exulcerationem ferè molesta sit: interdum tamen per se quoque oboritur, & vix, cum inueterauerit, eliditur. at si ex inflammatione pulmonis, aut laterum, aut ex pure in thorace collecto, aut ex tabe, aut ex alio id genus vitio in spirandi instrumentis contracto, aut ex spiritus difficultate, seu anhelatione excitetur, facilius curationem recipiet. Quæcunque autem promptè aliquid emolitur, materiâque educit leniter, idque citra dolorem, & oculorum rubedinem, ea securitatem pollicetur. quæ contra vix aliquid expellit, pessima censetur. quæ prius humida fuit, nunc autem subito redditur sicca, sic vt pectus graue maneat, febris vel putridæ, vel hecticæ, vel pulmonis exulcerati periculum indicat. Præterea omnis tussis mala iudicatur, qua somnus eripitur, seu in terpellatur. illa quoque malè habet ægrum, quæ frequens longo tempore grauiter hominem destillatione molesta exercet: quia hinc sanguinis sputum, & tabes comitari solet. At tussis, quæ semper continuatur, pulmonem viciatum, aut veterem pectoris obstructionem indicat. quæ à destillatione prouenit, ea per interval la, pro vt humor influit, bis terue per annum repetit. si lentus autem humor intus est, tussis vehementissima, eaq̃ue sicca euadit, qua nihil ferè eliditur, spiritus difficulter trahitur, idque cum stertore quodam ac sibilo, vt in anhelatione, seu asthma percipi solet. MATHETES, Quod vitium est difficilis spiratio? GERON, Quælibet respirationis offensio, aut simplex, aut composita, siue illa exigua, siue magna, siue imbecilla, aut vitiata fuerit, Græcè δύσπνοια vocatur: eaque non ex toto strangulatur.

- gulat : cum autem magna, & grauis incidit, suffocatoria nobis, Græcis πνιγώδης dicitur: in qua celeris, crebra & magna est respiratio, sed paucus aër attrahitur, & in pectore, spinâq; vbi pulmones membranâs adherescunt, grauitas percipitur. quæ autem vehementius vrget, Græcè ἀσθμα dicitur. ea verò spirandi difficultas, quæ non nisi recta ceruice spiritus trahi potest, Græcis ὀρθόπνοια nuncupatur. Tres igitur species, pro maiore, aut minore offensionis modo differentes, sub denso crebroue spiritu continentur, si quæ moderatè talis fuerit, ea communiter difficultas spirandi appellatur. in qua ille verò magis creber fuerit, anhelatio, siue asthma: in qua frequentissimus, sic vt iacentes ægri suffocentur, ea ὀρθόπνοια dicitur, MATHETES, Quæ igitur affectio vocatur spirandi difficultas? GERON, Crebra seu densa quædam respiratio, citra sonum & anhelationem febremque. atque in hoc omnes tres species spirandi inter se conueniunt, quòd febri careant. MATHETES, Quæ nam partes in iisdem afficiuntur? GERON, Instrumentariæ, & in ijs aspera arteria, quæ in ceruice, & thorace continetur, seu eius propaggines, quæ in pulmones distribuuntur: quod sæpius eis accidit. sunt enim arctiores, eoque promptius obstruuntur, strictioresque, seu angustiores euadunt. MATHETES, Vnde constat, quòd aspera arteria in hisce tribus vitij afficiatur? GERON, Inde, quòd licet thorax maximè dilatetur, eoque magna fiat respiratio: tamen aëris inspirati copia, nequaquam illius distentioni proportionè respondeat. siquidē modicus aër inspiratur, vt ægri ideo crebro & celeriter spirare cogantur. Qua de causa duo respirationis magnæ sunt discrimina: quorum vnum pro magna thoracis distentione æstimatur: alterum ex aëris ipsius inspirati copia. Quantum igitur spiritus semper attrahitur, tantum etiam thorax distenditur: quando instrumenta illius naturaliter se habent. quando autem malè fuerint affecta, fit interdum, vt thorax plurimum distendatur, sed parum externi aëris inspiretur. verum ea nō pro respirandi instrumentorum affectionum omnium proportionè, sed pro asperarum solum arteriarum inspirationibus contingunt. id autem non alio modo dignoscere poteris, quàm si ipsum tantummodo aërem inspicias, quantus inspiretur, quantusq; rursus expiretur. MATH. Quid mouet aliquem, vt difficulter spiret, præsertim cum omnes thoracis muscoli mouentur? GERON, Aut virium imbecillitas, aut vehemens cordis & pulmonis calor, aut viarum spiritus angustia: quamuis dug, aut tres, licet rarò causæ ex iam commemoratis concurrere possint. MAT. Quomodo dignoscitur vnde difficultas respirationis generetur? GERON, Si motus omnium thoracis musculorum, & septi transversi quoque paulatim fiat, eorumque actio

Anhelatio.

Communis spirandi difficultas.

Anhelatio.

Signi commune tribus spirandi speciebus.

Partes in spiratione affectæ.

Duo respirationis discrimina.

Quid difficilem respirationem efficiat.

Signa cuiusque causæ respirationis.

neque frequens, neque rara fuerit, neque thoracis dilatatio magna, nullaque efflatio fiat ab ore, & spiritus ex solis naribus emitatur, sique harum pinnæ per inspirationem manifestè contrahi videantur: ex sola virium imbecillitate provenit. ubi autem cordis, & pulmonis calor spirandi difficultatis auctor extiterit, tunc omnes quidem thoracis muscoli mouentur celeriter, crebrò & vehementer: nec non spiritus calidus frequenter efflando eliditur est. quando autem vniuersus thorax magna ex parte, & celeriter, & crebrò dilatatur, & efflatio prorsus intercidit, & calidus spiritus non emittitur: tunc spirationis difficultas, angustiae instrumentorum spiritus fertur accepta. Atque hæc sunt specierum illarum spirandi difficultatis indicia. ut iam rectius intelligas, quis sit respirationis difficilis affectus, dico actionis voluntariæ esse offensam in omnibus, non autem abolitionem, quæ Græcis ἀπνοια vocatur: sed imbecillitatem, aut interdum quoque deprauationem: quamvis rarius, & in ea, quæ non nisi recta ceruice fieri potest, vnde Græcis vocata est, ὀρθόπνοια. MATHETES, Quibus proprijs indicijs singulæ inuicem separantur? GERON, In spirandi difficultate generaliter appellata, spiritus densus duntaxat, isque modicus citra sonum, & anhelationem apparet. in hac præter maiorem illius densitatem æger sine sono, & anhelatione spirare non potest, in orthopnæa non solum magna spiritus frequentia percipitur, sed ille etiam non nisi recta ceruice trahi potest, & cum ægri decumbunt, singulari videntur. Id autem omnes illæ species commune habent, quod asperæ arteriæ angustiam comitentur: quamvis interdum viæ ipsæ, per quas aer inspiratur, obstructæ & coarctatæ malum hoc, pro ut variæ sunt causæ, generare possint. MATHETES, Quæ causæ potissimum, & quot eiusmodi difficultatem spirationis excitare solent? GERON, Non vna, sed plures, lenti, ac crassi, siue copiosi humores fistulis ipsius inhærentes, aut hi ipsi aliunde ad ipsos delati, qui arteriam ipsam obruunt: aliquando alia materia pulmonum arterias opplens. fiunt autem tum hi, tum eorum arteriæ etiam natura angustiores. Porro non modò hi, qui depressio constant pectore arctòque, sed etiam illi, qui ex victu pleniore, & vita otiosa fiunt obesiore, huic vitio sunt opportuni. Nam in his omnes corporis meatus valde sunt arcti, & exiles, spiritus paucus leui occasione, sinèque humoris influxu, interdum auferri extinguique solet. MATHETES, Quo pacto omnes istæ causæ distinguuntur? GERON, Ex symptomatis antecedentibus, etenim, si quis per bonam valetudinē, cum solitas actiones obire potest, difficulter spirare inceperit, pergatque magis ac magis paulatim,

sic vt

Sub quo affectu
sit spirandi diffi-
cultas.

Quibus notis re-
spirationis speci-
es separantur.

Causæ difficulta-
tis spirandi.

Qui natura diffi-
culter spirant.

Causarum distin-
ctio.

- sic vt neque stertat inter respirandum, neque quicquam expuat,
 nulla destillatione præcedente, crudi tuberculi orti suspicio est. *Crudus tuberculum in pulmone.*
 At cum non solum difficilis respiratio, verum etiam pulsus omni
 nõ varius, inæqualis, intermittensque, vel intercisus fuerit, nec
 5 non cordis palpitatio, animique defectio quædam, corde iam op-
 presso accesserit: tunc vel tuberculum, vel aliud quippiam non as-
 peris, sed leuibus pulmonum arterijs inhærescit. Quod si respira-
 tio sonum stertendo adferat, copię lentorum crassiorumque hu-
 morum pertinaciter inhærentium fistulas pulmonis infestantis,
 10 nota est. Si quis illicò ob angustiam difficulter spirauerit, defluxi-
 onem humoris, vel à cerebro, vel à vicinis ei partibus, in pulmo-
 nes incidere denunciat. Porro si affectiones istæ ex alijs quibus-
 dam causis nonnunquam oriantur, vt ex angina, pulmonis, &
 laterum inflammatione, pectoris suppuratione, aut humore ali-
 15 quotanquam abscessu in pulmone excitato, aut id genus alijs, ex
 proprijs superiorum vitiorum notis dignoscendæ sunt, maximè
 verò, quod non sine febris vrgeant. *MATHETES*, Quid de his præ-
 sagire licet? *GERON*, Prima spirandi difficultas diutius prorogari
 20 habent, quàm per quietem, ieiunium, & cælo sereno: reliquæ duę,
 anhelatio & recta spiratio acutę esse solent, vt quę ob vehementis-
 simas accessiones ægros interdum strangulent. anhelatio valida
 senibus oborta, ad mortem vsque ipsos comitatur. Qui gibbosi
 ex anhelatione, aut tussi fiunt: ante pubertatem intereunt. Cæte-
 25 rum hoc vitium magis viros quàm mulieres, magisque senes, pue-
 ros, tenerosque alios quàm iuuenes & robustos, idque per hye-
 mem quàm in æstate, noctu quàm die magis infestat. Hi ipsi au-
 tem ad anhelationem sunt procliues, qui frequenter destillatione
 & tussi laborant, præsertim senes, & angustis pulmonibus prædi-
 30 ti. *MATHETES*, Ad quarum partium morbos, honorate præcep-
 tor, nunc transeundum putas?

- GERON*, Ad viscerum, & imprimis ad pulmonis, cuius
 vehemens & acutus existit, quem Græci *περσπνευσμονίαν* vocant. Est
 autem inflammatio, sub qua, aut phlegmone, aut erysipelas
 35 Græcè dicta continetur. *MATHETES*, Quæ morbi huius est
 conditio? *GERON*, Magna spiritus difficultas, præcordiorum to-
 tiusque pectoris grauitas, magnæ febres, continua vigilia, cibi fa-
 stidium, tussis bilem, vel pus trahens, & tabes subsequitur: male
 supra modum tanquam inflammatae rubent, oculi intumescunt:
 40 idque magis ex pituitoso sanguine, quàm ex bilioso: & si phleg-
 mone infestat, sputum cruentum est, nisi morbus admodum cru-
 dus existat: præcordiorum ac totius pectoris angustia præmit,

summâque pectoris, & dorsi gravitas sentitur: quanquam febris acuta non admodum hominem occupet. Si verò erysipelas affligat, tussis flauum sputum trahit, non multo cruore tinctum: pectoris angustia, & gravitatis sensus minor percipitur, febrisque ardens vrget. adhæc vitium istud modò per se erit, modò angina, vel pleuritidi succedit, dum humor repente è faucibus, aut à latere in pulmones fertur. **MATHESES**, Quæ pars in malo hoc affecta dicitur? **GERON**, Pulmo, quocunque ex humore illud ducat originem: id quod spirandi difficultas, & tussis, quæ necessariò comitantur, indicant. Quia verò communia tum partis affecte, tum morbi huius sunt indicia, necesse est, vt singula quoque explorata habeas. **MATHESES**, Ea igitur obsecro mihi percenseas **GERON**, Pulmonem inflammatum indicant, maxima spirandi difficultas, atque angustia: qua laborantes suffocari videntur, rectè federe conantur: nec non calidum sentiunt spiritum, maximè si inflammatio fuerit erysipelacea. Quare vbi illi plurimum efflant, iuari videntur, multumque aërem frigidum attrahere percipiunt, quinetiam gravitatem quandam thoraci incumbentem doloremque ex imo, ad ipsum spinamque peruenire frequenter sentiunt: eò quòd etiam membranæ eundem ambientes ibi suspendantur. At pulmo nunquam vehementi dolore cruciatur: membranarum autem ipsius ratione, cum gravitatem, tum extensionem quandam, vel ad pectus, vel ad spinam interdum percipere potest. Porro si ille inflammatione laboret, acuta etiam febris incidit: si erysipelas eundem occupet, intolerabili incendio flagrat: angustia verò & gravitatis sensum minorem experitur. Quòd si ægri sputum inter tussendum edant, id sicut in pleuritide, nunc hoc, nunc illo colore tinctum cernitur, pro vt humor diuersus fuerit, qui inflammationem excitarit. **MATHESES**, Quod proprium in peripneumonicis signum existit? **GERON**, Malæ rubrae, pulsus magnus, languidus, mollis, inæqualis & vndosus: nonnumquam etiam bis feriens, Græcè *διεγδός* dicitur. Cum autem omnes pulmonis inflammatione affecti, acuta febre laborent, & soporis aliquid habeant, vtrum ex ipsis exuperet, pulsus frequentia ostendit. nam in febre ardentiore, ille multò est frequentior: si sopor ex-cellit, minùs ille creber erit. Postremò alia quoque symptomata pulmonis inflammationem comitantur, vt anxietas, impotentia, iactatio, lingua flaua: quamuis temporis processu nigrescat. Interdum etiam delirium, oculorum tumor, nares simæ, & venæ temporum elatae, cibi fastidium. **MATHESES**, Quibus notis humor inflammationis opifex dignoscitur? **GERON**, Si sputum tussiendo redditum, rubrum apparet, sanguis indicatur: si flauum, aut pituitosus;

Pars offensa.

Pulmonis inflammati notæ.

Pulmonariorum signum peculiare.

Humor, inflammationis auctor quibus nascitur.

fum, seu pallidum, biliosus sanguis: si spumofum, & candidum, pituitosus: si nigrum, aut liuidum, melancholicus illum generasse ostenditur. MATHETES, Quid si nihil expuatur? GERON, Tunc coniecturam sumes ex maiore, vel minore calore, seu incendio thoracis, angustia, respirationis difficultate, grauitate, temperamento, ætate, habitúque diuerso, regione, aeris statu, anni tempore, & antecedente victu. MATHETES, Quem in hoc morbo euentum promittere potero? GERON, Plus periculi, quam doloris habet. ac de, eo vt breuissimè septimo die, aut quattodecimo iudicatur: vt longissimè verò, decimo octauo. pauci malum hoc euadunt: sed vbi diem vigesimum excesserint, non amplius intereunt, sed pus expuunt, pectoreque dolent, & tussiant: quia ex hoc quoque vitio, pectore suppurati fiunt. Quòd si sputum flauum non multo sanguine permistum inter initia excreetur, inflammatio pulmonis bonam spem ostendit: si verò die septimo, aut tardius, minorem: si vires in ea sunt imbecillæ, pernitiōsa est: si spumofum ac biliosum, & nonnunquam cruentum, valdeque floridum per tussim reddatur, exitium minatur. quando etiam vigiliæ magis vrgent, aut somni breues, quæ stuporem ac delirium inducunt. quibus imaginatio mentem perturbat: & mala præsentia non admodum percipiuntur: extremæque membra frigent: & vngues liuidi incuruantur: quarto, aut septimo ad summum die emoriuntur. Quòd si morbus ad melius conuertatur, multus sanguis è naribus erumpit, aut alijs largos humores biliosos spumolosque excernit: interdum pus inflammatione iam suppurata per ventrem, aut vrinam expurgatur, statimque ægri omni molestia leuantur. Sin autem pus in pulmonem largiter eruperit, aut strangulat ægotantem, aut in tabem per graues accessiones conuertitur. Porro inflammationes pulmonis ex laterum affectu abortæ, minus sunt periculosæ, quàm quæ ab initio contrahuntur. quamuis quæ illi superuenerint, nihil boni denunciant. MATHETES, Quæ alia vitia huic sunt proxima?

GERON, Pectoris suppuratio, quæ Græcis *πνεύμωνιτις* dicitur: sub quapulmo totus pure, vel ex ipsiusmet, vel ex laterum inflammatione, vel ex angina contracto repletur. nisi enim partes affectæ per tussim expurgentur, abscessus exoritur. hoc tandem rupto, pus vniuersum sæpe in sinum thoracis influit, idemque tamdiu etiam postea è sordido vlcere destillat, donec immensa denique copia accumuletur: quæ ægros plærunque strangulat: alioquando pus ex abscessu in os erumpit, excreaturque. MATHETES, Quot igitur eius sunt species? GERON, Tres potissimum: vna, qua cuiusque partis inflammatio in pus degenerat: altera

Frenotio.

Quando pulmonis affectus vel sanabilis, vel despectus.

SUPPURATIO

Tres suppuratio nis species.

Suppurati.

qua hoc vniuersum in thorace & pulmone continetur : sic tamen
 vt partes istæ inflammationem sint expertæ; tertia ac præcipua
 existit, qua inflammatio lateris, aut pulmonis, non in pus transit,
 sed hoc in regione illius & thoracis intermedia colligitur, seu in e-
 am infunditur, atque hi, in quibus id accidit, suppurati propriè
 vocantur. vt autem ea, quæ dixi, rectè intelligas, omnis suppura-
 tio, quacunque in corporis parte contineatur, puris est, tum gene-
 ratio, tum congeries seu collectio. peculiariter autē, ea quæ in tho-
 race, aut abdominis sinu gignitur. quæ verò in alia corporis sede
 excitatur, si grandiuscula est, abscessus : si minor, vomica nomina
 simum, ac verè afficitur. GERON, Thorax perpetuò, præsertim
 intermedia eius, & pulmonis regio: eoque ægri, cum illa pure sca-
 teat, angustia vrgentur, adestque spirandi difficultas, tussis, & gra-
 uitas quædam in imo pectore percipitur. At si pus nondum in e-
 andem sedem influxerit, sed totum in parte prius inflammatio-
 nem experta substiterit, pulmonē, aut membranam costas succin-
 gentem malè habere, ex spirandi difficultate, aut laterum dolore
 antecedente cognosces. MATHETES, Quomodo deprehendam,
 vbinam pus contineatur? GERON, Si in pulmonis, tum dextra tum
 sinistra parte colligatur, ægri tanquam onus quoddam ambasque
 partes equè calidas persentiunt, & tam leniter, ac promptè in vno
 quàm in altero latere decumbunt. MATHETES, Quid si in altero
 tantum suppuratio fuerit? GERON, In altero quoque potius,
 quàm in vtroque pus collectum erit: neque, vbi in dextro hæ-
 ret, in sinistrum; neque contra, vbi in sinistro existit, in dextrum
 traduci potest. MATHETES, Vnde pars affecta cognoscitur? GE-
 RON, Inde quòd calidior sit, quàm reliquæ, quòdque ægri in ea-
 dem duntaxat dolorem, seu grauitatem sentiant : & cum in par-
 tem sanam decumbunt, onerare eam ex pondere aliquo viden-
 tur. MATHETES, Cum suppurationem triplicem esse dixeris, oro
 te, vt proprias cuiusque speciei notas explices. GERON, Cum in-
 flammatio ad suppurationem tendit, rigor præter rationem inuadit,
 febrisque vehementior quàm antea comitatur: nec nō grauitas po-
 tius quàm dolor multus percipitur. adhuc grauitas pectoris, tussis
 valida & sicca cum dolore affligit: interdum etiam humida adest,
 ob quam ægri quoque releuari videntur. MATHETES, Quæ signa
 abscessum erumpentem indicant? GERON, Quamuis dolor, fe-
 brisque pure iam confecto, mitiores appareant: tamen, cum ab-
 cessus breui erupturus est, ægri rursus vehementiùs cum horro-
 re quodam febricitant: sermo eorum præceps & intercisus est: na-
 res inter spirandum arctantur adeò, vt sibilus per eas elidatur.

MATHETES

*Note inflamma-
tionis suppuras-
centis.**Abscessus erum-
pentis indicia.*

MATHETES, Quæ suppurationis propria signa existunt? GERON, Abscessu rupto, purèque inter thoracem, & pulmonem effuso, febres vehementes, dolorque magna ex parte remittunt. quamuis ægri continua quadam hæctica febris laborent. præterea

Suppuratinis propria signa.

25 sudor multus oritur: tussiendo adest cupiditas, & penè nihil in tussi excreatur: oculi sunt caui: malæ rubent: venæ sub lingua inalbescunt: ungues in manibus sunt adunci: digiti maximeque summi calent: in pedibus tumores sunt: spiritus difficilius trahitur: cibi fastidium semper vrget. eo autem assumpto corpus grauius ha-

30 bere incipit: pustule toto corpore oriuntur. MATHETES, Qualis suppuratio esse solet, vbi ab vlcere pulmōnis intus colligitur? GERON, Superiori similis: cum iam incipit, pulsus in ea inequalis, inordinatus, & in totum hæcticus depræhenditur. vbi pus confectum est, paulò fit æqualior: vbi suppuratio erumpit, tardior, ra-

35 rior, languidiórque percipitur. MATHETES, Quomodo suppuratio ab angina, vel ab inflammatione pulmōnis orta, ab alijs distinguitur? GERON, Vtrumque ferè pectoris sinum membrana inter septum obsidet. MATHETES, Vnde suppuratio à lateris inflammatione procreata dignoscitur? GERON, Inde quòd ipsa partem

Suppurationes quomodo inter se differant.

40 affectam tantummodo affligat. MATHETES Laborant nè omnes suppurati febris, eaque hæctica, sicut antea docuisti? GERON, Ita, quatenus verè suppurati sunt. nam quibus suppuratio ex seroso, aut pituitoso humore capitis in sinum thoracis defluente, ibique

putrescente contrahitur: ij citra febrim laborant, & tabidi potius quàm suppurati nominari debent. Hippocrates destillationes in thoracem factas intra dies viginti suppurari, hoc est concoqui, e-

45 uinci & puri quidē similes effici, non autem verè in pus conuer- ti docuit, nam si pituita ex capite ad pulmonem destillet, ibique diu hæreat ac putrescat, ille temporis spacio exasperatur, intusque

50 exulceratur: simulque grauitas oritur in pectore, & dolor in priore eius, & posteriore parte: nec non corpus magis incalescit, & totum imbecillius fieri, extenuarique incipit. adhæc spiritus etiam tunc per sibilum eliditur. Porro quòd magis vitium hoc inue-

55 terascit: eò pus sincerius excreatur, magisque febris inualefcit, & tussis sitisque vrget vehementior. aliquando ingens cibi appetentia: aliquando vini meracioris. sæpe etiam æger sudoribus digeritur: postea pedes eius intumescunt: alius inferius turbatur: sputum retinetur: tandem interitus sequitur. MATHETES, Quid sub

Præsumptio

60 eo casu expectari solet? GERON, Bona sæpe valetudo: si pituita, priusquam in pus traserit, expuatur: aut si intra diem vigesimum, vt ferè accidit, intus maturata: tunc quoque sputo reijciatur. Nisi enim hæc eueniant, vel tabes, pulmone exulcerato, si hu-

mor acris est, vel certè anhelatio, si lenis ac rosionis experts, comitari solet: nonnunquam pituita ex capite in latus defluit, membranisque inclusa adherescit, suppuratq; atq; tunc illud plerumq; exardescit: multus spiritus trahitur: vox raucescit. quo in loco corporis morbus infestat, eo pectus modicè incurvatur, pedesq; tandem & genua intumescunt: aliàs horrores incidunt: aliàs sudores copiosi erumpunt. æger autem semper imbecillus est: modòq; calidus, modòque frigidus depræhenditur, vngues etiam contrahuntur, & alius incalcescit, ægerque demum strangulatur, aut viribus certè exhaustis emoritur: nisi pus vniuersum spuito multo, prius rupto abscessu euacuetur, quàm indicia hæc appareant.

Signa pulmonis exulcerati.

Prognostica.

Quæ communia suppuratis eueniunt.

MATHESES, Quæ signa comitantur, si pulmo ob venam ruptam exulceratus, & pus collectum fuerit? **GERON,** Sanguinis portio statim expuitur: portio in pulmonem fusa computrescit, suppurascitque: aliquando eruentum per tussim educitur. **MATHESES,** Quis huius euentus esse solet? **GERON,** Iuniores citius hoc malotentantur, grauiusque afficiuntur, quàm seniores. quanquam vtrique perire cogantur, præsertim si iam inueterauerit, & caput affligi, corpusque contabescere simul incipiat. Idem etiam de suppuratone à vulnere facta, quod pectori aliqua parte illatum sit, dici potest. nam sanguis in vacuam illius regionem illapsus etiam in pus conuerti solet: eoque idem periculum ex eo metuendum est, vbi sauciati pectoris vulnus foris tantum, non autem intus conflatum est. nonnunquam venæ pulmonis laterisq; ceu varicibus quibusdam obsidentur: quibus, quasi acutus morbus incidit: atque huic deinde leuis dolor, & tussis arida succedit. Quod si iam diu nulla vitij huius ratio habita fuerit, paulum sanguinis eiusque subnigri expuitur: deinde sincerissimus maiori copia erumpit: post hunc pus ipsum: cuius gratia æger processu temporis tollitur. **MATHESES,** Quæ generatim suppuratis euenire solent? **GERON,** Si æger, qui hoc laborat, concussus magnum strepitum intus audit, is minus puris habet, faciliusque spirat, & speciosior coloratiorque factus est. qui verò nullum strepitum abscessu iam dudum rupto sentit, sed valde difficulter spirat, & vngues eius liuescunt: is pure abundat, ac breui morietur. In quo latere pus continetur, id grauius, tum calidius existit. vbi aliquis in sanum latus cubare cogitur, maiórque angustia, & grauitas pectoris adest. vbi in eam partem, quæ afficitur, decumbere potest: tum ea ipsa, quæ dixi, minuuntur, somnusque facilior sequitur, & materia promptius tum maturescit. tum expuitur. **MATHESES,** Quæ alia de suppuratationibus prælagiri possunt? **GERON** Si dolores iuxta præcordia, & pulmones excruciant, periculosus est: si quis

- si quis ob hunc morbum vritur, aut inciditur, totumque pus semel effluxit, certè mortis indicium est: sin autem paulatim, & moderatè emittatur, sitque leuiter cruentum, vel liuidum, vel nigru, vel viride: nec non sordidum pariter ac foedū, si incidit, equè certum interitus argumentum est: praesertim, si animi etiam defectio comitetur. Quinetiam si pus multa tussī è pectore sollicitetur, nihil autem eius elidatur, ægri viribus iam imbecillis, mors in vicino est. adhuc si quis, cum melius habere videtur, foedi odoris sputum excreet: praesertim vbi candentibus iniectum est carbonibus, eum mali recidiua interimet. Tabes, & fusa aluus, puris sputo succedens etiam exitium denunciant. nouissimè, qui reliquis anni temporibus traxerunt, eos autumnus tollit è medio.
- MATHESES, Quibus notis huiusmodi suppuratione affecti ab alijs distinguuntur? GERON, Quod neque spumosa per aluum deiciant, neque cum tussī excreant: asperæ verò pulmonis arteriæ humore, qui à capite defluxerit, concocto quidem, & puri simili, sed minimè spumoso, sapius & manifestò sunt repletæ. MATHESES, Qui in suppurationis spem, vel periculum ostendunt? GERON, Qui feбри eodem post eruptionem puris die liberantur, cibumque citius appetunt, & à siti vindicantur, aluumque reddunt modicam & coactam, ac pus album, leue, vniùsque coloris, & vacans pituita, absque dolore, & valida tussī excreant, superstites manent. At ij moriuntur, quos febris non deferit, aut, cum iam desisse videtur, denuò repetit, ægrique sitiunt: cibum autem non appetunt, & aluum habent liquidam: pus viride, liuidumque, vel pituitosum, vel spumosum reddunt.
- MATHESES, Quid si alia ex his symptomata incendant, alia minus? GERON, Ægri partim intereunt, partim longo tempore consanescunt.
- MATHESES, Quid de suppurationis ex pulmonis inflammatione prædicis? GERON, Cùm hi per excreationem curari debeant, viribus egent valentioribus, idèoque minores natu potius quàm maiores seruantur. In alijs autem suppurationibus, cùm vehementiores dolores ac febres infestent, quando illæ fiunt, iuniores morte præuertuntur.
- MATHESES, Quid de suppurationis ex morbo laterali prælagiri potest? GERON, Si quadraginta diebus purgentur, ab eo tempore, quo fit suppuratio, liberantur, aut certè tabidi fiunt. Quod si lateris, aut pulmonis inflammatio in suppurationem conuertatur, nunc sursum versus, quando etiam periculosior est, nunc deorsum erumpit.
- MATHESES, Quid si erumpat sursum? GERON, Pus, nisi quàm primùm excreetur, protinus tabem accersit, pulmonesque exulcerantur: si verò purulenta ista collectio inferius tendat, rumpaturque, non adeò periculosa est: eò quod per vasa quedam

Aliorum suppurationum indicia.

Prælagia.

in aluum, & intestina, aut in vesicam transmittatur. At si suppurati, quibus totus thorax ob multam puris inter illum, & pulmonem collectam materiam in respirando attollitur, celerrimè strangulantur, tum affectus ipsius gratia, tum quòd vires omnium purulentorum sint defatigatae: vt quæ ob certamen, quod cum morbo habent, infirmiores reddantur. Porro, vt non pauci intereunt: ita quoque complures manent superstites, præsertim, quibus purulenta congeries tussi expurgatur. Solent enim interdum singulis diebus sex puris hæminæ, aut octo, interdum quindecim aut plures sputo expurgari. **MATHESES**, Quia id fit ratione & modo? **GERON**, Dum expiramus, vniuersus thorax vehementer constringitur: ac pus inter ipsum, & pulmonem contentum, per validam tussim comprimendo cogit: atque ad hunc ipsum impellit, sic vt pulmonis membrana idè pus, ac quoduis aliud excrementum similiter penetrare concedat. Tunc enim thorax pulmonem vndiq; & vehementer admodum comprimit: cumq; asperæ arteriæ partes in sinibus suis maiores quàm veng, liguësque arteriæ existant, orisque pateant amplioribus, & firmis adeò, vt non concidant, neque vndiquaque concludantur, eò quòd sint cartilagineæ, pus in asperas pulmonis arterias, non autem in læues, venasq; recipitur, & tandem per sputum redditur. **MATHESES**, Quid vomica est cuius supra mentionem fecisti?

VOMICA.

GERON, Exiguus pulmonis abscessus, aliqua in pulmonis parte inhaerescens, ac peculiari membrana inclusus adeò arcuè continetur, vt vix aliquid foedi in cor exhalet. frequens est in tabidis. non raro etiam extra tabem incidit: nempe cum sanguis ex vena aperta, rupta, aut exarsa in paruam quandam pulmonis regionem secedens, in ea putrescit, paulatimque in pus conuertitur. Latens hoc malum est, tum medico, tum ægro sæpe incognitum: eò quòd hic consueta adhuc numina obire possit. **MATHESES**, Quibus notis deprehenditur? **GERON**, Si ægri faciem habeant subliuidam, linguam humore quodam lento madidam: & si vrina longius à cibo & potu calidiore assumpto, corporisq; agitatione facile tingatur: pulsusq; sit concitior: adhuc si quandoq; globuli qui dā exigui, magnitudine pisi membranula inclusi, è pulmone, quādo corpus vehementius agitur, excerni solent: qui digitis contriti pus foedissimum referunt: quale ex cauo putrisq; & carioso dente nonnunquam expurgatur. Est, cum repentinā vomicae ruptae materia in pulmonibus subito hominem strangulet: ex qua pus in cordis sinum penetrarit, vim eius extinguens opprimensque. quanquam non raro densitas membranæ pus continentis prohibeat, ne retrum quippiam in cor ipsum, vitæ officinam inspiretur.

Vomicae indicia.

tur. Hoc autem notandum est, omnes sic affectos longè antequàm vomica erumpat, è pulmonibus cruenta simul cum tussi excreare, anhelitumq; grauem, ac foedum mouere: nec nò corporis grauitatem, leuèmq; pectoris oppressionem, & spirandi difficultatem experiri: quando tabes rarò comitatur. *MATHESES,* Vnde vomica contrahitur? *GERON,* Ex membranæ costas ambièntis, aut pulmonis inflammatione suppurascēte: aut ex sanguinis erumpentis, vlcere nondum ad cicatricem perducto: aut ex angina, quando ægri ab ea liberantur. *MATHESES,* Cum iam sputi sanguinis mentionem feceris, cupio ex te scire, quomodo propriè græcis latinisque nominetur?

Causæ vomice.

GERON, His quidem excreatio crûeta, siue sanguinea, aut sanguinis sputum: illis autem αἱμορρῖη, vel αἱμορρῖς: quæ non solum inter alias illius excretiones, sed etiã inter affectus naturæ contrarios periculosior existit, vt quæ perniciosos longòq; morbos magna ex parte excitet. *MAT.* Quid amabo vitium hoc existit? *GER.* Quæ libet sanguinis ex oreeductio, seu excretio. cum autè ipse à varijs corporis partibus per os feratur: diligenter proprijs indicijs distinguendæ iunt. *MAT.* Dic quæ sint partes, vnde ille ferri solcat? *GER.* gula, ventriculus, thorax, pulmo, aspera arteria, fauces, gurgulio, vel os ipsum, siue gingiue. Id tamè obseruari debet: sanguinis fluxum à sputo differre. ille enim plurimùm materiæ, hoc parum indicat: quæ ex gingiuis, aut vna, aut faucibus emittitur. *MAT.* Quæ ratione, & modo sanguis ex partibus illis excernitur? *GERON,* Ex gula & ventriculo, vomitione: ex spiritus instrumentis, tussi: ex faucibus & gurgulione, excreatu: ex oris, aut gingiuarum regione aliqua, simplici sputo educitur. Sæpe etiã sanguis à cerebro, & internis gurgulionis partibus ad fauces copiosius descendens, tussifertur: vt qui subito gutturi incidens, illam excitare possit. quod cum accidit, nò tantum affert periculi: quantum illius à pulmone admodum affecto, eruptio. Quinetiam interdum accidit: vt aliquis sanguinem, ob hîrudinem deuoratam, quæ in ea oris parte adhærelcit, qua foramen ad nares tendit, pluribus deinceps diebus excreat. similiter sanguis hîrudine epota, ex ventriculo per vomitum reijcitur. siue autem is ex illo, siue ex naribus, siue ex ore feratur, tenuis existit, & saniem repræsentat. *MATHESES,* Quæ signa præter vomitum indicant sanguinem è gula educi? *GERON,* Quod non magna eius copia erumpat: cum exiles illius venæ sint, & ille cum nausea excernatur, acrimoniæq; eius in deuorando percipiatur: præsertim si astringentia, aut acria. assumantur. *MATHESES,* Quid sanguinem ex ventriculo efferri ostendit? *GERON,* Nausea multa comitata, vomitioque: & si ille se-

EXCRETIO cruenta.

Partes lesæ.

Sanguinis fluxus quid à sputo differat.

Sanguis ex varijs locis, & diuersa ratione educitur.

Sanguis à gula prorumpentis signum.

Sanguis ex ventriculo.

Sanguis ex iecore, vel liene.

cundum cibum efferatur: idem cum hoc, ut etiam pituita, & bile nonnunquam permixtus excernitur. **MATHETES**, Potestne mihi præceptor sanguis etiam ex proximis visceribus, nempe iecore, & liene, in ventrem deferri, ex eoque tandem vomitu rejici, isque proprijs signis indicari? **GERON**, Potest, uti ex illorum confecti-

Sanguis ex iecore erumpens.

one depræhendilicet. quod autem ille etiam in ventrem interdum defluere soleat, alterutrius visceris tumor, dolorque ostendet: nec non sanguis grumosus, concretusque & niger erumpens, eoque magis, si à liene in ventrem descenderit. **MATHETES**, Quæ sanguinem ex thorace, pulmone, aut aspera arteria educi ostendunt?

Sanguis ex pulmone.

GERON, Si ex thorace effertur: neque multus, neque ruber erit: sed niger, canis ac grumosus, minusque calens tanquam è longinquo proveniens. Præterea dolores circa eum vehementiores sunt: eo quod complures nervi, ad thoracem ipsum perveniant: nec non, quod hic musculus ossibusque abundet: item quod sanguis ex eodem prodians, inter-

Sanguis per asperam arteriam.

im scædum odorem exhalet, interim pure mixtus sit. **MATHETES**, Qualis sanguis ex pulmone ferri solet? **GERON**, Spumans, subalbidus, floridus, feruens: qui uniuersè copiosèque citra dolorem, aut cum eo remissiore, & tussi rejicitur. Pulmo namque laxus, & ab iniurijs tutus, nervos duos admodum exiles, à sexto

Sanguis ex faucibus.

neruorum cerebri coniugio duntaxat per membranam eius dispersos, excipit: qui minimè per visceris alta extenduntur. **MATHETES**, Quando per asperam arteriam sanguis ferri dignoscitur? **GERON**, Quando paucus cum tussi effertur, dolorque iuxta aliquam illius partem sentitur, & ille ipse quodammodo pure est permixtus, paucitasque sputi, & tussis non valida adest. **MATHETES**, Quando sanguis è faucibus excreatur?

Sanguis è capite.

GERON, Vel cum ipsæ primariò affectæ sunt, vel ille consortij lege à cerebro ad ipsas descendit. **MATHETES**, Quid sanguinem à capite defluere demonstrat? **GERON**, Quod ille non solum sreatu, sed etiam tussi interdum excernatur: adsitque palati ipsius titillatio, crebraque excreatio: quodque ægri ad tussim irritentur: quamvis non valde tussiant: præsertim, ubi aliquid subito gutturi incidit, capit-

Sanguis ex ore aut gingivis.

isque grauitas vrget, aut dolor, auriumque sonitus vexat, faciei rubor apparet, venæ frontis eminent, vertigines accedunt, capitisque ictus nimis, aut frigus, aut calor, aut temulentia antecessit: interdum consueta per nares sanguinis excretio cohibita. **MAT.**

Sanguis ex capite in ventrem.

Quid si cum sreatu sanguis educatur, faucèsque sanguinolentæ sint, & veluti exulceratæ? **GERON**, Hæ ipsæ per se affectæ esse solent. quemadmodum, si sanguis sputo simplici excreetur: tunc ex ore seu gingivis profluere consuevit. **MATHETES**, Qua ratione sanguis à capite per gulam in ventrem defluere, vomitumque rejici

cogno-

- cognoscitur. GERON, Ea, quòd omnia illa symptomata antecendant, sitque hic sanguis levis, æqualis, atque purus, non adeò crassus, & colore niger, & quòd excreatu statim se in linguam inferat rotundus, facileque per sputum rejiciatur. MATHETES, Cui affe-
- 5 ctui naturæ contrario cruenta ista excreatio ascribitur? GERON, Generi excretionum naturæ limites superantium: sic vt, nunc functiones offendant, nunc citra noxam appareant. MATHETES, Quot modis sanguis rejicitur? GERON, Aut ad aperto vasis ore, aut rupto, aut eroso, aut etiã eo modo, quo sanguis è vasis
- 10 exilit, Græcè, *Ἀσπιδιόνης* nominatur. Quia igitur sanguinis profluuium, vel ob exiles venas reseratas, seu tunicas earum rarefactas, vel ob sanguinem ipsum attenuatum accidit: affectio hæc, vasorum apertioni attribuenda est, non autem cruentæ excretioni: cum sanguis ille, qui profluit, feri speciem repræsentet: qualis
- 15 per iecoris renũque imbecillitatem frequenter emanare solet. MATHETES, Vnde agnoscam sanguinem ob vasorum rupturam profluere? GERON, Si copiosus ac vniuersè prorumpat. MATHETES, Quas ob causas vasa rumpuntur? GERON, Primum ob externas, vt ob casum exalto, siue is in ludò, siue in certaminè contrigerit: aut ob res quasdam graues corporibus superincidentes: aut
- 20 ob magnam, ac violentam vociferationem. ob internas autem, vt cum vas aliquod citra illam euidentem causam, cum in reliquis corporis partibus, tum in pulmone, ob sanguinis abundantiam venas extendentem, vel seorsum, vel simul cum frigido, crudo & flatuoso spiritu rumpitur, quando indubiè vas ipsum, vel
- 25 ob frigus è vicinis partibus contractum, vel ob insitam intemperiem extensioni resistit. Potest etiã interdum aqua frigida venas rumpere, non quidem suapte natura: sed, quia venarum tunicas frigore suo duras efficit, vt extendi nequeant: facilius autem
- 30 rumpantur. MATHETES, Quæ igitur peculiaris rupturæ causa est? GERON, Aut exterior, vt quiuis vehemens motus: aut interior, vt humorum, siue sanguinis copia, siue repentina, & vniuersè facta profusio, vtrique causæ communis. MATHETES, Quid sputum cruentum vase aliquo ex æso profluere indicat? GERON,
- 35 Quòd ipsum nõ vniuersè, sed paulatim modicis intervallis excreetur, sic vt exigua sputa antecesserint, & acres capitis in pulmone defluxiones. MATHETES, Quid à pulmone sanguinem fluere notat? GERON, Id, quòd illè multus spumosusque tussiendo diutius erumpat, præsertim si nulla causa exterior præcesserit. MATHETES, Quid cruentam excreationem concitauit, si nulla ex prædictis causis præterquàm repletio antecesserit? GERON, Vi-
- 40 ctus humidior calidiorque: balnei immoderati vsus: habitatio

Sanguis quot modis rejiciatur.

Sanguis rupturam vasis effluens.

Vasorum rupturam vnde fiat.

Vena ex aqua frigida rumpuntur.

Peculiaris venarum rupturæ causa.

Sputum cruentum.

Sanguis à pulmone fluens.

Excretio sanguinis aliunde quam ex causis internis & externis.

Præſagia.

Vomitur ſanguis ſine febrī quid nūciat.

Sanguis cum tuſſi eductus quid noſet.

Mulier ſanguinem vomens.

Pus excreatum poſt ſanguinem.

*Sanguis ex tuni-
cis vaſorum ex-
eroſis.*

*Ex ore.
Ex faucibus.
Ex capite.*

nimis calida : ſimilēque anni tempus, & aëris tempeſtas. **MATHETES**, Quid de ſanguinis ſputo præſagire licet? **GERON**, Immodica illius euacuatio, non modo periculum, ſed etiam mortem affert præſentaneam. ſi verò illa diutius perſeueret : tandem vel interitum, vel tabem minatur. Qui ſanguinem euomunt, idque ſine febrī: extra periculum eſſe dicuntur. cum febrī autem, in periculo verſantur. quando ſanguis ex pulmone cum tuſſi fertur, idque potiſſimum ſine febrī, parua ſalutis ſpes eſt. et ſi malum perſeuerarit: febres poſtea ſuccedent. quòd ſi mulier ſanguinem euomuerit, menſibus erumpentibus, morbi ſolutio contingit. quòd ſi poſt ſanguinis ſputum pus excreetur: malum eſt indicium. adhæc ſanguinis profuſio ex pulmone, ſi intra triduum non curetur, inflammatio autem deinde accedat: nulla medicina periculo ſubtrahit: præſertim ſi vaſorum eroſio morbi fuerit initium. ſi autem ſanguis tuni-
cis vaſorum exæſis profluat: nihil boni ſperandum eſt. etiam ſi non ex pulmone erumpat: haud tamen omninò deſperata eſt curatio. Quòd ſi ex ore, & gingiuis ſanguis edatur: minus periculi timendum eſt. ſicut etiam, vbi ex faucibus internisque partibus prodierit: fluor ſanguinis ex capite inter omnes alios curatu eſt faciliſſimus. ex gula, aut ventre, aut faucibus prodians: facilem curationem recipit. ab vlcere autem factus: difficilem. at ex pulmone procedens, ob continuam ſpirationem omnium difficillimam. **MATHETES**, Qui morbus poſt pulmonis exulcerationem ſuccedere conſueuit?

TABES.

*Tabis exquiſita,
& non exquiſita.*

GERON, Tabes, qua corpus vniuerſum emacreſcit: ac plures eius ſunt ſpecies. Prima, ſub qua corpus alimentum non ſentit: ſic vt ſemper aliquid naturaliter decedat: nihil autem in eius locum ſurrogetur. vnde ſumma macies oritur, & niſi ei occurratur, ægrum tollit è medio. Græci hanc *ἀντοφία* vocant. Altera ſpecies Græcis à malo corporis habitu *καχεξία* dicitur: ſub qua omnia alimenta corrumpuntur. Tertia Græcis *φθίσις*, vel etiam *φθόν*, Athenieſium more nominatur, longè omnium periculoſiſſima. Hæc tabes etiam tribus conſtat differentiis: ſub quarū vltima, pulmo eſt exulceratus, eoque tabe quaſi vlcerofa laborat: totum corpus extenuatur, ſic vt leuis febricula inſanabilibus pulmonis vlceribus ſuccedat. prima harum è capitis pituita ad pulmones deſluente, altera à labore, tertia à ſpinæ medulla prouenit: qua potiſſimum ſalaces, & veneri corripuntur. Porro, quæ pulmonis exulcerationem ſequitur, tabes, etiam duplici nomine appellatur: nempe exquiſita, & non exquiſita. in illa, corpus totum febrī lenta, ob pulmonis: in hac ob thoracis, & faucium aſperæquæ arteriæ vlcera extenuatur. quamuis autem hoc modo laborantes, reuera tabidi

non

non sint: eandem tamen curationem exigunt. Nam corpus in his quoque, sicut in veris tabidis conficitur: præsertim, si thorax, aut aspera arteria exulceretur: eò quòd cor ipsum æquè vt illa sic-

Animal non in totum afficitur nisi corae offensa.

5 visceris offensione in totum afficitur, licet singulæ corporis partes non æqualiter in tabidis, sed cor & iecur minus quàm aliæ extenuentur. Quia enim cor valida trahendi facultate præditum est: sanguinem vehementer attrahit, & non antea, quàm omnia membra extrema laborent in ædia, ipsum alimento indiget. MATHETES,

10 Quid nam est, quod in singulis partibus, præsertim in corde per tabem primum consumitur? GERON, Humor ipsis insitus, medijs quæ partibus similaribus inspersus: vnde membra primum aluntur. Quousque verò aliqua eius portio in corde ipso reliqua existit: nulli, quamuis propius veram tabem accedant, rectè tabidi appellari possunt. postquam autem

Verè tabidi qui.

15 carnosa partium materia, aut fibrosa, seu membranosa consumi ob humoris natiui feruorem inceperit: tunc marcor exquisitus adest. vbi verò humor duntaxat, qui per medias partes simplices, præcipuè autè per cor, ac totum corpus dispersus exaruerit: tabes adhuc vocatur. Quamuis enim eam exulceratio semper anteceda-

Marcor.

20 tunc tamen statim carnosæ partes, aut fibrosæ, seu membranosæ consumuntur, sed humor, de quo dixi, antea exhauritur. MATHETES, Quæ partem affectam indicant? GERON, Tussis & spiritus difficultas, quæ verò ex eis sit, aliunde depræhenditur. Nam

Partis affectæ signa.

25 si pulmo offensus fuerit: multa materia sputo excreatur, idque citra dolorem. hic enim pulmonis vlcerata non comitatur. Quòd si propria eius caro, quæ *μυελὸς*, Græcè dicitur, exulcerata fuerit: ex propria eiusdem pulmonis natura percipies, cum ipsius caruncula per tussim reijciatur. quemadmodum, si gutturis pars

Caro pulmonis tussi reiecta quid signet. Gutturis portio.

30 quædam inter tussendum educatur: pulmo iuxta arteriam asperam exulceratus esse censetur. imò totum guttur excreari oportet. MATHETES, Quid arterias quasdam, aut venam in pulmone exulcerari testatur? GERON, Ipsarum quædam portio per tussim excreata. MATHETES, Quid vlcus in aspera arteria natum ostendit? GERON, Non solum sputum purulentum: sed etiam doloris

35 in parte affecta sensus. MATHETES, Quomodo autem vlcus arteriæ, ab illo, quod in pulmone ortum est, discerni potest? GERON Per ea, quæ excreantur: eò quòd exigua sint, nam plurimum puris ab vlceribus pulmonis educitur. MATHETES, Quo alio indicio guttur offensum esse depræhenditur? GERON, Quòd interdum particula quædam, quam Græcè *εμψυδα* superius appellauimus, per exulcerationem inde excreari soleat: nec non inde,

Asperæ arteriæ vlcus. Vlcera pulmonis & arteriæ quomodo discerniuntur.

Gutturis offensa nota.

quòd eger dolorem in loco vlcerato percipiat. MATHETES, Quibus notis thoracem affectum esse cognoscam?

THORAX affectus.

Sub quo genere vitiorum, exulceratio pulmonis continetur.

Vlcerationis nota

Nota puris.

Tabis confirmatae indicia.

Tabidorum pulsus.

Tabis causae.

GERON, Si sputum purulentum excreetur, manifestus doloris sensus in aliqua thoracis parte adest. MATHETES, Sub quo genere morborum malum hoc continetur? GERON, Sub continuitatis diuortio: quod est exulceratio. MATHETES, Quomodo ab alia dignoscitur? GERON, Crebra tussis: per quam modò pus, modò cruentum aliquid excreatur. quicquid autem excreatum est: si in ignem impositum est, mali odoris est. MATHETES, Quae affectui huic accidere solent? GERON, Vt totum corpus extenuetur, carnesque consumantur, vt febris lenta vrgeat: quae etiam si conquieuit, tamen & repetit. Proprium autem vlcerationis in thorace indicium est, ramentum, seu crustula quaedam eius particula, à qua excernitur: grecis *ιφιδρις* dicitur. in spiritalibus autem instrumentis, si tussiendo excernatur. proprietates verò ipsiusmet partis affectae peculiare est indicium. MATHETES, Quibus alijs notis puris differentiae discernuntur? GERON, Si materiae pituitosae carbonibus imponantur. nam quicquid naturae fuerit mutatum, veluti ex carnis defluxione proueniens, retri odoris esse solet. adhuc sputa laborantium aquae imposita. nam quae secundum naturam habent, facile soluuntur: vitiosa autem & mutata, perseverant, tenuitate quadam coacta, subsiduntque: eò quòd sint graviora, naturaeque contraria, ex carnis defluxione profecta. MATHETES, Quae confirmatae tabis sunt indicia? GERON, Carnes consumptae, liuescentes malae, vngues adunci, albi, & pallefcentes. malo iam vincente, capilli ex capite defluunt, alui profluvium superuenit: praecordia sursum conuelluntur: sitis aegros magis excruciat: cibi fastidium vrget. atque id, quod sursum per os excreatur, vehementer foedi odoris est. Coeterum pulsus tabidorum languidus est, parvusque propter virium imbecillitatem, non nimium velox, vt plerumque febricitantium existit: eò quòd non ardenti febris illi laborent. hecticus autem pulsus in tabidis deprehenditur: quoniam etiam hectica febris afficiuntur. MATHETES, Vnde tabes ducit originem? GERON, A capitis defluxione, quae in pulmonem destillat, eumque exulcerat. nam illius destillationes primùm tussim, & raucedinem excitant. Ac duae sunt potissimum causarum illius differentiae. prima ex capitis defluxione, altera ex pulmonis ipsius vitij prouenit: praesertim vbi sanguis vase rupto excreatur. plerumque etiam pulmo fluxione alia de causa, alijsque ex partibus, non ex capite repletur. MATHETES, Quomodo tabis causae iam comprehensae distingui inuicem poterunt? GERON, Facile, ex antecedente destillatione, sanguinis excreatu,

creatu, suppuratione, pulmonis, & laterum inflammatione. MAT-

THETES, Qui ad tabem sunt procliuiiores? GERON, Iuuenes ma-
ximè, id què non ob eorum imbecillitatem; sed ob intemperanti-
am à decimo octauo vsq; ad trigessimum quintum annum, MATH.

*Ad tabem pro-
clines.*

*Tempus ad ta-
bem accommoda-
tum.*

Pronosticum.

5 Quod anni tempus huic malo opportunum est? GERON, Autum-
nus, MATHESES, Quid de finienda tabe prædici potest? GERON,
Sicut vlcera crebrò in pulmone fieri possunt: ita tabes difficulter,
aut nunquam sanari potest: vt quæ citra tussim expurgari neque-
at: & si hæc excitatur, ipsa lacerentur. adhæc quòd medicamenta

10 vlceribus idonea locum affectum in pulmone contingere, sicut
in ventriculo nequeant. quia dum partes interpositas transeunt,
vires suas amittunt, atque vlcera respirando commouentur. Nisi
enim vas in pulmone ruptum statim conglutinatum fuerit, ante
quàm inflammatio excitetur: postea nunquam confanescit. & si

15 quandoque curetur: remanet tamen in eo callosum quiddam, ac
fistulosum: quod temporis spatio, leui occasione expellitur. quan-
quam si eruptiones quædam in pulmone sint ortæ, ob vlcerum
exiccationem, præsertim asperæ & scabiosæ, restitui possint: sicut
contra nullam curationem recipiunt, qui vlcus ex succi viciosi a-

20 crimonia in pulmone experiuntur: eò quòd longum prorsus tem-
pus requiratur, vt succi vicium emendetur. at thoracis vlcera eti-
am diuturna faciliùs curari possunt. MATHESES, Quamobrem?

GERON, Quia id, quod in pectore continetur, multò commodi-
ùs, quàm quod in pulmone subsistit, expurgatur: primùm quia

25 vasa in illo sunt multò minora: deinde, quia sanies, ad spaciū in-
terioris effluit: nouissimè: quoniam pectus ipsum magis carnosum,
quàm pulmo existit. At interioris asperæ arteriæ tunicæ vlcera,
præsertim summæ eius parti, quæ Græcè *λαρυγξ* dicta est, vici-
na, aut quæ in ea ipsa consistunt, curationi magis sunt oportuna,

30 præsertim vbi interior eiusdem arteriæ tunica exulcerata fue-
rit. nam omnis eius affectus facillimè confanescit: nisi fortè magna
ipsius portio à putredine crosa aliquando cartilaginem nudam
prorsus reliquerit. cartilagines autem ipsius exulceratæ, aut

35 nullam curationem, aut difficilem recipiunt. Porro si spura tabi-
dorum grauiter oleant carbonibus iniecta, capillique defluant:
mortis est indicium: sicut etiam alui profluuium, si illis tunc su-
perueniat, quibus sputum retinetur, ij quoque in periculo mor-
tis versantur. nam dum viæ spiritus occluduntur: ægri strangula-
tu pereunt. MATHESES, In quibus bona sperare licet? GERON,

*Salutis signa in
tabidis.*

40 Vbi sputum album, leue, æquale totum, vniùsq; coloris, & in-
flammationis expers existit. quod autem à capite defluit: ad nares
conuertitur, præterea, si hoc effuso febris conquiescit, eaque vel

omniñò non adest, vel tantula, vt neque cibum impediatur, neque sitim faciat. item, si alius quotidie reddat coacta, eaque conuenientia his, quæ assumuntur. adhæc, vbi corpus minimè tenue, maximèque lati, atque setosi pectoris, eiusque cartilago exigua & carnosa existit. Qui nihil horum in se habent, proximi sunt, vt intereant, sin autem quis euadere cupiat, inter initia malo huic occurrendum est: neque enim id faciliè, cum inueterauerit, euincitur. MATHESES, Nondum explicasti morbum, sub quo sanguis ex laterum inflammatione reijci solet.

*LATERVM in
flammatione, seu
pleuritide.*

GERON, Is græcis *πλευριτις*, dicitur, quasi morbus, seu dolor lateralis, sicut etiam isdem *πλευρικὸς νόσος*, vocatur. MATHESES, Quid latera propriè appellas? GERON, Eas duntaxat partes, quæ costis ipsis circumscribuntur: non illas, quæ ilia & inania latini, græci autem *λαγόνες*, & *κενεῖνες*, & *λαπαράες*, nominant: sunt autem complures præter costas & cutim, partes, vt musculi thoracis, & intercostales tum interni, tum externi: nec non membrana, quæ costas cingit, ac græcis *ὀπισθωκὸς*, & *πρωθωκὸς*, id est succingens, vel circuncingens appellatur, quare cum morbus lateralis esse dicitur, non omnes, aut plures laterum partes affecte intelliguntur, sed membrana costas succingens, quamuis, cum ipsa primariò infestatur, nonnunquam partes musculorum intercostalium, præsertim interiorum ei consentiant. sicut etiam interdum accidit, vt membrana ipsa illis per se affectis similiter condoleat. MATHESES, Intelligo: verum quis morbus lateralis exquisitus dicens erit? GERON, Sub quo membrana costas succingens primariò affecta laborat. Hæc autem cum laterum pars existat, bona ratione ab illa nomen sortita est: quæ nihil aliud quam eiusdem membranæ costas succingentis inflammatio existit. MATHESES, Qualem esse inflammationem intelligis? GERON, Non siccam, sed humidam: non quæ à sanguine optimo, ac mediocriter crasso, aut à bile duntaxat, sed ex quouis siue optimo, siue bilioso, siue pituitoso, siue melancholico affluente sit orta, siquidem quælibet inflammatio, ex humoris cuiusdam multitudine contrahitur. MATHESES, Quæ pars lateris in hoc exquisito morbo afficitur? GERON, Membrana, quæ costis obtenditur. Cum enim ipsa spirandi instrumentis annumeretur, animal ea oblata difficulter spirare nec non tussit, dolètque tanquam pungatur, longèque extenditur, & latissime diffunditur. Cum igitur morbus hic ex magna intemperie, ac continui diuortio constet, necessariò tumor naturæ contrarius, rubor, ac dolor ei succedunt. MATHESES, Quare in hoc affectu homo dolet? GERON, Quia ille inflammatio est.

*Membrana co-
stas succingens.*

*In morbo latera-
li quæ partes affe-
cte intelligantur*

*Lateralis mor-
bus exquisitus.*

*Membranae co-
stas succingentis
inflammatio,
pleuritide est.*

*Inflammatio ex
humoris multitu-
dine.*

*Dolor cur in pleu-
ritide sit.*

*Spiratio qualis
in pleuritide.*

MATHESES, Cur doloris species punctoria est? GERON, Quia pars ipsa

pars ipsa affecta neruosa est, membranosaque. MATHETES, Quales in hoc morbo est spiratio? GERON, Parua, ac crebra, non autem multum tarda: quia dolor non adeo grauiter thoracem affligit. MATHETES, Quæ alia comitari lateralem morbum solent?

Symptomata pleuritidis.

GERON, Febris: cum affectus ipsius gratia, tum quod offensa particula cordi sit vicina. Omni igitur parti inflammatae duo hæc, calor immodicus, & tensio necessario accidunt. MATHETES, Qualis pleuriticorum pulsus est? GERON, Velox ob usum virgentem, durus autem, quod pars affecta sit neruosa, & inæqualis in vno

Pleuriticorum pulsus.

occurso, ob artieriarum intemperiem. quæ si ambo sint coniuncta, ferrans etiam erit: sub quo alia pars arteriæ attolli, alia non videtur. MATHETES, Semperne eadem symptomata pleuriticis eueniunt? GERON, Non. quia interdum excreatio per tussim fieri, interdum non solet. & si ægri excreent sputum, nunc hoc, nunc illo colore tinctum, pro diuersa excrementi in parte inflammata contenti, natura excernitur. Quando enim multus simul, ac tenuis humor in parte inflammata, ipsaque pars rarior existit, plurimum ex ea foras effluit. vbi verò è contrario fluor paucus crassusque, & corpus spissum fuerit, minimè ad tussim irritat, ægrique nihil expuunt: sicut etiam cum copiosissimus adest, ægri plurimum tussunt, multaque expuunt. MATHETES, Quid efficit, vt dolor nunc ad præcordia, nunc ad iugulum pertingat?

Dolor nunc supra nunc infra tendus.

GERON, Tum læsæ particulae natura, tum inflammatio, quæ dolorem tensorium parit. si enim succingentis membranae partes inflammatione laborent, dolor ad iugulum vsque perringeret, vt ipsum deorsum trahi videatur: si inferiores, dolor ad præcordia perueniet. MATHETES, Cur ægri facilius in alterum latus decumbunt? GERON, Quia aliàs parua inflammatio ad medias costas extenditur, vt neutram partem contingat: aliàs magna, quæ

Demittit in alterum latus cur.

ad vtranque peruenit. Hoc quoque laterali morbo familiare est, vt æger facilius in hoc, quàm in illud latus decumbat. sit enim interdum, vt si in sanam partem cubet, minori dolore afficiatur: interdum verò, vt in vtraque similem dolorem percipiat, licet alterutrum necessario pleuriticis comitetur. MATHETES, Quam ob causam? GERON, Quia, cum succingens membrana duplex sit, si pars eius exterior circa ossa magis inflammetur, ægri facilius in oppositam partem declinantur: sin autem in affectam decumbant, opprimuntur. quod si interior inflammationem experiatur, ægri in aduersam partem magis decumbentes dolore vrgeantur. Porro si vtraquæ membranae costas succingentis regio offensa fuerit, ægri super vtroque latere etiam simili or decumbent. MATHETES, Repete obsecro, vnde morbum lateralem magnum,

*Magni morbi in
indicia.*

aut paruum fore cognoscamus? GERON, Si ingens valdè dolor punctorius infestet, maximaque sit spirandi difficultas, nec non febris valida, & tussis multa, dolorque ad iugulum pertingat, seu ad præcordia: & si ægri utroque in latere difficulter decumbant, nihilque cum tussi excreent. Contrà exiguum indicant mor-

*Parui morbi no-
tæ.*

bum dolor mediocris, febris, spiratio & tussis: sub qua ægri aliquid excreant coloratum, & neutrum latus statim doleat, nec æ-

*Dolor dissimilis
in pleuriticis*

gri difficulter sub utroque latere decumbant. MATHETES, Similesne morborum lateralium dolores existunt? GERON, Nequaquam: sed alij cum febre affligunt: in quibus exigua sit respiratio, & nihil expuitur. alij nulla omnino cum tussi, aut certè exigua admodum vexant: alij sine sputo sicca tussi plurimum excruciant: alij non æquè adeò acuta febris, neque difficilis spiratione ægros afficiunt: quidam ex parte inflammata extrinsecus, percipiuntur: quorum causæ materia sputo non expurgatur, eò quòd per initia nihil eius succi, qui inflammationem peperit, ad thoracis spacium peruenire soleat: verum pus, nisi inflammatione cõcocta prius discutatur, ad cutim vsque effertur, inciditurque: quidam sunt pulsatorii, quos recentiores medici non veros pleuriticos nominant: eò quòd inflammatio non in membrana costarum, ac mu-

*Pleuritidis non
veræ signa.*

sculis interioribus illis continuis, sed in exterioribus intercostalibus contrahatur: sicut etiam ex multa cruditate, cibo crasso & pituitoso, ex bulbis ac fungis similibusque crudis, viscosis & lentis humoribus: gignitur: qui se interdum subito in vacuam thoracis regionem, aut in ipsum etiam pulmonem ingerunt, quum dolores membranæ costas ambientem multitudine sua intus distendentes pariant: nec non, dum spiritus viam intercipiunt, vehementem spirandi difficultatem inducunt, ut imperiti quasi inflammationem genitam esse putent: atq; hic dolor lateralis non

*Pleuritidis veræ
signa.*

verè pleuriticus nuncupatur. MATHETES, Quæ ergo exquisitæ pleuritidis causæ existunt? GERON, Sanguis, aut optimus, mediocriter crassus, aut biliosus, aut pituitosus, aut melancholicus: sæpius autem biliosus, qui membranæ nuper dictæ affluit. MATHETES, Vnde singuli humores pleuritidis auctores dignoscuntur?

*Singulorum pleu-
ritidis humorum
nota.*

GERON, Ex vario sputi colore. nam si rubrum ex creatur, sanguinem membranæ costas cingenti influxisse indicium est: si flauum aut pallidum, biliosum: si spumans & album, pituitosum: si nigrum, aut liuidum, melancholicum. præterea etiam ex corporis temperatura, ætate, habitu, consuetudine, victu antecedente, anni tempore, regione, aëris tempestate cognoscere poteris, qualis sanguis redundet, qui pleuritidē excitarit. MAT. Estne morbus alius, qui huius notitiam, quòd ei & similis appareat, impedire possit?

GERON,

- GERON, Maximè, nempe iecoris inflammatio, ob quam aliquis in spuriarum costarum regione doleat, dum videlicet interiora ligamenta intenta sunt: quibus nonnullorum iecur alligatur. atq; sic dolor ad membranam costas cingentem peruenit, vt pleuritis esse videatur: quanquam signis quibusdam dignosci possit. In iecoris enim inflammatione neq; dolor punctorius, neq; pulsus adeò durus, vt in laterali morbo deprehenditur: & si affectus iecori peculiaris cum illius inflammatione adsit, alius similis erit aquæ, in qua caro nuper mactata, fuerit elota, qualis in pleuriticis non apparet. Præterea iecoris inflammatione laborantes, exigua tussis, eaq; sicca perpetuò vexantur. thorace autem affecto tussis augetur, eoque tempore omninò ea apparent, quæ per illam excreantur: item lingua in hepaticis, faciesque & corporis vniuersi color mutatur, eiusque decor amittitur. *IECORIS inflammatio.*
- MATHESES, In quibus & quando omnis laterum inflammatio periculosa, aut extra periculum est? GERON, Senibus & foeminis vterum gerentibus, quibûsque iam secundo, aut tertio reperit, perniciosa est. *Iecoris inflammationis nota.*
- MATHESES, Vnde morbus hic fit? GERON, Aut ex magnis symptomatis, aut stragulatâ, aut materia in alium locum translata: vnde inflammatio pulmonis, tabes, syncope, & infania excitatur. Quòd si per initia sputum in ea appareat, breuior: si postea, longior erit. magna autem ex parte die quarto decimo, aut certè vigesimo finitur: quamuis Hippocrates eum ad trigessimum quartum perdurasse scripserit. *Presagia.*
- MATHESES, Quibus indicij morbi huius tempora cognoscuntur? GERON, In principio eius ægri nihil ex latere affecto excreant, sed tenuem tantummodò ex pulmone pituitam, vel crassum quippiam, glutinosum, & rotundum, maxima cum tussis excernunt. In incremento, sputum iam vtunque concoqui incipit: flauum copiosius, & faciliùs educitur: liquidum, magis crassum fescit: cruentum magis albidum redditur. in statu plurimum sputum album, læue, æquale, promptiùs educitur: & dolorem maxime leuat. in declinatione etiam dolor cessat, & febris, similiâq; finiunt. *Quomodo sputum ratione morbi temporis variet.*
- MATHESES, Quod aliàs sputum optimum censetur? GERON, Quod in statu existit: deinde quod protinus flauo admodum commistum est. post hoc, quod flauum non multo sanguine tinctum est, per initia quidem salutem portendit: septimo autem die, vel post, minorem securitatem pollicetur: nec non subcruentum ab initio, nihil mali indicat. mucosum, quod ad concoctionem citò coloratur, præsertim intra diem quintum, sine villo metu est. E contrario, quod non illicò, sed longè post dolorem editur, flauum, vel non mistum, multâque tussim excitans, malam spem adfert: sicut etiam sincerum, vel cruentum, vel flauum, *Sputum optimi.*

sic tamen, ut hoc illo sit deterius. album ex cruda pituita, visco-
 sumque, & rotundum, periculum ostendit: eo deterius est id,
 quod ex viridi valde pallefcit, spumofumque & liuidum, vel gru-
 ginofum. tale etiam est vehementer cruentum. denique omne
 fputum, quanto magis miftos, & non inter fe diductos colores
 habet, tanto deterius, & tamen nihil peius, quam fincerum id edi,
 fiue rufum fit, fiue cruentum, fiue album, fiue glutinofum, fiue pal-
 lidum, fiue fpumans: nigrum autem pefsimum eft. Porro vt om-
 nia fputa mala, quæ dolorem non leuant, fic optima, quæ illum
 finiunt. Cæterum quicumque per morbi huius initia fputum om-
 nino purulentum excreat, is tertio die, aut quinto perit. hunc fi
 euaserit, tunc meliusculus feptimo die, aut nono, aut certè vnde-
 cimo in fuppurationem incidere folet: quanquam rarò aliquis
 fupra diem quartum decimum durarit, qui purulenta feptimo
 aut antea excrearit. *MATHESES*, Quid de doloribus in lateris in-
 flammatione dicis? *GERON*, Interdiu leuiores quam noctu exi-
 ftunt. quod fi etiam idem morbus in neruorum rigorem, vel di-
 ftentionem vertatur, exitiofum eft, æquè vt pulmonis inflamma-
 tio. Similiter peftiferum eft, fi materia inflammationis ad cere-
 brum exhalet, ibique delirium, amentiamque generet. Non mi-
 nus mali denunciatur, fi morbus fpinæ inhærefcat: quando rigor
 ægrum inuadit, febrisque & tuffis valde moleftat: dorfum autem
 tanquam verberibus percuffum dolet, magnaque fit refpiratio
 cum anhelatione: pauca verò per tuffim excreantur: nunc ex vi-
 ridi pallida, nunc etiam leuiter cruenta: dolor autem ad inguina
 descendit: vrina aut tertio, aut quarto die cruenta redditur: cor-
 pus totum vt ex itinere defatigatum eft: mors die quinto, aut cer-
 tè feptimo ægrum opprimit. fin ille diem hunc, quod rarò acci-
 dit, euaserit, ad fanitatem reuertitur. Haftenus certa exitij indicia
 percenfui: nunc graues periculi notas fubiijciam. primum ingens
 vitæ difcrimen fignificatur, vbi copiofum fputum intus in pecto-
 re ftrepitum excitat: fi vultus ægri trifftior: oculi colore aureo im-
 buti apparent. periculi etiam plenum eft, fi nihil excreetur, neque
 quicquam ad pulmonem excernatur, fed guttur repletum ferueat.
 non minus malum eft, fi homo antea probè excrearit: poftea
 autem in totum excreare defierit, fic vt neque grauitas in pecto-
 re, neque dolor fæpe leuatus fit: adhæc pectus valde calens, ex-
 tremis multum frigentibus terribile eft: nec non dolor augefcens,
 vbi æger in latius, vel in fanam, vel contrariam partem decumbit,
 fic vt lupinus elle cogatur. præterea aluus fufa, poft morbi initi-
 um, viribus iam infirmis, vbi nec corpus conquiefcit, nec fpiritus
 facilius redditur, periculum indicat. Non minus graue difcrimen
 eft.

*Præfagia in la-
 terum & pul-
 monis inflamma-
 tione.*

Exitij figna.

- est, si dolores in superiore, aut in posteriore corporis parte vrgeant: aut si morbus siccus, sineque sputo existat, nisi ipse adeo per se leuis sit, vt parum materiæ expurgandæ subesse videatur. MATHE-
 TES, Vtro in latere morbus iste plus habet periculi? GERON, In dex-
 5 tro, nam in sinistro citius maturefcit, soluiturque. MATHESES, Quo tempore dolor iste laterum periculosior est? GERON, Septimo ferè die, vel nono: atque hæc propè omnia periculum minantur. MATHESES, Quæ sanitatis sunt indicia? GERON, Si æger à primo statim die facile excrearit, & sputum flauo mistum sit, eoque dolor leuetur, & æger morbum ipsum non difficulter ferat,
 10 facile spiret, non sitiât, neque strepitum in pectore sentiat: item si somnus, sudor, vrinæ, aluiusque secundum naturam habeant, & totum denique corpus æquale, temperatum calore, ac molle existat. MATHESES, Quando suppuratio, seu abscessus fieri solet, & quid significat? GERON, Cum dolores neque sanguinis detractione, neque exercitio, neque victus ratione, neque fomentis, aut medicamentis conquieuerint: sic tamen vt æger non pessimè affectus videatur. certissimum autem indicium est, illam excitari, si inflammatio intra dies quatuordecim sputo non expurgetur.
 20 si autem illa, postquam eruperit, intra dies quadraginta tota excreata purgatæque fuerit, ægri consanescunt: si non, tabes sequitur. At quæ suppuratio ex sputo adhuc vel sincerè bilioso, vel pure coniuncto oborta fuerit, magis periculosa erit, præsertim si post septimum diem, & talis sputi excreationem fieri inceperit.
 25 nam mortem, nisi quid boni intercesserit, die quartodecimo securam indicabit. MATHESES, Quæ singulares notæ suppurationis incipientis existunt? GERON, Tussendi magna cupiditas: quæ tamen nihil, aut certè parum excreatur: nec non febres, nouæque ac insolita grauitas, dolorèsque acres, maximè per noctem: item
 30 magna spiritus difficultas, venæ sub lingua albescences, malæ rubræ, cibi fastidium, potionis autem desiderium: vigilie, & sudores circa iugulum, & ceruicem erumpentes. vbi malum inueterauerit, oculi etiam caui apparent, vngues in manibus adunci, summique digiti refrigescunt: in multis tandem sudor toto corpore, & in
 35 pedibus tumor oritur. MATHESES, Quid pure iam confecto accidit? GERON, Febris & dolor paulum remittunt: sæpè etiam pro sensus iudicio desinunt: grauitas autem partis affectæ augetur, tussisque vehemens, & sicca vrget: nonnunquam etiam humida: vnde æger sæpè leuari videtur. MATHE-
 40 TES, Quid infestat, cum turgens iam abscessus erumpit? GERON, Horror febrisque vehementior, tremor cordis, virium lapsus, spiratio imbecillis: æger in sermone turbatur, inspiratione offensus.

*Dolor laterum
quomodo pericu-
losior.*

Suppuratio.

*Suppurationis
notæ singulares.*

*Quæ post à pure
confecto acci-
dant.*

pulsum habet languidum, tardum, & rarum. at hæc non statim ter-
 rere debent, dummodò abscessus erumpentes non virium pror-
 sus afflictarum ratione contingant, maxime, vbi etiam signa in
 sputo & similibus salutaria cernuntur. *MATHETES*, Quid eo
 tempore incidit, quo abscessus rumpitur? *GERON*, Tunc ali-
 quid in alto pectore transfluere videtur, prout corpus variè incli-
 natur, atque inde pus aliàs sæculentum educitur. *MATHETES*,
 Quo die suppuratio erumpit? *GERON*, Quarto decimo, postquam
 ipsa inceperit, sed rariùs: septimo autem rarissimè: plurimùm cir-
 ca vigesimum: aliæ circa quadragesimum. Ab eo autem die nume-
 randum erit, quo loci affecti grauitas pro doloris ratione percipi-
 tur, & reliqua suppurationis signa apparent, nempe vehemen-
 tissima febris: deinde spiratio difficilis, & dolores. Quo autem ma-
 gis hæc vrgent, hoc suppuratio celerius: quò verò illa sunt mi-
 tiora, eò hæc ipsa rariùs erumpet. Ideò ferè accidit, vt, si vehe-
 mentior tum dolor, tum tussis, tum spirandi difficultas ab ipso
 morbi initio fuerit, abscessus circa diem vigesimum, vel antè
 fiat. *MATHETES*, Potestné abscessus tum lateris, tum pulmo-
 nis, etiam per alia loca quàm per os expurgari? *GERON*, Vtique,
 sed rariùs: ac lateris quidem, per intestina & aluum: pulmonis au-
 tem per vesicam cum vrinis, sæpissimè, & ferè perpetuò in vacuū
 pectoris spacium sese exonerat: vnde materia per tussim intra di-
 em quadragesimum editur. quod nisi fiat, tabes subsequetur. *MATHETES*,
 Qui ex rupto abscessu securiores existunt? *GERON*, Hi
 quibus febris eodem die, quo abscessus, leuata est, quique cibum
 appetere incipiunt, ac aluus mollia, coacta, & probè figurata red-
 dit, pus album, læue, inodorum, eiusdem coloris, & omnis pitui-
 tæ expers, facilè excreatur. Illi verò minùs tuti sunt, quos febris nō
 deserit, aut quos semel ea deseruisse visa est, eos iterum inuadit. ad
 hæc, qui cibi fastidio laborant, siti vrgentur, aluūque ex toto li-
 quidam habent, & pus ex viridi pallidum, vel liuidum, vel pitui-
 tosum, vel spumans excreant. pus etiam periculum indicat, quod
 sub viribus imbecillis copiosum expuitur. Atque hæc omnia de
 vera lateris inflammatione, quam superius pleuritidē appellauī,
 tractata sunt, quæ ex sanguine, eoque magis bilioso inter costas &
 membranam has succingentem, aut saltē in musculis interco-
 stalibus substante procreata est. *MATHE*. Quæ est spuria, seu falsa
 lateris inflammatio? *GERON*, Quæ ex destillatione, vel ex flatibus
 vel ex alio modo originem duxerit: & si etiam vera inflammatio,
 vt prima existit, exteriores tamen pectoris musculos occupat.

Note. *MATHETES*, Quæ in hoc genere morbi symptomata incidunt?
GERON, Omnia, quæ in vera laterum inflammatione, sed mitio-
 ra, dolor

*Suppurationis
tempus.*

Pleuritiū falsa.

- ra. dolor autem, si quis extrinsecus partem affectam contingat, comprimátque, magis intenditur: æger in partem sanam difficulter decumbit: in affectam facilius. Pulsus licet frequens, & inæqualis, non tamen aut densus, aut durus est, eò quòd membrana
- 5 afficiatur. At acutus laterum dolor, tum ex pituitæ destillatione, tum ex flatibus ortus, quantum ad ipsum pertinet, febris caret. Quamuis autem dolor grauissimus ex illis excitetur, fomentis, tamen & frictio nibus leuatur, & sæpius etiam discutitur. is ipse dolor non vna in parte hærescit, sed ferè huc illuc per latus vaga-
- 10 tur. **MATHESES**, Quid si malum hoc pleuriticum ex frigidi humoris destillatione prouenerit? **GERON**, Primum ceruices & scapulæ indolescent: deinde materia ad exteriores pectoris musculos delata lateris ibi dolorem mouet: qui etiam ad manus tactum crescit, non autem, vt is, qui ex flatu contrahitur, fomentis discuti-
- 15 tur. Sæpe etiam vera lateris inflammatio ex istis doloribus oritur, qui tum ex distillatione, tum ex flatu constant, si nimium graues, vel diuturni sint. Quinetiam lateris dolor, aut iecoris, aut lienis tumidi causa excitari potest, dum membranæ horum viscerum contrahuntur. sed de his aliàs copiosius.
- 20 **MATHESES**, Quis morbus post hunc sequitur? **GERON**, Cordis *Palpitatio cordis.* palpitatio, quæ greci *παλῶς τῆς καρδίας* appellatur: sub quo cor ipsum concussum tremit & palpitat: siue ipsum per se siue ex aliarum quarundam partium consortio afficiatur. nonnulli perperam hunc affectum tremorem vocant. Græci alij recentiores *καρδιακόν:*
- 25 licet etiam malè: cum & *καρδιακή*, & *καρδιαγία*, & *καρδιωμο*, non ipsius visceris, quod in thorace continetur, nempe cordis, sed oris ventriculi affectiones sint: eò quòd illud, cor appellare consue-
- 30 rint. **MATHESES**, Quid tandem propriè est palpitatio, & quomodo à tremore distinguitur? **GERON**, Partium earum, quæ dilatari possunt, eleuatio depressioque naturæ contraria. *Os ventriculi cor grecis dicitur.* **MATHESES**, *Partes affectæ.* Quæ sunt illæ? **GERON**, Omnes natura molles, sic vt tum dilatari tum rursus summitti, ac subsidere possint, velut sepe cutis, nonnumquam subiecti muscoli, non rarò ventriculus, vesica, vterus, intestina, iecur, lien, septum transuersum, cor & arteriæ. Qua de cau-
- 35 sa affectio hæc neq; voluntariæ facultati, neq; instrumētis ipsi idoneis, sed omnibus ex æquo partibus, quæ distendi, & dilatari possunt, propria existit. Qua etiam ratione fit, vt neque os, neque membrana, aut cartilago vnquam, neq; neruus palpitet, eò quòd cauitate careant, eòque dilatari nequeant. **MATHESES**, Vnde palpitatio contrahitur? **GERON**, Ex nebuloso spiritu, atro, seu flatuoso, in ætate frigidiore, similiq; corporis natura, regione, tempore
- 40 aui, vita otiosa, satietate, temulètia cibis frigidis, flatuosisq; & om-

*Palpitationis &
tremoris differen-
tia.*

*Quid in palpi-
tatione afficiatur*

Tremor quid.

nibus alijs, quæ refrigerant. MATHE. Qualis affectus est tremor?
GERON, Motus, qui in partibus inuicem discedentibus sursum
& deorsum contra voluntatem efficitur: ac Græcis *τρεμου* voca-
tur. MATHE TES, Quare à palpitatione discrepat? GERON, Quia
non idem est sursum ferri eleuarique, neque deorsum agi, & de-
primi. nam quæ sursum & deorsum feruntur, cum alio priorem
locum mutant, vt in tremore: eleuata autem, & depressa, cum ve-
terem sedem retinent, vt in palpitatione cernitur, nunc aëris ali-
quid assumunt, nunc amittunt, ideo non sponte moueri, sed con-
tra voluntatem & naturam vtriusque est commune. MATH. Quid
propriū est palpitationi? GERON, Quod maiorem minoremq; lo-
cum occupet, priore non relicto. tremori autem peculiare est, vt
loca commutet, ne in eodem maneat: qui motus licet naturæ sit
contrarius, non tamen totus ex causa minùs naturali efficitur: si-
cut in palpitatione & conuulsione accidit: sed mixtus est quodam
modo, idque ex causa naturæ contraria, & facultate animali. MA-
THE TES, Qualis igitur tremoris motus existit? GERON, Compo-
situs, vt arteriarum pulsus, præcipuè formicæ similis. Sicut enim
arteria in paruo spacio sub hoc pulsu agitur: sic in tremore a-
nimalis particula, quæcunque ab imbecilla facultate mouetur. vi-
cissitudo autem motus, non à sola natura, sicut in arterijs, sed ex
pugna facultatis, & corporis pondere perficitur. Quauis autem
hoc symptoma cum conatu accadat, tamen ex virium infirmitate
contingit. hinc tremor efficitur, dum facultas animalis nūc vincit
nunc vincitur, & motus contrarij mutuo semper succedunt. Li-
cet autem pugnam manifestò cernere, dum neque facultas mem-
brum decidere sinit, vt in resolutione, nec pondus id sublatum ser-
uare permittit, ita vt cum adhuc valeret: sed cum vna motio inci-
pit, altera huic aduersa quasi adiuncta dicitur. Atque hinc con-
stat, tremorem & palpitationem symptomatis, & loci affecti rati-
one inuicem differre. nam tremor facultatis infirmæ actio est, eò-
que motorix facultatis, non autem instrumentorum affectus exi-
stit, quia functiones non à solis instrumentis, sed à viribus impe-
diri solent. MATHE TES, Quid in palpitatione offenditur? GERON,
Non facultas, sed instrumentum, siue partes ipsæ, quæcunque
contra naturam dilatari possunt: eòque membris penitus immo-
tis accidit. MATHE TES, Quid propriè est tremor? GERON, Im-
becilli motus symptoma, siue facultatis mouendi corporis imbe-
cillitas. Differt etiam tremor à palpitatione, quòd ipse non vna ex
causa, vt hæc, generetur, nempe vt ex frigido, & nebuloso, crasso,
vaporosoque spiritu contrahatur. In summa tremor & palpi-
tatio hisce inter se distinguuntur, quòd vterque non idem sit affe-
ctus contra-

etus contra naturam, neque eadem symptomata habeat, neque eundem locum affectum, neque eandem causam. Quamobrem illi à vero aberrant, qui palpitationem cum tremore confundunt: cum illa semper voluntariam mouendi facultatem subsequatur.

5 tremor autem nō ita fieri potest, eò quod nulli nerui ad cor ipsū pertingant. **MATHESES**, Cui affectioni cordis palpitatio succedit: **GERON**, Frigidæ ipsius intemperaturæ, & vnionis diuortio.

Palpitatio, cui affectioni succedat

MATHESES, Quæ causæ præter spiritum crassum, nebulosum, atrum, flatuosumque illam procreant: **GERON**, Frigidior corpo-

10 ris ætas, regio, anni tempus, vita otiosa, repletio, largior vini usus, cibi frigidi, seu flatulenti, & quæcunque alia corpus refrigerant. **MATHESES**, Alterinē parti etiam, quā cordi superuenire solet: **GERON**, Primariò quidem, ac per se cordi soli: consortij au-

tem lege etiam illius inuolucro, Græci *περικάρδιον* vocant, tali hu-

15 moris materia, qualem pustulæ *ὀδανδεις* dictæ emittere solent: quandoque onerato, vt ne illud attollatur, impedire possit: quandoque etiam tumore duro contra naturam obfesso. **MATHESES**,

Quibus hoc malum accidere solet: **GERON**, Non solum adultioribus & senibus, sed etiā adolescentibus natura frigidioribus: magna

Quibus hoc malum accidat.

20 verò ex parte ips, qui infra quinquaginta, supra verò quadraginta aṅos nati sunt, euenire consuevit. quanquam nonnulli id ex calida cordis intemperie prouenire docuerint: eò quod perperam accipiant palpitationem pro cordis dolore, qui Græcis *καρδιαλγία*: de-

inde, quod vētriculi rōsionem pro motu quodā cordis veloci pal-

25 pitationi similem interpretētur, qui ex immo dico cordis incēdio nō ex refrigeratione, vt palpitatio, contrahitur. **MAT**, Quid de pal-

Præfagia.

pitatione prænosci potest: **GER**, Si increuerit, aut diutius traxerit,

omnium virium lapsus, qui *συνκοπή* Græcis dicitur, expectari debet, & tandem mors ipsa subita: eò quod vitalis facultatis imbe-

30 cillitas illam subsequatur, sicut in alijs acutissimis cordis affectibus fieri obseruatum est. **MATHESES**, Nullinē hoc casu liberantur: **GERON**, Vtique, per sanguinis detractionem, tenuemq; victum,

Qui liberenter hoc malo.

& commoda medicamenta: omnes tamen ante senectutem è vita decedunt: idque nunc per febres acutas, nunc cum magna viri-

35 um defectione, cum adhuc sani videntur, nunc citra illam alia quadam mortis specie intereunt. **MATHESES**, Cum mentionem feceris syncopæ, dic amābo, quid nam ipsa significet, quòsque morbos potissimū sequatur. **GERON**, Morbus est acutissimus,

Syncope.

40 cis *λειποθυμία*, vel *λειποψυχία*, latini animis defectio dicitur: quamuis non idem hæ ambæ existant. Syncopa enim præceps est omni-

um virium, præcipuē autem vitalium lapsus: quo sensus motus-

Animi defectio.

Pars in syncope affecta.

Sudor rigidus videtur.

Cur non sudores frigidi in defectu one.

Syncope ex consensu.

Syncope primaria.

Syncope quibus malis succedit.

que perit, vitæque periclitatur. **MATHESES**, Quid animi defectio propriè existit? **GERON**, Non omnium simul virium, vt in syncope interitus, sed spirituum duntaxat resolutio, & qui hanc experitur, præsentis audit, videt, & agnoscit. **MATHESES**, Quæ pars in syncope offenditur? **GERON**, Cor ipsum, sic vt munus suum integrè obire nequeat: vires eius non modò imminuuntur, vt in animi defectione, sed quasi in totum aliquando deficiunt, præsertim vbi sensus considerantur. **MATHESES**, Quæ syncope sunt indicia? **GERON**, Spiritus resoluitur, animus deficit, arteriæ parum, & obscure pulsant: exterior pars corporis friget: corpus sudat, præsertim circa caput, faciem & ceruicem: Græci hos *συνκονικός*, vocant. atque hæc omnia calorem natium strangulari, aut extinguere nunciant. Id non est prætereundum, egros in syncope sudore frigido: in animi autem defectione non item perfundi. **MATHESES**, Cur hoc euenit? **GERON**, Quia cum vires in syncope admodum conuellantur, calorque natius ad cor, ceu ad proprium asylum confugiat, deseratque partes externas, humidum, quod in eis, præsertim solidis continetur, reseruari nequit: imò calore insito tãquam destitutum, & retentrice facultate adeò imbecilla, vt illum conseruare non possit, ad externas cutis partes confluit, eoque sudorem excitat. non enim is ex recrementis solum, sed etiam ex solidarum partium proprio humore prouenit. **MATHESES**, Cur sudores isti sunt frigidi? **GERON**, Quia calor naturalis vel prorsus, vel propemodum extinguitur, eoque solidis partibus iam refrigeratis, quicquid ex ijs profluit, frigidum esse oportet. atque hac de causa sudores in syncope exorientes necessariò sunt frigidi. **MATHESES**, Cur non in defectione animi etiam tales inueniuntur? **GERON**, Quia vires in hac non adeò concidunt, nec calor innatus quasi extinguitur, neque solidæ partes sic destituuntur, vt in syncope, cum minor sit in illa, quam in hac cordis affectio, eoque nec sudores. ijque frigidi in illa erumpunt: imò laborantes ea prorsus non sudant. **MATHESES**, Cum superius docueris cor in syncope nunc proprio affectu, nunc aliarum partium consensu laborare: indices mihi, quomodo hoc dignoscam? **GERON**, Si ore ventriculi affecto, vomitus, nausea, aut dolor, ac rosio quedam primum, deinde syncope successerit: cor ex illius consortio affici dicitur. sin autem syncope oriatur, sic vt nullius partis læsæ indicium præter quàm immodica quædam animi excandescencia antecesserit: cor primariò offensum esse censeo. **MATHESES**, Quibus affectibus syncope succedere consuevit? **GERON**, Quodcumque fiat, aut valide cordis intemperaturæ soli, aut vitioso, seu virulento humori coniunctæ, aut erysipelati, aut inflammationi, aut alteri cui-

dam tumo-

- dam tumori naturæ contrario. At si ob inflammationem, aut erysipelas, syncope excitetur, antequam affectus tales augetur, laborans ea interit. non eo modo fit, si ob simplicem cordis intemperiem illa, siue æqualis, siue inæqualis oriatur. Hinc itaque distinguere poteris, cum syncope ob proprias simplicium partium intemperies genita fuerit. quoniam hæc repentinam mortem non inducit: quemadmodum illa, quæ ad partes compositas pertinet, ac subito iugulare potest: sic tamen, ut signa quædam interdum præcedant. **MATHESES**, Quæ syncopæ causæ dicuntur? **GERON**, *Syncopæ causæ.*
- 10 Quamquam nonnullæ esse possint: omnes tamen cor ipsum, aut eius spiritus offendunt: vtrique verò bifariam lædi possunt, nempe quantitate, vel qualitate mutata. Quæcunque igitur causa syncopen efficit, aut solidas partes, aut spiritus ipsos corrumpit, aut certe eorum intemperiem mutat, in quibus vtriusque vires consistunt. hæc autem ita conseruari debent, ut tum qualitate, tum quantitate naturaliter habeant. **MAT.** Ex quibus spiritus immutantur?
- 15 **GERON**, Tum ex succis vitiosis abundantibus, tum ex aëris ambientis grauitate, qui aliàs ab alia causa in hanc est conuersus, nempe ex metallis, caminis, vel barathris, aut ex leguminum, olerum, animaliumque putredine, aut ex halitu stagnorum, paludum, aut fluminum: nec non ex venenatis facultatibus, aut animalium virulentorum venenis. **MAT.** Cur spiritus ex aëre ambiente, ac vitiosis succis corrumuntur? **GERON**, Quia ex subtiliori purioreque sanguine: nec non ex aëre optimè temperato, omni excremento purgato, per inspirationem nutriuntur. **MATHESES**, Quomodo spiritus ipse vitatur? **GERON**, Ex ingenti dolore, crebris motibus, quales etiam sunt vigiliæ: item ex immodica eius tenuitate, & corporis ipsum continentis raritate. Præterea ante hæc omnia ex ipso aëre, respiratu prohibito, nutrimenti inopia, animi affectibus
- 20 ut timore subito, ac vehementi: item ex illis, qui huic sunt contraria, ut ex maxima voluptate, nimio gaudio, tristitia, anxietate, ira, curis, & frequentibus vigilijs, spiritusque corruptione, vires resolvuntur. atque ex his causis modò spiritus commutantur: modò corrumuntur: modò disperguntur, modò vtrique hæc experiantur. **MATHESES**, Vnde solidarum partium vires digeruntur, dissipanturque? **GERON**, Ex morbis antecedentibus, alimenti defectibus, ex febribus acutis, quæ corpus colliquant. **MATHESES**, Ex quibus earundem partium intemperies mutatur? **GERON**, Vel ex immoderato calore, vel frigore, vel humore, vel siccitate, vel quibusdam horum coniunctis. **MATHESES**, Potestne syncopa etiam aliunde prouenire? **GERON**, Potest ex immodica quoque ventris inanitione, aut ex principum viscerum intemperie, aut ex motu, &
- Spiritus vnde mutantur.*
- Vires quibus resolvuntur.*

ijs, quæcunque spiritus, aut solidas partes mutare, aut corrumpere solent: id quod ex familiarium ægris assistentium sermone, partim tua industria cognoscere poteris. Cæterum syncope interdum ex magna crudorum humorum copia, simul cum oris ventriculi offensione excitari consuevit. hinc enim præcordia inflantur, & totum corpus amplius, quàm naturaliter apparet: nec non albidius, similiúsque ijs, qui hydropè laborant; in quibusdam nigrius, aut magis liuidum, seu plumbeo colore infectum cernitur. **MATHESES**, Quales sunt syncope laborantium pulsus? **GERON**, Minores quàm calor exigit, si febricitauerint: nec non obscuri, prorsúsque inæquales plærunque multi ordine: quæ ratio *συμμετρικῶς*, Græcè dicitur: semper autem in vno ictu. **MATHESES**, Quæ reliquæ syncopæ causæ extant? **GERON**, Flaua bilis os ventriculi infestans: quæ cum ex alijs cognoscitur, tum inde quòd ipsa illud assidue rodar, vellicet, ac dolore afficiat, anxietatémque inducat. item succi & spiritus adedò subtiles, vt celerrimè exhalent, & retentrix facultas per totam corporis molem valde imbecillis: expultrix autem immoderatiús concitata sit. **MATHESES**, Quæ notæ in eiusmodi affectu apparent? **GERON**, Lethales statim, vt nares acutę, oculi concaui, tempora collapsa, frigide languidęque aures, & imis partibus leniter versæ: color autem niger, per pallidus, aliæque id genus signa ab Hipocrate citata, multo que magis, si hæc ita sint, vt neque vigilia præcesserit, neque ventris resolutio, neque inædia. Ex his enim minus malum est, quàm si absq; istis ægri crucientur. **MATHESES**, Quæ spes, aut metus, syncope finiendę esse potest? **GERON**, Si valida existat, nulla medicina periculo subtrahit: sin autem vires adhuc aliquântulum consistent, interdum ad pristinam valetudinē reditus est. Quòd si in syncope cor peculiari affectu laborauerit, sic vt animi robur etiamnum supersit: ex quibuscunq; affectibus ipsa excitetur, eger nunquã succumbet. At si illa ob intemperie eius prouenerit, periculosior, quàm ex cerebri intemperatura existet. sicut hæc perniciosior erit, quàm si iecur per se affectum fuerit: quanuis syncope ex cordis intemperie nata nō tam subito interimere possit, quàm quę compositos eius morbos comitatur. **MATHESES**, Quę syncope est periculosa? **GERON**, Quę ex spiritu & sanguine extenuato nimium trahit originem: maximè ubi retentrix totius corporis facultas, imbecilla, expultrix autem supra naturæ modum concitata fuerit. In totum autem mortifera syncope existit, quę ex crudis succis plus satis extenuatis prodierit: ubi iecur, aut ventriculus inflammatione laborat. At quę syncope ex oris ventriculi vitio gignitur, vnde Græcis *πυλωτική*, vocatur, multam quę nauseam mouet, tutior est, quàm si ex trium principiorum aliquo

Syncope causæ alie.

Syncope perniciosa.

Syncope mortifica.

- aliquo contracta fuerit: licet cor ei confortij lege condoleſcat. Porro quæ citra cauſas euidentēs, ſtomachique noxam, crebrâ autem cum palpiatione cordis incidit, graue periculum minatur ipſique cordi in hæreſcit, Græcis *καρδιακή ανωστανή*, nominatur. hæc
- 5 tum ſenibus, tum conualeſcentibus, tum alijs quacunque ex cauſa debilitatis accidere potiſſimum, mortemque, ſi crebrò adueniat, repentinam inferre conſueuit. Atque hanc iam in vicino eſſe teſtatur facies liuida, viridis, aut nigra: vel ſi aëre medicamentum naribus inditum ſternutamentum non moueat: nec non ſpi-
- 10 ratio, pulſatiōque arteriarum abolita, caputque in humeros, vel in pectus delapſum. Sicut enim cordis palpiatio, quæ ſyncopen gignit, mortem denunciat, ſic illa, quæ cordis palpiationi ſuccedit, multò magis lethalis eſt. *MATHETES*, Quæ ſigna cordis percufſi *Cordis percufſi ſigna.* exiſtunt? *GERON*, Sanguis multus profunditur, præſertim ſi gran-
- 15 diores arteriæ, & venæ ſint vulneratæ: pulſus langueſcunt; color faciei pallidus apparet: ſudores frigidi, malique odoris, tanquam in rotato corpore oriuntur: extremis que partibus frigidis, matura mors ſequitur. *MATHETES*, Quæ indicant ſeptum tranſuerſum ictum eſſe? *GERON*, Sanguis ſpumans editur: præcordia ſur-
- 20 ſum contracta, ſpina dolens, ſpiritus rarus, ſputum cruentum, delirium, nonnunquam tuſſis, poſtremo febris, & tabes, niſi per initia ægri perierint. Atque hæc propemodum notæ ſunt omnium morborum, qui caput, & thoracem infeſtare ſolent: ſi mammarum affectionum ſigna adiunxero. pergam igitur ea quoque abſoluere,
- 25 vt deinde ad ventriculi ac inteſtinorum vitia deſcendam.
- MATHETES*, Quæ ſunt mammarum affectiones? *GERON*, *Mammarum affectiones.* Lactis defectus, & abundantia. *MATHETES*, Quando lac deſicit? *GERON*, Cum ſanguis in toto copore modicus extiterit: vel cum, licet non in toto exiguus fuerit, parcior tamen à mammis attrahi-
- 30 tur, id, quod diſtingui poteſt, ex vniuerſi corporis temperamento, ac habitu ſiccior: item ex immodica eiufdem ſanguinis, aut aliorum humorum euacuatione, vehementi exercitio, labore, vigilia, fame, mœrore, vel ſollicitudine, ac curis, vel ex ſicca, & arden-
- 35 te febrî, vel ſimilibus alijs antecedentibus: quæ corpus plus ſatis exiccarint, ac calefecerint. Hæc enim inter alia lac imminuunt, ipſumque naſci prohibent, nedum ſanguinem, cuius partim etiâ qualitatē vitiant. quāuis ea ſimul, quæ immodicè refrigerant, id preſtare poſſint. *MATHETES*, Quid ſi hæc non adſuerint? *GERON*, Tunc mammæ ob propriam ipſarum imbecillitatem, ac ſiccari-
- 40 intemperiem emacreſcunt, gracileſcuntque, & lacte deſtituuntur: eò quod tantum ſanguinis, quantum lacti generando ſufficiat, attrahere nequeant. *MATHETES*, Quomodo depræhendam lac ip-
- Lactis ob ſanguinem non vitiatum deſectus nota.*

sum ob sanguinem, bile, aut pituita, aut melancholico humore vitiatum de hîcere: GERON, Ex ipsius materia, colore, & sapore, præsertim si non in totum abolitum fuerit: sic tamen, vt temperamenti quoque habitûsque totius corporis, & ætatis notitiam habebas. nam si biliosus sanguis extiterit, lac erit tenue, flauum, & saporis amari, idq; in temperatura calida, habitu gracili, ac ætate iuuenili. si verò pituitosus, lac crassius, album, aut pallidum, acidum, odorisque expers: nec non lactantis temperamentum, habitus, & ætas, pituitam testabuntur: lactis vehementer spissi, pauci, colore obscuri, ac quodammodo nigri, melancholicus sanguis-

Præfagia de lactis defectu.

auktor esse dicetur. MATHETES, Quid de lactis defectu prædici solet: GERON, Et si infantibus magis, quàm mulieribus penuria ipsius noceat, non tamen ideo negligi debet: quia citra mulieris nutriendi affectum aliquê naturę contrarium deficere nequit. Quade causa cum lac imminuitur, aut prorsus aboletur, vel corrumpitur, vel spissatur, vel extenuatur, alia nutrix quærenda est: sin id res quædam incidens non permittat, nutrix victu reficienda est, ne infans morbo implicetur: ipsa verò ad meliorem valetudinem teuertatur. MATHETES, Quando lac supra naturę modum abundat: GERON, Plerumq; talis mamarum affectus in puerperio, ali-

Lactis abundantia.

oq; tempore facile tum visu & tactu, tum etiam ex ipsius mulieris verbis percipi solet. MATHETES, Quæ vitij huius causa est: GERON, Boni sanguinis copia, quæ venis, mamme & vulue communibus repletis, contrahitur. Ea nonnunquam mulieribus vterum gerentibus ob fœtus imbecillitatem, nonnunquam, cum mulier neque grauida est, neque peperit, sed menstrua ei defecerunt, euenire solet. Verum hîc de illis non agitur: sed de his, quibus lac à partu, aut reliquo lactationis tempore adeò in mammis increuerit, vt inde mulieres grauentur, doleantque: ac de mammarum inflammatione metus sit. MATHETES, Quid si lac copiosum è mammis effluat: GERON, Tunc abundantia huius non amplius morbi causa, sed symptoma erit: nec affectus aliquis contra naturam in mammis ipsis metui debet. MATHETES, Quid igitur de hoc vitio periculi instat: GERON, Ne mammarum inflammationem pariat, nisi statim occurras, vel lac casei instar coaguletur, siue in grumos vertatur: & si viciatum fuerit, vasa mamarum exulceret, scabiêmque panos, & papulas excitet. MATHETES, Vnde lac ita cogitur: GERON, Ex ipsius copia, vel crassitie: tanquam ambo affectus originem ex materia trahant. Itaque lac, siue crassum, siue copiosum, in casei formam redigi, aut in grumos conuerti ex immodico tum

Lactis effluens è mammis.

Præfagia.

mammarum calore, tum ex frigore tanquam causis effectricibus, potest: sic vt prima quidem tenuem, ac serosam eius partem excicet.

- cet, secernátque: altera verò vt totum ipsum astringat, cogátque, MATHETES, Vtra ex illis lac in grumos conuertit? GERON, Solum frigus, sicut calor sanguinem in casei formam coagulat, siue lac crassum siue multum fuerit, nisi extra vasa elapsus perfrixerit, 5 in grumos concrescit. MATHETES, Quali vitio præterea mammarum afficiuntur? GERON, Inflammatione: sicut etiam aliarum partes. *Mammarum inflammatio.* hoc autem intercedit discriminis, quòd hæ non solum ex sanguine, sed etiam ex lactis copia, aut eo quasi coagulato inflammari soleant. MATHETES Quibus notis id cognoscitur? GERON, Ipso sensu facile deprehenditur. cum autem duplex inflammationis causa esse possit, nempe sanguis, aut lac concretum, prior ipsam quouis tempore excitare potest, signisque proprijs internosci: altera non item, nisi in puerperis, aut vterum gestantibus, seu quibus menses contra naturam fuerint retenti. mulieres enim, vna quadam ex tribus ratione, lac in mammis, idque copiosius continent: quòd tum 15 ex lactis copia antecedente, tum ex coagulatione eiusdem dignoscitur. MATHETES, Quid de eius curatione sperandum est? GERON, Cum moles earum latior, ac glandulosa existat, parùmque caloris innati habeat, metuendum est, ne scirrhum tumorem, 20 tandemque in cancrum definat, aut vlcus exedens eam suppuratam, aut in abscessum mutatam, subsequatur.

- Hæc de capitis & thoracis virijs habui, quæ tibi satis esse posse existimem: nunc ad inferiores corporis partes me conferam: inter quas primum locum obtinet ventriculus, qui duabus 25 stat partibus, quarum prima os eius dicitur, cui ciborum appetentia commissa est: altera spatium siue sinus ipsius appellatur, quo ciborum conoectio perficitur. MATHETES, Qui prioris eius partis sunt affectus? GERON, Ii, qui cordi sunt communes: vnde Græcis etiam καρδιά, interdum στήν, vel στήν, Latinis gula dicitur. quanquam Celsus nunc stomachum, nunc superiorem 30 ventriculi partem nuncupet. MATHETES, Quibus morbis os ventriculi conflitari solet? GERON, Nunc proprijs seu primarijs, nunc secundarijs, hoc est aliarum quarundam partium, maxime principum, vt cordis, aut cerebri dolentis, consortij lege natis. 35 cordis sanè, quod huic sit vicinum, ac exactam sentiendi vim habeat. cerebri verò, quòd ei ob magnos mollésque nervos consentiat, quos per sextam coniugationem ab illo ipso ortam recipit. Qua de causa os ventriculi, etiam acerrimo sensu præditum est, ac magis quàm cæteræ quælibet partes alimenti defectum percipit 40 & sic vt nullum aliud membrum, vtrùmque principium vnà secum afficit. MATHETES, Quis proprius, & peculiaris oris ventriculi affectus est? GERON, Qui adeò molestus esse solet, vt cumi-

dem augetur, illud ob acrem suum sensum, cor ad doloris confortium pertrahat, ipsumque offendere videatur. quamuis tunc stomachicæ syncopæ fieri deberent, & non illud malum, quod trifariam apud Græcos vocatur: vt καρδιαλγία, quasi cordis dolor: καρδιαγμός, quasi cordis rosio: καρδιακή quasi cordialis. Tria igitur hæc vitia, non solum nomine, sed etiam re ipsa differunt. MATHETES, Quomodo? GERON, καρδιαλγία tum à parte affecta, nempe καρδιά, hoc est corde, tum ab affectu ipso, qui άλγία, Græcè dicitur, hoc est à dolore nomen acquisiuit. notari autem debet his nominibus non cor in thorace contentum, sed ventriculi os intelligendum esse. MATHETES, Quibus hic morbus superuenit? GERON, Non ægris modò, sed etiam ijs, qui paulò diutius ieiunium sustinuerunt: præcipuè cum ex valida exercitatione fatigati nihil cibi assumpserunt: sicut etiam, cum ventriculus rosionem in mœroribus percipit: item cum flaua bilis ex vehementi exercitatione in ventriculum confluit: qua deinde irritati erosique ægri cordis dolore afficiuntur. MATHETES, Quid καρδιαγμόν propriè esse dicis? GERON, Rosionem cordis, hoc est oris ventriculi, ex καρδιά & αγμός compositum. Hac igitur ratione καρδιαγμός & καρδιαλγία simul conueniunt: quanquàm aliqui καρδιαγμόν, non oris ventriculi dolorem, sed motum quendam cordis ipsius palpitationi similem interpretentur. MATHETES, Quid καρδιακός propriè vocatur? GERON, Stomachi etiam vitium est, ex prauis rodentibus, & viru, lentis succis in ventriculi ore collectis. MATHETES, Quo pacto ille à καρδιαλγία dissidet? GERON, Cardiacus cum acuta ardenti- que febrì inuadit, & non solum à rodentibus, sed etiam à virulentis humoribus originem trahit, ac nimia corporis imbecillitas in illo deprehèditur: eò quòd immodico corpus sudore digeratur: qui supra consuetudinem, modumque, & tempore alieno, ex toto thorace, ceruicibus, atque etiam capite prorumpit, vt pedes tantummodò sicci permaneant, frigescantque a deò, vt hoc laborantes, in syncopen propemodum incidant. Cardialgia verò ex acribus humoribus duntaxat, ac os ventriculi rodentibus, vt pote biliosis, non autem virulentis nascitur. Quinetiam Cardialgica affectio citra febrim acutam interdum oboriri, cardiacus verò nò potest. MAT. Quibus signis cardiacos cognoscere poterò, quando os ventriculi non autè cor in affectibus illis affigitur? GER. Ex dolore, & situ. nam in cardialgia angor quidà dolorq; ac rosio in thoracis partibus inferioribus, nēpe, sub pectoris cartilagine percipitur: in Cardiacò autem grauior dolor, & rosio: eò quòd ventriculi os vehemèter adeò in illo excrucietur, vt desperatio quedam animi, & corporis iactatio accedat. Hi duo casus, siue symptomata, in hoc lo-

Cardialgia qui-
bus superueniat.

Cardiagnos quid

Cardiacus quid.

Cardiaci & Car-
dialgie differenz

Oris Ventriculi
affecti signa.
Cardialgie.
Cardiaci.

- hoc solum inter se differunt, quòd hic magis, illa minùs animales sentiendi functiones, præsertim tactum offendant. Nam in cardiao calor natiuus, totumque corpus languescit, labefactatur, ac resoluitur: qui os ventriculi acris sensu præditum habent, statim sub
- 5 hoc intereunt: eò quòd immodicam humorum rosionem tolerare nequeant. Præter angorem & rosionem in Cardialgia ori-
 ventriculi incidentem, etiam mera bilis vomitu quibusdam reijci consuevit: interdum per aluum descendit. In ægris extrema frigen-
 10 tem refect: pulsus artieriarum circa cor ipsum vehemētiores sunt ac magni: animus desperat, angiturq; & corpus iactatur. MATHE-
 TES, Qui vtriusque vicij obnoxij sunt? GERON, Non tantum ca-
 lida oris ventriculi intemperatura præditi, sed etiam qui eiusdem rosionem, quæ vnionis est diuortium, experiuntur. MATHESES,
- 15 Quæ causa istos affectus procreat? GERON, Humor acris rodē-
 que, siue in ore illius contineatur, siue ad id confluat. Cardiacum autem morbum non tantum acris, ac rodens, sed etiam virulentus, ac prauæ qualitatæ participes generat: ob quod mirū non est, si ille etiam ex lumbricis sursum os ventriculi impetentibus rodē-
 20 busque interdum oriatur. MATHESES, Ex quibus notis prauī humores rodentes affectus huius auctores dignoscuntur? GERON, Ex eorum abundantia, ægritudine, temperamento, anni tempore, victus ratione antecedente, & id genus alijs. MATHESES, Quo-
 modo cardiacus ex lumbricis ortus deprehenditur? GERON, Ex
- 25 proprijs illorum signis, & victus ægrorum ratione antecedente, & reliquis modò enumeratis, similiter, cognosces hinc quādo hoc viciū ex inflammatione contractum sit. MATHESES, Quid cordis rosio, seu cardiogmos tandem portendit? GERON, Si febricitantibus superueniat, malum: eò quòd os ventriculi rodatur. Sic
- 30 etiam Cardialgia in febribus periculum ostendit: sin autem citra febrem, aut alios morbos eueniat, non adeò periculosa erit. At morbus Cardiacus, cum semper acutè febris, & præsertim ardenti succedat, periculum minatur: eò quòd à succis rodentibus, ac virulentis, siue à visceris cuiusdam inflammatione prouenerit. ad-
 35 hæc idem morbus cardiacus, cum à lumbricis, vt dixi gignitur, periculo subiectus est, adeò vt, qui os ventriculi acris sensu præditum habent, statim pereant: quia bestia ista non minus quàm pe-
 stiferi humores repentīnam mortem, & syncopas inducant, vt quidam statim cum lumbricis moriantur, interea tque. MATHE-
- 40 TES, Quibus mala ista potissimum eueniunt? GERON, Frequentius iuuenibus, quàm reliquis ætatibus, idque circa diem sextum: in augmento morbi, & præsertim eo tempore, quo æstas cali-

Cardiacus & car-
dialgia quid dis-
ferant.

Cardialgie &
cardiao qui obe-
noxij sint.

Cardialgie & car-
diaci causa.

Cardiacus ex lum-
bricis ortus.

Cordis rosionis
presagia.

Quo cardiao &
cardiogmo oppor-
tuni.

dior existit. **MATHETES**, Enumerasti morbos, qui partim ventriculo peculiares, partim cordi communes existunt: refer nunc etiam, à quibus ille infirmari soleat?

VENTRICULUS
lus à quibus potissimum infirmetur.

GERON, Ab intemperie tum simplici, tum humoris participatione, nec non ab inflammatione, quanquam raro, abscessu rarius, interdum ab ulcere debilitatur. **MATHETES**, Quæ pars in eo præcipue afficitur?

GERON, Os stomachi, siue ventriculi, ijs quos dixi, modis infestatum. **MATHETES**, Quæ notant ventriculum ex calore infirmum?

GERON, Sitis continua, qua frigidam potionem expetit, cibi fastidium, æstus, ructusque nidorofus, noxius calidorum, commodus frigidorum vsus. **MATHETES**, Quæ ex frigore imbecillum testantur?

GERON, Contraria his, quæ sunt modo compræhensa. **MATHETES**, Quæ humidum ventriculum indicant?

GERON, Nulla, vel parua bibendi cupiditas: salua multa: utilis siccorum vsus. **MATHETES**, Quæ siccitatem eius referunt?

GERON, Humor intus vitiat, nausea, vomitus, ructus, præsertim secundum cibum: & si flaua bilis intus coierit, præter ea, quæ calido ventriculo insunt, os etiam amarescit, ipseque humor amarus vomitu rejicitur, ventriculus offenditur, præsertim per inæ-

Syncope stomachica.

diam: unde syncope etiã stomachica comitari solet, maximè si os ventriculi admodum acri sensu polleat. **MATHETES**, Quod pituitæ ventriculo inhærentis existit indicium?

GERON, Ea nunquam illum, nisi cum falsa esse ceperit, rodere solet, neque sitim facere, sed multum saliuæ citra tussim excreatur: ructus quoque tunc acidus euadit, concoctio infirma, inflatio, tensioque ventriculi.

MATHETES, Quid vitium hoc, si multum increuerit, ventriculo adferre solet?

GERON, Tensiones magnas, grauèsque dolores, præsertim horis aliquot post cibum, ac sæpe etiam insignium morborum initia, vt Hydropis & Illij. **MATHETES**, Quod signum atræ bilis intus abundantis existit?

GERON, Cibi cupiditas, sputum pisculentum olens, palpitatio in mesenterio: ex quo nunc morbus melancholicus, nunc comitialis nascitur: adhæc somnus inanis: quo mens vanis imaginibus addicta est, & musculi summo dolore furarum contrahuntur: denique animus tristitia, atque mœrore afficitur. **MATHETES**, Quid appetentia, aut fastidium ciborum significat?

GERON, Illa quidem ægros benè se habere ad ea quæ offeruntur: hoc autem per longos morbos, & post eos, malum denunciat, Si appetentia diu amissa est, non leue malum expectatur, præsertim si ex frigore fuerit contractum. **MAT.**

APPETENTIA
tia canina.

Quid de magna illa fame, quæ canina appetentia dicitur sentis?

GERON, Equè periculosum complurium ciborum desiderium est: sub quo multum voratur: quod vbi ventriculum grauatur, iterum vomit.

- rum vomitu rejicitur: atque sic æger leuatus, iterum vorare noua cupiditate incipit, ac rursus canum instar quod assumptum est, reuomit. Hoc grandis famis vitium sæpè altum soporem, intesti-
 5 norum læuitatem, aquam subter cutem, alimenti defectum, & tandem interitum inducit. In eodem isto malo ægri primum multa fame vrgentur, non tamen diuturna: animus plerumque deficit: spiritusque simul digeritur: & extrema frigent, quando syncope
 in vicina, & mors in propinquo est. *MATHESES*, Quot alijs affectibus ventriculus laborare solet? *GERON*, Varijs. ac primum intem-
 10 perie, nunc sola, nunc cum humore. sub hac ille venas miseraicas alimentum sugere non percipit, aut hæ non sugunt. Nam si talis fuerit intemperies, quæ ventriculi ipsius oris sensum abolet, certe venas iam dictas sugere non sentit: idque fieri potest, vel dum
 illud primario, vel cum cerebri sextiue neruorum paris, consortij
 15 lege affectum est. similiter etiam venæ sugere nequeunt, vel cum deest inanitio, vel cum reliquæ partes, ob earum imbecillitatem non sugunt, etiam si fiat inanitio. Qua de causa, frigus in ventriculo, tanquam ad famem excitandam non parum conducit: ed quod partes corporis vacuas reddat, & dum tunicâ ipsarum cogit, astrin-
 20 gitque, famem inducat. *MATHESES*, Si frigus hoc præstat, quid calor efficit? *GERON*, Is inter efficacissimas, & proximas causas recësetur, quibus fames impediri solet. Etenim solidas partes resoluit, & ad functionem attrahendi imbecilles reddit: humiditas autem dum fundit liquatque, immodicè extendit. quamuis frigida quoque oris
 25 ventriculi intemperies nimia, ipsam excitare queat. Ea nanque vires corporis emortuas efficit, prosternitque: vnde cibi fastidium generari quoque consuevit. *MATHESES*, Quænam ventriculi in temperaturas indicant? *GERON*, Calidam quidem, sitis ructusque ni-
 30 dorosi, vel oleosi, si cibus præter voluntatem assumptus fuerit: ad hæc ea laborantes, cibos frigidiores potius, & concoctu difficiles possunt contingere. frigidam autem contraria ostendunt: quippe æ-
 gri in hoc non sitiunt, neque frigidis iuuantur: acida nonnunquam eructant. *MATHESES*, Quid humores biliosos cum intemperie calida abundantes signat? *GERON*, Quod valetudinarij rorsionem ven-
 35 triculi sentiant, magisque nausea & siti torqueantur: & si humores computruerint, febres quoque interdum infestet. In quibus autem crassi ac viscosi succi, vna cum frigida intemperie exuperant, ijs nec ventriculus roditur, nec sitis omnino molesta est. omnibus autem communiter superuenit: & si humores ventriculi si-
 40 nibus infarcti fuerint, ex his etiam ipsis vomitus erumpit. si verò tunicis ventriculi adhærescunt, laborantes etiam, eo quod ingesserint educto, sola nausea non vomitu vexantur: nisi ubi cibos as-

*Ventriculi intem-
peries.*

*Famem calor im-
pedit.*

*Intemperiei ven-
triculi indicia.
Calide.*

Frigide.

*Signa intemperiei
calide cum hu-
moribus biliosis.*

*Frigida cum cras-
sis & viscosis suc-
cis indicium.*

*Inflammatio
ventriculi vnde
oriatur.*

sumperint. MATHESES, Quis morbus post intemperies explicatas sequitur? GERON, Inflammatio, quæ ex sanguine inter membranas iecoris immoderatiùs effuso trahit originem: qui tactu percipi, & nonnunquam visui exponi potest: huic inquam inflammationi, febris ardentissima succedit: corpus valdè iactatur, & in quietum est: siti insatiabili cruciatur: assumpta continuo, aut per aluum excernuntur, nisi cum os eius fortè, aut portæ obsidentur: animus crebrò resoluitur: vigiliæ vrgent, & frequenter deliria obueniunt. MATHESES, Quibus abscessus manifestatur? GERON, Pure, quod aut vomitu rejicitur, aut per aluum descendit. MATHESES, Quæ vlcus subesse indicant? GERON, Siue id ex abscessu, siue ex pharmaco adurète, siue ex humore simili prodierit: dolor plerumque subest, quanquam interdum etiam sine illo serpat: alui deiectio, aut vomitus adest, quando potissimum ex aliena qualitate excitatur: adhuc febris lenta, eaque assidua sine appetentia fatigat: concoctio, omnesque ventriculi functiones languent. vnde corpus malè alitur, sensimque macrescit, dum tandem nativo calore deficiente, vita finiatur. MATHESES, Quibus alijs vitijs ventriculus laborare solet?

PICA quid proprie quàm pariter affligat.

GERON, Primùm pica, quæ Græcis *πίση*, vel *μυλαρία* dicitur: eaque non modò in mulieribus gravidis, sed etiam in viris accidit, deprauata nimirum appetentia: quippe hac laborantes non copiosa, sed vitiata appetunt. Est autem propriè hæc affectio, stomachi imbecillitas, nausæque & fastidium: quod bilis ac pituitæ vomitum mouet. nam modò acida & acerbæ, modò acriæ: interdum cimoliam terram, vel testas, vel carbones, aut alia id genus absurda appetunt, MATHESES, Quæ pars in hoc morbo affligitur? GERON, Os ipsius ventriculi, cui functionis eius, scilicet appetentiæ noxa superuenit: non copia, vt in fame: sed in qualitate delinquens, qua laborantes, absurda, ciborum loco, vt superius expofui, assumunt. MATHESES, Quibus notis isti cognoscuntur?

*Pica laborantis
signa.*

GERON, Quòd crebrò expuant, ventriculique rosionem, & ango rem sentiant. MATHESES, Vnde ista eueniunt? GERON, Ex oris ventriculi intemperie, vbi tunicæ ipsius vitioso quodam excremento infectæ fuerint. Qua de causa mulieres, præsertim gruidæ, tale vitium experiuntur, & pro humoris vitiosi in eis contenti diuersitate, ipsæ quoque variæ, & aliena appetunt, quæ etiam vomitu innoscere solent. MATHESES, Quando affectio hæc in gravidis accidere consuevit? GERON, A conceptu ferè, circa diem

Cause.

*Pica in gravidis
quando accidat
finiaturque.*

quadagesimum, sæpe ad mensem quartum: interdum ad secundum ac tertium vsque durat. in quarto autem finitur: partim quòd humores vitiosi expurgentur vomitu: partim quòd concoquantur.

quantur. Nam tunc grauida parum cibi, fastidij causa assumit, & abundantia eius per euacuationem est imminuta. quia foetus primis duobus mensibus parum sanguinis attrahit, vt qui adhuc sit paruulus: auctior autem factus multo indiget alimento. At tunc non modò quod optimum est, è venis allicit: sed etiam, quia plus ali desiderat, vitiosi aliquid simul attrahit: vnde corpus vniuersum ali minùs incipit, & minùs quoque humoribus vitiatis cruciatur. **MATHESES**, Quando viris ipsi quoque affectus hic obuenit? **GERON**, Quando humor aliquis non satis integer ad os ven-

Viris quando obueniat pica.

10 triculi delapsus fuerit.

Porro est etiam alius ventriculi affectus iam enumeratis contrarius: in quo cibi cupiditas imminuitur, aut omninò aboletur: quando vniuersi corporis partes nihil alimenti ex illo sugunt: Græcis nunc ἀνορεξία, nunc ἀσπλία, nunc etiam ἀνορεξία, & ἀσπλία, nobis ci-

FASTIDIUM cibi.

15 bi fastidium nuncupatur: atque ea laborantes ἀσπλιοι, & ἀνορεξιοι, dicuntur. Sed hoc inter se differunt, quòd illi cupiditate cibi carentes, eum non assumant: reliqui oblatum fastidiant, contrario modo quàm qui canina cupiditate laborant. illi enim immodicè, hi omninò nihil appetunt. **MATHESES**, Quæ in his fastidij speciebus

Fastidij differentia.

20 pars oblata est? **GERON**, Os ventriculi, sic vt non integrè functionem suam, vel omninò non obeat. **MATHESES**, Quot, & quæ sunt fastidij causæ? **GERON**, Duæ, aut stomachi intemperies, aut humorum abundantia. si enim humores abundant, certè ventriculus non exinanietur, præsertim si illi non solum in ore ventriculi,

Fastidij causæ duæ.

25 sed etiam in toto corpore exuperent. **MATHESES**, Qua ratione cognoscere poterò, an immodica humorum, præsertim crudorum multitudo, inanitionem prohibeas fastidium pepererit? **GERON**, Facile, vt in vris, & nonnullis alijs bestijs latitantibus accidit: quæ longo tempore à cibo abstinent, præsertim per hyemem. Non difficulter etiam scire licet, num exinanitio ob aliam quampiam causam, vt cutis densitatem, aut vitam otiosam impedita fuerit, secutùmque cibi fastidium. At si calidi succi & vitiosi totum corpus occupent, id cum alia, tum rigor, febris, & cibi fastidium demonstrant. **MATHESES**, Quid in his affectibus boni

Fastidij ex humorum copia vris nota.

30 speratur? **GERON**, Si per initia morborum, aut in statu accesserint, cum vires constant, nihil periculi inferunt, vt in quo ægri paucò indigeant alimento: in declinatione verò, si cupiditatis cibi aboleatur, aut in longa imbecillitate, aut viribus debilitatis, aut ex immoderata exinanitione proueniat, periculo non caret. Crescit hæc

Fastidij prægnatio.

35 affectio etiam ætatis processu. pueri nanque ea intestantur graui-ter, vt pote qui natura voraces sint, & assiduò ægeant alimento. **MATHESES**, De magna cupiditate cibi, & eius fastidio satis me-

*SITIS, siue potius
omnis cupiditas.*

docuisti: restat vt desiti quoque similiter me instituas.

GERON, Totidem potionis, quot cibi sunt desideria. interdum enim illa omnino deficiunt: interdum imminuuntur, quæ ex iisdem quidem causis originem trahunt, sed excessu defectuq; solum differunt. At vitiosa potionis cupiditas prauæ alimenti appetentiæ respondet: aliquando immodicam portionem, aliquando alienam postulat, sicut etiam cibi appetentia. MATHETES, Quæ pars in hoc symptomate offenditur? GERON, Siue ingentem, siue immodicam, aut vehementem sitim appelles, ventriculus, & præsertim eius os semper oblaesum erit: quamuis non per-

*Ventriculi in siti
ingenti affecti
notæ.*

petuo per se, sed interdum ex inflammato iecoris, præsertim cauæ eius regionis, vel pulmonis, vel meseraicarum venarum, seu intestini ieiuni consensu. MATHETES, Vnde id dignoscam? GERON, Si ex societate doloris affectum fuerit, ex indicij inflammationis prijs: si verò per se, nullum eiusmodi indicium inflammationis partium, quas superius nominaui, apparebit: quod autem illud in hac affectione oblaesum sit, ex proprij ipsius muneris, quod tum cibi, tum potus cupiditas est, noxa constat. MATHETES, Quid ingens sitis existit?

Sitis ingens quid

GERON, Symptoma, quo functiones oris ventriculi offenduntur, & ipsius appetentia deprauatur. quanquam idem symptoma non vnum semper oris ventriculi morbum comitetur. ille enim, præsertim os ipsius, aut calida, aut sicca, aut vtraque intemperie afficitur. MATHETES, Quid igitur sitim efficit?

Sitim quid efficit.

GERON, Aut humoris penuria, aut caloris abundantia. at non solum nudæ istæ intemperies, sed etiam vitiosi quidam humores illis coniuncti, vt salii, aut biliosi, ventrem rodentes. MATHETES,

*Cur potio magis
quam cibus ob
salio humores
appetitur.*

Cur ob eos potio magis quam cibus appetitur? GERON, Quia præterquam quod illi ventriculum calefaciant siccantque, tanquam sitis causæ, etiam tum in illo tum in venis liquantur, fundunturque. Cum autem succi funduntur, ea quibus continentur, replent: sicut è contrario frigus euacuat. Quinetiam cum succi modò compræhensi in ventris tunicis redundant, potus alieni similiter ac cibi pro illorum vitiositate, expetuntur. atque id sanè diu ijs, qui mala victus ratione vsi sunt, contingit. MATHETES,

*Alteræ immo-
diæ sitis causa,*

Vnde aliàs interdum sitis immodica oboritur? GERON, Ex nativo ipsius oris ventriculi humore in illo tanquam feruente: id autem fieri nequit, nisi eiusdem oris calor exuperet. atque hac de causa meritò ingens sitis, aut ob humoris inopiam, aut caloris co-

*Causæ sitis quo-
modo distinguun-
tur.*

piam, aut ob vtrunque excitari dicitur. MATHETES, Quomodo causæ distinguuntur? GERON, Non admodum difficulter, nam si ob humoris penuriam sitis excitetur, tum ex ægri verbis, tum ex his, quæ antecesserunt, faciliè percipitur: verbi gratia, si ipsa ob

potionis

potiohis inopiam incidere, aut ob vrinæ profluium, quod dia-
 betes nominatur, aut ob largam aliquam euacuationem ante-
 cedentem. Possunt etiam sitim excitare ij, qui à potu se valde ab-
 stinent, aut aquæ dulcis penuria, marinam bibunt. At qui ob calo-
 5 ris vehementiam citra acrium humorum multitudinem sitiunt, ij
 præter nimiam sitim, calorem in ventriculo sentiunt, idque inter-
 dum ex medicamento quodam calido, acri, ac rodente sumpto ac-
 cidit. Porro qui calore & siccitate simul coniunctis siti crucian-
 tur, ij in febribus ardentibus, & vniuersis adurentibus, ac æstate
 10 grauicq; estu infestantur. quandoquidem in his, præsertim febrici-
 tantibus, calor multus succedit, sic vt non parum humoris per fe-
 bris vehementiam consumatur. Quod si humores vitiosi, falsi,
 aut biliosi calori simul adfuerint, facile distinguere præsertim
 ex diuerso oris sapore, salso, aut amaro, licebit. MATHETES, Vnde
 15 sitis provenire dicitur, si humores biliosi redundarint? GERON,
 A calida & sicca ventriculi affectione: cum ij succi tali natura sint
 præditi. MATHETES, Ex quibus alijs nonnulli siticulosi reddun-
 tur? GERON, Ex immodico vini meracioris, præsertim veteris
 potu, ciborumque calidorum, & quandoque viperarum vsu, aut
 20 ex vino, in quo huiusmodi serpens macerata sit. Hoc autem notan-
 dum est, non exiguæ ac moderatæ sitis, quæ sanis aliquando cor-
 poribus incidere solet, mentionem fieri, sed magnæ & vehemen-
 tis, quæ ægris obuenit. quamuis enim ob siccitatem, aut calo-
 rem generetur, tamen neque à toto corpore, neq; ex magno ven-
 25 triculi affectu concitatur: sed ijs locis, per quos humor ab ore ad
 ventriculum delabitur, aridis, aut calescentibus, generatur: atque
 ideò, si somnus succedit, illius est remedium, sic vt penitiores loci
 corporis madefacti fuerint, idque sanguine ad interiora per som-
 num delato: vel quia idem somnus humores concoquit. At super
 30 ficiaria sitis ex partium, quas retuli, calore orta, eaque à somno ex-
 pergefactis, vigilijs facile sedatur. dum enim cibi in stomacho cō-
 coquuntur, calido quodam halitu ad eas partes accedente incale-
 scunt: cumque calor per vigilias in superficiem expanditur, la-
 borantes ab eiusmodi siti facile liberantur, dum partium calor eua-
 nescit. Quod si illa ventriculo ex cibi potusque vsu calefacto, à
 35 somno excitata fuerit, non absq; extremo subsidio per vigilias se-
 dari poterit: eòq; somnus siti superficiali medetur: ei verò que ex
 somno fit, vigilia quibusdā succurrit. At qui noctu bibere deside-
 rant, ijs ad modum sitientibus, vbi superdormierint, salutare est.
 40 neque enim omnibus à somno excitatis sitis ab eodem affectu
 oboritur. Qua de causâ magna vehementis sitis ratio ha-
 benda est: quia, si nimium inualescat, ægris exitium adferre po-

et si talis sit
 autem sitis

idem sitis
 autem sitis
 autem sitis

Sitis à somno.

Sitis quæ noctu
 infestat.

Sitis perniciosa.

test. Atque hæcenus de siti, nunc ad singultum me conuertam.

MATHESES, Quid nam ille est? GERON, Motus quidam vehemens stomachi ac violentus, quo ille, quod ipsum infestat, expellere conatur, tanquam distensoria oris ventriculi affectio, siue distentio quædam: Græcis λυγμός, quandoque λυγξ, dicitur.

Singultus & vomitus differunt.

Hic motus quamuis in eodem genere, quo vomitus, consistat, tamen illo fortior ac vehementior est: eò quòd stomachus per illum appetat, coneturque aliquid eorum expellere, quæ in ipso comprehenduntur: non quæ in latiore ipsius sinu, sed quæ in ipsomet ventre, quæque penitius in ipsius ore subsistunt. At ea quæ stomachus, siue os ventriculi veluti absorpserit, & ille per singultum excernere molitur, vehementiore motu, vt expellantur, indigent, quàm ea, quæ in ventris sinu hærescunt, vomitumque expelluntur.

Motus stomachi in vomitu & singultu quomodo differat.

MATHESES, Qualis igitur stomachi motus in vomitu existit? GERON, Mediocris, nam per illum ea duntaxat excernere conatur, quæ in amplo eius sinu consistunt: in singultu autem fortior vehementiorque: cum ea que penitius in ore ipsius hærescunt, quæque in ipsomet ventre infarcta sunt, ventriculus expellere conatur.

MATHESES, Quæ pars in hoc vitio affecta dicitur? GERON, Os ipsum ventriculi, cum id acriori sensu sit præditum. interdum non modò os illius, verum etiam totus ipse ventriculus: nonnunquam ea quoque pars, quæ propriè Græcis σφαχθός, nobis gula appellatur, affici potest: quanuis non adeò exacto sensu polleat.

Singultus sub quo motuum genere continentur.

MATHESES, Sub quo genere motuum hæc affectio continetur? GERON, Sub communi vitiosorum, præsertim illorum, qui à facultate quidem fiunt, quam causa naturæ contraria irritat. eoque rectè symptoma dicitur, quod sub naturali stomachi ipsius functionum noxa comprehenditur. quippe non vnus solùm facultatis actio, sed duarum prauus motus existit, putà expultricis retentricisque.

Singultus prauus ex putricis motus.

Fit enim interdum, vt tum morbi, tum symptomata vtriusque facultatis misceantur: sed primum quidem ventriculi prauus expultricis motus est: deinde retentricis, nam ventriculus per initia quidem prauo hoc motu expultricis facultatis auxilio, noxiū rejicere cõtendit: secundo autè, cum ventriculus singultit, retentrix facultas quoque offenditur: eò quòd cibus malè minùsq; naturaliter ob distensoriū vetriculi motum compræhèdatur.

Singultum ob duplicem causam etiam fieri.

MATHESES, Est ergò prauus hic motus, ventriculi distentio? GERON, Non ex toto, sed veluti distentioni similis, & cùn oune vtriusque facultatis symptoma: quanquam singultus iste etiam ob duplicem causam, sicut ipsa distensio propriè dicta, excitari possit nempe ob multitudinem magna ex parte, & ob inanitionem, quanuis rariùs.

excitata-

- excitare? GERON, Indubiè, acres, aut serosi, medicatiq̃ue humores, stomachum rodentes : qui vbi vomitu reiecti fuerint, ille statim finitur. ad hæc medicamentum ex pipere confectum, vel ipsummet piper cribro subtiliter incretum, ac deuoratum generare potest, si vinum postea statim superbibatur, præsertim aqua calida dilutum. piper enim calore potionis ad interiora fertur : acrimonia verò sua ventriculum infestat. præterea ex cibo mordaci, orisque ventriculi rigore, seu frigore contrahitur. MATHETES, Quantum ex te audio, potest etiam singultus non modò ex communibus & maximis, sed etiam ex singularibus, & manifestis, vt vehementi calore & frigore concitari? GERON, Quid nîc ambo enim rodere, & dolorem diuortio vnionis intercedente mouere solent, sic vt vnum rodendo, alterum diuellendo id præstet. Porro quamuis plures speciales singultus causæ esse dicantur: tamen ad duas has generales, plenitudinem, & vacuitatem reduci possunt. MATHETES, Qua ratione obsecro? GERON, Cùm omnes illæ rosionis nomine singultum efficiant, aut calidæ, similisque humores acres & rodentes, certè hæc, quia vim habent exiccandi, singultum ex vacuitate prouenientem, excitant: aut quæ ventriculum ipsum immodicè refrigerant, eundem efficere possunt, atque hic ei qui ex plenitudine oritur, annumeratur. Cùm enim rigor & frigus omnes partes nervosas à perspiratione impediant, id efficiunt, vt illæ impleantur, eòq̃ inde singultus proueniat. MATHETES, Quomodo omnes sigillatim dignosci possunt? GERON, Facile, nam singultum à vacuitate ortum, causæ inanientes, quæ antecesserunt, vt immodicus sanguinis fluor, aut alui profluuium, & id genus reliquæ demonstrant. Ex copia natum, illius quoq̃ notæ ostendunt, ex acris humoribus, & medicata qualitate præditis procreatum, illorum etiam signa testantur: & quòd-
30 ægri, vbi vomitu eos reiecerint, statim liberentur: quemadmodum, qui ex cibo in mordacem qualitatem conuerso, singultiunt. At si ex rigore oris ventriculi, aut eius frigore, aut ex medicamento piperis deuorato, singultus incidat, æger facîle referre poterit, quamuis pueri magis ob alimentum in ventriculo corruptum, aut ob frigidam eius naturam singultire soleant. MATHETES, Quid boni, vel mali de singultu finiendò sperandum est? GERON, Si ex vacuitate fiat, aut ex immoderato sanguinis profluuiò, aut nimia purgatione, semper periculum minatur, sicut etiam cùm à vomitu excitatur. MATHETES, Quamobrem? GERON,
40 Quia vel cerebrum, neruorum originem, vel ventriculum non exiguam inflammationem experiri indicat. In altiore autem sopore, aut animi defectione, aut neruorum distensione, siue rigore ex

Note singultus ex vacuitate. Et plenitudine orti notæ.

Singultus quid boni, vel malis ostendat.

citatus, mortem in propinquo esse denunciat. Si verò sternutatio singultui superueniat, huic medetur, quando scilicet ex plenitudine est contractus. **MATHESES**, Qui supersunt adhuc post singultum, stomachi affectus:

*VOMITVS, nau-
sea.*

GERON, Nausea, & vomitio, quæ magnam inter se habent cognationem. nam hanc illa antecedit: quamvis non perpetuò ubi aliquis nausea pressus est, vomitus statim sequatur. nonnulli enim nausent, & turbantur, nihil autem euomunt, cum ipsæ ven-

Nausea quid.

triculi tunicæ humore vitioso imbuti sunt. **MATHESES**, Quid propriè est nausea? **GERON**, Prauus quidam expultricis facultatis ventriculi motus, quo etsi nihil eijciatur, sæpe tamen aqua pellucida, sponte, nullòque conatu ab ore profluit, vel si maioris ir-

Vomitvs quid.

ritum vomendi desiderium. quanquam etiam citra illud fiat. **MATHESES**, Quid vomitus est? **GERON**, Prauus etiam eiusdem facultatis ventriculi motus: quo ea quæ in illius sinu habentur, fluitant

eumque molestant, per stomachum celerrimè rejiciuntur. **MATHESES**, Quis tandem locus in ambabus hisce affectionibus obleditur? **GERON**, Os ventriculi potissimum: quamvis etiam aliqua ex parte totus ventriculus, sicut etiam in reliquis iam dictis vitis.

MATHESES, Qui affectus autem ipsi sunt? **GERON**, Eiusmodi symptomata, in quibus causa quædam naturæ contraria illum ad tales

Nausea notæ.

functiones incitat. **MATHESES**, Quo pacto nausea dignoscitur? **GERON**, Quod ipsa per inanem illam vomendi irritationem ventriculum ipsum tantummodò lancinet, nullum autem humorem educat. **MATHESES**, Quibus à subuersione stomachi distinguitur

*Nausea & sub-
uersio stomachi
quomodo differ-
rant.*

GERON, Quod hæc non nisi cibo assumpto: illa verò sine cibo fiat: aut quod ea ob solam ventriculi debilitatem, aut cum vitiatò aliquo, licet modico humore: hæc autem ex multo, & valdè vitia-

to etiam citra cibum generetur. **MATHESES**, Quid vomitus à nausea differt? **GERON**, Quod per illum aliquid perpetuò foràs

excernatur, per nauseam verò nihil, licet vomitiones interim eam subsequantur, interim non. **MATHESES**, Quibus morbis hæc ventriculi symptomata succedunt? **GERON**, Qui multifariam à di-

uerfis quòque causis oriri possunt, idque ideo, vt eorum morborum tum notitia, tum curatio fiat euidentior. **MATHESES**, Quæ

*Nausea ac vom-
itus causæ.*

nauseam & vomitum pariunt? **GERON**, Duo in vniuersum præcipua, nempe humorum abundantia, vel prauitas: illa quidem sic vt ventriculum grauet: hæc vt rodendo affligat. **MATHESES**,

Vnde humorum copia percipi potest? **GERON**, Expondere ac tensione, quæ in ventriculo sentiuntur. nam cum is eos ferre ne-

quit, ad nauseam & vomitum excitatur. num autem ciborum sit abundantia, ex agro, vel ex assistentibus facile condiscis: quemad-

modum

*Tensio à cibo
quid significet.*

*Humorum vitio
forum ventricu-
lum obsidentium
notæ.*

*Vomitum ex viti-
osis cibis orti se-
ena.*

*Causæ vomitus
ac nausæe quo-
modo distingua-
ntur interno-
scanturque.*

*Ventriculi primi
vi affecti nota.*

modum, si tensio, seu pondus absque cibis orta sentiat, humo-
rum copię ascribenda est. Quod si non multi humores, sed prauī
& biliōsi ventriculū obsederint, oris amaritudo, sitis, ardorque
simul cū erosione oris ventriculī, & fastidio vrgent, cibiq; assum-
5 pri in amaram nidorosaq; qualitatem conuertuntur: sicut vbi
frigidi fuerint, æger neque siticulosus erit, neque ardorem in ore
ventriculī sentiet: sed è contrario frigus, & nonnunquam immo-
deratè cibum appetet, acidamque in ore qualitatem depræhen-
det. si verò falsa, maior quoque potiois: minor autem cibi erit
10 cupiditas: ac forsā abolebitur: præterquam quòd similis quo-
que in ore qualitas percipiat, MATHETES, Quid si vomitus ob
easdem has causas subsequatur? GERON, Humor abundans vomī-
tu facilius dignoscetur: à medico, visu: ab ægro autem, gustu. At
cū humores saniōsi, serosi ac tenues superauerint: ij non modò
15 ante cibum, sed etiam post eum assumptum nimio motu agitati,
vomitus concitant. MATHETES, Quomodo dignoscitur vomitus
ex vitiosis ingestis cibis, aut in ventriculo corruptis prouocatus?
GERON, Ex ægris, aut assistentibus: nec non ex eorum, quę vomī-
tu reijciuntur, qualitate. MATHETES, Possuntne causę ex hisce no-
20 tis satis dignosci? GERON, Minimè, sed etiam diligenter obser-
uandum est, num eiusmodi humores in vetriculo solummodò re-
dūdent: an ex alia quadam parte, siue ex toto corpore in illam con-
fluxerint. item num ij, qui in vetriculo gignuntur, aut ab alijs par-
tibus in eum transmittuntur, in lato ipsius sinu conipræhendant-
25 tur, fluētque in eo, & innatent: an itī ipsomet infarcti impactiq;
sint, siue tunicis eius inhærescant. MATHETES, Quomodo singu-
la hæc internoscant? GERON, Si totum corpus plenum humori-
bus est, multitudinis signa apparebunt. si vitiositas eorum vrget,
ex colore, & papularum cutis eruptionibus, vrinaque ipsa depræ-
30 henditur. sin autem à parte quadam, vt capite, liene, aut iecore in
ventriculū descenderint: æger primū membri offensi noxam
experitur. id enim aut incallescere, aut refrigerari, aut grauari, aut
etiam durum tactu depræhenditur: & si nausea, aut vomitus exci-
tetur, vehemens ac crebrior non erit, sed potius leuis: qui per lon-
35 giora interualla repetat. Præter hæc ad maiorem horum digno-
tionem, etiam notandum erit: qua victus ratione æger vsus sit:
numque in cruditatem, aut satietatem crebram inciderit: idque
in vita otiosa præter consuetudinem. hoc etiam negligendum nō
est: an alia pars corporis certo temporis circuitu cruciari solita,
40 nunc libera sit: vel num excretio quēdā consueta, nunc retenta sit.
nam si horum nihil adfuerit, & affectus prædicti crebrò, vehe-
menter, continuēque vrgcant, constat ventriculū ipsum per se,

ac primario affectum humoresque in eo copiosos esse generatos. num autem ij in amplo eius sinu continentur, fluitentque, vel ipsimet inhærescant, infixique sint, hoc pacto internoscens. Humor in ipso ventriculi sinu contentus, vomitu statim à nausea suborta, absque vehementia violentiæ reijcitur. At biliosos, vel serofos in ore ventriculi absorptos, vel viscosos eidem infixos esse intelligo, si nausea quidem excitata fuerit, sed nihil mentione dignum per vomitiones reijciatur. Cum enim humor aliquis in ventriculi tunicis inhærescit, nausea quidem premit, irritatque, sed inanis, citraque vomitum, quæ nihil humoris educat: quamuis etiam humores crassi, ac viscosi, qui, summo ventris infarcti adhærent, nauseas, inanisque vomitiones ante cibum moueant: eoque nauseam ob eiusmodi humores oriri, rationi est consentaneum. MATHESES, Cur interim nausea citra vomitum excitatur, interim hic post illam sequitur GERON, Quia facultas expultrix nunc est imbecilla, nunc robusta, & humores ventriculi tunicis adhærescentes, tenues: & exigua quædam eorum portio, ex nausea violenta in sinum ventriculi effunditur, eoque vomitu excitato, per os expurgatur. MATHESES, Cur humores ventriculi tunicis infarcti ipsum molestantes præsertim rodendo calidi, aut frigidi non singultum potius quam nauseam excitant? GERON, Quia hi, cum non adeo acres sint, ut rodant, nauseam: vbi verò valde rodant, singultum promouere solent: eoque non semper mordaces ventriculo ipsi impacti, singultum efficiunt. quæ de causa etiam non solum nauseam, sed alias vnum, alias alterum symptoma gi-gnunt. MATHESES, Quid de his prædicat Hippocrates? GERON, Si vomitui singultus ruborque oculorum succedit, perniciosum esse, sicut etiam vomitum, qui, postquam tuberculum intus eruperit, subsequitur. Quinetiam ille pestiferus est, qui Ilij morbum comitatur. quoniam is non semper incidit, sed quando Iliaci morbi exitiales sunt. MATHESES, Quid nausea futurum nunciat? GERON, Quandoque crism, hoc est, morbum finitum iri, quandoque malum, ut in febribus pestilentibus. In ista autem, qui à morbo conualescunt, frequentior illius recidiua testatur. At vomitus, ex pituita ac bile, non autem multa, nec crassa admodum permixtis, securitatem pollicetur. sincerus autem, & vnius humoris vomitus deterior est: siue porracei, siue liuidi, siue nigri coloris sit, sicut etiam, vbi omnium colorum humores vomitu redduntur, adhæc liuida excreta, grauis odoris, maturam mortem ostendunt. in vniuersum onis subputris, ac fetens vomitio exitialis est. MATH. Nul-lane interdum valæudinis causa citari solet? GER, Vtique: sed quod idianus ipsius usus illi noxijs, qui valere diu, & senescere vult.

Nausea cur citra vomitum. & hic post illam exci-tetur.

De nausea ac vomitu quid prædicendum.

MATHETES, Cùm ventriculus primæ omnium morborum concoctioni dicatus sit, potestne etiam aliquando offendi, *CRUDITAS ventriculi.*

vt eam nequeat obire? GERON, Maximè: atque hoc illius symptoma, nobis cruditas, græcis *ἀκρεσία*, seu cōcoctionis frustratio vocatur. Sub hoc quoq; aliæ duæ species continentur. ac prima earum Græcè *βραδυακρεσία*, quasi tarda concoctio dicitur: qua cibus difficulter, & longiore temporis spacio immutatur. altera *δυσακρεσία*, seu praua, ac vitiosa concoctio: qua cibus nullam naturæ gratiam adipiscitur. Quanquam autem singulæ istæ suis distinguantur

10 nominibus: omnes tamen eadem voce cruditatis appellari possunt. MATHETES, Quæ pars ventriculi potissimum in cruditate laborat? GERON, Inferior ipsius ore, nempe spaciosus eiusdem sinus: vbi minùs probè valet, quomodo cūq; concoctio vitiosa fuerit: modò læsiones, seu noxæ illius non ab exteriori quadam cau-
15 proueniant. nam cruditas quædam citra ventriculi affectum fieri potest. Quamuis igitur tria illa concoctionis symptomata, frustrationi functionis succedant: non tamen semper facultas ipsa offensionem experta fuerit. Cùm enim symptoma aliquod ex prædictis externo quodam errore contrahatur: nequaquam facultas

20 ipsa offensam sustinet. MATHETES, Cuius facultatis noxæ sunt eiusmodi symptomata? GERON, Immutatricis, sic vt actio eius, in concoctione tarda sit imminuta: in difficili, vitiosa: in cruditate, abolita. MAT. Quomodo priora symptomata dignoscuntur? GERON,

Facilè: nam ciborū assumptorum qualitas, siue ructus, siue vomitus incidat, planè seruator retineturq;: quamuis in tarda cōcoctio-
25 ne, acidi ructus interdum fiant: interdum ventriculus halituoso spiritu impleatur. At victus ingratus euadens, vitiosam cōcoctionem palàm indicat, vt qui modò vnum, modò alium vitiosum saporem representet: & si corrupti cibi per aluū deficiantur, grauis

30 eorum odor necessariò percipietur. MAT. Quæ causâ communiter ea symptomata excitat? GERON, Immutatorie facultatis frustratio.

MAT. Quot primæ frustrationis genera existunt? GERON, Duo: vnum ex facultate ipsa oblæsa: alterum ab externo quodâ errore ex-

citatum. præterea noxa facultatis etiam duplex existit: nempe, aut
35 propriæ essentiæ culpa, ex quadam primarum qualitatem intemperie, vt si contra naturam calfacta, refrigerata, humectata, aut exsiccata fuerit: aut si facultas ipsa à morbo quodam instrumentario vt erysipellate, inflammatione, œdemate, scirrho, abscessu, aut alijs
eiusmodi offendatur: ob quæ omnia ventriculus, vi eius conco-
40 ctrice offensa, malè concoquit. At si ventriculus in ipsiusmet temperaturæ vitijs labefactetur, concoctio violatur: in reliquis morbis instrumentarijs, duntaxat impeditur. Porro affectus ex intem-

temperie simul, & instrumentario morbo compositi, utroque modo nocent, atque tot sunt interiores causæ, unde ventriculus male concoquit. **MATHETES**, Potestne concoctio etiam impediri, si ventriculus à nullis causis fuerit affectus? **GERON**, Vtique, cum nimius cibus potusque ingestus est, aut aliena qualitate infectus, aut intempestiue assumptus: hoc est, antequam prior descenderit, ac hora insueta: nec non ordine præpostero, aut somno exiguo, aut vitioso excremento subsequente. **MATHETES**, Cum tot frustratæ concoctionis causæ existant, qua ratione secerni, ac dignosci poterunt? **GERON**, Quod si vitia prædicta ex immodico cibo potusque, vel prauo, vel intempestiue, hoc est, extra ordinem sumpto, aut exiguo somno profecta fuerint, ex ipso ægro, aut assistentibus facile percipitur: si verò corruptelam ciborum, cruditas secuta sit, ex antecedente qualitate cognoscitur. nam si corruptio ciborum fumosam qualitatem refert, calidiores, magisque biliosi cibi cruditatem generasse censentur. At si in ventriculo cibi non suapte natura fumosi euaserint, & talis cuiuspiam ructus accedat, calidam ventriculi intemperiem hanc peperisse conijcimus: si vero acidum saporem referant, frigidam esse putamus. quamuis simili modo in excrementis fiat, cum in ipso ventriculo continentur. frigida namque & pituitosa qualitas, acidas: calida & biliosa, fumosas generare consuevit. **MATHETES**, Quo pacto distinguas utrum calida quedam intemperies, aut frigida duntaxat, an vitiosus quispiam humor ventriculum infestet? **GERON**, Cibi, qui suapte natura corruptioni maxime aduersantur, cruditate laborantibus exhiberi debent: panis quidem illis, in quibus fumosum quid eructatur: mel autem is, qui acidum à cibo saporem percipiunt. adhæc excrementa, tum quæ vomitu, tum quæ per aluum eijciuntur, considerare oportet: num scilicet humor aliquis cum his quidem biliosus ac calidus, cum illis autem pituitosus frigidusque excernatur: an nullo humore euacuato, ipsa paululum quiddam immutentur. nam si illa modicè immutata sine humore deijci videas, ventriculum intemperie tantummodo laborare deprehendes: sin autem humor quoque descenderit, qui cibos potest corrumpere, conspicias hos tali humore infectos, ab ipsiusque ventriculi actione manifestius immutatos. At si excrementum ventriculi tunicis infarctum fuerit, ex inani nausea, seu vomitione, quæ solummodo irritat, nihil autem humoris educit, dignoscet. si calidum fuerit, etiam sitis præter nauseam vehemens aderit, & nonnunquam febris. si frigidum, maior ciborum cupiditas urgebit: nulla autem sitis, nullaque febris excruciat. At quia ventriculus in eiusmodi intemperiem calidam & frigidam brevi tem-

pore

*Frustrata conco-
ctio ex intempe-
rie & vitioso hu-
more.*

pore perducitur in humidam autem, & siccam sine longo nō potest, adeo vt actionem amittat, vtriusque intemperaturæ tum humidæ, tum siccæ indicia minimè requiruntur. quamuis humidam, aqua subter cutem plærunque antecedit: siccam vetò, aut senium
 5 aut marcor: eoque ex iisdem dignosci possunt: sicut etiam ex illarum affectibus. nam frigore superante, frigida vitia: calore, contraria exitari solent. At si enumerata symptomata à morbis quibusdam instrumentarijs proueniant, ex proprijs eorūdem morborum indicijs dignoscuntur. MAT. Ex qua causa inter prædictas, tar-
 10 da concoctio excitatur? GER. Ex somno breui, ex cibis, qui non facile corrumpuntur, & ex plenioribus quàm natura postulat. frustra ratio cōcoctionis omnino citra corruptelam ciborum accidit, ita vt quales illi assumpti sint, tales per omnem eorum qualitatem man-
 15 neant. MATHETES, Vnde ventriculus victus esse dicitur? GERON, A nimia ciborum multitudine, aut à maiori eorum modo quàm vires conficere possint: aut à valido frigore, seu ex ventricu-
 si caloris natiui refrigeratione. quod si autem ille etiam medio-
 cres & consuetos cibos nullo prorsus modo confecerit, maximam eius intemperiem subesse testatur. At cruditas corruptioni cibo-
 20 rum cōiuncta, quam propriè græci *δυμεψία* vocant, ex calida, vel frigida intemperie præsertim calida contrahitur: eò quod nulla es-
 sca vehemèter calefacta putredinis expers permanere possit. simili modo extremètis calidis, aut frigidis, aut vitiosis ciborum quali-
 tatibus, in ventriculo substantibus. interdū etiam ex cibo potius
 25 extra ordinē, aut intempestiuè assumpto gignitur. MAT. Quid de cruditate prælagire licet? GERON, Assidua maximè periculosa est,
 eò quod vitiosi humores morbiq; ex ea procreantur, siue ex boni, siue ex mali succi cibis orta fuerit. quāuis ea sit deterior, quam viti-
 osi succi esculenta effecerint. quæcunq; tamen symptomata supra
 30 recitata ex cibis oriuntur, facile corrigi solent. At quæ cruditas ex summo virium lapsu prouenit, lienteriam excitat, aut in id hydro-
 pis genus, quod tympanias vocatur, desinit. Porro cruditas in bi-
 liosis naturis deterrima est, celerrimèque febrim accendit: in qua
 nidorolenta, fumosâque qualitas cibos inficit. in qua verò acida
 33 illos imbuir, vt raro talibus naturis incidit, ita quoque minùs est noxia. quin & nidorosa fumosâque cruditas minùs eisdem incom-
 modat, si alius fusior extiterit: sin astrictior, grauis est. nam natu-
 ræ vitiosæ ex eius astrictione, promptiùs in febres incidunt, præ-
 sertim, vbi ad consueta munia reuertuntur. Postmodò tertia cru-
 40 ditatis species quam Græcè *ἀμψία* nominauī, longè periculosissi-
 ma est, si facultatis concoctricis vitio contradatur, sicut secunda
 quam *βεγάμψία* appellauī, minus periculi affert.

*Cruditās si à mor-
bis instrumentarijs
prouenerit.*

*Prælagia crudi-
tatis.*

*Cruditās deterri-
ma quæ.*

VENTRICULI
in inflatio.

Inflationis differe-
rentia.

ΟΙΔΗΜΑ.

Cause.

Inflationis signa
pro assumptis
vum ratione.

Proſagia.

MATHESES, Quæ post hanc affectio sequitur? GERON, Interdum ventriculus inflatur, quando vis eius tetentrix imbecilla est: vitium hoc græcis πνευμάσις vel ἐμφύσις, nobis inflatio nominatur: qua venter distenditur, indolescitque. nam cum flatuosus spiritus in eo gignitur, aut per os excernitur, eoque ructum ex-
citatur, aut per aluum erumpit, nunc sonorus, nunc silens, vel neutra parte editur. Cum autem venter imbecillis eum dissipare nequit, aliquando non inflatio, sed fluctuatio cum sonitu in ventriculo oritur: hæc ex potu, ventre admodum refrigerato nascitur, ac Græcis κλύδων, appellatur: illa verò ex propria ventriculi concoctione frustrata provenit: eò quod rententrix eius facultas, imbecilla cibos vndique prorsus non constringat, sed regionem quandam inter ventrem & cibos vacuam relinquat.

Alius huic affectus similis ventriculo accidit, qui à Græcis οἰδήμα dicitur. sic autem ab inflatione differt, quòd digitis prementibus cedat. hæc verò nullum vestigium relinquat, sed instar tympani sonitum edat: imò quandoque non solum venter, sed etiam totum pectus, ceruixque & dorsum in hoc vitio retrò grauatur distenditurque. aliquando etiam os ventriculi intumescit, & ructus inanes succedunt, qui illum paulum alleuant: quandoque flatus inhibentur, qui aliàs per aluum excerni consueverant, hinc dolores quibusdam eueniunt Colicis similes: appetentia amittitur, & caput dolet. MATHESES, Quid inflationem generat? GERON, Spiritus flatulentus, qui ex succis quibusdam pituitosis, vel cibis non satis ob caloris natui inopiam concoctis, sed in vaporem tantum redactis, conflatur, MATHESES, Quæ notant inflationem ex cibis flatuosis ortam? GERON, Exiguus & brevis spiritus, qui vno, vel altero ructu edito euacuatur. MATHESES, Quæ ex cibis non flatuosis, sed in vaporem resolutis subortam indicant? GERON, Hæc non longè postquam illi assumpti fuerint, provenit, ut ex ægris ipsis, seu eorum familiaribus facile cognosci potest. MATHESES, Quid si nulli tales cibi antea assumpti fuerint? GERON, Pituitosos humores in ventriculo contentos, solutosque in vapores, inflationis auctores esse iudico. meus enim & tristitia propriè præter cætera, affectionem hypochondriacam testantur, quam flatus quidem atræ bilis ventriculo infusa soboles, generat. MATHESES, Quomodo me geram, ut commodè ei curationem adhibeam? GERON, Si diutius eam differas, hydrops præcipuè sicca subsequetur: & si inflatio ventriculi augeſcat, recidivam in convalescentibus minatur. Qui enim à morbis cibo nimio ad sœtatem vsque se replent, statibus toto corporis habitu inturgeſcunt: quamvis regio morbo affecti, non admodum

modum flatibus distendantur. MATHETES, Quis morbus his proximè recitatis succedit?

GERON, Tum ventriculo, tum intestinis communis, quem *CHOLERA* Græci *χολέρα*: latini illos secuti similiter: barbari verò Cholera cur dicta.

5 cam, seu Cholericam passionem appellant. MATHETES, Cur græci sic eum nuncupant? GERON, Non quod à bile, quæ *χολή* græcè dicitur, fieri soleat (quamuis etiam bilis non rarò in hoc vitio tum suprà, tum infrà erumpat) sed quod materia, quæ per ventrem fertur, ab intestinis, quæ veteribus *χολάδες* nuncupantur, excerni videatur. MATHETES, Vbi hoc malum versatur? GERON, *Cholera finis*

Inter stomachum, & intestina, sic vt cuius potissimum sit partis, non facilè dici possit. venter quidem totus primariò: stomachus autem & intestina consortij lege afficiuntur. MATHE. Quomodo hoc accidit? GERON, Cùm venter duplici ore constet, id quod gra *Intestina quomodo afficiuntur in cholera.*

15 ue, ac molestum in stomacho continetur, per superius: quod in ima eius parte subsistit, per inferius: quod in ipso toto excruciat, per vtrunque os expellere consuevit. MATHETES, Quæ indicant has partes simul affectas esse? GERON, Complura: primùm tum vomitus, tum deiectio simul incidentes: deinde inflatio intestino-

20 rum torsionésque. Sicut autem nausea, & vomitus, prauis expultricis vetriculi facultatis motus existunt, ita etiam vera Cholera. falsa autem citra eius facultatis noxam superuenit: quamuis perpetuò affectum aliquem naturæ contrarium subsequatur. MATHE-

25 TES, Vnde legitima hæc Cholera contrahitur? GERON, Ex ciborum qualitate. MATHETES, Quæ eius sunt indicia? GERON, Vomitus biliosus, nidorosus, acidusque, non paucis horis continuè perseuerans: ventérque inferius eadem excernit, sequiturque sitis, & corpus frigido sudore digeritur: pulsus impeditur. Sæpe etiam surget contrahuntur tendunturque, ac non mera bilis suprà infràque e-

30 rūpit, sed primùm aque similis, deinde talis, in qua recens caro lota esse videatur, interdum alba, interdum nigra, aut variat: interim ex magna ciborum prauitate: interim ex superfluis vitiosis humoribus trahens originem, vt quæ non ex vna sola causa, sed etiam ex multis contrahatur. MATHETES, Ex quibus? GERON, Ex copio-

35 siore cibo assumpto corruptoque: eò quod concoqui non poterit. adhæc ex prauis humoribus cibisque ac potionibus stomacho præsertim noxijs, quales sunt pepones, pingues cibi, dulcesque, & oleosi: insuper ex nimia bile, quæ naturam sursum ac deorsum, ad expellendum irritat: nec non ex frigidis quibusdam admotis, aut

40 frigidarum aquarum potu, aut earum infessu diuturno. præter has etiam aliæ singulares causæ esse possunt, sempe cibi & potus. MATHETES, Quomodo omnes inter se distinguuntur? GERON,

Ciborum assumptorum copia, aut praua eorundem, portionumque qualitate: quæ ex ægro, eiusque familiaribus facile cognoscuntur. quemadmodum etiam, si frigidarum aquarum, aut similium medicamentorum foris adhibitorum vsus antecesserit. **MATHESES**; Vnde Cholera ex bilis aliorumue prauorum humorum copia concitata dignoscitur. **GERON**, Ex proprijs eorundem humorum signis. **MATHESES**, Cur Cholera inter acutos morbos refertur. **GERON**, Quia syncopen eximiam, & virium resolutionem inducit, quæ de causa propè internosci, curarique quàm celerrimè debet. Nisi enim omnes acuti morbi protinus discutiantur, periculo **10** loli esse solent, sicut etiam in hoc vitio, vel exigua ac levis curandi mora interposita, magnam offensionem, ac absolutam subinde tabem adfert. **MATHESES**, Quo anni tempore, & in quibus Cholera frequentior esse solet. **GERON**, Æstate, atque autumnò, magisque, in pueris quàm senioribus, verum his periculosior. **MATHESES**, **15** Quid spem metumue in hoc morbo ostendit. **GERON**, Vehemens sitis inutilis est, & somnus superueniens. è contrario autem vomitio suppressa, salutaris est: si syncope secuta, & vomitus fœdi odoris fuerit, summum discrimen indicant: si verò nullus odor adest, securitas indicatur. **20**

*Cholera quando
infolare solet.*

Prefagia cholerae.

*COELIACVS.
LIENTERIA.*

MATHESES, Qui alij morbi sequuntur. **GERON**, Duo, qui ferè sibi inuicem respondent: primus à Græcis vocatur κοιλιακός, nobis quasi ventriculi morbus: alter Græcis λειντερία, nobis læuitas dicitur. **MATHESES**, Quomodo inter se differunt. **GERON**, Prior talis est, in quo cibus quicumque assumptus statim per aluum descendit, quamuis non omninò crudus, & concoctionis expers: alter sub quo intestina nihil continere possunt, sed quicquid assumptum est, imperfectum protinus deijcitur: sic vt ventriculus nihil in eius materia, colore, odore, aliæue omninò qualitate immutaret: atque in hoc quidem ambo vitia conueniunt, quòd **30** cultas retentrix in eis sit offensa: sed in illo rursus differunt, quòd in priore minùs, in altero magis sit oblata. **MATHESES**, Quæ inter reliqua indicia Celiacum morbum propriè testantur. **GERON**, Excrementa læuia, & humida, quæ venter imbecillis non satis concoxit, neque digessit: eoque assidue excernuntur, fœdi interdum odoris: sub quibus etiam ægrî animo deficere, cibum fastidire, colorem corporis amittere, & valdè graciles fieri solent. **MATHESES**, Quæ peculiariter læuitatem indicant. **GERON**, Si cibi assumpti, liquidi sint, putredinis expertes, nihilque omninò mutati, subalbidi, inæquales, & valdè aquosi: summam, si tales sine dolore descendant, quæ antea assumpti fuerint: **MATHESES**, Vter affectus alterum solet præcedere. **GERON**, Celiacus læuitatem. **40**

nam in

*Celiacus & Læu-
itas.*

*Quibus morbis
Celiacus & Læu-
itas succedant.*

*Præfagia Celiac-
i & Læuitatis.*

- nam in illo, cibus per initia exiguo quodam tempore permanet. procedente autem augeſcenteque vitio, non poteſt. In Læuitate cibus protinus, vt aſſumptus eſt, excernitur: ſic vt retentrix facultas in priore morbo ſit imminuta, infirmaque: in altera prorsus abolita. MAT. Infeſtatné Læuitas ſola inteſtina: an etiā aliam corporis partem? GER. Non illa duntaxat: ſed etiam vētriculum, ſicut Celiacus quoque morbus vtraſque partes affligit. MAT. Cur cibi tam celeriter in ambobus vitijs deſciuntur? GER. Non quod crudi per maneant: ſed quia ob imbecillem retinendi facultatem, citò elaborantur: idē omnis concoctionis ſunt expertes. MAT. Quibus morbis hæc duo mala ſuccedunt? GER. Vel intemperaturæ cuiſdā, ob quam retentrix facultas, tum vētriculi, tum inteſtinorum infirma redditur: vel vlceribus, illis ſimilibus, quæ ſummam oris cutem in feſtare ſolent. MATHE. Quæ ſignant imbecillitatem ex intemperie natam? GERON. Excrementa, quæ ſine vilo doloris ſenſu deſcendunt. MATHE. Quæ rursus vlcera notant? GERON. Extimæ totius vētriculi, ac inteſtinorum tunicæ ramenta. MATHE. Quæ intemperies eſt, imbecillitatis vētriculi, & inteſtinorum cauſa? GERON. Calida, vel frigida: quamvis hæc ſæpius, quā illa, ſic vt eiſdem humor aliquis ſit adiunctus, iſque vel calidus, vel humidus, raro autem calidus: quia iſ ipſe etiam, cum de iectionibus excernitur, fortē exulcerat. MATHE. Quid in vtroque affectu, nempe Coeliaco, & Læuitate præſagiendum putas? GERON. Quod ſi ille duret, parū in eō ſpei eſt: ſi ægri tardiùs ad idoneam victus rationem perueniant, & ſi ab autumno incipiens in hyemem vſque prorogetur, difficiliùs omninō curari poterit. hinc ſit, vt corpus alimentum non ſentiat: eō quod id minùs perfectè in illud digeratur: ſi verò idem vitium in vetuſtatem incidat, tardè remoueri ſolet. Læuitas, quæ ex ſuperficiaria totius vētriculi, & inteſtinorum tunicæ ob acrimoniam humorum ab ratione prouenerit: his ſublatis, ſtatim alimento denſandi viribus prædito, ſanatur. ſin autem longiùs perſeueret, in difficultatem inteſtinorum tranſibit. Quod ſi acidus ruſtus tandem ſuperuenit, qui antea non fuerat, bonum eſt indicium: eō quod pituita diutiùs in vētriculo retineari, & à natura magis elaborari poſſit. Quæ verò Læuitas inteſtinorum ſpirandi difficultatem, & lateriſpunctionem aſſert, in tabem deſinit. Summatim Celiacus & Læuitas inteſtinorum, cum ambo ex retentricis facultatis noxa contrahantur, eadem quoque remedia requirunt.
- MATHE. Quod reliquum eſt inteſtinorum vitium? GERON. Difficultas eorum: quæ à græcis, *δυσεντε-
ρία* vocatur: lati-
ni eodem nomine, interdum quoque tormina appellant. nam in-

Quatuor dysenteriae differentiae.

testina ipsa in hoc affectu dolore cruciantur, exulceranturque. atque hanc medici tum veteres, tum recentiores, veram dysenteriam nuncupant: nonnulli non modò hanc, sed etiam eam, quæ cruenta ob excrementorum speciem existit, similiter nominant. Sub hac, quatuor differentiae continentur: vna sanè ipsius sanguinis, in ijs quibus artuum abscessus inest, vel qui exercitia omiserunt, per circuitum repetens: atque ea etiam mulieribus menstruis retentis accidere consuevit. altera, cum sanguis aquosus ex iccoris imbecillitate deijcitur, quem loturæ carnis similem esse referunt. tertia, in qua sanguis melancholicus, ac splensens descendit. quarta, sub qua modò verus sanguis, modò cruentus paulatim expellitur: item exiguum aliquid puris non rarò, sicut etiam crustulæ vlcerum exeunt, quæ *ἰσχυρὸν* Græcis vocantur. adhuc membranosæ quædam intestinorum particulae: præterea stercus sæpè numero collectum, quod guttas sanguinis in se contineat, excernitur. **MATHETES,** Quæ tandem ex quatuor hisce excretionibus cruentis Dysenteria propriè dici potest? **GERON,** Ea, sub qua intestina ex acri humore abundante abstergentèque vlcera siue iam dudum, siue nunc primùm, siue nondum adhuc experta sunt. **MATHETES,** Quibus notis hoc deprehendam? **GERON,** Cum vitium hoc incipit, pinguia quædam excernuntur: deinde ramenta intestinorum, quæ ex interiore eorum tunica prodeunt: postea carnosæ quædam simul descendunt. **MATHETES,** Quam partem maxime hic affectus offendit? **GERON,** Sola intestina: id quod ex dolore, situ, ipsiisque excrementis & impedita eorundem functione constat. **MATHETES,** Quo pacto discernam, num vlcus superiora intestina ac tenuiora, an inferiora ac crassiora infestet? **GERON,** Si pinguiæ simul cum ramētis deijciuntur, crassa intestina vlcerari, nota est. sin autem cruenta cum reliquis excrementis vniuersis sint commixta, superiora intestina rodì exulcerarique manifestum est. si verò supernatent, inferiora affici. At si neque excrementa ijs quæ ab vlcere descendunt, admodum permixta fuerint, neque prorsus discreta appareant, media potius intestina cruciari coniectura est: id etiam abrafa excrementa testantur: quamuis non adeò manifestè, vt in cruentis. Adhæc crustulæ per aluum editæ ostendunt, quodnam intestinum fuerit offensum, idque cum peculiari essentia, tum etiam eo modo, quo ipse reliquis excrementis commisceri, vel vni tantum eorum parti supernatare videtur. nam si latiores, crassioresque multò extiterint, quàm tenuia intestina exigant, crassa vlcerata esse indicant: nec non stercora, quæ deijciuntur, multa esse, & flatibus permixta: nonnunquam etiam spumosa, pinguiæ, cruenta illis commixta apparent. **MATHETES,** Quæ

Intestinorum vlceratorum signa.

Crassa intestina si exulcerata.

- Quæ tenuia intestina vlcerari indicant: GERON, Dolores circa vmbilicum: aluus biliosa, porracei coloris, & omninò varij: stercora plurimùm mista sine ramentis, sic vt etiam tormina adsint: rosio, desperatio, & animi dissolutio, remissioque, sitis, febris, alui deiectio crudior. MATHETES, Quæ ieiunum intestinum exulceratum esse ostendunt: GERON, Deiectiones crudæ, quibus nigrior sanguis valdè commixtus sit, bilisque insigniter flaua, sitis magna, nausæaque: interdum vomitus, ciborum fastidium, dolor vehemens circa vmbilicum: interdum febres malignæ, facies ægri decolor, & desudatio ad defectionem animi vsque, velox virium imbecillitas: æger non statim ad aluum deijciendum vrgetur, sed tempore quodam interposito, etiamsi rosio infestet. MATHETES, *Dysenteria quæ sit afficitus.* Subquo tandem morborum genere Dysenteria compræhendi debet: GERON, Sub vniõis diuortio. MATHETES, Suntne etiam alij, in quibus sanguis per aluum deijcitur: GERON, Est vtique ipsius iecoris cruenta excretio. MATHETES, *Dysenteria à cruenta excretionē quomodo differtur.* Quomodo inuicem differunt: GERON, Aluus in hac nullum ramentum edit, sed nunquam duobus, aut tribus diebus interpositis supprimitur: deinde iterum redit, & excrementa longè deteriora prioribus reddit. In Dysenteria verò id non accidit: quia in ipsa deiectiones neque copiosæ, neque per longa temporis interualla fieri consueverunt. MATHETES, Enumeres igitur Dysenterix ipsius tum communis, tum cuiusque eius speciei notas, quibus tum inter se, tum à iecoraria excretionē sanguinis distinguuntur. GERON, Generale omnium specierum indicium est, quòd semper rodentes quidam intestinorum dolores precedant: deinde ipse humor rodens excernatur: postea ramenta intestinorum sequantur: nouissimè cruoris aliquid cum illis descendat sensim, exiguoque tempore: nunc verò sanguini, nunc concreto simile: sæpe etiam momentum puris edatur, & vlcera crustulæ, quæ *Φελιδες*, dicuntur: adhuc quòd membranose quædam intestinorum particule, nec non stercus super ijs collectum, frequenter descendat, quod sanguinis guttas in se continet: quia intestina intus in hoc vitio exulcerantur. MATHETES, Cur ex ijs cruor manat: GERON, Quia intestina per Dysenteriam exulcerantur: ille autè nunc cum stercore aliquo semper liquido, nunc cum quibusdā quasi mucosis excernitur, nunc simul quædam carnosæ descendunt: frequens deijcendi cupiditas, dolorque in ano est: cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur: atque eò quoque tormentum intenditur, idque post tempus aliquod leuatur, exiguaque requies est: somnus interpellatur: febricula oritur. MATHETES, Quomodo tempora huius mali, quod veram Dysenteriam appellasti, distinguuntur: GERON, *Dysenteria veteretempora quomodo distinguantur.*

*Singulares dysen-
teriae causae.*

*Humores dysen-
teriae auctores
qui sunt.*

*Praesagia dysen-
teriae.*

Prognosticum.

In primo pingua quaedam excernuntur : in secundo ramenta aliqua intestinorum ex summa interiore tunica abrasa : nec non cruenta quaedam simul cum ramentis : in tertio carnosa quaedam descendunt : postremo saniei similia : qualia ex morborum ca-
daucibus profluere solent. **MATHETES**, Quae peculiares eiusmodi symptomatum causae sunt. **GERON**, Nimius ardor, aut frigus, virulentorum medicaminum potus, ciborumque alienorum, & acrium usus : nec non cruditates, eisque similia, quae singula facile ab aegro, vel assistentibus cognoscere licet. atque haec sunt exteriores. **MATHETES**, Quae sunt iam interiores. **GERON**, Omnes a-
cres rodentesque humores, siue à toto corpore, siue à quadam eius parte ad intestina confluerint, siue in ipsis fuerint geniti. **MATHETES**, Quales autem ipsi sunt. **GERON**, Flava bilis, quae magna ex parte Dysenteriam excitat : aut atra, aut etiam pituita falsa : id quod excrementorum qualitate, aegri aetate, temperamentoque, & anni tempore, victu antecedente, & id genus similibus cognoscitur. nonnunquam inflammatio Dysenteriam generare potest, ut ex illius signis facile percipitur. **MATHETES**, Quid praesagiri de hoc vitio potest. **GERON**, Ea, quae iam facta est Dysenteria, sic ut veluti carunculae, seu magnae intestinorum partes excernantur, mortem minatur : cum in tali neque caro condescere, neque cicatrix obduci possit. At in qua non tam magnae intestinorum partes deijciuntur, neque pingua duntaxat, sed veluti ramenta etiam illorum, tunica eorundem interiore abrasa, descendunt : non adeo citò curabitur, ut ea, cuius primum mentio facta est : neque
difficilis curatu, vel noxia erit : sicut illa, in qua tanquam carunculae excernuntur, ut quae inter primam & tertiam media quodammodo existat. Porro in longis Dysenterijs, cibi fastidium, malum testatur. Periculosa sunt etiam Dysenteriae, quae cum vehementi inflammatione febrisque, & cibi fastidio generantur. Pessimae autem sunt, in quibus excrementa plurima porracei, nigri, varique coloris : grauis autem odoris deijciuntur. adhuc quae sordes magnas membranis commistas, simul cum excrementis emittunt. **MATHETES**, Quid de omnium tenuium, tum crassorum intestinorum exulceratione sperandum putas. **GERON**, Quae tenuia oblidet, difficulter curatur, praesertim, quae ieiunum exercet. si verò in vetustatem inciderit, aut hominem tollit è medio, aut etiam si finiatur, excruciat. Quae ab acris cibis, aut flava bile originem ducit, in totum ferè medicinae parat : sicut, ubi ab atra bile prouenit, nulla medicina iuuat : cum nihil à cancro ulcerato differat : quamuis ab eadem contracta, si quidem ratione febrilium morborum critica, illa excernatur, transitque suo in intestina descendat, ea

dat, ea quoque curationi resistit. Quòd si atra bilis sua sponte nullo febrili morbo antecedente, neque concoctione bona apparente reddatur, nulla medicina ei subuenit. quando enim absque concoctionis signis exacta illa fuerit, semper in perniciem excernitur. vbi verò post illa descenderit, neq; pura, neq; exacta erit, sed vtilem euacuationem indicabit, vt qua corpus à natura expurgetur. MATH. Quid portendit dysenteria, quam aluus sincera peperit? GERON, Perniciem, sicut etiam, quæ lienosis superuenit, pestifera censetur, quàm humores crassi ac melancholici, lieni antea in farcti generarint. MATHETES, Quid ea prænuñciat, quam falsa pituita, longiori tempore intestina rodens abradensq; excitauit? GERON, Ferocissima existit, eoque periculosior, quàm quæ ex bilioso humore contrahitur. MATHETES, Qua de causa? GERON, Quia hic obiter affligit: ille cum sit lentus, moram trahit, ob eamque magis exulcerat, & intestinis diutius ob lentorem suum inhaerens, semper aliquid abradit: non tamen adeò exitialis existit, vt quæ ex atra bile originem trahit. MATHETES, Quomodo cuiusque ætatis & sexus ægri in hoc morbo curantur? GERON, Mulieres facilius, quàm viri: senes & pueri promptius, quàm iuuenes: ætate autem vigentes, vt viri difficilius, quàm curationem recipiunt.

MATHETES, Dysenteriam satis clarè mihi exposuisti, soletne illud vitium quandoque aliud aut præcedere, aut comitari? GERON, Frequenter, præsertim quod græcis *τηνερμύς*, latinis etiam tenesmus, siue tenasmus vocatur, eò quòd sub hoc rectum in testinum quodammodo tendatur, dum ægri in desidendo vehementer exurgunt. MATHETES, Quid igitur hic affectus existit? GERON, Idem quod frequens quædam desidendi cupiditas: qua tamen sæpe nihil præter pituitæ mucisq; similia, interdum etiam læuiter cruenta excernantur. Eadem ferè in hoc casu quæ in dysenteria, euenire solent, nisi vehementiore maioreque ægri conatu. In hoc autem tenesmus à dysenteria differt, quòd non eandem regionem seu partem afficiat. nam vera dysenteria in omnibus æquè intestinis: tenesmus autem, non nisi in recto oriri potest. MATH. Quæ affectum hunc indicant? GERON, Ingens conatus, & continua desidendi cupiditas, dolor, tensioque, sitis, sic tamen vt pauca admodum excrementa sequantur: item quòd hæc illis, quæ à superioribus descendunt, per totum morbi curriculum nequaquam misceri videantur: adhæc alius mucosa cum flatibus descendunt: interdum sanguis post crementa destillat, idque graui cum distensione. æquè dolor orietur, vbi aliquid excernitur: interdum pituitosa mucosaque deiectio: interdum eti-

Tenesmus & dysenteria quid differant.

am subcruenta apparet: sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoque recte coacta. Olim calculos etiam ipsi, qui in vesica nascuntur assimiles excretos fuisse, memoria est proditum. MATHETES, Quæ causæ huius morbi existunt? GERON, Eadem quæ dysenteriae, modò ipsæ circa rectum intestinum exulcerationem pariant, nam citra hanc, tenesmus dici non potest: quamquam extent, qui hunc etiam à causis dysenteriae, absque illa gigni posse cõtendant. verùm ij non in paruo errore versantur, qui cunque enim tenesmus dolorem quidem infert, non autem rectum intestinum rodit exulceratque, verus esse non potest. MATHETES, Qua ratione diuersæ tenesmi causæ inter se distinguí possunt? GERON, Si tenesmus ob copiam excrementorum eueniat, imus venter grauius distendetur, & alui excrementa naturæ contraria remorabuntur: copià verò non in cæco intestino, vt quidam opinantur, subsistet, eò quòd id ad eò exiguum in hominibus existat, vt nullum ferè vsum præstet, neque fæces intra ipsum ex cipi queant, sed in ipsomet intestino recto, vel quòd primum colo, vel alia in parte alligatum sit. MATHETES, Quibus morbis tenesmus annumerari debet? GERON, Neque acutis, neque longis: cum & faciliè tollatur, & nunquam per se iugulet. At si mulieri grauidæ superueniat, abortus periculum est, dolorem sane tensionis gratia excitat: molestiam verò, quòd assidue in eo desidendum sit. quare etiam conceptus ob crebras desidendi necessitates, de abortu periclitatur: quandoquidem etiam grauidæ ob omnes alios validos motus atque dolores, abortire solent.

MATHETES, Quæ vitia post cruentas istas alui deiectiones restant? GERON, Primum quod græcis *διάρροια*, latinis ventris fluor vocatur: sub quo, illa & liquida magis, & diuturnior quàm ex consuetudine fertur, idque sine inflammatione, exulceratione, & ingenti doloris sensu: summum, aluus est fusa, citra deiectionem cruentam, tenesmus siue tensionem, ac crudorum ciborum excretionem. MATHETES, Quæ pars in hoc morbo affecta est potissimum? GERON, Nunc totum corpus ventriculo incolumi, aut intestinis saluis: nunc cerebrum, aut ventriculus, aut intestina: nunc iecur, aut lien: nunc ventriculus ipse, aut intestinum aliquod, toto corpore sano, aut reliquis eius partibus integris. MATHETES, Qui humores in hoc affectu profluere solent? GERON, Modò pituitosus, modò biliosus, aut flauus, aut ater, absque sanguinis crudorumque ciborum deiectione, & tensione. MATHETES, Vnde quæso dignoscere licet, num fluxus, seu diarrhoea materia, ex toto corpore, vel qua ex parte huius profluat? GERON, Si deiectio est exigua, glutinosa, pinguis, fædique odoris, ea ex toto

DIARRHOEA
fluxus ventris,
seu aluus fusa.

Pars affecta.

Humores qui in diarrhoea fluunt.

Signum humoris ex corpore toto, an ex parte qua fluunt.

- toto corpore liquefcente, in febribus pestilentibus, ardentibusque, & heclicis: nec non in tabe, marcere, & in viscerum inflammationibus ad ventrem delabitur: sicut etiam, vbi corpus ob re-
 5 centricis facultatis imbecillitatem extenuatum fuerit. At si excre-
 menta tenuia, & spumosa, noctu magis, & post cœnam exeant: nec non, si per intervalla capitis destillatio, & dolor antecesserit, præsertim, si calor subitus, & frigus infestaret, cerebri affecti notæ
 sunt. Si verò copiosæ cremoris deiectiones fuerint, à iocinore ori-
 ginem traxerunt: si crassæ & mucosæ sine certis intervallis prode-
 10 unt, intestinorum, mesenterij, aut ventriculi vitio ascribi debent. *Cerebri affecti nota.*
 Quod si flaua ardēsq; bilis, ac sæpè etiam spumans in ventrem descendit, idque certo tempore, & per noctem, sine magnota-
 15 men ventris dolore, is fluor ex iocinore, aut etiam ex mesenterio, *Vnde crassæ & mucosæ deiectiones. Fluor ex iocinore vel mesenterio.*
 quod sæpius accidit obortus est. at hic eo breuior esse solet, qui
 20 ventriculo debilitato superuenit. Porro atra bilis per aluum flu-
 ens, lienis, ipsiusque mesenterij affectum indicat. multum autem
 refert, num humor melancholicus, an sanguis torridus, concre-
 tus, picisque liquidæ instar nigricans alui fluorem moueat. In hoc
 enim vomitus cruentus, quo lintea tincta inficiuntur, vel adest,
 25 vel antecessit: in atræ autè bilis deiectione nihil horum deprehē-
 ditur. Quod si crassæ, ac mucosæ pituitæ fluxus fuerit, crassa ferè
 intestina malè habent, vbi potissimum illa solet conrescere: sæpe
 etià ex mesenterio, in quo copiosior congregata, molles tumores,
 & duros, quos Græci σκισσάρους & οιδήματα vocant, progignit. atque
 30 hinc ferè omnis pituitosus fluxus trahit originem. quanquam
 Hippocrates tenuem spumolamque pituitam, è capite in ventri-
 culum, & intestina: dilutam verò & dulcem, ex toto corporis ha-
 bitu manare docuerit: eoque illius fluxionem aquæ inter cutem
 genus quod λευκοφλεγμώδης dicitur, soluere cōsuevit. Ideo etiam ex
 35 ore & lingua profluere solet: ex illo quidem in pueris, cū den-
 tes præcipuè caninos edunt, eò quod alimentum non benè con-
 coquatur distribuatúrque: ex hac autem in blæsis, aut balbis, qui ce-
 rebrum natura humidum obtinent, aut linguam, aut vtrunque.
 atque inde humores in ventrem descendunt: qui longum eius
 40 fluxum excitant. Cæterum si nullum affectus totius corporis, aut
 partium, quas iam dixi, indicium appareat, tunc vitium hoc ad
 ventriculū, ac intestina referri debet. nam alimenta quoque
 tunc minùs probè concocta, deiectioneque liquidior, & valdè a-
 quosa existit. Quamvis autem talis alui fluxus nu'os certos habe
 45 at circuitus, crebra tamen deiectio, exigua, albâque, vt plurimum,
 & pituitosa aderit: interdum etiam nausea, & vomitus ipse vr-
 gent, aliâque nonnulla symptomata, quæ retentricis ventriculi

& intestinorum, facultatis imbecillitatem demonstrant, Id nota-
ri hîc oportet, omnia, quæ per aluum excernuntur, aut ipsa illo-
rum materia, aut copia, aut qualitate, à statu naturali degenerare,
morbosque omnino reliquorum symptomatum instar comitari,

Causa diarrhæe

Idque vel concoctione, vel distributione frustrata, nisi intestino-
rum exulceratio antecesserit. MATHETES, Quæ ergò morbi hu-
ius causa existit? GERON, Cibus in ventre inferiore malè distribu-
tus, vel humor aliquis, qui ex toto corpore, seu aliqua eius parte,
eò defluerit: Idque decretoria, aut symptomatrica ratione. MA-
THETES, Quæ nota indicat, hoc vitium ex mala cibi concoctio-
ne, siue imperfecta eiusdem distributione ortum esse? GERON, Al-
uus admodum aquosa, minimè foetida, albicans, & nonnunquam
spumosa. MATHETES, Vnde eiusmodi excrementorum fluor, ex
ciborum copia, aut ex mala eorum qualitate, prouenisse cognosci-
tur? GERON, Ex ægro ipso, vel ei assistentibus: nec non ex illius
temperamento, ætate, habitu, annique tempore, regione, & æ-
ris tempestate, & vita antecedente. MATHETES, Quando ventris

*Fluxus ventris
quædam noxiæ.*

fluores commodi, aut noxiæ esse dicuntur? GERON, Cum aquosi,
crebrò & paulatim, aut simul, ac sæpe cum dolore fiant, non à na-
tura, sed à rei cuiusdam irritamento incitati, insalubres existunt,
præsertim vbi per initia nulla cōcoctione antecedente, & in febris
bus inciderint. Vbi verò multo tempore interposito, ac similis
cum exiguo, aut nullo dolore, ac stridore contigerint, signaque
concoctionis antecesserint, & deiectio corporis habitui respon-
deat, ægerque facillè illam toleret, sentiâtq; inde leuâmentum, &
cōualescat: tunc benè succedet, eò quòd natura noxios humores,
corpori molestos per se expellat purgétque. Si Diarrhæa vno die
perseueret, sæpius bonam valetudinem promittit: nec non etiam
si pluribus, modò febris absit, & intra septimum diem conquie-
scat, purgatur enim corpus, & quod intus læsurum erat, vtiliter
effunditur. Quòd si alui fluxus maturè desinat, sine vlla est noxa:
id quod contingit, quando nullus amplius motus, ventre iam
contracto, manu imposita percipitur: simulque status deiectioni-
nem extremam comitatur. Prodest etiam, si alui excrementa in
melius mutantur: sicut etiam biliosæ deiectiones surditate acce-
dente desinunt, ita hæc eisdem finitur. Longior ventris profusio,
balbis est frequentior, & vomitione suborta conquiescit. Quine-
tiam in eadem vomitione acida, ructus qui postea, non initio ac-
cessit, vtilis existit. Cum alui fluor in vetustatem incidit, tunc vo-
mitu sua sponte oboriente cessat. vbi aluus diu non descendit, su-
bitam deiectionem, aut febriculam minatur. Quòd si febris acces-
serit, aut deiectio semel finita iterum reuertatur, eadèmq; diu-

Præsigna.

Bona.

Mala.

tius trahere cœperit, periculi plena est, siue illa biliosa, siue cruda ac pituitosa fuerit. similiter etiam, si inflammatio iocinoris, aut precordiorū, aut ventris ei superuenerit: nec nō si ipsa varia diu cum dolore profluat. Nihil boni quoque indicat deiectio, quæ ante tem-
 5 pus compressa fuerit. nam stomachus inde affligi incipit, febresque, & viscerum inflammationes oriuntur. Quod si fluxus ventris materia sursum correpta fuerit, capitis dolores incidunt, vel insania, vel lethargus, pro humoris ascendentis ratione gignitur, multa simul, ac frequens alui deiectio, animi defectionem affert. si
 10 in aluo fusa cibi cupiditas amittitur, aut singultus oritur, perniciosum est. Quibus atra bilis ceu niger quidam sanguis per aluū descendit, præsertim ex morbo, vel acuto, vel longo, vel ex vulneribus si extenuati sequenti die è medio tolluntur. Nigra atrī sanguinis instar excrementa ventris, quæ & cum febris, & sine hac deiciuntur,
 15 pestifera censentur: eoque magis, quò plures mali colores apparent, vltæ bilis deiectio per morborum initia, mortis est indicium. sic etiam illa, cui nausea, vomitus, & delirium accedit. adhæc si ægro pulsus vermicularis & formicans assidue superuenit, nec melior etiam sumpto cibo euadit. Quæ aluus à longo morbo
 20 fluere incipit, aut eo etiam non perseverante, nihil inde leuatur, egerque non facile eum tolerat, certum mortis discrimen instat. Horrenda perinde est alui deiectio: vnde aqua inter cutem originem traxerit, aut quæ vlceri melancholico successerit, quæque ex superiorum intestinorum, præsertim ieiuni exulceratione proue-
 25 nerit, aut in qua durante adhuc, pustulæ, quæ antea fuerant, subito delitescunt: aut si eadem deiectio in sene inueterascit: aut si primò per eam veluti aqua excreta fuerit: deinde si humor vnguenti modo pinguis sinceræque alui deiectio descendant, & longa intestinorum tormina sæpe generant. vnde grauidæ exitium
 30 obuenire solet: & quamuis ipsa quandoque conualescat, partus tamen eius corrumpitur interitque. Longus alui fluor sæpe efficere solet, vt pedes egrorum intumescant. Si verò longius deiectio perseveret, periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculas excitat, viresque consumit: in febribus curatu difficillima
 35 est: vbi in vetustatem incidit, balbuties excitatur. At exigua, glutinosa, alba, & subpallida, perniciosa est, præsertim cum læuitate intestinorum: perniciosior est nigra, aut liuida, aut pinguis, aut fœtida diuturna, & varij coloris.

MATHETES, Quot morbi inter ipsa intestina consistunt.

ILEVS morbus.

40 GERON, Duo. quorum alter in tenuiore est, quem Græci εἰλεον, interdum χερδαλον, latinobarbari voluulum nō minant: alter in pleniore est, atque inde Græcis κωλικός, sicut etiam latinis appellari ce-

*Intestina quæ in
ileo afficiantur.*

pit, prior illorum acutus est: insequens longus esse potest. **MATHETES**, Quæ intestina in primo afficiuntur? **GERON**, Sublimia, graciliâque: non autem crassa: atque vehementissimi dolores, nunc supra vmbilici regionem, nunc infra torquent: nec non graues vomitus adeò excruciant, vt nonnulli tandem ster- 5
cus suum euomere cogantur: è quo miserabili malo, vix vti-
quam aliquis euadere potuerit. nam ventris itinera, per quæ ex-
crementa feruntur, adeò sunt impedita, ac præclusa, vt neque cly-
ster subiens ascendat, neque cibus assumptus deiciatur, imò ne,
flatus quidem per inferiora erumpat: quo fit, vt omnibus, quæ in 10
ferius herent, propulsis, nausea, ructus inanis, humidâque ventri-
culi exhalatio antecedit, & crebra statim bilis ac pituitæ vomitio
subsequatur: spiritus difficulter trahatur: & cibus omnis licet in-
frâ descendat, paulò tamen post (quia transire non potest) iterum

*Cibus quando per
os in ileo affici-
tur.*

vomitum impurus, malique odoris reijciatur. Tunc autem ferè is 15
per os effertur, cum superior gracilis intestini pars laborat: con-
trâ, si inferior regio afficitur, stercus per aluum quoque excerni-
tur. Sub utroque verò casu hoc idem incommodum tunc accidit,
cum res ad extremum deuenit: lumbrici frequenter euomuntur:
vrina non facile redditur, præsertim, vbi vomitio est assidua, al- 20
uiusque adeò clausa, vt ne aciculam quidem admittere possit. No-
uissimè certam mortem nunciant malus stercoris vapor, odorque,
singultus, delirium, neruorum distentio, sudor frigidus, extre-
ma frigida, tremor cordis, & syncope. **MATHETES**, Quæ huius

*Ille dolorum cau-
sa.*

mali causa esse poterit? **GERON**, Vehemens vtriusque intestini a- 25
strictio, quæ vel ob inflammationem, vel scirrhum, vel abscessum
vel stercoris siccati durique in superioris intestini volumine ali-
quo, retentionem generata sit. adhæc ex multis, aut varijs cibis
præter consuetudinem assumptis, præsertim pinguibus carnibus,
interdum ex quibusdam plagis, vehementi frigore, & largo frigi 30
dæ potu, quem sudore diffuentes exhauerint. Quinetiam mor-
bus iste ipsi euenire solet, quibus intestinum vnâ cum stercore in
scrotum delapsum sit, indeque violenter retrusum & inflamma-
tum existat. præterea ex veneni potione, & stercore duro, tenui-
bus intestinis impacto. **MATHETES**, Vnde causas istas diagnosce- 35
re licebit? **GERON**, Exteriores, ex ægrorum, siue astantium collo-
quio: interiores tu opte iudicio, ac ex proprijs signis eorum, quæ
antecefferunt successeruntque. **MATHETES**, Quid de hoc morbo

*Ille morbi præsa-
gia.*

prænosci consuevit? **GERON**, Vomitus, singultus, amentia, vel
neruorum distentio eis superueniens, certum est periculum. ad- 40
hæc qui hoc morbo sunt oppressi, stercus per os reddentes, mise-
rabili tandem morte intereunt. In summa hoc vitij genus omni-
um quæ

- um quæ intestinis aduersantur, est acutissimum, & nisi resoluatur, intra septimum diem occidit, frequensque in eo vomitus, & surditas eueniens periculum ostendunt. At salutariter est, si alui deiectio ex medicamento purgante fieri inceperit: præsertim si reliqua etiam salutaria signa appareant. minus quoque periculi adest, si dolor locum mutet, quam si fixus vna in regione hærescat. **MATHESES**, Quibus malum hoc magis familiare est? **GERON**, Pueris quam senibus, ut quos rarius quidem, sed penitus occidat. **MATHESES**, De priore intestinorum morbo satis iam dixisti: dic nunc quis in pleniori & laxiore intestino existat.
- GERON**, Qui græcis καλὴν ὀδὴν, latinis coli, vel colicus dolor, seu morbus, vulgò colica dicitur: in ea maxime parte, quæ cæca est condita. nam crassum illud, & plenius intestinum colon, multisque anfractibus sinuosum in hoc vitio offenditur. **MATHESES**, Quæ huius mali sunt indicia? **GERON**, Nulla ferè peculiaris: sed tum partis ipsius oblæsa, tum affectus, aded sunt communia, interque se confusa & permixta, ut neutrum sine altero significari possit. itaque non exquisita illorum notitia, sed potius artificiosa quadam coniectura deprehendere licet.
- MATHESES**, Quæ igitur prima affectum hunc declarant? **GERON**, Grauiissimus dolor per totum abdomen in ventre excrucians, idque dextra magis parte, ubi læsum intestinum est. hinc enim ad sinistriorem illorum regionem vergens, zonæ modo ventrem cingit: ideo etiam iuxta renes & dorsum versatur: nec non supra infraque umbilicum, sic ut magnam ventris portionem oblideat, modò dextram, modò sinistram: vagus & omnino instabilis, præsertim si à flatibus originem traxerit, qui intus quodammodo inclusi murmurant, sic ut neque ore, neque aluo erumpant. atque hoc primum colici doloris genus vocari potest. Alterum verò tunc accidit, cum dolor altè fixus, vno in loco excruciat, quem tamen neque flatus, neque ructus erumpentes leniant. in hoc autem crebræ vomitiones vrgent, quibus pituitosa, varia, pòrracea, & æruginosa redduntur: maxime cum pituita crassa vitrea dominatur. In utroque isto genere communia sunt, cibi fastidium, magisque dulcoris, ac pinguis: nec non assidua ventriculi veluti punctura, multa litis, & magna potus aquæ cupiditas, quæ tamen ex eo non leuatur. adhæc ructus, qui cum iam quasi mouetur, statim cohibetur, aluique aded astricta est, ut ex ea ne flatus quidem aliquis exire possit: aut si ead illa vel sponte, vel sollicitata reddat, id siccum, modò stercoris ouilli in globulos coacti instar, modò ut bubulum, læte, flatibus plenum, quod aquæ supernatat. Præterea vrina quoque ob nimium do-

Colica morbus
vbi existat.

Illeus quibus fa-
miliaris potissimum.

COLICVS do-
lor vbi existat.

Coli doloris indi-
cia.

Colicus dolor is
qui parte excruciat.

Primum colici
morbi genus.

Alterum morbi
colici genus.

Primumque doloris
colici signa, commu-
nia.

*Renum cum coli
eo dolore com-
mercium.*

*Renum & coli
dolores quomodo
discernantur.*

*Coli & renum
propria indicia.*

*Coli dolores in si-
nistra parte pro-
creati.*

*Colici doloris cau-
se quatuor.*

lorem biliosa apparet: interdum suppressa, cum renes colo affe-
cto condolitant. nouissimè frigidi sudores, crebèrque singultus,
delirium, neruorum distentio, extremarum frigus, ac tandem
syncope oriuntur. **MATHESES**, Si renes interdum cum colo lege
confortij ac consensus simul afficiantur, quomodo ambarum
partium dolores inuicem discernuntur? **GERON**, Non ita facilè,
maximè per initia: id quod ipse quoq; Galenus confirmat, dum se
deceptum fuisse in eo fatetur, quòd cum se calculo alteri meatu-
um vrinariorum impacto laborare putaret, coli dolore afficeretur.
et si nihil refert, an morbi vtriusque exordio similibus reme-
dijs vtaris, modò postea diuersa adhibeas. **MATHESES**, Recen-
seas igitur propria singulorum tum coli, tum renum indicia, qui-
bus inuicem discernantur. **GERON**, In colico dolore, nausea, vo-
mitus, cibi fastidium magis vrgent, dolorque à dextra propemo-
dum parte inferius incipit: atq; hinc ad sinistram ascendit, idem-
que sæpius totum ventrem ambire ac circumire videtur, pluri-
màque loca occupat, modò in his, modò in illis violentior. Ne-
phriticus autem, seu renum dolor, vno eodémque loco persistit:
nisi quòd nunc ad coxam, nunc ad testiculum, qui è directo est,
perueniat, ferèque alterutrum latus iuxta renem obsideat. Idem
si in loco renibus altiore fuerit, colicus manifestò esse iudicatur.
quanuis autem renum perinde ac coli dolor, non tamen æquè ef-
ficaciter aluo clysteribus subducta, & flatibus emissis remittit.
Adhæc in nephriticis vrina primùm tenuis, pauca & aquosa est:
nonnunquam tota supprimitur: processu temporis copiosior
fertur, crassa, arenosa, & bullans, interdum sola cum cruore excer-
nitur, præcipuè si calculus asper, vel acutus fuerit: postea sabulo-
sa: vnde etiam nephritici, vbi calculus cum vrina exit, à dolore
leuantur. At in colici egri vrina neque calculus, neque cruor, ne-
que arena, sed crassus aliquis, ac pituitosus humor subsidere vide-
tur. **MATHESES**, Cum coli dolores vehementes, dextra magis
parte eueniant, etià in sinistra gigni possunt? **GERON**, Ma-
ximè: quoniam intestinum illud à dextra, ad sinistram cinguli
modo tam latè defertur, vt & lienem, & iecur sepe numero attingat,
ventriculoque continenter adhærescat. Hoc autem animad-
uertendum erit, colicos cruciatus semper grandiores esse, quàm
nephriticos, & illos eosdem facilius, quàm hos lenientibus cly-
steribus mitigari. **MATHESES**, A quibus, & quot causis colicus
dolor oboritur? **GERON**, Vehementissimus quidem, quanuis in-
terdum lenior fieri possit, sicut Iliacus, à præcipuis quatuor inter-
nis gignitur: præsertim ijs, quæ refrigerant, vel calefaciunt, vel
vniionem diuidunt. Sunt autem hæ, vel crassus pituitosusque hu-
mor,

- mor intra membranas coli intestini subsistens: vel crassus, ac flatulentus spiritus ibidem contra naturam retentus: qui illinc transmitti non potest: vel inflammatio intestinum illud obsidens: vel acris rodensque succus idem infestans. MATH. Quomodo crassus pituitosusque humor coli doloris auctor esse noscitur? GERON, Siis, præsertim vitreus, totum abdomen in alto excruciet, intestinumque ipsum, quasi perforare videatur: adhæc si ructus, nausea, humorisque cuiuslibet, potissimum autem pituitæ vomitiones superueniant: aluus valdè astricta nihil reddat: imò si ne spiritum quidem transmittat, quod magis est verisimile, si continuus ciborum potuumque maximè frigidorum, crassique succi vsus, satietas, cruditas, & id genus alia antecesserint. MATHETES, Quæ nota doloris colici ex flatuoso spiritu contracti existit? GERON, *Flatuosi spiritus nota in coli dolore.* Quod ægri magis tensionem, murmuræque in ventre sentiant, præsertim vbi cibi potusque flatuosi antea sumpti fuerint, utpote olera, fructus horarii, aqua frigida, & id genus similia. MATHE. Quid dolorem coli ab inflammatione ortum indicat? GERON, *Colici ex inflammatione signa.* Id quod tunc vno in loco stabilis sit: quodque valida urgeat: quod æger multo æstu & ardore extrinsecus afficiatur: quod intus iuxta ventrem molesta sit pulsatio: nec non quod sitis, nausea, quodque vrina simul & stercus retineatur: tandem quod bilis vomitiones accedant, quæ tamen nihil morbum leuent. MATHETES, *Humores rodentes colici morbi auctores.* Quæ acres rodentesque succos, coli dolorem generasse testantur. GERON, Eadem quæ inflammationem illius auctorem esse indicant. similiter etiam æstus, sitis, & vigilie: quanuis in hac minus, quam in illis. item febricula, vrina acris, & biliosa deiectio: sæpe aluus etiam, si cum cruciatu maiore deijcitur: præter hæc cibi & potus calidioris vsus. atque istud morbi genus omnium est atrocissimum. His colici morbi generibus aliud adhuc accedit, vehementia quidem illis simile, sed non eadem in sede proueniens, ut id spurium potius, quàm verum appellari possit, ut quod vel in peritongo, vel in membranis, abdomini, ventrisque partibus obtensis, non in colo gignatur. MATHETES, Quomodo à vero distinguitur? GERON, Eò quod multò sit grauius, & valdè diuturnum: quod neque medicamentis per os assumptis, neque per inferiora iniectis, neque fomentis extrinsecus adhibitis, breuiterque nullis quæ vero dolori colico conueniant, remedijs mitigari soleat. MATHETES, Quid hunc morbum generat? GERON, *Falsi colici doloris causa.* Materia, seu flatus tenuis, aut humor acerrimus, æruginosusque membranarum spacijs inclusus: è quibus ægrè extrahi potest. MATHE. Quos morbos hoc vitium comitatur? GERON, Febres longas, aliòsque morbos biliosos, qui difficulter finiuntur. cum enim na-

tura in morbis noxios humores emoliri conatur, nullam autem expeditam euacuandi illius viam nanciscitur: tunc illum è venis & visceribus in membranas sæpe auertit, ac dolores inde oriuntur priore morbo grauiiores. Quinetiam continuæ ac tertianæ, sæpius quartanæ febres huiusmodi doloribus terminantur: qui diu certo circuitu exacuuntur, & parem accessionum ordinem retinent. *MATHETES*, Quæ spes in colico dolore finiendo expectari, aut quod periculum timeri solet? *GERON*, Vbi salus futura est, excrementa non nimium retinentur, dolor mutatur, atque etiam intermittit: æger post sterces flatûsque emissos leuatur, & conquiescit, facilisque spiratio dum morbus durat, semper esse consuevit. Contrà periculosus morbus est, qui in neruorum resolutionem, vel in morbum tum articulare, tum comitalem, vel in aquam subter cutem degenerat, vel etiam in ileum transit, idque intra diem septimum. *MATHETES*, Explica hoc apertius. *GERON*, Inter omnes coli dolores, grauisissimus est, qui inflammationi fertur acceptus, vt qui in ileum degenerare soleat. adhæc vehementissimi quique, periculosiores sunt quàm mediocres. adhuc minori periculo subiectus est, in quo excrementa non prorsus retinentur, neque dolor vna in coli parte fixus percipitur. minus etiam periculi est, vbi excrementum aliquod clysteribus iniectis deijcitur, aut flatuosus quidem spiritus erumpit, vnde dolor remittat, quàm si nihil eorum vsu descendat, neque dolor leniatur. *MATHETES*, Cur morbus iste colicus tam atrox esse dicitur, tamq; vehementes cruciatus inducit? *GERON*, Quia Colon istud intestinum, densum, crassum neruosumque existit, & nihil quod in illud defluit, tam facile, quàm quod in tenuioribus intestinis continetur, discuti potest, expellique.

TARDA ALUI DEIECTIO.

MATHETES, Estne etiam deiectio alui aliquando tardior quàm conuenit, extra morbos hosce colicos & iliacos? *GERON*, Est vtique tunc, cum cibi excrementa rariùs descendunt, minorique portione quàm ille fuerit assumptus: idque ea de causa, quod hæc diutius calor vi retenta, siccescant, durescantque: ac venæ meferaicæ non modò tenuibus, sed etiam crassis intestinis insertæ, semper nonnihil succi ab eis exugant, sic vt excrementa præ siccitate insigni effluere nequeant. his itaque relictis, caput vapore tentatur: corpus ingrauescit: ventriculi concoctio offenditur: & reliquæ eius actiones deteriores fiunt. *MATHETES*, Quæ alia aluum tardiores reddunt? *GERON*, Cibi sicciore, acerbiori, astringentisque, præsertim prima mensa assumpti nimium copiosi: quos natura paulo tempore neque vincere, neque digerere potest. denique etiam otium, decubitus, somnûsque longus. adhæc

- hæc sensus quoque obtusior alium tardare potest, quem morbi
veterinus, apoplexia, & resolutio, antecedentes intulerunt, eius
quod vitare naturam debet, inopia: verbi gratia, fistula bilis que
intestina obiter ad excretionem irritare solet, ab actione sua pro-
5 hibetur: id quod in arquato morbo frequenter accidit: vel si inte-
stina obstruuntur, aut astringuntur: quod sæpius quàm reliqua
evenire consuevit. *MATHESES*, A quibus intestina astringuntur?
GERON, A mesenterij, aut viscerum tumore, qui intestina premendo
coarctat: nonnunquam ab intestinorum ramice. *MATHESES*,
10 Vnde illa obstruuntur? GERON, A duris & siccis excrementis:
vel à crassa lentâque pituita: vel à cibis assidue corruptis, tum
multis, tum varijs, insuetisque: nec non à magna cruditate: vel à
calculo concreto. Sunt quidam ex ijs, quibus aluus tarda descen-
dit, sic ut non nisi septimo, vel nono, vel duodecimo quoque die
15 excrementa deijciant: nonnunquam totos quadraginta dies citra
manifestam corporis functionum noxam, nihil prorsus excernant:
idque nec ob consuetudinem, nec ob naturam, sed ob ea,
quæ nuper recensui vitia: vel ob humorem naturæ contrarium
in colo intestino procreatum: qui id ex toto obstruit, & recre-
20 mentorum descensum impedit. *MATHESES*, Vnde putas acci-
disse, quod nobilis illa virgo, ad quam nuper consilij dandi gratia
fuisi accersitus, non solum aluum, sed etiam vrinam, menses, &
sudores iam annis amplius octo suppressos habuerit, neque ha-
ctenus quicquam natura potuerit excernere. GERON, Res est om-
25 nium admiratione maior, qualem nunquam me vspiam legisse,
vel audiuisse, vel conspexisse fateor: omnes scilicet naturæ excre-
tiones, tam diu esse quasi abolitas in homine, quæ aliàs cibum po-
tûmque sumere, & captare somnum potest, nisi enim excrementa
nuper citata ex corpore pellantur, calor nativus, qui vitæ fons
30 est, extingui strangularique cogitur. *MATHESES*, Quid ergo
virginem illam in vita retinet? GERON, Quod tertio quoque die
clystere iniecto aluus subducatur: cum qua videtur quidem ali-
quid etiam vrinæ excerni, sed non per meatum vrinarium. *MATHESES*,
Cur autem natura deiectionem non molitur? GERON,
35 Quia nervi huic operi dicati ex morbo, vel comitali, vel vteri-
no, & simili resolutionem sunt experti: quemadmodum superius
commemoravi. Quamdiu ergo nervi hisce vitijs laborant, actio-
nes naturæ perfici nequeunt. *MATHESES*, Quibus præter hæc
vitijs aluus, seu intestina occupari solent?
- 40 GERON, Lumbricis, quos græcè *ἐντερίδας* appellant: quan-
quam alij quoque exigui interdum in renibus geniti cum vrina
excernantur: alij in pulmonibus: alij in auribus: alij quoque in

Intestinorum astringitio unde fit.

Obstrutio.

Excretiones naturæ omnes sic mul abolitæ.

DE LUMBRICIS.

dentibus orti cernantur: alij sæpè in abscessibus, vlceribûsque neglectis appareant. **MATHETES**, Vnane omnium species existit: **GERON**, Nequaquam: sed eorum, qui in ventre generantur, triplex: sic, vt vna sit teres, seu rotunda: altera lata: tertia tenuis. prima græcis *ελμὺς σπύσιλος*: secunda *ελμὺς κοιλία*, seu *κείρα*: tertia *ἀόνη*: **5** gis nominatur. **MATHETES**, Quæ intestina species istæ singulæ infestant: **GERON**, Teretes, gracilia potissimum: lati cum longius extendantur, & gracilia, & crassa: tenues *ἀόνηδες*, crassum, seu re-
 ctum. **MATHETES**, Quæ communia lumbricorum indicia appa-
 rent: **GERON**, Venter in omnibus distenditur, murmuratque, & **10**
 roditur: intestina læuitare laborant: corpus dissoluitur: facies pal-
 lescit: oculi suffunduntur, vel suggillantur: nares pruriunt. quan-
 do sursum illi repunt, agitanturque, præsertim per inædiam, ci-
 bique inopiam, intestina aut rodunt, aut exugunt, tussimque sic-
 cam excitant: os ventriculi, & præcordia pungunt, vel neruo- **15**
 rum distentionem, vel animi defectionem, vel syncopem ipsam
 inferunt. cum magis ascendunt, ægri deuorare nequeunt, me-
 tuuntque strangulari. quibus malis pueri sæpè oppressi sunt, &
 extincti. **MATHETES**, Cur hi potius quàm alij, lumbricis affligun-
 tur: **GERON**, Quia calor illorum humidior, & vapore magis est **20**
 perfusus. **MATHETES**, Quibus notis lumbricorum differentia
 inuicem dignoscuntur: **GERON**, Teretes, ac longi, qui in superio-
 ribus tenuibûsque intestinis gigni solent, cum cibis descendit,
 renituntur, & sursum in ventriculum plerumque obrepunt, eum-
 que vt intestina, præcordia, & stomachum mirum in modum ro- **25**
 dunt, maximè si adest inædia, tunc quoque coli dolorem, appeten-
 tiam caninam, grandem famem, & cordis palpitationem pariunt,
 inde per gulam in os ipsum conscendunt, ex eoque hiant, etiam
 foedius redduntur: ex eodem verò clauso, inter dormiendum ad
 palati sinum emergunt, naresque subeunt, & prodeunt noctu ma- **30**
 gis, quàm interdiu fatigantes: tussim exiguum ac siccam pariunt.
 ægri in somno tremunt: aliquando præter rationem excurrunt à
 somno, clamorèq; edito, expergiscuntur, & è cubili exiliunt, ite-
 rumque sopiuntur: interdum singultiunt: aliàs linguam exerunt:
 oculos claudunt: taciturni sunt, & cum excitantur, molesto fe- **35**
 runt animo, vigilare imbecillitatis gratia nequeunt: dentibus stri-
 dent: os saliuæ plenum habent, quam ipsi quoque deuorare tan-
 quam mandantes aliquid videntur, præsertim si infantes fuerint.
 Quidam pulsus destituuntur, ac refrigerantur, & tenui quodam
 frigidòque sudore sudant, sicut ij, qui animo deficiunt, & magna **40**
 ex parte liuescunt: facies etiam maximè circa malas rubescit: sta-
 tim autem rursus pallefcit magis quàm antea. pulsus adest inæ-
 qualis,

*Quenam intesti-
na ledantur à
lumbricis.*

*Lumbricorum
indicia.*

*Pueri cur lumbrici
obnoxij magis*

*Lumbricorum
differentia.*

*Teretes ac longi
lumbrici.*

qualis, obscurus, deficiēs, ac recurrens: in alijs cibi cupiditas amittitur: venter cibum vitiosum deijcit, ac flatibus intumescit: reliqua pars corporis sine causa extenuatur, febris sine ordine, ac certa lege increfcit: interdū, vel noctu, ter quaterque præter rationem recurrit, extremāq; valdē frigent: alij decubitus somno continuo dormientes mutant, angunturque, & ex vno loco in alium se proiectant: ac plerique vocis expertes omnino permanent: nec cibum assumptum reuomunt, aut nauseabundi deuorare vix possunt. interdum venter cum murmure distenditur, multūq; torquetur, aut tympani modo inflatur: oculi sanguine suffusi sunt. Atque hæc omnia accidunt, cum lumbrici isti intestinis inhærescunt, aut cum per eadem serpunt, roduntque: nec non cum præui humores ex calore febrili, ac putrido ventris humore ad cerebrum exhalant. adhæc antecedens victus ratio, lumbricos eodem generatos esse indicat: nempe si cibi crassiores, concoctūque difficiles, ac largiores præsertim frumentarij assumpti fuerint, balneaque statim post illos successerint. *MATHE.* Per quæ lati lumbrici ac breues cognoscuntur? *GERON.* Per ea, quæ, cum excrementis per aluum excernuntur, semini cucumeris, siue cucurbitæ sunt similia. tales in cæco intestino, vel in coli sinibus procreantur, mirabili serie non rarō coherentes, idque in membrana, tenuibus intestinis obducta: nunc in morbis absque febre: nunc in longis cum febre infestantibus. Multa sanē hi lumbrici cum longis habent communia: sed id peculiare ac proprium, quod ipsi cibum continuē depascant, eoque iam consumpto, statim intestina rodere incipiant. ideo qui huiusmodi lumbricis affliguntur, macri, imbecilles, atque inæquales euadunt. *MATHESES.* Quæ tenuium lumbricorum indicia existunt? *GERON.* Hi in ano rectoque intestino pruritus intus mouent: deinde in scemora accedentes proserpunt, quoquo versus: sæpe magnus excrementorum foetor, quem cibi præui corruptique pariunt, in deiectionibus sentitur: id quod etiam adultis non rarum est. ægri his laborantes assiduē desidere cupiunt: & post aluum redditam melius habent. *MATHESES.* Quæ lumbricorum originis causa censetur? *GERON.* Communis quidem cruda, crassa, lentaque pituitæ materia, putredini obnoxia: quam cruditas, luxuria, seu crapula, & ea, quæ faciliē putrescunt, vt lac, caseus, fructūsque dulces & temporarij suppeditant. Hoc autem intercedit discriminis, quod alij ex minore calore: & rursus quidam ex multa, quidam ex pauca materia putrida originem trahant. *MATHESES.* Quid lumbrici portendunt? *GERON.* Vbi morbus per crissin finitur, lumbrici teretes commodē per aluum descendunt. Magna autem diligentia

Latorum ac breuium lumbricorum nota.

Tenuium lumbricorum indicia

Lumbricorum causa.

Presagla.

Lumbrici deteriores qui.

in ijs curandis adhiberi debet. nam plerique neglecti, exaſi ſunt, neruorumque diſtentione perierunt. **MATHESES**, Qui ſunt inter lumbricos deteriores? **GERON**, Maiores minoribus, multi paucis, rubri albis, viui mortuis. Qui circa morborum, præſertim februm initia procreati ſunt, hi ſanè ex ſubiectæ materiæ putredine: 5 qui in ſtatu orti ſunt, ex morbi malitia prouenerunt: qui in morbi declinatione prodeunt, ex omnibus, quæ in melius immutata ſunt, originem traxerunt: ſi modò citius ſeperentur. natura enim illos aliorum excrementorum modo foràs expellit. **MATHESES**,

Lumbrici qui minus periculoſi.

Qui lumbrici inter omnes eorum ſpecies minus ſunt periculoſi: 10 **HERON**, *Ascarides*: quanuis ex deteriore forſan materia gignantur: tum quia tenues & exigui ſint, tum quia recto inſtino, à principibus partibus remotiſſimo, generentur: adhæc quia cum alui deiectionibus facilè excernantur: & quòd medicamenta aſſumpta ſtatim eos attingant. illi verò minus quàm teretes in pueris oriuntur: teretes autem hiſce peculiareſ ſunt. **MATHESES**,

Lumbrici qui obnoxij.

Qui inter latos & teretes deteriores exiſtunt? **GERON**, Lati potiùſ quàm teretes. **MATHESES**, Quos ſæpiùſ omniſ generis lumbrici exercent? **GERON**, Communiter pueros, qui multa cruditate, vitioliſque cibis, vt caſeo, & fructibus fugacibus uſi fuerint. 20

ANI VITIUM.

HÆMORRHOIS.

Sanguis hemorroidalium qualis.

MATHESES, Quæ poſt inſtina partes affici ſolent? **GERON**, Anus quoque multa, tædijq; plena mala recipit. primum quod græci *αιμορροΐδα*, latini ſanguiniſ profuſionem vocant: deinde inflammationem, abſceſſum, fiſtulam, ſciſſuram, condyloma. **MATHESES**, Quid propriè *αιμορροΐδα* nuncupaſti? **GERON**, Eiùſmodi 25 ani vitium, ſub quo ora venarum in ea extantium tanquam ex capitibus quibuſdam ſurgentia, ſanguinem ſæpe ſine modo fundunt: ſicut etiam in ore vuluæ ſœminarum incidere ſolet. **MATHESES**, Qualis ſanguis per eas, & vnde profluit? **GERON**, Primum ater, & melancholicus ſeorſim, qui ex caua vena in extre-

Sanguiniſ profuſiſ differentia.

mas venarum partes deſertur: deinde purus rubenſq;: interdum grumi ruſi inſtar, vt qui in recti inſtini ſinu concreuerit. Diſfert itaque ſanguis hic ab eo, qui vel ex meſenterio, vel ex iecore, vel ex locis ſuperioribus prodijt. nam modicus à meſenterio prouenit: à iocinore infirmo non verus, ſed dilutus, & aquæ ſimilis, 30 in qua caro animantiſ nuper maſtati lota fuerit. **MATHESES**, Qualis ſanguis à ruptis, aut putrefactis ſuperiorum locorum venis emanat? **GERON**, Picis modo retorridus, nigrèque: ac craſſus ille ſanguis, ubi in ea loca, quæ iam dixi, delatus, hinc ruſus euacuari pro conſuetudine non poteſt, vehementem dolorem exci- 40 tat, præſertim ubi durum alui excrementum exprimitur. atque hæc cæca *αιμορροΐδα* dicitur. Externa conſpicua ex ano vtcunq; promi-

Hæmorrhoidis cæca conſpicua.

- prominet: quæ verò intus occultatur, ea sine omni ferè dolore, tumoréque sanguinem effundit. atque sic occulta hæmorrhoids appellatur: quæ nihil sanguinis effundit. quæ verò iam aperta est, sanguinem interdum sua sponte in desidendi conatu semper pro-
- 5 fundit, nec adeò intumescit. Interiores hæmorrhoides, cum corporis venæ, aut multo, aut acri sanguine turgent: superfluum nullo ferè sensu tumoris dolorisque emittunt: idèq; solum in desidendi conatu. atque is seorsum, minimè autem cum fæcibus permistus conspicitur. *MATHESES*, Quæ hæmorrhoidibus euenire so-
- 10 lent? *GERON*, Immoderata sanguinis profusio, eiùsque minimè consueta suppressio. vtraque enim naturæ contraria est, grauiumque morborum fit occasio. sola nanque euacuatio illa naturalis esse censetur: quæ quod graue infestumque est, veluti onus inutile citra corporis infirmitatem, citràque virium iacturam de-
- 15 ponit. *MATHESES*, Vbi continens profusionis causa subsistit? *GERON*, Vel in sanguine copioso, tenui, aut acri, violenter erumpente, vel in venis, siue apertis, siue exsistis, aut ruptis: *MATHESES*, Quid de eiusmodi sanguinis fluore præfagiendum putas? *GER.* *Præfagia.*
- 20 Si nimius est, ingens periculum nunciat: nempe quòd vires hominis consumantur: liuidus faciei color pereat: coxæ grauentur: & crura multum debilitentur: cruor non amplius ater crassusq;, sed purus ac rutilus sit, thesaurus naturæ necessarius. Quòd si hoc malum in vetustatem inciderit, aquæ subter cutem principium affert. Non minus periculi est, vbi hæmorrhoides in ijs suppri-
- 25 muntur, qui sanguinis profluuiò non sunt imbecilliores, habent enim id purgationis non morbi vice: idèq; curati quidam cum sanguine exitum non habent: materia in præcordia, ac viscera inclinata, subitis grauiissimisque morbis corripuntur: præsertim aqua subter cutem, aut tabe. Qua de causa rectè Hippocrates præ-
- 30 cepit, hæmorrhoidas sic esse curandas, vt ex multis vna maneat aperta. Porro in quibus hæmorrhoides maturè fluunt, hi neque lateris aut pulmonis inflammatione, neque vlceribus exedentibus, neque lepra, seu elephantiasi, neque vitiligine, neque melancholia, neque quartana febris tentari solent. Quibus autem hæ-
- 35 morrhoidum fluores intempestiue curantur, hi isdè ferè morbis corripuntur. Melancholicis, vel nephriticis, vel insanientibus, si hæmorrhoides fluere cœperint, salutares sunt. Quòd si hæ ipse nimium suppressæ fuerint, in mulieribus menstrua crumpere, aut sanguinem è naribus ferri conducit.
- 40 *MATHESES*, Vnde fit inflammatio? *GERON*, Cum ex alijs causis, tum ex equitatione multa, duràque: sic vt sanguis copiosus

*Hæmorrhoidum
symptomata.*

*Causa continens
hæmorrhoidum.*

Præfagia.

*Hæmorrhoidum
suppressio.*

*INFLAM-
matio ani.*

*Inflammationis
notæ.*

influxerit. MATHETES, Quæ notæ inflammationem indicant? GERON, Magnus admodum, pungensque dolor, ex cæcis hæmorrhoidibus concitatus: qui compresso ano, & deiectionis nixu valdè exasperatur, forasque interdum pertingit: alius ob anum tumorem difficulter, & summo cruciatu deijcitur: interdum febricula incidit, præsertim si alius longo tempore non fuerit reddita, & vesica ob viciniam molestetur.

*ABSCESSVS
ani.*

MATHETES, Quid de abscessu refers? GERON, In recti intestini cavitatem sæpius quàm in cutem erumpit: quia pus exedens in parte molliore promptius sibi viam parat. cum autem abscessus ruptus est, vlcus manet purulentum, ac fordium, quale etiam ex tenebro neglecto interdum fieri solet: vel in fistulam quoque breui, ob loci naturam degenerat: quia vix in parte humida, excrementisque peruia coalescit, callosumque sordium copia diutissimè profluit. quamuis etiam dolor sit mitigatus, nec non pus ante primam deiectionem, aut certè in media ipsa sincerum, non excrementis mistum, emanet.

*Fistula ani ab
excessu.*

*Pus quando &
quomodo erum-
pat.*

MATHETES, Quando & quomodo pus erumpit? GERON, Vel deiectionis initio, vel seorsum, multoque aliter, quàm è mesenterij, aut superiorum partium vlcere. nonnunquam in vesicam penetrat, ac cum vrina reddenda est, crepitus è genitali similiter, vt ex ano erumpit: deinde nonnihil puris atque excrementi vrinæ mistum. Interdum non abscessus, aut vlcus ex inflammatione relinquitur, sed venæ crassa ac melas cholica sanguinis colluie ad anum distentæ, magnos dolores, & cruciatus vicinis etiam partibus inducentes, illam postea intestinis immittunt, vel in condylomata transferunt.

*FISSURA
ani.*

MATHETES, Quod vitium græci *payádiov* vocant? GERON, Fissuram ani, vel vlcusculum oblongum: in quo cutis exciditur, ei simile quod inferius labrum, & manus pedesque dilacerat. Huic respondet etiam quoduis leue ani vlcusculum: dolor hic acerrimus, ardorque citra inflammationem illud infestat: nec non vlceris extremum ano expresso plerumque circumspectui patet. MATHETES, Vnde contrahuntur? GERON, Ex duriorum excrementorum asperitate, vel ex humoris acris, falsi, & siccantis erosione.

*CONDYLO-
mas ani.*

MATHETES, Quid est condyloma? GERON, Durum tuberculum, quod in ani superficie oritur, instar verrucæ, aut acini vuarum, aut maturi mori, aut ficus. MATHETES, Vnde contrahitur? GERON, Ex sanguine melancholico, & atro: qui illic paulatim exuperat, increfcitque, tandem plus quàm doloris inducens.

ANIPRALAPSVS.

MATHETES, Quomodo anus precidit? GERON, Modò sponte, modò deijcendi conatu: interdum totus ani musculus eam astringens: interdum totus inuersus prouolutusque apparet. atque

ret. atque id efficiunt muscoli resoluti, seu laxi, multo humore perfusi. Qua de causa etiam pueri, & infantes magis quam adulti, huic vitio oportuni sunt.

*STOMACHI,
ventriculi, & in-
testinorum vul-
nerum note.*

MATHESES, Omnes ferè offensas partium, per quas cibus
5 fertur, exposuisti: vnum adhuc scire desidero: quibus notis vul-
nera illarum cognosci poterunt? GERON, Vbi stomachus percuf-
sus est, neque cibus, neque potio transit, sed citò redditur: singul-
tus, & bilis vomitus insequitur: animus deficit: & nonnunquam
nerui distenduntur. Ventriculi vulnerati nota est, frequens bilis
10 vomitus: quòdque cibus & potus statim reddatur: & quòd su-
dores extremis frigidis, oriantur: & post hos demùm mors succe-
dat. At ieiuni intestini vulnerati, & ventriculi communia sunt:
quòd cibus potusque per vulnus exeant, & in abdominis spatium
delabantur, indeque in ventrem: adhuc quòd præcordia intume-
15 scant: & nonnunquam bilis per os reddatur. Cetera intestina icta,
vel sterus, vel odorem eius exhibent.

*MESENTE-
rij.*

MATHESES, Solènt etiam ea pars ventris, quæ inter iecur,
& intestina consistit, vitijis quibusdam laborare? GERON, Vtique.
nam cum totius corporis veluti sentina existat, magnam sæpe hu-
20 morum superfluatorum colluuiem recipit: ac ideo, in quibus ma-
gnus vtriusque bilis & pituitæ proventus astidua ingluuie con-
trahitur, illos natura firma, robustaque, non raro è iecore, & liene
per ramos portarum illius in pancreas, & mesenterium, tanquam
partes minùs nobiles, quàm intestina deponit: vnde grauissimorum
25 morborum Cholera, Melancholia, fluxus alui, torminum,
mali habitus, summæ maciei, languoris, lentarum & errantium
februm, aliorumque latentium affectuum principia generantur.

MATHESES, Quid mesenterio sic humoribus superuacaneis re-
pleto superuenit? GERON, Tumor primò ferè laxus, ac mollis, in-
30 flammationis expers: deinde temporis spatio siccatur, & ferè scir-
rhi modo durefcit: idque adeò nonnunquam, vt vel os, vel calcu-
lus in abditis sub vmbilico partibus concreuisse videatur. MA-
THESES, Quomodo mesenterij tumor, ab alijs dignosci potest?
GERON, Quòd sine dolore sit, tactuque maxime deprehendatur:
35 vt qui penitus delitescat, eoque intestina ipsa vrgeat, arctèque,
& aluum tardiores efficiat, sine tamen dolore: vipote quòd hu-
ius nature sit expers. Hæc autem non in abdominis musculorum
tumore, neque in ventre adipis mole prominulo eueniunt: in neu-
tro enim intestina, vel aluus sollicitatur. Quin etiam adeps ven-
40 tris manu deprehendi, & à musculis abdominis distingui potest.
hi nanque intumescentes, primo contactu decurrunt, & semper,
cum premuntur, & interdum, cum non premuntur, indolescent:

nec non horum tumor forâs prominet, non pressu, sed blando tactu perceptibilis, figuramque recti abdominis, musculi modo oblongam obtinet. MATHETES, Quomodo deprehendam, totumne mesenterium, an partem eius aliquam duntaxat, & quamnam tumor occupet, mollisque ne, an durus? GERON, Tactu. MATHETES, Quisnam humor in mesenterio abundare solet? GERON, Eum non tactu, sed notis, quas in iecore aut liene trademus, cognosces. MATHETES, Quod vitium præter tumorem mesenterium infestare solet? GERON, Inflammatio vera, cui intus quidem grauitas, nullus autem manifestus dolor adlit, nisi fortè grauius prematur. MATHETES, Qui alij casus illi molesti sunt? GERON, Nulli grauior, quàm leuis & lenta febricula, sine siti, alijsque incommodis: sic vt æger sub ea consueta vitæ munia obire possit. incipiente morbo, rubra quædam sanies: oborto deinde abscessu, pus album per aluum defluit, & vtrunque modò alui excrementis permixtum, modò sincerum, præcipuè si inflammatio versus extrema intestina tendat. Hoc genus puris à solo mesenterio ferri certum est: eò quòd ab alijs locis descendere citra dolorem, vel mixtionem, vel magnam febrim non potest.

MATHETES, Mesenterij, & aliarum ventris partium iam satis mihi explicasti, obseruande præceptor: miror cur nihil de iocinoris, & lienis affectibus hætenus docueris. GERON, Iam aggrediar, & quanto licebit compendio, absolua: tu autem diligenter aduertas. Vtrunq; viscus varij generis affectibus infestari solet, præcipuè duobus: scilicet nunc intemperie sola citra tumorem, nunc tumore simul cum intemperie commisto. Sed pri-

IECORIS IM-
becillitas.

us de iocinoris, postea de lienis vitijs agemus. Peculiare illius malum est, imbecillitas, quæ græcis νόσος ἡμειλιχός, hoc est, morbus iecorarius, & ægri, qui eo laborant, etiam hepatici, seu iecorarij nominantur: sicut stomachici, qui ventriculum habent imbecillum. MATHETES, Quæ ergo est affectio, iecoris imbecillitas? GERON, Quæ propriam ipsius facultatem adeò debilitat, vt succum, seu chylum ab intestinis attractum in sanguinem exactè conuèrttere immutareque non possit. MATHETES, Vnde noxa huius facultatis percipitur? GERON, Ex deiectionum specie, quæ carnis cruentæ, animalis recenter mactati loturæ, aut si mauis dicere aquoso sanguini respondet. Nam si excrementa feci sanguinis similia per aluum descendunt, & sanguis, qui excernitur, tum nigrior quàm naturalis, tum splendens apparuerit, vtpote sanguine, & nigra bile commixtus, quamuis iecur affectum esse conijciamus: tamen sanguinem ex eo torrerè indicium est. Qua de causa eius affectio humidam ventris deiectionem repræsentat, quæ ad ex-

Imbecilli iecoris
nota.

ctam

- etiam quidem concoctionem est perducta: non tamen commodè est distributa. Nam sicut venter ab illa omnino grauatus, cupit eandem excernere: sic iecur, vbi nutrimenti probe in ipsum distribui fructum coeperit, non diutius id apud se retineri sustinet.
- 5 Cùm autem illud rectè progredi vlla ex causa nequeat, necessariò ad ventrem iterum recurrit: eoque sanguis in eiusmodi affectione apparet: in qua iecur, non ipsummet, vt in superiori vitio affectum est, nec propria eius functio offensa: sed ob frustratam sanguinis distributionem multitudine eius grauatum, cùm diutius
- 10 retineri nequeat, retrò iterum ad ventrem, & ad intestina reuertitur. Huc succus qui ex ventre in iecur distributus est, peruenit, cùm ipse, eò quòd vltius non distribuatur, illic diutius subsistit. Porro huiusmodi excretio quibusdam difficultas intestinalium, siue dysenteria, aut cruenta deiectio, quæ ex iocinoris imbecillitate oritur: alijs hepatica dysenteria appellatur: interdum
- 15 pars aliqua affecta per ipsum iecur expurgatur: vbi vires eius præsertim expultricis facultatis robustiores euaserint, etiam dum integra constat valetudo: multitudine autem tantùm laborat: eoque sanguis sincerus ei similis excernitur, qui à mactata bestia proflu-
- 20 it, ac talis fluor per circuitum repetit. *MATHET.* Quomodo is accidere solet? *GERON.* Vel membro aliquo mutilato, vel vbi quis se post exercitationem otio commiserit, vel menstruis retentis. *MATHETES.* Quot igitur cruentæ istæ excretiones existunt? *GERON.* Tres. in primà iecur ipsummet, ac facultas eius oblata est,
- 25 ac cruentus humor per aluum deijcitur: qualis sanguis aqua mixtus, vel in qua caro victimæ recens mactatæ lota fuerit. In alijs duabus, aut iecur offensum non est, aut alterius facultatis noxam sustinet. in hoc malo homo sensim, ac spatio temporis minùs alitur, & decorem colorémque amittit: vnde iecur affectum esse
- 30 constat. *MATHETES.* In quo genere noxæ functionum, hæc iecoris imbecillitas consistit? *GERON.* In naturalium, nempe immutatricis: speciatim autem sanguificæ, eiusque non abolitæ, neque deprauatæ, sed diminutæ, ac imbecillæ. *MATHETES.* Quæ tandem huiusmodi iecoris imbecillitatem procreare solent? *GERON.*
- 35 Quæuis intemperies propriam iecoris carnem, quam græci *σπένδα*, id est, affusionem vocant, venasque, arterias, & materiem in spatijs earum contentam affligens. *MATHETES.* Quibus notis singulæ intemperaturæ dignosci possunt? *GERON.* Vbi calida intemperies quacunque ex causa proueniens iecur infestat, imbecillumque reddit: primùm humores colliquefunt: deinde ipsius
- 40 caro, & bilis crassa, sædi odoris, & valde tinæa per ventrem descendit: sicut in febribus pestilentibus accidit: nec non eadem af-

Hepatica dysenteria.

Fluor cruentus per circuitum repetens.

Imbecillitas iecoris.

Intemperies iecoris.

fat, aduritque tum humores, qui in ipso continentur, tum eas, qui per venas mesenterij deferuntur: adhæc fastidium cibi, maxime carnis vrget: quamvis inedia plurimum incommodet: ingens sitis excruciat, febrisque magna, ac vitiosorum humorum, sæpe etiam æruginosorum vomitus vexat: similesque deiectiones apparent: lingua scabra est: æger toto corpore, præsertim palmis, & pedum plantis calet. atque hæ partes etiam, si calori accedat siccitas, inarescunt: si humor, madescunt: iecur quasi colliquescit, & in cruentis sanies intabescit. Temporis processu, particulae admodum foetide ex ipsa iecoris carne tandem excernuntur. Quò hanc intemperiem firmitus dignoscere possis, ægri temperamentum, ætatem, anni tempus, & victus rationem antecedentem considerato. nam iocinorosi temperamento calidi, habituque tenui, & pilis densis præditi, nec non curis dediti, & animo sunt iracundi. **MATHESES,** Quibus signis imbecillitas iecoris ex frigida orta intemperie dignoscitur: **GERON,** Contrarijs. maior enim cibi cupiditas: sitis autem nulla: præsertim si illa quoque humida sit, in ea neque assiduæ alui deiectiones, neque multæ fiunt. quamvis autem iecur frigidior intemperie laboret: imbecillitas tamen diutius perseverat, aluiusque largius per dies aliquot profuit, quæ neque similiter foetet, utique ex calore est liquefacta: adhæc neque coloribus ita variat, aut coacta est: verum minus foetida est, & sanguinis putridi, non carnis colliquatæ speciem representat. interdum ipsa sanguinis nigri instar apparet. Sin autem diligentius consideres, neque sanguis ater est, neque grumus, sed veluti quidam crassi sanguinis limus: qui ferè ad atram bilem accedit. at plures colores ventris in tali affectione apparent, cibi que cupiditatem interdum amittunt: interdum multò maior quam antea adesse videtur: humores in iocinore contenti crassescunt, sic ut fluxui motuique refragentur. Quod autem ad ipsum fertur, tum pituitosum, tum crudum, tum semicoctum efficitur: ægrorum facies non collabitur, ac colorem decorémque amittit: febris languida incurfat: reliquum etiam corpus illorum, temperamentum que ad frigidam magis inclinare videtur: sicut antecedens victus ratio, vitæque otiosior: balnea frequentiora, & intempestiva, eaque secundum cibum indicant. **MATHESES,** Quæ ex sicca intemperie iecoris imbecillitatem natam esse ostendunt: **GERON,** Excrementa sicciora, simileque corpus, & tenuius: sitis magna: deiectiones alui modicæ, & crassiores. **MATHESES,** Quæ humidam intemperiem significant: **GERON,** Quòd nulla sitis, neque siccitas adsit, sed lingua potius humida: item quòd facies & totum corpus in pristino statu persistant: post hæc quòd plurimæ alui deiectiones

ctiones appareant, magisq; tenues, & aquosiores. *MATHESES*, *Humores intem-*
 Quomodo cognoscam, si humores in temperaturis accesserint? *perati.*

GERON, Id sit, vbi hæc diutius inhæserint: & si iecur calore labo-
 5 ret, bilis subinde vomitu, vel aluo excernitur: primum tenuis, ac
 pallida: deinde crassa, flaua, ac foetida: præterea os amarescit: fasti-
 dium & sitis vehementer vrget: nonnunquam etiam febris in-
 cursat intermittens ferè tertiana, vel incerta, vel si iecur ipsum ra-
 dicitus quoque vitiatum fuerit, lenta: propter quam corpus tem-
 poris spatio paulatim contabescit. *MATHESES*, Quæ frigidum *Frigidi.*

10 humorem simili intemperaturæ coniunctum esse notant? *GERON*,
 Aluus rara, & modica, foetoris expers, sinéq; varijs coloribus, & fe-
 bri tertiana, aut certè cum rara: corpus autè magis plenum quàm
 gracile, aliâque superioribus contraria signa testantur. *MATHE-*

Obsecro te honorate *GERON*, vt quæ de iocinorosis dixisti, bre-
 15 uiter repetas, vt accuratam eorum noticiam consequar. *GERON*,
 Primum facies in iocinorosis pallore quodâ decoloratur: aluus,
 si iecur minus quàm par est, attrahat, chyli seu cremoris instar, li-
 quida est: quamuis ventriculus, aut mesenterium nullo tunc vi-
 tio laboret, aliàs vix vlla concoctionis nota in deiectione apparet,

20 Quod si iecur humores ad se allatos non retineat, tunc varia, dif- *Retentio iecoris*
 ficiliâque symptomata incidere post alui deiectionem possunt. *vitiata.*
 per initia quidem alui deiectio, aquæ in qua carnes animalis nu-
 per mactati sunt elotæ, respondet: sincera scilicet atque leniter
 cruenta: tempore interposito, eadem pro varia iecoris intemperie

25 mutatur. Nam cum iecur plus satis calidum existit, sanguis foecu-
 lentus, crassusq; ex assatione, ac melancholia deficitur: postremo
 atrabilis etiam descendit. inter hæc totum corpus liquefcit, febris
 superuenit, fastidiumque cibi, & sitis: pulsus occurrit velox: vrina
 redditur biliosa. *MATHESES*. Quid si iecur absque calore infirmum

30 existat, eoque non probè retineat? *GERON*, Sanguinis limosi, ac *Retentionis vi-*
 veluti in grumos deiectio sequitur: non autem alsidua, neque co- *tiata signa.*
 piofa, sed diuersis coloribus tincta, & certis temporibus cumula-
 tior, non semper foedi admodum odoris: præsertim si malum diu-
 tius propagetur, & sine febris incipiat: quanquam languida ea in-

35 terdum, sanguine in viscere putrefacto, suboriatur. At iecur æ-
 tenuo siccius aluum crassiores, magisq; aridas: humidius, magis
 tenuem & dilutam efficit. *MATHESES*, Quæ ratione iocinorosa *Iocinorosa deie-*
 hæc deiectio, per quam cruenta excernuntur, à difficultate inte- *ctio, & dysente-*
 stinorum, seu torminibus distinguuntur? *GERON*, Facile. Nam *ria.*

40 in his sanguis cum dolore, rosione, & strigmentis sensim breui-
 bûsque interuallis, paucus excernitur. E contrario, si iecur humo-
 res malè retineat, cruenta sine dolore, sinéque ramentis, largius

autem & duobus, aut tribus interdum diebus interpositis descendunt. Sin autem sanguis vena intus rupra, aut ad aperta erumpat, is ferè purus ab inferioribus locis, leuiter nigrescens defluit: à superioribus autem partibus ater protinus, ac pici liquide simillimus, excernitur: qui in hoc ab atra bile dissidet, quod ipso tincto lintea rubescant: illa verò non item. At vbi sanguis ex grandiore membro mutilato, aut ex necessaria solitæque vacuatione suppressa, per aluum defluit, is sincerus purusque, & copiosus subito erumpit, & definit, sic vt longissimis temporum interuallis recurat. Porro sanguis ab vlcere iocinoris proueniens, paucus admodum est, & paulatim descendit, multo pure, virulento turbidoque infectus. Quinetiam lenis dolor circa iocinoris regionem in hoc affectu percipitur. adhæc omnia, alius saniosa, leniterque cruenta, quam iocinoris inflammatio peperit, proprijs signis internoscitur. Hoc pacto sanguinis deiectiones, quas paulò ante recensuimus, à iecorarijs hilce discernuntur. MATHESES, Alijs sine signis iecoris ista imbecillitas noscitur: GERON, Omnino. frequenter enim sanguis vel è naribus, vel ex vtero, vel ex hemorroidibus, vel cum sputo fertur. MATHESES, Estne similis quædam imbecillitas adhuc reliqua? GERON, Est alia etiam huc referenda: qualicet iecur probè attrahat, retineatque: imbecilliter tamen concoquit, & sanguinem imperfectè generat. MATHESES, Quem euentum morbi huius curatio habere solet? GERON, Si minùs diligentet adhibeatur, facile ægri intereunt. Quamprimùm igitur iecoris imbecillitas ex calida intemperie nata, curari debet. nam temporis spatium primùm humores, deinde etiam caro iocinoris colliquatur: nec non totum corpus absumitur. Similiter imbecillitati iecoris ex frigida intemperie contractæ maturius medendum est: quia vbi sanguis in viscere, temporis processu corruptus fuerit, febris oboriri consuevit, quam medici sæpe adeò negligunt, vt ægros interdum illius omnino expertes esse arbitrentur. Quod si morbus iste in vetustatem inciderit, & præsertim frigida intemperie augeatur, in malum corporis habitum, & aquam subter cutem commutatur. Quod si atra bilis prius deijci incæperit, quàm vitium hoc nascatur: ægri vita in præcipiti esse dicitur. Quando, sub hoc modo cibus non benè concoquitur, humorum cruditates oriuntur: deinde pedes, mox reliquum corpus intumescit. MATHESES, Quibus hoc vitium frequentius incidere solet? GERON, Illis, qui à morbis vel grauius, vel longius conualescunt, aut quibus aqua inter cutem instat, aut quos durus iecoris, aut lienis tumor, aut morbus regius obsidet. MATHESES, Quibus alijs morbis iecur laborare solet?

GERON,

Imbecillitas iecoris in concoquendo.

Imbecillitati iecoris qui obnoxij.

- GERON, Inflammatione, sicut etiam reliquæ omnes corpo-
ris nostri partes. verum in iecore propriè *ἡπείτης*, in alijs partibus
communiter *φλεγμονή* appelletur. ea sit vtrinque ex sanguinis co-
piofioris quam conuenit, influxu. MATHETES, Quomodo? GE-
 5 RON, Cum sanguis ipse è venis immoderatius, vel ob copiam, vel
ob tenuitatem, vel ob feruorem, & acrimoniam, vel ob exterior-
res causas erumpens in iecur ipsum cumulatior abscedit, tunc ex-
tra propria vasa putrescit, inflammaturque, nec non carnosam vi-
sceris partem simul eo imbutam labefactat, corrumpitque: vnde
 10 sinus plærunque excauatur. Sanguis igitur primum in puridam
saniem conuertitur: atque hinc fit inflammatio: illa deinde natui
caloris adiumento in pus degenerat: huius ipsius congeries ab-
scessus vocatur. Vbi tandem idem ipsum erumpit, vlcus cauum
& sordidum manet. atque sic multa vitia ex vna origine proueni-
 15 unt. MATHETES, Quæ inflammationem indicant? GERON, Dex-
tra parte sub præcordijs vehemens dolor est, præsertim cum ea
regio attingitur, idemque ad latus dextrum, & ad iugulum, hu-
merumque partis eiusdem peruenit, idque ob inclusam materiæ
colluuiem: quæ membranam costas succingentem affligit. Simi-
 20 liter grauitas in dextro latere sentitur, & cum spiritus magis tra-
hitur, vehementius excruciat, tussis exigua, eaque sicca vexat:
qua nihil excreatur. Notandum autem iecoris inflammationem,
ab ea, quæ latera infestat, græcis *πleuritis* dicta, tum hisce notis,
tum doloris situ dissidere. febris ardens & acuta ex inflammatio-
 25 ne gignitur: sitis implacabilis, lingua scabra, lentæque pituita ei
inhærens, initio quidem flaua, postea verò nigricans. adhæc nau-
sea, & cibi fastidium molestat: aliquando singultus ferè strangu-
lans, corpus vt in regio morbo coloratur: vrinæ crassæ, subrubræ,
turbidæque apparent: insuper vomitio sinceræ bilis, nunc luteæ,
 30 nunc æruginosæ: sæpe talis etiam deiectio vrget, quæ nonnun-
quam aut ventris fluxum, aut tormina inducit. Quod si inflam-
matio erysipelacea fuerit, febris superuenit, ardor, vomitio, aliæ-
que grauiora incommoda sequuntur, ac tandem corpus marcore
consumitur. atque hæc generatim omni inflammationi eueni-
 35 unt. Si verò sigillatim caua iecoris regio magis inflammetur, nau-
sea, cibi fastidium, bilis vomitus, aut deiectio vehementius excru-
ciat. ægri difficilius in sinistrum latus decumbunt: & tumorem
iecoris inflammati manu contingente vix deprehendunt. Rur-
sus, si gibba potius iecoris pars inflammationem experiatur, spi-
 40 ritus ægrè trahitur, tussis dolorque infestat grauis, qui iugulum
ad partes inferiores detrahat. In dextro latere difficilis est decubi-
tus, quia illud affectum premitur: & cum attingitur, premiturque,

Inflammationis
& pleuritidis
ferentia.Inflammationis
erysipelaceæ
signa.

Magne inflam-
mationis, & exi-
gue indicia.

dolor magis intenditur: tumor facilè percipitur, vt qui nonnunquam promineat, pateatque oculis. Cum magna est inflammatio, omnes istæ notæ euidentes apparent: cum autem exigua, obscuræ sunt, & latentes. Non rarò enim accidit, vt iecur tuberculis, & abscessibus, tanquam furunculis occupetur: sic vt nullus præcordijs dolor adsit: nullusque tumor extet: æger in neutro latere difficultatem decubitus sentiat: febris autem duntaxat, non tamen admodum ardente, nec non siti, cibi fastidio, biliosòque alui profluuiò diuturniore laboret. Atque hæc de iecoris ipsius inflammatione satis. Quia verò interdum etiam musculi, qui visceri illi incumbunt, inflammari solent, ita vt sæpe medici nonnulli iecur ipsum affici putent, cum illi potiùs laborent: operæ pretium videtur, vt vtrarumque partium affectuum signa cognoscas. Iecoris igitur inflammati tumor rotundus apparet, & pro decubitus ratione variat. Cum enim corpus in sinistrum latus inclinat, maior existit: cum autem in dextrum, minor: eò quòd iecur sub costas spurias cedat, neque conspectui, neque tactui occurrens. adhæc in iecoris inflammatione cutis ei incumbens, naturaliter habere consuevit: musculis autem illam expertis hæc circumtenditur, vt si digitis eam apprehensam attrahere coneris, non sublequatur. Siue autem inflammatio in imo, siue per summa consistat, tactu accuratissimè discernere licebit. Rectorum musculorum tumores nature contrarij, oblongi, & per totum ventrem extensi videntur, sic vt vmbilicum comprehendant. Qua de causa illi facile dignoscuntur, tum situ, tum figura, tum quòd nullo exteriore musculo contegantur. hæc signa etiam obliquis musculis, qui à thorace descendunt, communia sunt. at eorum, qui his sunt subiecti, notitia longè est difficilior: transuersorum autem difficillima. Iecoris igitur inflammatio, cum id intra hos musculos sub peritonæo situm sit, tribusque contegatur musculis, certè tactu cognosci non potest: nisi illa magna existat, aut musculi, qui ei incumbunt, sint extenuati. Quare gibbæ eius partis inflammatio, præcipue ingens, perfacilè, vel solo tactu dignosci potest. ea namque à musculorum tumoribus propriè discrepat, quòd moles sub manibus desinat, vel etiam soli iocinori peculiare est, vt vniuerso tumore circumscribatur. at cum quiuis musculus totus sibi sit continuus, inflammationis ipsius tumor paulatim imminuitur. Porro cauæ iecoris partis inflammatio non tactu, sed alijs symptomatis inuestigari debet. num autem caua iecoris regio, an gibba inflammata sit, hoc modo dignosces: illam namque nausea, cibi fastidium, biliosus vomitus, ingensque sitis comitatur: hanc verò maior quàm illam dolor inter spirandum torquet, maiorque tussis

Cauæ iecoris partis inflammatio quomodo deprehendatur.

- tulsis vrget, ac dolor ad dextræ partis iugulum pertingit, adeò vt hoc detrahi videatur: quanquam inflammatio exquisitè distincta, in neutra parte consistere possit: eò quòd omnes vtriusque partes sibi inuicem continuentur. **MATHESES**, Quæ iecoris inflammationis causa existit? **GERON**, Sanguis optimus, mediocriter crassus, & copiosior, quàm natura desideret. **MATHESES**, Quid de affectu isto præfagiendum putas? **GERON**, Singultus ei succedens, malum portendit. hic enim non semper iecoris inflammationem comitatur, sed cum ea magis inualescit, feruescitque.
- 10 os ventriculi in hoc feruore consortij lege afficitur: interdum neruorum consensus gratia. **MATHESES**, Quando os ventriculi iecori condolefcit? **GERON**, Tunc solum, cum inflammatio magna, & ampla, & periculosa fuerit: nonnunquam etiam ex bile multum calida, copiosaque, in visceris huius inflammationibus
- 15 procreata. dum enim hæc ad intestinorum initium confluit largior, recurritque ad ventriculum, os eius rodere consuevit, eoque singultum excitare, nonnulli ventriculum ex magnitudine inflammationis premi, ac singultire, dum status non habent exitum, arbitrantur. Quacunque autem ex causa singultus fiat, sem-
- 20 per ob iecoris inflammationem periculum denunciat. idem etiam indicat febris vehemens, & acuta: quæ iecoris inflammationem sequitur. hæc enim idem viscus valdè inflammatum esse demonstrat, sicut ea ipsa, vbi exigua, & non acuta fuerit, minus malum præfagit: eò quòd paruam quoque inflammationem esse testetur. quia febris perpetuò inflammationum magnitudinem,
- 25 pro eius portione subsequitur. At si eadem febris valdè acuta, ac vehemens extiterit, magnaque siti ægros excruciet; nihil boni sperandum erit: quia inflammationem erysipelaceam, aut ipsum erysipelas iocinori obortum demonstrabit. tales nanque febres
- 30 magna ex parte in tabem degenerant: & si ista insignior in corpore valdè calido, & sicco generetur, æger omnino interibit, eò quòd viribus sit imbecillis. Harum nanque virium robur tum his, tum pleuriticis, tum peripneumoniacis, tum anginam, tum ventriculi inflammationem expertis vnam salutem adfert. **MATHESES**, Quæ nota putridam iam saniem ex inflammatione iecoris in pus, seu abscessum conuerti indicant? **GERON**, Dolores, febres, & reliqua symptomata valentiùs inuadunt: ægros sæpe inordinati, citràque rationem affligunt. omnia verò, vbi pus est confectum, remittunt: vires autem ægrorum multò imbecilliores relinquuntur: pulsus paruus, frequens, & languidus, crebrâque animi defectio. At cum pus rupto abscessu erumpit, cor virulento ipsius vapore inficitur: qui sæpe egrum cum graui defectio-

Inflammationis causa.

Præfagia de inflammatione iecore.

Singultus noxius in iecoris inflammatione.

Inflammatio erysipelacea.

Inflammationis in abscessum conuersæ signa.

ne animi è medio tollit. Quòd si exiguus abscessus existat, virèscit egri satis consent, pus vomitu interdum erumpit, aut per aluum urinàsque profluit: nonnunquam iecoris caro fissà, vel exesa, sicut etiam hydropicorum aqua in abdominis sinum elabitur.

*Pleus abscessus
quid minetur.*

MATHE T. Quid vlcus ex abscessu contractum minatur? GERON, 9
Quia nutrimento continuè irrigatur, multàque colluviè fordescit, nunquam potest conlescere. Cum enim iecur ipsum ex solida seminaria materia constet, non magis quàm pulmo restitui potest. Quia igitur sanguis non probè conficitur, corpus nostrum non sentit alimentum: sed planè contabescit, aluiúsque putrida, faniosa, & interdum cruenta, & sæpiùs cadaueris liquati instar deijcitur. Vrina quoque sanie perfusa redditur: aut si ea in abdominis spatia subeat, difficillimus omnium hydrops generatur: qui & inguinum pubisque gravitate, & insigni tumore manifestatur, modò vires tam diu persistant: quod rarissimè accidit. MATHE T. 15
Quid huic iecoris vitio proximum est?

*OBSTRV-
ctio iecoris quo-
modo fiat.*

GERON, Obstructio, qua nullum viscus magis quàm illud laborare solet: græcis ἐμφραξις dicitur. ea verò in hunc modum fieri solet. Venæ, quæ ab imè ventriculi partis, & summi intestini iunctura, quæ πλωρος græcè appellatur, tenuissimis propagini- 20
bus in cauiam iecoris partem vniuersam disperguntur: sæpius alimento, quod per eas transit, crassiore in iecore obillarum angustiam obstruitur. non solùm autem hæ venæ, sed etiam arteriæ, materia quadam tum humoris, tum spiritus flatuosi obstruuntur: non autem propria eius caro, quam πηγύρμα appellauit. MAT- 25
THETES, Quæ pars in hoc vitio affligitur? GERON, Extreme vasorum, quas iam dixi, partes, non spatia ac sinus illi, qui in reliquis partibus inueniuntur. Sic igitur iecur in hoc affectu laborat, quòd alimentum per venas & arterias in corpus vniuersum distri- 30
buere nequeat. MATHE TES, Quomodo obstructum illud rectè cognoscitur? GERON, Situ, & dolore, eiusque etiam natura. nam egri in dextris præcordiis gravitate indolescent, eaque tanquam suspensa videntur: quamuis dolor interdum sit obscurior: interdum euidentior, idque modò cum febris, vbi affectus est grandior longiorque: modò absque febris, cum est recentior, leuior- 35
que. Fit ergò hoc vitium, cum meatus vasorum iecoris obstructi infarctique fuerint adeò, vt alimentum siue sanguis per totum corpus, vel nullo prorsus modo, vel minùs integrè distribui- 40
queat. MATHE TES, Ex qua materia hæc affectio generatur? GERON, Ex humoribus crassis, viscosis, aut spiritibus flatulentis, qui 40
bus non patet exitus. MATHE TES, Quæ vnquamque obstructi-
onem indicant? GERON, Ex crassis, viscosis, & flatulentis con-

Pars lesa.

*Obstructi iecoris
notæ.*

*Obstructionis ma-
teria.*

*Obstructionum
notæ.*

tractam.

tractam, grauitas & distentio, idque in dextra præcordiorum parte, sine tumore, sinéque feбри. tunc autem grauitas distentió-
que manifestè apparet, cùm quis statim à cibo exercetur, aut bal-
neis vtitur. **MATHETES**, Fiuntne obstructions etiam ex alijs cau-
5 sis, quàm duabus prioribus? **GERON**, Indubiè ex calidis quoque
copiosis succis, ijsque non solum in iecore, sed in reliquis quoque
partibus. nam iecur sæpe etiam ob materiæ ipsum permeantis co-
piam, seu principem causam obstruitur: quippe copiosior, cùm
ex toto simul confluit, non minùs quàm viscosa, & crassa obstru-
10 endo interdum herescit, infigiturque: & si per meatus angustos tran-
sit, multò certè magis retinetur, eò quòd copiosior materia, quam
uis non sit viscosa, & crassa, ipsius obstructions generare possit.
MATHETES, Vnde materia obstructionum provenit? **GERON**, *Materia obstru-*
Cùm aliunde, tum ex cerebro: quæ vbi iam ad ventriculum def- *ctionis, unde pro-*
15 cenderit, eumque permearit, in tenues iecoris venas cùm alimen-
to penetrat, illasque obstruit. Idem etiam efficit cibus crassus, vi-
scosus, & copiosus: cùm statim ab eo assumpto, balnea, aut motus
vehementiores succedunt. hinc enim ille in venas tenues rapí-
tur, aut impellitur, sicut etiam bilis flaua, quæ in iocinore contra
20 naturam diutius coacta retentaque crassescit plurimum, graués-
que, & valde periculosas iecoris obstructions inducit. Sub hoc
vitio malus faciei color: spiritus interdum non facile trahitur,
præsertim cùm æger inambulat, altiorémque locum ascendere
contendit: vrina tenuis, diluta, & aquosa est: aluus, si caua iocino-
25 ris pars obstructione laboret, chyli seu cremoris modo liquida,
copiosaque: nonnunquam etiam cruenta: si gibba regio obstru-
cta est: aluus coacta siccaque est: si vitium vtraque parte hæret, al-
uus modò dura, modò liquida est. **MATHETES**, Quæ in obstru-
ctionibus finiendis obseruari debent? *Prognostica.*
30 **GERON**, Multi graues ca-
sus superuenientes, nempe vel inflammatio, vel durus doloris ex
pers tumor, vel hydrops, vel febris, vel alimenti penuria, vel alui
fluxus. Porro quælibet siue iocinoris, siue alterius cuiusdam mem-
bri obstructio inueterata, putredinem excitat, febremque accendit.

Ex hoc, quandoque tumor durus, quandoque etiam sensus
53 expers provenit: quem græci σκίρρον, aliàs σκληρόν, vel σκληράμω Nun-
cupant. is tumor iecoris situ & figura circumscriptus tangenti
semper renititur, doloris, nisi durius prematur, expers: ac du-
plex eius est differentia: prior exquisitus scirrhus vocatur, tumor
naturæ contrarius, insensilis, durusque: alter, non exquisitus: qui
40 licet non omnino sensu careat, difficulter tamen percipitur. Præ-
ter hos tumores scirrhosos adhuc extant, qui vbi plurimum in-
creuerint, indurati que fuerint, non solum dolore, sed etiam sensu

*SCIRRHVS
iecoris.*

*Scirbi differen-
tia.*

*Scirrbus in hy-
drope non est ma-
nifestus.*

*Exteriores scir-
bi nota.*

*Scirrbus sub quo
genere morbo-
rum sit.*

Causa.

*Prophagia de scir-
rho.*

carent, aut certe exiguum habent. Iecur scirrhus obductum eu-
dentiùs apparet, quàm inflammatione obsessum: idèq; idèd, quòd
moles eius magis dura sit, & partes, quæ ei incumbunt, in hoc af-
fectu extenuatæ. Quia verò scirrhi tumor, licet temporis proces-
su magis augetur: non tamen faciliè tactu dignoscitur, dum aqua
inter cutem, quæ statim scirrhus succedit, sensum impedit. adhæc
iecur sub scirrhus multò minùs, quàm sub inflammatione dolet.
MATHETES, Quæ notæ exteriores in vniuerso corpore apparent,
in quo iecur scirrhus afficitur? GERON, Nigredo, pallorque mix-
tus: venter & pedes intumescunt: superiores partes extenuatæ
sunt: aluus quandoque copiosa, & tenuis est: eò quòd ora vaso-
rum, per quæ cibus ex cauis iecoris partibus in gibbas transfer-
tur, admodum sint coarctata: vrina ab initio quidem multa: vbi
autem ægri in aquam subter cutem inciderint, pauca existit. MATHETES,
Sub quo genere morborum hoc vitium comprehenditur?
GERON, Primum sub tumoribus naturæ modum egressis:
deinde sub intemperie: tertio sub vnionis diuortio. MATHETES,
Quæ morbi istius causa existit? GERON, Humor viscosus crassus-
que induratis partibus contumaciter infixus: qui aliàs statim per
initia colligitur, & paulatim augetur: sæpiùs autem gignitur, vbi
medici imperitiores erysipelata, & inflammationes nimium astrin-
gunt refrigerantque. Id autem omnibus scirrhis commune est, vt
quacunque ex causa oriri dicantur, semper tamen ex frigido, &
crasso humore, hoc est, ex bile atra pituitaque nimis exiccata pro-
ueniant, eò quòd tumores scirrhusi materiæ omninò aut pituitosa
sæ, aut melancholica, aut ex vtraque mixta, serantur accepti. Quia
igitur scirrhi, aut tumores scirrhusi, ex frigidi humoris multitudi-
ne, frigorisque simul vehementia gignuntur, profectò, aut nullus
planè sensus, ac doloris, vel certè exigui participes existunt.
MATHETES, Quomodo diuersæ scirrhi causæ internosci possunt?
GERON, Si ex atrabile, quæ veluti sanguinis sæx est, scirrhus exci-
tatus fuerit, corpus vniuersum nigrius apparet: sin ex crassa len-
taque pituita, albidius: interdum veluti plumbeum colorem ha-
bet. Quali nanque colore alimentum corporis tinctum fuerit, sic
etiam hoc coloratur. non solùm autem vniuersi corporis color
morbi causam indicat, sed etiam ægri temperamentum, ætas, re-
gio, anni tempus, ac antecedens victus ratio. MATHETES, Quid
de scirrhis curandis spei habendum putas? GERON, Qui iecur, aut
alias partes obsident, omnes sunt insanabiles. quanquam per ini-
tia Galenus se curasse, inueteratum autem, nec se, nec alios vn-
quam sanasse prodiderit: eò quòd pleròsque omnes sic affectos,
aqua inter cutem necessariò insequatur. Quàm plurimi inter istos,
longo

- longo tempore interposito: quidam etiam breui intereunt, qui ventris fluxu laborant. At qui scirrhusi iecoris tumores curari, præsertim inter eorum initia, rectè poterunt, si ratione medendi, musculosarum partium scirrhis accommoda, discutiuntur. MATHETES, Infestantne iecur etiam alij tumores, præterquam scirrhus, de quo iam mentionem fecisti? GERON, Duo præterea, ex quibus vnus plærunque magnus iecur distendit: atque isdem notis, quibus scirrhus agnoscitur, nisi quod minus tangendi renitatur, & breuiore tempore prouenerit. MATHETES, Quas iecoris partes obsidet? GERON, Membranas illud ambientes: tactu facile deprehenditur. Tantus enim plærunque apparet, vt tota præcordia repleat: vnde neque costæ extremæ percipi, neque digiti sub his infigi possint, neque vlla iecoris figura, aut circumscriptio sit conspicua. MATHETES, Vnde eiusmodi tumor oritur? 15 GERON, Aliquando à flatu, aut à tenui humore crudo, quem vel immodica frigidæ potio, vel intempestiuus fructuum vsus, vel nimia crapula, & satietas contraxit, atque hic grauitatis, non densitatis sensu percipitur, & breuiore tempore quàm scirrhus gignitur: aliquando idem tumor à crasso lentoque humore, nunc bilioso, nunc pituitoso excitatur: quem iecur robustum à se propellens, in membranas proprias ipsum ambientes deponit. Is etiam magis quàm scirrhus tangenti renititur, molèque sua illum premit, & non nisi longo tempore tum congeri, tum discuti potest. Alter ille tumor sub præcordijs subsistit, abdominis musculis insertus, rarus, & insolens: qui leni blandoque tactu potius, quàm compressione deprehenditur, vt qui foràs promineat, figuram rectorum abdominis musculorum modò oblongam sortitus.

MATHETES, Quæ deinceps vitia sequuntur? GERON, *ARQUATUS.*
sive morbus re-
gius.

- Quæ ex viscerum, tum iecoris, tum lienis excrementis, siue totum suppressis, siue parum ritè separatis contrahuntur. MATHETES, Quomodo appellantur? GERON, Quædam proprio nomine carent: quædam vulgari nuncupantur: latinis quidam arquatus, vel regius morbus, vel aurigo: græcis autem *ισχερος*. MATHETES, Quando generatur hæc affectio? GERON, Cum excretria iecoris, ac vesiculæ fellis ei appensæ facultas humorem biliosum ad sedes proprias propellere nequit: vnde icterus semper in eorum genere subsistit, quæ interioris corporis vitij euenire solent. MATHETES, Quæ partes corporis in hoc malo afficiuntur? GERON, Iecur ipsum, vesicula fellis, & corpus vniuersum. MATHETES, Quot arquati species sunt, & quibus ex causis nascuntur? GERON, Variæ: ac simplex sanè, quæ frequentius incidit, ex iecoris, aut ex vesiculæ fellis illi appensæ vitio gignitur. Cum enim bilis copio-

sior in calido nimium iecore oritur, quàm ipsa tota è vesicula expurgari possit, eadem redundans in corpus vndiquaque erumpit. atque dum ipse cum sanguine, vel eius sero in extimam corporis partem fertur, ipsam inficit: quinetiam eadem cùm in iecore plenius colligitur, molem eius ampliorem reddit, in tumorémq; tactu conspicuum attollit: deinde spatio temporis crassescens, durescensque non modò meatus, per quos educi deberet, obstruit: sed etiam iecoris scirrhum renitentem duramque efficit: cui ferè hydrops succedit. MATHEſ, Vnde aliæ Arquati species proueniunt: GERON, Vel ex obstructione meatuum ad vesiculam fellis ostendentium: vel ex inflammatione iecoris: cuius vi & incendio maxima sanguinis portio in bilem vertitur, & vndiquaque in totum corpus distribuitur: vel ex virulentarum bestiarum ictibus: aut ex venenis potis: quorum efficacia totus sanguis corrumpitur, omniâque membra penetrat, & cutim luteo colore contaminat: vel denique ex febrium biliosarum crisi, per quam natura noxiam illarum materiam ex alto corpore in extima forâs propellit.

Arquati notæ.

MATHEſ, Quales sunt arquati notæ: GERON, Partim communes, partim propriæ. communes quidem omnibus eius speciebus sunt, flauus vel pallidus totius cutis color, maximè oculorum: in quibus quod album esse debet, fit luteum, solétque accedere & sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & præcordiorum in dextra parte durities. & vbi corporis vehemens motus est, spiritus difficultas, membrorum resolutio. quando morbus manet diutiùs, totum corpus, præsertim facies, tempora, & malæ cum pallore quodam inallescunt. Hoc etiam omnibus Arquaticis commune est, quòd mens eorum hebetetur, & vanis imaginibus addicta sit, corpusque moueri pigeat, & grauitas in præcordijs dextris sentiatur: dulcium elus, ingrator: amarorum gravior: venæ sub lingua tument: tota cutis prurit: corpus ægrè sudat. Peculiares autem notæ sunt: primùm eius, qui ex iecoris, fellisque vesiculæ offensione contractus est, quòd aut nulla, aut admodum lenta febris ei adsit: & quamuis vrinæ turbidæ, crassæ, ruffæque existant, deiectiones tamen albicent: eò quòd multa bilis ex vesicula fellis, atque etiam ex iocinore in aluum deferatur. Eius autem arquati, qui ex obstructione meatuum ad vesiculam fellis pertinentium natus est, signa sunt: quòd hominem repentè adoriatur, sine febris, sineque magna corporis, aut virium defectione: item quòd alui deiectiones albicent: quia bilis, ne intestinis incidat, impeditur: stercus exiguum, & leuiter viscosum, paulatim descendit, idque crebra desidendi cupiditate: vrinæ crassescunt, rubentque adeò, vt ferè nigrescant: grauitas in dextris præcordijs sine manifesto

*Notæ peculiares
arquati.*

festo tumore percipitur. at in illo Arquato, qui ex inflammatione
 procreatus est, vehemens ardēnsque febris superuenit: dolor, gra-
 uitasque dextra præcordia exercet: alui deiectiones, & urinæ bi-
 liosæ apparent: iecorisque inflammati signa comitantur. atq; hic
 5 quidem rariùs incidit, nec omninò simplex est. Porro eius Arqua-
 ti, qui ex bestiarum, vt vipere, & similiū, aut ex veneni potu pro-
 uenit, indicium est, quòd euident causa antecesserit: color subitò
 aut breui mutatus sit, nullaque febris affligat. *MATHESES*, Quæ
 indicant Arquatum ex crisi factum? *GERON*, Quòd hic repente
 10 nascatur, febrimque finiat, nec tamen cum illa desinat, sed diutius
 aliquando protrahatur: urinæ & alui excrementa naturaliter re-
 spondeant. *MATHESES*, Quid in hoc morbo regio curando, spei,
 aut periculi prædici potest? *GERON*, Quibus in febribus ille se-
 ptimo, aut nono, aut vndecimo, aut quarto decimo superuenit,
 15 sanitatem futuram ostendit: nisi dextra præcordia induruerint.
 sin ante septimum obuenerit, perniciem: eò quòd natura bilem
 citiùs critica ratione in corpus perducere nequeat. imò neq; post
 septimum, si iecur inflammatione, aut obstructione laboret, peri-
 culo vacabit. Longè autem is est periculosior Arquatus, qui ex
 20 iecore prius indurato prouenerit.

Prælagia.

ol.

MATHESES, Quis Arquatus niger est? *GERON*, Sicut verus *ICTERVS*, seu
 arquatus flauæ bilis, ita hic atræ, seu humoris melancholici in
 summam corporis cutem est effusio, quæ græcis *ἰκτερός μέλας*, seu
μελανοχλωρός dicitur. *MATHESES*, Qua ratione is efficitur? *GERON*, *Icterus quomodo*
 25 Crassius iecoris excrementum, aut parum commodè, aut ne-
 fiat.
 quaquam à sanguine separatur secerniturque: atque id trifariam
 fieri solet. primum, cūm lienis infirmior factus, crassiore, excre-
 mentitiâque sanguinis partem, ex iecore ad se nequit attrahere.
 30 secundò, cūm lienis meatus, tum hi, per quos excrementum istud
 allici, tum illi, per quos ipsum educi solet, obstructi sunt. tertio,
 cūm maior excrementi est copia, quàm vt tota perpurgari possit.
 Ea igitur de causa sub hoc affectu, corpus totum nigro colore,
 aut albo pallido, aut plumbeo, aut fusco, aut alio, atque alio simili
 inficitur. Quamuis autem huiusmodi colores ex iecoris vitio ge-
 35 gerentur, tamen ob lienis etiam affectum iidem multò nigriores
 sunt. Non solum autem colores Arquatum nigrum indicant, sed
 etiam in sinistris præcordijs grauitas, aut distentiò, aut subdurus
 nonnunquam tumor. At in hoc Arquato corpus quidem minùs
 graue, quàm in altero percipitur: animus autem in agnibus me-
 40 rus & tristitiæ plenis magis perturbatur: sic vt ægri, quando se
 conuertunt, aliquid in parte affecta conuelli opinentur. iidem e-
 tiam oris ventriculi rosionem sentiunt: difficulter spirant: nausea

Arquati nigri
signa.

laborant: interdum leuiter ipsi per interualla quædam caleſcunt: vrina, & alui deiectione modò naturaliter ſe habent, modò ſubnigræ apparent: aluius tamen ſæpius aſtringitur. **MATHESES**, Quid ergò verè eſt Arquatus niger? **GERON**, Symptoma etiam, vt flauus, ex eorum genere, quæ in vniuerſo corpore conſpiciuntur. **MATHESES**, Quæ cauſa illius eſſe dicitur? **GERON**, Humor melancholicus: qui cum ſanguine in totum corpus effunditur: lienis imbecillitas, vel meatuum ipſius obſtructio, vel excrementi craſſi copia. **MATHESES**, Quæ ſingulas has cauſas indicant? **GERON**, Humorem, color niger: viſceris obſtructionem, eiùſque meatuum, grauitas in præcordiis ſiniſtris, diſtentio, & dolor. ſi nihil ex his apparuerit, attrahendi facultatis imbecillitas nunciatur, atque hæc ex quauis intemperie tum ſimplici, tum compoſita contrahitur. **MATHESES** Vnde intemperies lienis dignoſcitur? **GERON**, Ex cibo, potu, & iis, quæ cuticulæ iuxta ſiniſtri præcordia admoventur, nam frigida intemperies ex cibo, potionibus, externiſque remedijs valdè refrigerantibus augetur: & lien magis euidenter offenditur: à calidis omnibus iuuatur. **MATHESES**, Quibus notis Arquatus niger ex inflammatione, ſeu ſcirrho natus indicari poterit? **GERON**, Eorum proprijs, de quibus poſtea. Quia verò affectus hic non minùs, quàm verus Arquatus, ex eiùſdem excrementi copioſi vitio generari poteſt, etiam ſi lien nullo peculiari morbo laboret, cognoſcendum id quoque arbitror: quod facile poteris, ſi nunc aliquid ex prædictis ſignis, lienis affectui demonſtrando idoneis, adſit: & idem totius corporis color admodum nigricet. **MATHESES**, Cum excrementi huius copia à duabus cauſis, nempe iecoris intemperie, & ciborum vitioſitate gigni poſſit, vnde diſtinguere id licebit? **GERON**, Ex iis, quæ antecceſſerunt, ſic vt ægrum, aut ei familiares interroges, num cibus ac potionibus melancholicis uſus fuerit, nec ne. vbi enim talis victus ratio præceſſerit, quæ humorem craſſum, & natura ſæculentum procreare poteſt, inde morbum regium atrum proueniſſe cenſebis. ſi verò nulla talis alimenti ſpecies aſſumpta fuerit, iecoris autem frigidi & ſicci notæ apparuerint, quæ id affectum eſſe denuncient, eidem ipſi quòd excremento tali generando ſit accommodum, tanquam auctori aſcribes. **MATHESES**, Quæ ſigna extant, vbi morbus hic Arquatus ex vtriuſque viſceris, tum iecoris, tum lienis vitio excitatus fuerit? **GERON**, Color nigrior, quàm pro conſuetudine veri morbi regij, ſed vt flaua bilis fuligini permixta videatur. Porro lienis nunquam flauum arquatum parit: iecur ſæpe nigrum: quam hic non æque nigricet, vt ille, qui ex liene affecto oritur. **MATHESES**, Quæ de iſto præſagire licet? **GERON**, Quia ſuperiore grauior

gravior est, magisque inueterascit, nullis remedijs idoneis quauis commodè adhibitis, cedit: & quacunque ex causa inceperit, iecore consentiente, hydropis periculum minatur: præcipuè, si vrina prorsus alba, aut certè multum diluta diu feratur. Quinetiam calculus niger in fellis vesicula concretus, sub hoc affectu periculosus est. Quod si in eo malo hæmorrhoides fluere inceperint, securitatem portendunt. sin inflatio quoque huic vitio aderit, metum parit, maximè si curationibus non discutiatur. Nimia etiam vigilia in hoc morbo tuta non est, neque amissa cibi cupiditas, aut lingua resoluta adeò, vt æger loquelam exprimere nequeat. grauius est delirium, si interuenerit. postremò febris vtrique Arquato superueniens, perniciosa est, modò præcordia quoque dura permaneant.

Inflatio lienis.

MATHEſ, Quibus alijs morbis lien conflictatur? GERON, LIENIS inflammatio. *Inflammationis notæ.*
 15 Inflammatione, licet rariùs quàm cætera viscera. MATHEſ, Quæ hanc adesse notant? GERON, In sinistris præcordijs dolor, feruor cum febris continua ac vehementi, & siti: item lingua subnigra, humoris lentore grauata, spiritus difficilis, cibi fastidium, & distentio: nec non tumor durior, qui faciliè tactu deprehendetur, maximè temporis processu. nam per initia, dum humor adhuc fluit, ille humidior apparet. MATHEſ, Cur in liene maior durities tumoris, quàm in iecore inflammato percipitur? GERON,

Primùm, quia ille tali quoque sanguine, non autem optimo, & mediocri nutritur: deinde, quia etiam rariùs ex huiusmodi, sed
 25 frequentius ex crasso, limoso, & fæculento inflammatur, qui faciliè, & promptè durescit. Qua de causa, vbi inflammatio sortè ex sanguine optimo, vel bilioso fuerit excitata, non difficulter ex temperamento, ætate, habitu, anni tempore, & victus ratione dignosci poterit. MATHEſ, Quæ sunt de liene inflammato præ-
 30 sagia? GERON, Quod si in hoc affectu sanguis è nare sinistra, tanquam è directo profluat, multum inde commodi accidet. si parum in eo curando laboris ac diligentia adhibeatur, non modò praua insequentur symptomata, sed etiam temporis interuallo interitus, maximè si illa in scirrhum conuertatur.

MATHEſ, Quid est lienis scirrhus? GERON, Tumor in SCIRRHVS lienis quid.
 35 sinistris præcordijs, vt antea dixi, induratus: cui ille vt iecur maximè est opportunus. quanquam hic rariore natura præditus, magis quàm iecur, scirrholis vitijs ob alimenti speciem sit obnoxius. Porro qui eiusmodi indurato lienis tumore laborant, propriè lienosi, aut splenetici nominantur. MATHEſ, Quæ indicia sunt scirrhi lienis? GERON, Nigrior totius corporis color: sinistra præcordiorum pars tumida, duraque, prementi renitens,

Scirrhi lienis signa.

venter intentus, grauis oris foetor, gingiuæ exese, vlcera crurum, quæ aut non sanescunt, aut vix cicatricem recipiunt: in ambulatione intensa, cursuque, & cubando in dextrum latus dolor, & quædam spiritus difficultas, ac frequentia: cibi ferè cupiditas manet, sed malè idem concoquitur, & in ventre fluctuat: multa ex ore salua defluit: sinistra præcordia murmurant: flatus supra infraque erumpunt plurimi. MATHETES, Ex quibus causis lienis scirrhus oritur? GERON, Non ex alijs quàm iecoris. atque duo sunt scirrhi generationis modi, vtrique visceri communes: vel cum per initia paulatim colligitur augeturque, & in magnum tumorem attollitur: vel medicantium errore, ac imperitia accidit, vti cum illi inflammationes & erysipelata vehementer refrigerant. Notandum autem est, lienem etiam ex spiritu flatuoso indurari quodammodo renititque. MATHETES, Quo pacto hic tumor à vero scirrho distinguitur? GERON, Si ex flatu contrahitur, tactui non resistit pertinaciter, sed imposita manu cedit, & lien puncturam tensionemque experitur, sic tamen, vt nullum pondus & grauitatem sentiat. at si grauitas pondusque, cum renixu, tumore, ac duritiæ in sinistris præcordijs deprehendatur, tumor durus ex humore lento crassoque lieni infixio prouenisse dicitur. atque hic propriè scirrhus, aut scirrhosus tumor appellatur. MATHETES, Quid in hoc affectu futurum iudicas? GERON, Vbi diuturnus fuerit, aquam inter cutem, iecore potissimum consentiente generari posse. sin autem exquisitus extiterit, prorsus esse insanabilem.

Causa scirrhi lienis.

Scirrhi veri à tumore differentia.

Præsigna in scirrbo lienis.

HYPOCHONDRIACA affectio.

MATHETES, Quæ alia præcordiorum vitia restant? GERON, Quod grecis vocatur *ὑποχονδρῆλαιον πάθος*, hoc est, hypochondriaca affectio: cuius vtrunque viscus, maximè verò lien auctor existit: quanquam etiam superius inter melancholiæ species ipsius facta sit mentio. Dug verò eius sunt differentie: vna sanè lenior: altera verò asperior. MATHE. Vnde vtraque trahit originem? GERON, Prior ex terrestri humore melancholico, ac sanguinis fecce, quæ in liene, & propinquis eius partibus immodicè accumulata, tumorem excitat: vnde noxius vapor sursum in cerebrum exhalat. Sub hoc malo sinistra præcordia neque tument, neque distenduntur, aut premuntur, neque vnquam, nisi forsan obscurius dolent. interdum autem conspicuus lienis tumor, & ingens, sine arquato, sinèque malo corporis habitu apparet: præcordia æstuant, præferim cibo potuque calidiore assumpto. quia hic non facile concoquitur: flatus & ructus plurimus accedit. Cum autem humor ater propria sede in venas eruperit, arquatum, & malam habitudinem parit. vbi verò calidior, deteriorque contra naturam euaserit, atro vapore exhalante, mentem variè perturbat, hypo-

Hypochondriacæ affectionis nota.

- hypochondriacæ melancholiæ opifex. MATHETES, Quomodo se gerunt hoc vitio laborantes? GERON, Multum diuque sunt cogitabundi: omnia habent suspecta: pudore afficiuntur: solitudinem quærunt: tristitia & timore infestantur: animo deficiunt: de omnibus desperant: mentem & sensus habent obtusiores: somnūque tumultuosum: iudicium corruptum, ac sæpè præposterum. MATHETES Vnde altera gignitur affectio? GERON, Ab atra bile, quæ vel ex terrestribus sanguinis sæce nimium calida exusta, vel ex bile flaua contracta est. MATHETES, Vbi atra ista bilis colligitur? GERON, Aliquando in liene: sæpius in mesenterio, sic tamen, vt nullus inde tumor appareat. Cum autem ea humor sit acris & perniciosus, etiam exiguus, sæuissima quoque symptomata inducit. MATHETES, Quibus signis hæc Melancholia cognoscitur? GERON, Iisdem, quibus superior, sed multò grauioribus.
- 35 præcordia in hac sæpè ingenti feruore æstuant: arteriæ in præcordijs supræq; vmbilicum valdè mouentur, vt in pulsu: cor crebrò palpitat aut premitur, vapore quauis ex causa sursum exhalante: animus deficit: fauces præcluduntur, vt sæpè hoc vitium ab vteri suffocatu secerni nequeat. Sub hoc malo facies rubet ardescitque: oculi quasi suffusione caligant: mens denique perturbatur. MATHETES, Quid spei de miserabili hoc malo curando haberi potest? GERON, Si inueterascit, ægri adeò fiunt pusillanimi, vt se ad meliorem valetudinem redire, imò vitam diutius agere posse desperent. Quod si vapor ille noxius extinctus discussusque reuertatur. sin autem idem malum in cerebrum penetret, & obfirmetur, furorem siue insaniam, & postremò febrem hæcticam proximam, ac marcorem inducit. Hic omittendum non est, similia incommoda ex simplici bile excitari, quæ circa iecur congregata copiosius æstuat. Sub ea igitur corpus inardescit, animus deficit, oculi suffunduntur, facies rubescit, & nisi vires iam à malo superentur, animus incitator inflammatur: ira sæpè vlciscendi libidine mouetur. hac autem affectione corpus denique consumitur, liquaturque, nisi in Melancholiam degeneret.
- 35 MATHETES, Quibus renes morbis afficiuntur? GERON, *RENVM inflammatio.* Inflammatione, obstructione, abscessu, & exulceratione: quam rariùs inflammantur, eò quòd caro illorum firma multumque dura, defluxionibus minùs sit opportuna. interdum tamè ex ictu casuue contusi, & sanguinis per cauæ venæ ramos ad ipsos tendentes, fluxionem experti, eodem malo infestantur. MATHETES, Quomodo hæc iocinoris inflammatio græcis appellatur? GERON, *Nephritis.* Νεφρίτις: quanquam nonnulli hodie præclari aliàs medici, λιδίασι

Atra bilis collectio vbi.

Melancholice altius nota.

Præagia in melancholia.

Inflammationis causa.

*Inflammationis
renum nota.*

etiam nuncupent. MATHETES, Quæ vitium hoc indicant? GERON, Febris assidua, sinéque certo ordine vrgens, & ardor magnus: qui nunc increfcit, nunc imminuitur: dolor grauis ac pulsans in dorso, paulò altius quàm minores costæ sunt, excrucians, isque inde ad iecur vsque tendit, si dexter ren labore: deorsum verò ad vesicam, naturalia, pectinem, & scemora, si sinister afficiatur. Idem dolor sternutamento, atque tussi intenditur: aliàs continuatur, aliàs per interualla remittit: in alijs adeò sæuit, vt ægri animo deficiant, sudoribúsque digerantur. Super hæc ingens cibi fastidium vrget, nausæaque & stomachi dolor, crebèrque bilis vomitus: 10
alius maximè alstricta est, vnde etiam venter inflatur, & ructus frequentes accedunt: vrinæ reddendæ difficultas, assiduæque cupiditas adest: sæpè ipsa cum ardore quodam profluit: primùm tenuis & diluta, in qua nihil subsidet: deinde magis rubra: tandem crassa & mucosa: extrema, præsertim pedes sæpissimè frigent: 15
crus propinquum, siue è directo situm, stupet, adeoque locus offensus dolet, vt spina dorfi vix inflecti, ægerque erigi, aut incedere possit. quinetiam in latus affectum faciliùs decumbit: nec non supinus magis quàm pronus. MATHETES, Quid de hoc genere morbi futurum præfagis? GERON, Si concoctio probè peracta, & dolores finiti fuerint, æger iam sanatus esse dici potest. adhæc, si vrina copiosa, & crassa prodierit: in qua quod subsidet, bonum est. Periculum verò instat, si frequens bilis vomitus incidit: 20
magis autem terret delirium: præcipuè si extremæ partes frigescent. sin autem renes præ nimio tumore disrumpantur, certa mors in propinquo est. Porro vbi inflammatio remedijs discussa fuerit, dolorque in loco affecto, & grauitas mateat, febrisque adhuc crescat, & frequens vrinæ reddendæ desiderium, magnæque eius difficultas adsit, suppuratio intus fieri solet. Vbi iam absoluta fuerit, grauitas in rene manet, dolor autem mitescit, & febris 30
imminuitur. MATHETES, Quid de renum abscessu sentis?

*ABSCESSVS
renum signa.*

GERON, Cum erupturus est, æger inhorrescit: febris & dolor vehementior insequitur. quamprimum autem ille eruperit, hæc omnià protinùs conquiescunt. vrina crassa, turbida, subcruenta, & multa profluit: cum qua si pus album, læue, æquale, & 35
non mali odoris fertur, potest ægro bona valetudo contingere: sin id ad intestina quoque, aut aliorum diuertit, quod cum vrina redditur, malè olet, liuidumque est, & inæqualiter mucosum, periculum signat. ex eaque grauem intus exulcerationem portendit: atque tunc etiam carunculæ quædam exiguæ, quasi cum vrina ex putrida renum carne prodeunt. Quòd si inflammatio interrim perperam curata fuerit, sitis dolorque post concoctionis tem-
pora

pora desinunt: tumor autem durus cum multa loci grauitate remanet: eò quòd dolores citra materiæ resolutionem, citràq; sup-
purationem conqueuerint: quòdque vrina diu aquosa, & pauca
reddatur, & quòd coxæ, partésque his inferiores stupeſcant, in-
firmæque fiant, & emacientur. Hoc vitium certè nulla medicina
subtrahitur, sed temporis processu in hydropem desinit, mor-
témque minatur. **MATHESES**, Quid est renum obstru&io?

*RENVM ob-
stru&io.*

GERON, Eiusmodi vitium, quo illi vel crasso, & viscoso hu-
more, vel arenosa materia, vel calculo siue top̃ho replentur: quod
10 græci communiter vocant *ἐμφορὴν τῶν νεφρῶν*. Rarò autem, aut vix
vnquam accidit, vt renes in totum à solo humore crasso, vel glu-
tinoso obturentur: à calculo autem, vel arenulis sæpiſsimè: à qui-
bus etiam solis vrina supprimitur. **MATHESES**, Quæ partes re-
num ab his afficiuntur? **GERON**, Non solùm interior eorum sinus,

15 sed etiam propria ipsorum caro: à qua arteriæ duritiæ, rubrúm-
que colorem sortiuntur. illinc etiam vrinæ effluentis impetu in
sinum feruntur: ex hoc deinde per meatus vrinarios in vesicam
fluunt, atque sic vrina arenosa redditur. Quòd si arenarum colle-
ctio minis curiosè caueatur, temporis spatio illæ crassescunt, vel
20 mutuò inter se cohærentes calculum generant: quod cùm fit, gre-
ci *λιθιδιον* appellant. **MATHESES**, Quid igitur propriè hoc malum
dici potest? **GERON**, Nihil aliud, quàm materia quædam à natura
in totum aliena, calculi seu top̃hi instar, in carne renum, vel in si-
nibus ipsorum concreta: eòque in illorum genere ponitur, qui in

λιθιδιον.

25 excessu naturæ prorsus contrario substant: dignoscitur autem
ille ab alijs renum vitijs, doloris ratione: vt qui velut aculeus æ-
grum pungat, firmitérque renibus inhæreat: nisi quòd nonnun-
quam per ilia coxam versus, vel ad testiculum proximum perue-
niat: in dextra quidem parte, si dexter: in sinistra verò, si sinister af-
30 fligatur. similiter fœmoris stupor è regione affecti renis sitit: item
testiculus retractus eiusdem lateris, idémque indolens: atque
id vaſorum consortio contingit, quæ cauæ venæ arteriæque ma-
gnæ incumbunt: acharum interuentu tum crura, tum testiculus
renibus consentiunt. **MATHESES**, Quibus temporibus id accidit?

35 **GERON**, Non iisdem, sed diuersis. nam vbi calculus, vel nascitur,
vel erumpit, renes grauissimè dolent: reliquo autem tempore
quasi re quadam graui eis incumbente afficiuntur, eò quòd ex-
libus neruis donati sint: quanquam illorum dolor, vbi calculus
ipsis impactus fuerit, à Colico cruciatu, qualitate non possit dis-
40 cerni, nisi in sequentia symptomata respicias. **MATHESES**, Quan-
do potissimùm dolores calculosis istis excitantur? **GERON**, Vbi
ægri cibo, seu alimentis, & intestinorum excrementis repleti fue-

rint: vbi verò affectus renum increuerit perseueraueritque, tunc etiam vomitus, primum pituitæ, mox bilis flauæ, ac tandem æruginosæ incidit, sanguine ob cruciatum, & vigilias corrupto: præsertim quando ægri simul febricitant, & inedia euacuantur. Post vomitum dolores leuantur: aluius astringitur: vnde cruciatus rur-
sus augetur, eò quòd illa renes excrementis, aut flatibus comprimat. si forsàn ipsa resoluatur, excrementum leuiter bile tinctum cum flatu redditur: vrina in accessione, pauca, tenuis, & diluta est: vbi dolor augetur, statim tota supprimitur. deinde, vbi calculus à meatu vrinario excussus fuerit, crassa illa copiosaque proflu-
it: in qua arenulæ multæ, & plerunque grandiores, calculique inæquales, & eorum fragmenta subsident. Eadem interdum vrina bullat, & malè olet, crebròque redditur, sic vt eger ardorem quendam in exitu sentiat. sæpe etiam veluti sanguis cum ea fertur, præsertim, si vehementior exercitatio cum alio in motu, tum in equo
anteceaserit. **MATHESES**, Qualis igitur vrina eorum esse solet, qui calculo sunt obnoxij? **GERON**, Crassa, subrubra cum densa ac tenaci spuma: in qua nunc rubrum leuiter, viscosum, arenosumque subsidet: nunc turbidum remanet. Talis vrina sæpe multorum annorum spatio, nullo vitæ incommodo citra renum dolo-
rem, aut vllam calculi notam excernitur. tandem autem ipsa repente, & ex inopinato cum acutissimo dolore fertur, aluiusque simul contrahitur, & crus è directo situm torpet. Per intervalla rur-
sus dolor redit: & quamuis calculus non expellatur, vrina crassa & turbida apparet: interdum ob duram equitationem cruenta
prorumpit. sæpe solus ex vesica destillans sanguis calculum in rene subesse indicat: qui neque doloris, neque alterius cuiusdam sensu deprehensus sit. Sin autem calculus post renis dolorem excretus in meatus vrinarios impegerit, vrinæ tenues, paucae, subaquosæ profluunt, & non raro in totum etiam supprimuntur.
quando verò calculus renis inde in sinum ipsius reuertitur, vel certè foràs in vesicam excutitur, similis statim vrina exit. quòd si calculus grandior sit, quàm vt è renum carne, in qua gignitur, extendi in sinum ipsius possit, statim etiam vrina, ei quam modò retuli, similis redditur, & nullus ferè dolor adest. Quinetiam si eger
corpus vehementius exercuerit, aut durius equitauerit, non modò talis vrina profluit, sed etiam verè cruenta: in qua sanguis tanquam in grumum concretus subsidet. **MATHESES**, Qualis vrina excernitur, vbi calculus in renis sinum inciderit, isque grandis ad-
eò in meatum vrinarium descenderit, vt eum obstruat? **GERON**,
Pauca, solito tenuior, & subaquosa, vel ex toto intercipitur, idque cum dolore acerbissimo. **MATHESES**, Cuiusmodi vrina prodit.

- dit, quando calculus renis minor est, quàm vt in meatum illius, cum ad hunc descendit, multùm impingere possit: item vbi grandis est, & in sinu eius contentus, hùcque è carnosâ renis parte depulsus, nondum ad vrinæ meatum incidit: GERON, Crassâ, turbida, rubra, aut subliuida, obscura. hoc autem sciri debet in ijs, qui grauioribus doloribus renum sunt obnoxij, vrinam claram vix vnquam excerni. MATHETES, Quâ ratione calculi inter se differunt? GERON, Alij magni, alij parui, alij mediocres sunt, eoque pro meatuum amplitudine, vel exilitate, faciliè, aut difficulter excernuntur. hi rursus lœues, & rotundi sunt, ac faciliùs: illi asperi & longi, ac difficiliùs exeunt. Quibus autem vetustus renum dolor molestus est, hos grandiores calculi magis affligunt: mediocres minimè: quia vrinæ itinera in his magis patent. quibus recens hoc vitium, aut certè rarum est, eos vel minimus calculus excruciat. MATHETES, Quo colore calculi renum præditi sunt? GERON, Subrubro, vel albo, si renes purulenti sint, vel nigro, & pallido. MATHETES, Qui duriores, & firmati magis existunt? GERON, Qui cum vrina diu aquosa feruntur: in qua pauciora habeantur subsidientia. MATHETES, Qui hoc renum vitio frequentius tentari consueuerunt? GERON, Pinguiore, & seniores: adulti, rariùs: pueri rarissimè. sicut etiam illi, qui sæpius vomunt, & aluum habent minimè astrictam. MATHETES, Quæ spes in curando, quòdue periculum expectatur? GERON, Omnia renum vitia in senibus difficillima: calculorum autem desperata. Qui à parentibus calculosi nati sunt, ij hæreditario ferè semper eiusmodi affectu corripuntur. MATHETES, Quod restat renum vitium?

Calculorum differentie.

Prenotio.

RENVM exulceratio.

- GERON, Vlcus, siue exulceratio, græcè dicitur ἐλκωσις, siue ἐλκωσις: quæ nihil aliud existit, quàm carnosæ ipsorum partis continuæ diuortium. MATHETES, Quæ renes exulceratos indicant? GERON, Dolor, & grauitas circa lumbos substans: in vrina pus mixtū subsidens, & carnosæ particulæ innatantes: æger sæpissimè dolorem in affecto rene percipit: interdum pus cum vrina inæqualiter diffusum apparet: interdum sanguis cum vrina redditur. is nanque, & pus, si pluribus diebus ac mensibus excernatur: nec non caruncula parua cum crassâ vrina simul prodeuntes, renum, aut vesicæ exulcerationem testantur. MATHETES, Quæ renes exulcerant? GERON, Acrimum, erodentiùmq; humorum copia: deinde abscessus erumpens: vasis ruptura, seu erosio: item calculus. adhuc exteriores causæ, vt medicamenta rodendi facultate prædita, si assumantur: aut vulnus illatum, quod ex ægri, aut familiarium narratione percipere licet. MATHETES, Quæ singulorum vlcum renis causarum notæ sunt? GERON, Vrina cruenta,

recens, & simplex vlcus significat: crassior, alba, foetida, purulenta, lactique similis ferè, in qua pus subsidet: cauum ac foedi odoris vlcus, in rene esse portendit. at acrium humorum in toto corpore abundantiam, vlcus renis excitasse, non solum vringe, sed etiam temperamentum, ætas, habitus, anni tempus, victus antecedens demonstrant, sic vt nullius rupti seu erosi vasis, nec erumpentis abscessus, aut calculi nota adfuerit. Porro vlcus ex calculo perrodente factum, vrina crassa, turbidaque, & vbi corpus exercitatur, magis colorata signat: vbi verò conquiescit, id quod subsidet, crassiusculum fit, & reliqua vrina ferè clara euadit. **MATHETES**, Poteruntne eiusmodi renum vlcera sanari? **GERON**, Quod si non summa diligentia labores, vt renes vlcerati circatrice obducantur, vix ad sanitatem perducipotuerunt: quamuis in illis excitata facilius, quàm in vesicæ curationem admittant, eò quod carnosæ partes promptius, quàm neruosæ glutinentur. sunt tamen tum renum, tum vesicæ exulcerationes curatu difficiles, præsertim ex erosione ortæ: vnde pauci perfectè hoc vitio liberantur, quamuis etiam id recens adhuc fuerit: quia hæ partes in continua sunt actione, & excrementum acre illos exacerbat. In senibus & renum & vesicæ affectus longè sunt difficillimi: quoniam etiam alij omnes in illis præcipuè diuturni manent.

Vrina cruenta è renibus.

MATHETES, Quid præter excrementa iam comprehensa prodire ex renibus solet? **GERON**, Sanguis, qui vniuersæ vrinæ sic miscetur, vt ipsa quasi dilutus sanguis esse videatur. hic autem proptinùs subsidet rubicundus, liquidus, ac minimè concretus. **MATHETES**, A qua parte potissimùm cruor iste emanat? **GERON**, A vesicæ ceruicis musculo: qui inde in sinum vesicæ lapsus, hinc destillat, vrinæ non æqualiter temperatus. vbi autem subsedit, in grumum mutatur. Si calculus cruentam vrinam efficit, vt ferè semper, nisi casus, aut ictus eius auctor fuerit, peculiaries notæ obseruari debent: quamuis sæpe solus calculus sine renum dolore, aut alio morbi indicio, cruentum reddere vrinam possit. Quod si interim sanguis copiosè, & subito præter opinionem profluat, vena intus rupta est, casusq; simul violentus antecessit: siue ictus aliquis est, siue onus graue tentauerit, siue aliud id genus incommodi perpeßus fuerit. **MATHETES**, Qua alia ex causa cruenta vrina profluit? **GERON**, Ex renum imbecillitate: quanquam longè rariùs: vel ex venarum adaptione, vel ex iecoris infirmitate, vel ex solitæ euacuationis defectu, vel ex vita summè otiosa, vel ex membro aliquo prefecto, sæpe à renibus erosis & exulceratis, eadem prodit: quæ paulatim, & cum aliquo mista destillat, idque diutius. At quando sanguis è rupto renum abscessu cum pure destilla-

Vnde cruor, qui vrinam tingit.

Calculus solis cruentam vrinam reddit.

Cause cruentæ vrinæ.

scendit, non ab vlcerere reddi censetur, quòd non longo tempore destillet, sed intra tertium ferè diem desinat. **MATHETES**, Quid de sanguinis fluxu isto prædicitur? **GERON**, Hippocrates eum cum febre, & dolore sæpius reddi, malum esse indicat. non autem
 5 prænosci potest, púsine profluxurum sit, núnque febres eodem tempore finiendæ. verùm si periculosum non est, cruenta vrina sine dolore, sinéque febris erumpet: quod per lassitudines ferè incidit: ac hæ statim inde resoluuntur.

MATHETES, Exulceratorum renum notas explicasti, quæ
 10 sunt vulneratorum? **GERON**, Dolor ad inguina, testiculósque descendit: vrina difficulter redditur, eaque aut est cruenta, aut cruor ipse interdum fertur. atque hi sunt ferè omnes renum affectus, si vnum adhuc eis addidero.

MATHETES, Quis ille est? **GERON**, Vrinæ fluor, qui græ-
 15 cis *Ἀσθίτης*, vel *Ἀσθίανος*, vel *ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ἀσθίδα*, vel *Ἀσθίπεια εἰς ὄρον*: idque ob rationes diuerfas. Cum enim renes præcipuè sanguinis serum ex venis vniuersum attraxerint, vasa alium humorem ex iecore alliciunt: deinde hoc ex intestinis, & ventriculo. vbi verò oris venæ exiccatae fuerint, ipse rursus humectari desiderat: deinde ve-
 20 næ ex iecore ad ventriculum tendentes, totam portionem exhibitam tanquam aridæ arripiunt: atque ex his aliæ deinceps, donec illa ad renes attrahentes transferatur. Cum autem isti adeò fuerint imbecilles, vt serosum illum humorem continere diutius nequeant, statim is, quàm primùm assumptus est, per vrinam ex-
 25 cernitur. **MATHETES**, Quæ pars igitur propriè in hoc vitio affecta est? **GERON**, Non alia quàm renes, tum attrahendo, tum retinendo, tum immutando imbecilles. atque ideò malum hoc ventriculi, & intestinorum leuitati, & caninæ appetentiæ responderet.

MATHETES, Quibus notis cognoscitur? **GERON**, Potio assidue
 30 quæritur: deinde non multò post, quàm assumpta est, iterum per vrinam redditur, nihil ferè immutata, sed aquæ instar cruda: æger autem inde non satis expletur, neque satiatur. imò id, quod bibitur, sæpe cumulatiùs quàm sumptum fuerit, excernitur, eoque corpus totum contabescit, & veluti liquatur: quanuis vrina
 35 quandoque paulatim retineatur. Nonnullis lumbi, coxæ, & testes, maximè verò pedes leuiter intumescunt: nonnulli in visceribus æstum sentiunt. Si acris calor adhuc magis in illis augeatur, superior venter corrugatur, venæque in eo attolluntur, & vniuersus corporis habitus gracilescit. **MATHETES**, Quæ hunc mor-
 40 bum generant? **GERON**, Interdum calida nimis renum intemperies, absque humoribus vitiosis: interdum hi ipsi renibus infusi: qui aut biliosi, aut pituitosi, aut salsi fuerint. Num igitur intempe-

Presagia.

ries duntaxat molester, aut humores siue in renibus, siue in vniuerso corpore redundarint, facile ex superioribus dignosci poterit. **MATHETES**, Quid de morbi huius euentu coniecturare licet? **GERON**, Quauis rarissimè incidat, plerunqne tamen diuturnus est, & à renibus pendet: recens sanari, vetustus nunquam potest, sed corpus liquatur, ac marcore consumitur. Non solum enim venarum humores, sed etiam totius corporis siccitas, & tabes temporis spatio necessariò consequitur: eò quòd hæc affectio, vbi incœperit, paulatim increseat, eiùsque initium, & augmentum vix percipiatur, quousque ad statum peruenerit: sic vt subito aduenire videatur: quod renum desiderium, non animale, vt ventriculi, sed naturale existit. **MATHETES**, Cur vrinæ profluuium censetur exitiosum? **GERON**, Quia plures instrumentorum actiones & vires impediuntur, aut in totum pereunt. nunc ad vesicæ affectus digrediar. **MATHETES**, Quibus illa torqueri solet? 15

*VESICÆ affectus.**Calculus vesicæ.*

GERON, Iisdem ferè, quibus renes: sed calculo crebrius, inflammatione & abscessu rarissimè: exulceratione verò interdum. **MATHETES**, Quibus notis calculus vesicæ deprehenditur? **GERON**, Dolor partes interiores circa pubem multum & diu excruciat: interdum, vbi remiserit, per interualla recurrit. adhuc gravitatis quoque cuiusdam in eo loco sensus est: qui si calculus grandior existit, in cursu omniqne motu augetur: si verò exiguus, & levis adhuc est, titillatio quædam eadem in sede percipitur: vrina prodit cruda, alba, crassa, & turbida: inq; ea subsidet purulentum, vel mucosum: aliàs cruentum quippiam coactum exit. adhuc vrina difficillimè redditur: sic tamen, vt assidua eius sit cupiditas, paulatimque adeò destillet, vt vix retineri possè videatur: interdum etiam sine voluntate, quamprimum autem erumpere cœperit, protinus tota intercipitur: eò quòd calculus ei obuiam veniat: qua de causa fluor eius minimè continuatur, sed per vices repetit: ac dolor aliàs totum colis meatum, sæpe glandem solam obsidet. renes autem sub eo tempore affligit, quo vrina postremò excerni desinit, & tunc alius quoque cum vrina reddi solet. Hanc quidam promptè recti, quidam resupinati, maximèque hi, qui grandiores calculos habent: quidam etiam inclinati reddunt, cõlèmq; contrectando extendendoque, dolorem leuant: quidam etiam, cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis vicibus implicant. foeminæ verò naturalium oras manibus suis ad mortis scabere crebrò cõguntur: nonnunquam, si digitum admouerint, vbi is vesicæ ceruicem vrget, calculum sentiunt. **MATHETES**, Qualis calculi vesicæ generandi est materia? **GERON**, Crassus crudusque humor: qui ex renibus per venas cum vrina in vesicæ si-

num in-

- num influit; in qua tanquam fæx subsidens loci calore sicceſcit, & paulatim in calculum concreſcit. **MATHE TES**, Quid limum iſtum tam diu poteſt in veſica remorari, cum dixeris antea, & grumos ſanguinis, & pus, & pituitam mucoſam, aliâque multò craſſiora
 5 facile illinc cum vrina profluere? **GERON**, Quamuis limoſa illa materia ob anguſtam, aut aſtrictam veſicæ ceruicem ab exitu prohiberi queat, tamen ſola ipſa calculo componendo ſufficere non poteſt, niſi ille rudimentum quoddam è renibus traxerit: è quibus ſi
 10 grandiuſculus eſt, per cruciatum excidens, aliquandiu in veſica hæret, immoraturque, & ſordibus eò delapſis, coagmentatur, dum calculus verè confirmetur. Qua de cauſa nullus ferè calculo veſicæ laborat, quem non antea renum dolores cruciarint. id teſtatur, quòd in quorumlibet veſicæ calculorum medio, ſi exempti atterantur, quiddam veluti nucleus offendatur: quod cuiſlibet
 15 illorum rudimentum è renibus eſt expulſum, alio quàm inuolucrum ipſius ac tegumentum colore, & materia præditum. **MATHE**. Eſtne eadem calculi veſicæ cauſa, quæ renum? **GERON**, Non in totum: nam principalis in veſica materiæ qualitas, nempe vrinarum craſſitudo exiſtit: vt quæ eis inſiti caloris vi concreſcendis
 20 ſit idonea: quanquam calor in hac etiam ad calculum coagmentandum non parum ſit efficax. Quamobrem non ſolum aſciticus & ingens, ſed etiam quiuiſ mediocris, vt in pueris reperitur, ad ſpiſſandam huiuſmodi materiam ſatis eſſe poteſt. quia ipſe quoque aliquid calculo coagmentando præſtare valet. **MATHE TES**,
 25 Quomodo calculi tum renum, tum veſicæ inter ſe differunt? **GERON**, Veſicæ magis albicant, grandioresque ac duriores quàm renum exiſtunt. quanuis etiam in hiſ olim mihi calculus grandis oui gallinacei inſtar, tum in viro, tum in muliere conſpectus per anatomen fuerit. Hoc etiam notandum eſt, ſi minor calculus in
 30 veſica natus eſt, faciliùs in illius ceruicem impingi, & vrinam per tinaciùs retinere, quàm maiorem. hic enim vel idoneo corporis ſitu, vel iniecto inſtrumento facillimè excutitur. **MATHE TES**, Qui tandem calculi ſunt obnoxij? **GERON**, Pueri ſæpius, quàm adulti: & viri crebriùs quàm fœminæ. **MATHE TES**, Cur autem
 35 pueri potius, quàm alijs? **GERON**, Quia illi natura edaces, voracèſque ſunt, cibòque citra delectum, ordinem, & tempus opportunum vtuntur, ac rursus alijs ſe replent, antequam priores fuerint conſecti: vnde multi crudi humores in venas ac renes diſtribuantur: & deinde ad veſicam percolantur. **MATHE TES**, Solane humorum iſta collectio calculum veſicæ generari poteſt? **GERON**,
 40 Minimè: ſed etiam calor quiſlibet, ſiue aſciticus, & ingens; ſiue natius, & mediocris, licet minor quàm in iecore, aut renibus. Qui

Veſicæ calculi cauſa.

Calculi veſicæ & renum quomodo differant.

Cauſæ calculi.

ergò adulti, & senes minùs, tum in vesica, tum in toto corpore calidi existunt, non tam facilè, vt pueri, calculis vesicæ laborare solent. **MATHESES**, Quid spei, aut periculi in illis ostenditur? **GERON**, Minor faciliùs in ceruicem vesicæ impingit, vrinamque pertinaciùs retinet, quàm maior. non leue periculum in quouis calculo circumstat: quia æger immensis fractus doloribus ex vrina ob angustum vesicæ iter nimium suppressa, extingui potest. Haud rarò desidendi cupiditas, vel infimi intestini procidentia à vesicæ calculo incipit. multi hunc in vesica diutissimè citra dolorem fouerunt. pueri ad quartum decimum annum vsq; ob corporum ipsorum mollitudinem facilè curantur: senes propter duritiem vix consanescunt. Qui calculi in medijs ætatibus procreari sunt, mediocrem etiam curationem recipiunt. Rursus qui maiores experiuntur calculos, facilè sanantur: eò quòd inflammationibus assueuerint: qui minores habent, difficulter sanantur. **MATHESES**, Quod aliud vesicæ vitium oboriri solet?

INFLAMMATIO vesicæ.

Nota.

GERON, Inflammatio: quanquam non ipsiusmet proprium, cum tenuis exanguisq; naturæ sit, sed muscoli, qui ceruicem eius stringunt. **MATHESES**, Quæ illam subesse indicant? **GERON**, Febris acuta, & ardens, distentiòque à pube, tum ad vmbilicum vsque, tum ad partes inferiores: sic vt summa vrinæ reddendæ difficultas cupiditasque adsit. sæpe ea tota diutius supprimitur, præsertim cum æger cubat: interdum guttatim, magnòque conatu destillat: & quod excernitur, tenue est: atque etiamnum subsidet: aliquando inflammationes sequuntur: & alius solita astrictior est, quàm rectum intestinum, ob inflammationis magnitudinem comprimitur: adhæc vigilæ, delirium, bilis sinceræ vomitus, & extremarum partium frigus vrget. **MATHESES**, Quibus familiaris est vesicæ inflammatio? **GERON**, Pueris, sed alijs perrara: à calculi cruciatu excitata. **MATHESES**, Qualis ipsa morbus est? **GERON**, Grauiissimus, & maximè lethalis. Ea verò inter alias omnes eius species perniciosior est: in qua vehemens dolor, febrisq; magis comitatur: vrina aluùsque prorsus supprimitur. minùs pestifera est, in qua contraria predictis apparent. nam febris non citra rationem ex inflammatione vesicæ incidit, & quantò illa maior est, grauiorq; tantò magis febris augetur. Vbi vrina purulenta prodit, cui album ac læue subsidet, minùs est horribilis. Quòd si dolores in hoc vitio non soluantur, neque vesica mollescat, periculum est, ne æger primis circuitibus moriatur, nulla etiam spes est salutis, quando febris acuta diu trahit, vrinæque simul, & alius prorsus astringuntur: aut quando illa nullam concoctionis notam edit, doloresq; magis simul indies ingrauescunt.

Sæpe

Vesicæ inflammatio quibus familiaris.

Sæpe Gangrena lethalis sua sponte oritur: ex qua nemo vnquam ferè euasit: vbi graue hoc malum suppurare incipit, omnia fiunt deteriora. Quòd si id eruperit, antequam æger intereat, dolores, cæteraque omnia mitescunt, ac vrina copiosa cum pure fertur: 5 abscessus ea parte viam sibi aperuisse videtur, qua vrina omnis per anum elabitur. Quòd si æger ex abscessu superstes seruetur, ylcus cauum ac sordidum, in strictore vesicæ musculo permanet: è qua nunc sanies, nunc pus copiosum, & grauiter olens cum vrina crassa excidit, tandèmq; in imo subsidet.

- 10 MATHETES, Quid præterea vesicæ accidere solet? GERON, *VRINA cruenta.* Vrina cruenta, quæ paulatim veluti stillicidio quodam redditur, dolorèmq; in exitu mouet, ac radicem colis veluti adurit. MATHETES, Quamobrem cruor ille ex vesica ferri consuevit? GERON, Præcipuè ob calculum, dum hic vehementi conatu promittitur, idem autem non totam vndique vesicam vrina perfundit, sed 15 cùm per quietem subsedit, in grumum concreuisse videtur. Subinde pars quædam istius cruoris sine vrina elabitur: vbi sanguis in vesica concretus fuerit, grauissima quoque incidunt symptomata. nam anima crebrò deficit: spiratio fit exigua: pulsus obscurus, paruus, & frequens apparet: multa etiam nausea superuenit: 20 animi anxietas, & sudor frigidus. hinc igitur multum debilitatur, & pallefcit, extremæquæ ipsius partes refrigerantur: vt plurimum autem violentus aliquis casus antea vesicæ obuenit: quem cruenta vrina aliquandiu secuta est, ac subitò sine certa causa desijt. Iam rigor etiam subinde inuadit, ac alia signa modò comprehensa protinus hunc comitantur. MATHETES, Quando igitur 25 cruenta vrina ex vesicæ affectu nata, curatur? GERON, Tardiùs quàm si à superioribus locis prodierit. MATHETES, Quid reliquum de vesica habes? GERON, Quòd ipsam quoque non rarò duplex exulceratio infestet: nunc grauior, nunc leuior. prima in 30 ceruicis vesicæ musculo: altera in ipsamet vesica. MATHETES, Quæ sunt vtriusque indicia? GERON, Vehemens in pube & imo ventre dolor: vrina crassior, nunc sanguine, nunc pure exiguo perfusa. Cum hac membranulæ, aut squamulæ, aut furfurum similia prodeunt. Quinetiam in vesica vlcerata ægri acuto dolore, quouis tempore laborant, præsertim cùm vrinam reddunt, & pus excernunt, assiduò decumbunt: coacti consistere nequeunt: neque etiam reclinati quiescunt: eò quòd vrina assiduè vlcera 35 contingat. ob quod etiam vesica nunquam in totum vacuari potest, licet vrina copiosissima excernatur: sed aliquid eius semper in illa relinquitur. Quòd si vlcera fuerint sordida, fœculenta simul, & mucosa exeunt: in quibus crassa, farinæ similia subsident,

Exulceratio vesicæ.

Nota.

interdum membranulæ, foliorum & laminarum modo tenues cum vrina excernuntur. At si ulcera serpendo depascantur, saniosa, & odore fœda exeunt. insuper vrinæ difficultas vrget: naturalia eriguntur: non solum autē vrinæ meatus, sed etiam ipsiusmet vesicæ vlcus: dolor circa pubem comitatur. **MATHESES**, Quando ceruix vesicæ exulcerata dolescit? **GERON**, Cum æger vrinam reddere vel cœperit, vel desierit: præsertim si illa fuerit acrior. **MATHESES**, Vnde procedit vesicæ exulceratio? **GERON**, Vel ex abscessu, vel ex calculo perrodente, vel ex vrina acriore: quam vel meracioris vini, & ciborum calidorum vsus, vel acris salisq; humor commissus procrearit. **MATHESES**, Quomodo causæ hæc inuicem discernuntur? **GERON**, Ex proprijs ipsarum indicijs. Nam vlcus in vesicæ ceruicis musculo ex abscessu ortum, maius, atque grauius existit, vt pote cauum & sordidum: eoque nunc sanies, nunc multum puris foetidi cum vrina crassa fertur: in qua id ipsum per quietem subsidet. vlcus autem, quod ipsammet vesicam obsidet, ex vrina acriore, vel calculo concitatur. tenuius est, in quo interior illius membranula leuiter abraditur. sub hoc vrina crassa excernitur, quæ aliàs momentum puris, aliàs cruoris trahit: & cum paulò penitius insideat, membranulas & furfurum quædam educit. si vlcus in penitiore vesica est, membranulæ istæ magis crassæ, albæ, grandæscque existunt. si verò iuxta canalem vrinæ, atque fistulam consistit, minùs albæ, magis autem tenues, & exiguæ redduntur. In hoc casu etiam tam magna vrinæ adest cupiditas, vt illa vix retineri possit, nec non grauis dolor pubem, & partes interiores exercet: maximè, cum vrina reddi postremò desinit: magis etiam æger dolescit, cum se erigere conatur. Porro in vlcere depascente, sæpe etiam cruor cum sanie, & pure fœdi odoris in vrina deprehenditur. In vlcere admodum sordido, præsertim, quod à venereo seminis profluuio subortum est, quædam veluti filamenta sæpissimè in vrina hærent, eaq; primùm tenuia, deinde statim crassa, adeò vt vrinam quoque talem efficiant: postea crassum glutinosumque mucī, & alboris oui instar subsidet. **MATHESES**, Quo pacto vesicæ & renum vlcera inter se discrepant? **GERON**, Si illa exulcerata est, maior vrinæ, tum cupiditas, tum difficultas vexat. quicquid excernit, album est, nisi id à renibus descendat, minùsque vrinæ mistum est. Sub renum vlcere vrina non æquè difficulter exit: quod in eadem hæret, rubescit: quod decessit, rubet, seu carunculæ tenues, seu filamenta capillis similia trahantur: dolor etiam minor incidit: cruor sæpius & copiosior, magisq; toti vrinæ permistus redditur. At si meatus vrinarum exulceratus fuerit, vrina subcrassa, & exigui cruoris, vel certè puris,

Vlcera vesicæ quomodo à renum differant.

puris, capillorum modo innatantis particeps excernitur. Similiter etiam membranulae, ac quaedam veluti fursurea prodeunt: dolor autem inter cutem & pubem affligit. Aduertendum quoque colem aliquando exulcerari, sicut vesicam quoque, sed pro-

Colis exulceratio.

5 prijs signis internosci. In colis vlcere excrementum primo exitu apparet: vrina verò sequitur. quòd autem è vesica affecta egreditur, vrinae mixtum videtur. quanquam si interea ramentum, siue pus vrinis admixtum in vesicae vlceribus excernatur, protinus tamen, vbi redditum est, subsidet. MATHETES, Quid de colis vl-

10 cere prædicis? GERON, Diu perdurare solet, & vix vnquam sponte sua confanescit. Quamobrem eo neglecto, vel tuberculum carnosum verrucæ instar suppullulat, vel sordes congregata in calum obdurefcit, idque non vno meatus loco, sed duobus, ac plærunque tribus. MATHETES, Vnde tuberculum, callumque na-

15 tum depræhendamus? GERON, Inde, quòd vrina supprimatur: vel tenuis reddatur: quòdque non pleno cursu, ac fluore, sed exili quodam ceu filo prodeat: tuberculum durum cole compresso percipitur, & fistula demissa occurrit, & tanquam offendiculum obstitit. MATHETES, Quid in curandis vesicæ vlceribus spei, aut peri-

Prognosticon.

20 culi prænosci potest? GERON, Omnes ijs affecti, dolore continuo, febribus, vigilijs, & tæbe intereunt: hi quidem citius: illi vero tardius, idque tum illorum, quæ dixi gratia, tum quòd vesica ipsa neruosa sit. Ea uerò ulcera maiori periculo subiecta sunt, quæ ex vesicæ erosione contrahuntur. Quæ uerò huius ceruicem oc-

25 cupant, minus periculosa sunt: quoniam ea non tam neruosa & exanguis, ut caua eius regio, sed carnosæ existit. Senes sub eiusmodi ulceribus nullam curationem, aliæ ætates difficillimam admittunt. MATHETES, Expositis iam vesicæ affectibus, cupio etiam abs te optime præceptor audire, quænam urinæ reddendæ

30 incommoda euenire solent?

GERON, Aliud, quo illa contineri nequit, sed inuitis, seu *INCONTINENTIA VRINÆ.* contra uoluntatem, ac intempestiuè, sine acrimoniæ & doloris sensu excernitur. græcis ἀκράτος ἐκκρησις τῶν ὕδρων, uel οὐρησις ἀπρόσδε-

35 τῶν, ἢ ἀκράτῳ: nonnullis hoc uitium οὐρουρῶντων appellatur. Aliud, quo urina paulatim destillat, ac ad excretionem assidue irritatur,

græcè uocatur σπασσοῦρία. Aliud, quo in totum supprimatur, ac gre-

σπασσοῦρία.

cè dicitur ἰσσοῦρία. Aliud quo eadem summa cum difficultate efflu-

ἰσσοῦρία.

it, & græcè δυσσοῦρία nuncupatur. MATHETES, In qua parte primum

δυσσοῦρία.

malum consistit? GERON, In secundo uesicæ ipsius musculo, qui ceruicem eius ambit, resolutionem experto. MATHETES, In qua

40 alterum? GERON, In uesica, licet ea non proprio semper, sed interrim accidentario affectu subeat, idque dum excretrix ipsius fa-

Causa inconti-
nentiae vrinae.

Suppressionis.

cultas immoderatiùs excitatur, vel ab excrementorum multitudine, seu acrimonia, vel ex propria eiusdem imbecillitate. MATHESES, Quæ pars in tertio vitio oblata est: GERON, Coles, & vesica, sic vt hæc imbecilla, & veluti torpida euaserit. MATHESES, Quæ singulorum horum vitiorum causæ existunt: GERON, Incontinentia vrinae, tum musculus, qui vesicæ ceruicem constringit, tum nerui, qui è lumbis in illum inseruntur, resolutionem experti auctores sunt. resoluuntur autem modò ex ictu, aut casu, modò ex refrigeratione, aut defluxione. Quibus vrina per somnum profluit, ijs musculus vesicam stringens, qui neque abundanti-
10
tiam, neque acrimoniam vrinae ferre potest, resolutus non est, sed laxus, mollisque euasit, præsertim cum vires animales somno sopitæ, obscuram functionem obeunt. Suppressionem verò totius vrinae, sola vesicæ astrictio, vel obstructio efficit: qua vel
vtriusque meatus vrinarij capita, vel ceruix vesicæ oppletur. Si
15
verò alter tantum meatus obstructus fuerit, nequaquam vrina supprimitur: id quod indicat vtriusque renis dolor, summa lumborum grauitas, interdum vehemens vtriusque partis cruciatus: nulla uel minima adest vrinae reddendæ cupiditas. In pube neque
dolor, neque tumor, etiamsi premas, sentitur: uesica inanis, uacua,
20
ut ne indita ei fistula, quicquam vrinae prodeat. At si ceruix uesicæ obstructa vrinam impediat, continuum vrinae reddendæ adest desiderium: summus, sed inanis conatus est: pubes vrinae collectæ copia distenditur, dolètque: meatuum vrinariorum capita obstruuntur calculis grandioribus, rarò humore crasso, vel sanguini-
25
nis grumo, rariùs ab inflammatione, vel pure: vesicæ ceruix subinde obstruitur, calculo inserto hærentēque, vel tuberculo carnosof, aut calloso, quale ex uirulenti seminis profluuiio generatur: minùs frequenter humore crasso, uel pure, vel grumo quodam vrina uisa est ceruice vesicæ obstructa, affatim profluxisse, dum
30
umbilicus non benè uinctus initio natiuitatis esset, neque coaluisset: nimirum quòd urina è uesica in umbilicum, sicut in vtero accidit, reflueret. Stillicidium tum ex urina acri, tum ex retentricis facultatis uesicæ imbecillitate contrahitur. Nam excretiones assiduæ, vel ob illam, vel ob rosionem humorum concitantur:
35
interdum etiam ob renes purulentos: interdum ob alias partes, quæ uitiosos ipsarum humores, aut pus, ubi abscessus aliquis infestat, cum urinis in vesicam possunt transmittere. Sub hoc malo vrina paulatim profluit, idque aliàs sanè cum quodam conatu, sed nullo cum dolore: aliàs cum vehemēti dolore, & irritatione. At
40
difficultas urinae vel ex eius acrimonia, vel ex inflammatione, vel ex vlcere ceruicis uesicæ proficiscitur. MATHESES, Vnde fit vrina
acrior?

- acrior: GERON, Ex victu calidiore, aut ex bile permista, aut ex pure acri, quod è rupto abscessu emanauit. MATHE TES, Quid in singulis istis vitijs curandis prænosendum erit? GERON, Inuitum *Prognosis.* vrinæ profluuium ex causa quadam exteriorē, musculo qui vesicæ ceruicem ambit, refrigerato, obortum celerius curari potest, quàm quod citra illam excitatum est, cum proprii eiusdem musculi nerui circa os sacrum offensi fuerint: adhæc qui vrinam ob ceruicis vesicæ vulnus, aut casum, aut vertebram luxatam continere nequeunt. si mortis notæ superueniunt, nulla medicina fiantur. In senibus id mali curari nequit: & si per febres acutas incidere, viribus iam debilitatis, exitium portendit. MATHE TES, Quid de suppressione vrinæ præfagis? GERON, Quæ ex spina percussa, aut casu, aut vertebra luxata, aut pestiferis accessionum insultibus generatur, nullam curationem recipit: vesica resoluta, nunc vrina contra voluntatem profluit, nunc in totum supprimi *Prognosticum.* tur. qui verò illam inuiti emittunt, minùs periculo sunt obnoxij: quibus eadem supprimitur, magis illi de vita periclitantur. Nam post vrinam interceptam vesica, lumbi, pecten, distenduntur: scæ mora intumescunt, & cum vrina non excernatur, subdita membra emoriuntur: atque ita longè post intereunt. Quinetiam, si concretus sanguis, seu grumus vrinæ exitum impederit, perniciosum est. nam partes affectæ putrescunt, contabescuntque, & omnes ferè talem vrinæ suppressionem experti, intereunt. MATHE TES, Quæ in difficultate vrinæ expectantur? GERON, Si ardentissimis ac malignis febribus superueniat, maligna censetur. non enim vesica solum sub hac, sed etiam omnes partes neruosæ affliguntur. Quæ verò alijs ex causis orta fuerit, tantò salutarior existit, quantò minùs doloris inducit, at quæ ex frigida intemperie prouenit, senibus periculosior quàm alijs esse solet. MATHE T.
- 30 Quid de stillicidij euentu prædicis? GERON, Id malum senibus diuturnum, iunioribus breuius: neutris nisi quid accesserit, mortiferum est. Si ileum ei adiunctum fuerit, primis diebus septem ægrum è medio tollit, nisi febris etiam interueniente vrina copiosius fluere cœperit. Quæ ex sanguine intus concreto exorta est, *Vesica vltim.* grauißimis periculis ægrum infestat. natius enim calor perit, pulsus fit paruus, frequens, & languidus: vel totus plærunq; collabitur. His accedit rigor, febricula, nausea, animi defectio, sudores frigidi, & similia, quæ sanguine intra vesicam coacto fieri constat. MATHE TES, Quid accidit, si vesica vulnerata fuerit? GERON,
- 40 Inguina dolent: quod super pubem est, intenditur: pro vrina sanguis, aut ex ipso vulnere vrina descendit: stomachus afficitur: ægri aut bilem vomunt, aut singultuant: frigus, & tandem mors

subsequitur. MATHE T. Quid reliquum de vesica habes? GERON, Solet etiam ex illa, sicut è renibus, cruenta quædam excretio, interdum cum alijs plerisque de causis, tum ob vehementes in calculo exprimendo conatus fieri. puri verò, sincerique sanguinis ex interiore colis meatu eruptio, non potest cruentæ vrinæ effusio appellari: eò quòd ille citra vrinam, & voluntatem ex vena ad-
 5 aperta, vel rupta, vel exesa profluat. At vbi sanguis vrinæ copiosus permiscetur, vel à renibus, vel à musculo vesicæ ceruicem stringente effluit. Non enim sanguis à meatu vrinario, neq; à vesica ipsa multus potest emanare: qui verò à renibus defluit, toti vrinæ ad amussim permiscetur, vt ea quasi dilutus, & tenuis quidam sanguis existat: qui mox subsidet, rubicundus, liquidus, ac minime concretus. MATHE. Vnde talis vrina cruenta procedit distil-
 10 laturque? GERON, Vel ex casu, vel ex ictu, vel certè ex calculo: qui dum æger valida exercitatione renes eiusque venas atterit, sanguinem profundit. Nam cum solus sanguis per colem redditur, calculum renis, eius auctorem fuisse sæpe constat. Iam etiam aliæ causæ huius fluxionem excitant, vt renum imbecillitas, eorundem adapertio, iecoris infirmitas, corporis repletio, mensium, aut hæmorrhoidum suppressio. MATHE TES, Quid aliud vrinam
 15 cruentam reddit? GERON, Sanguis, qui è musculo vesicæ ceruicem constringente in sinum illius instillat, non autem æqualiter vrinam perfundit: portio eius aut grumus citra illam interdum excidit: dolor plerunque, dum vrina redditur, premit, & ueluti colis radicem adurit. MATHE TES, Ex quibus purulenta vrina pro-
 20 dire consuevit? GERON, Interdum è renibus, interdum è colis fistula, illic pus urinae accuratè est permistum, aut si quid crassius seorsum est, id sub finem profluit: hic pus sincerum, quod à colis ceruice, uel à glandibus vesicæ ceruici adjacentibus (quos grece *πρωκτάς* uocaui) exulceratis, uel à uasis seminarijs exiuit: deinde purior
 25 vrina subsequitur. MATHE TES, Quales aliæ excretiones vrinæ existunt? GERON, Subnigræ, ac turbidæ, sine dolore exeuntes. MATHE TES, Vnde hæc proueniunt? GERON, Si neque ab arquato, neque à crisi prodeant, à calculo extracto, qui postea è rene grauius expellitur. Mucosa excretio, vel ab vlcere quodam, vel à
 30 calculo vesicæ trahit originem. Insuper excretio veluti capillamentis conspersa, vel à viscosa meatuum vrinariorum pituita: vel à seminis excremento, quod in uasis seminarijs longitudinem hanc consequitur. Haftenus de renum & vesicæ affectibus egi: nunc ad naturalium partium, quæ illis sunt proxime, vitia digre-
 35 diar. ac principio secreti & testiculorum, qui in illius sinu continentur, tum inflammationem, tum tumorem durum, ac scirrhum;

*Vrina cruenta
causa.*

Vrina purulenta.

Vrina nigra.

Vrina mucosa.

*Vrina capillamentis
plena.*

sum: deinde omnium ramicum genera persequar. MATHETES,
Quid indicat scroti inflammationem?

GERON, Distentio eius, durities, rubor, calor, dolor pun- *SCROTI in-*
flammetio.
ctorius, qui leui contactu intenditur, sic vt febris plærunque co-
mitetur. Quòd si testiculus solus inflammetur, symptomata ista
in alto percipiuntur, tactu magis quàm aspectu. MATHETES,
Vnde generantur? GERON, Extenui seruidòque sanguine in scro-
tum & testiculos profluente. Sin autem is in illud effundatur,
omnia foris conspectui subiiciuntur. si verò malè curata fuerit in-
flammatio, calore scilicet eius præproperè restincto, prædurus
sepe tumor illic, & durities citra ruborem doloremq; relinquitur.

Aliud scroti vitium est, cuius apud Romanos veteres inde-
corum, sed commune his herniæ nomen est, græcis κήλη, latinis
ramex. sunt autem plures eius species: prima in inguine promi-
ner, ac græcis βουβωνοκήλη dicitur, mulierum, atque virorum com-
munis: altera in scroto, quæ virorum solùm propria est. atque he- *Hernia in ingui-*
ne.
duæ sunt, quando tunica ea, quæ intestina ab inferioribus parti-
bus diducit, græcis περιγνώρος vocatur, rumpitur laxaturue, & o-
mentum, vel intestinum, vel aliud quippiam protinùs in alienam

sedem deuoluitur, vnde euident tumor excitatur: quanuis non
perseueret. nam cursu, exercitio, satietate, & spiritu retento auge-
scit: vbi verò æger resupinatus fuerit, eo quod intus est remean-
te, vel sponte, vel leui digitorum impulsu euanescit. Quando igitur *Ramex omenti.*
omentum in scrotum delapsum fuerit, nobis ramex, seu hernia

amenti, græcis Πρωτοκήλη nuncupatur. Is tumor nunquam in scro-
to tollitur, siue ingdia fuerit, siue corpus huc illuc conuersum,
aut alio quodam modo collocatum. si verò idē tumor attingatur,
inequalis, mollis, & lubricus deprehenditur. Quòd si intestinum *Ramex intesti-*
norum.
scroto inciderit, latinis hernia intestinorum, græcis ἐσπεροκήλη vo-

catur, atque is tumor, & doloris, & inflammationis expers, nunc
minuitur, nunc increscit. vbi verò eger conquiescit, aut etiam vi-
gilat, diutius tamen resupinus iacet, ille non apparet: interdum
ex toto euanescit: contra ex clamore, satietate, ac violento corpo-
ris motu, nixùque sub graui pondere augefcit, & omni frigore
contrahitur: calore autem diffunditur, seu laxatur. atq; tunc scro-
tum rotundum est, tactùque leue: idque quod subest, lubricum
est: si pressum est, ad inguen reuertitur: demissumque iterum cum
quodam quasi murmure, vel interdum spontè deuoluitur. Quan-
do vitium hoc ingrauescit, intestinum stercore accepto, vastius

tumet, retròque compelli non potest: vnde periculosus ille mor-
bus Iliacus generatur: qui ægro quoque vnam adimere solet. In- *Iliacus morbus.*
ter hæc, dolores magni, tum scroto, tum inguinibus, tum abdo-

mini superueniunt. Quinetiam stomachus frequenter affici incipit, bilisque vomitus, initio rufæ, deinde viridis, aliquando etiam atræ sequitur. MATHETES, Quomodo internoscam, vtrum

Hernia ex peritonæi ruptura.

hernia ex peritonæi ruptura, an ex eiusdem laxitate concitata fuerit? GERON, Si intestinum ex sola violenta causa antecedente statim ab initio, atque vniuersim in scrotum deuoluatur, tumorque

Peritonæi rupturæ nota.

grandis, & minus æqualis existat: & vbi æger resupinatus fuerit, intestinumque digitis pressum fursum multo crepitu, ac murmurere recurrat, idémque corpore iterum erecto, protinus vel tussi,

Laxitatis peritonæi signum.

vel spiritu retento in scrotum delabatur: peritonæi membranæ rupturæ nota est. Sin autem intestinum longiori temporis intervallo paulatim magis magisque quacunque de causa scroto illabatur: tumorque magis æquabilis, & altius delitescere deprehendatur, atque id quod descendit, nullo sonitu recurrat, neque adeo

Omenti & intestinorum ramex.

facile, cum æger se erexerit, decidat: membranæ iam dictæ laxitatem indicat, quæ vix vnquam extra inguina procedit: sicut ramex ex illius ruptura ortus, ferè semper in scrotum promouetur. Hic etiam notari debet, tum omentum, tum intestinum simul interdum ad scrotum descendere: quod vitium græcis

Ramex aquosus.

peritonæi offensam accidere solent. nam aliàs humor aquosus intus collectus, aliàs caro increfcens, aliàs varices ramicem progenerant. Cum humor subest, græcis ὑδροκήλη, quasi aquosus ramex dicitur, & tumor per se quidem nullum prorsus dolorem excitat: sed intento scroto firmius inherefcit, ac nunquam ex toto se remittit, vt alij: sed interdum leuior, aut propter famem, aut propter febriculam, maximèque in pueris sentitur: isque mollis est,

Sedes ramicis quomodo noscatur.

vt tactui cedat, si non nimius humor subfit. at si is vehementer increuerit, renititur, vt vter repletus, arcetèque alstrictus. venæ quoque in scroto inflantur: & si humor digito pressus circumfluensq; cedit, id quod non premitur, se attollit, & tanquam in vitro cornuæ per scrotum apparet. isque quandiu in ipso est, sine dolore est. MATHETES, Quomodo sedes ramicis istius deprehenditur? GERON, Si inter summam mediàmque tunicam est, cum humor duobus digitis pressus paulatim inter eos remittens subit,

Ramex flatuosus.

scrotum ipsius albidius est. si protrahatur, aut nihil, aut paululum intenditur: testiculus ea parte, neque visu, neque tactu sentitur. at si sub media tunica est, scrotum intentum magis se attollit, adeo vt superior coles, sub tumore eo delitescat.

Proximus huic aquoso ramici est, qui flatuosus dici potest, grauem dolorem nimio distentione concitans. Interdum ramex in vtraque parte scroti consistit, ac duplex dicitur: eaque ipsa, que

propro-

proposita sunt, cernuntur. Præterea ramex æquè integris tunicis innascitur, qui *καρσικήλη* græcis nominatur, nobis varicosus, cum venę intumescunt, durus, & ceu virgarum modo oblongus. Egedem venę intentæ, conglomeratæquæ ad superiorem partem, 5 vel ipsum scrotum implent, vel mediam tunicam, vel imam. interdum etiam sub ima tunica circa ipsum testiculum, neruūque eius increſcunt. Ex his cæ, quæ in scroto sunt, oculis patent: hæ verò, quæ mediæ, imęue tunicæ insident, vt magis conditæ, non æquè sanè cernuntur, sed tamen etiam visui subiectæ sunt. præterea tumoris aliquid est, pro venarum magnitudine, & modo, atque id prementi magis renititur, ac per ipsos venarum toros inæquale est, & qua parte id ipsum testiculum magis iusto dependet. Cum verò id malum etiam super ipsum testiculum neruūque increuit, aliquando longiùs testiculus ipse descendit, minórque 15 fit altero, vt pote alimento amisso.

Huic ramici aliquando alius accedit, licet rarò: sub quo caro durior, pondere grauior, obscurior, eiusdem coloris inter testium tunicas hæret, *σπερματήλη* græci vocant. Tumor huius pulsatus non resonat: longo autem temporis processu sensim increſcit. MATHETES, Quomodo omnes herniæ tumores inter se distinguuntur? GERON, Priores interdum ex toto desidunt: carnosus autem, & varicosus perpetui sunt: neque impulsu in abdominis interiora cedunt. adhæc carnosus molliores sunt: pulsati resonant, pondere leues, & obiecto lumine perspicui. Carnosi duri 25 sunt, graues, & obscuri, & longiore tempore increſcunt. MATHE. Quibus notis ramices tum virorum, tum mulierum distinguuntur? GERON, In viris omnes herniæ tumores in scrotum: in mulieribus tum intestinorum, tum omenti ramices in naturalia prolabuntur: è quibus illa tanquam è sacculo propendere videntur. 30 In his sæpe vmbilicus quoque ex partu, ictuue rumpitur, vt ramex cenſeri queat, intestinis sub cutem valdè prominentibus. Interdum accidit, vt intestinum aliquod ex accepto ventris vulnere prodeat: è quo stercus nondum cohærens, seu coactum alsidue redditur, itinere intercepto, quod in anum tendit. MATHE T. Qui ramicibus istis opportuni sunt? GERON, Aquosi sanè, malisque succis præditi, græcè *κακοχυμοί* vocantur, multò magis qui ad aquam subter cutem procliues sunt. MATHETES, Quid de ramicibus curandis spei, vel periculi expectandum erit? GERON, Qui ex ruptūra nati sunt, septem primis fortè diebus facillimè discutiuntur, præsertim in teneris: vbi in vetustatem inciderint, vix vnquam remedijs subtrahuntur. MATHE T²s, Quæ præcipuè naturalium partium vitia existunt?

Ramex varicosus.

Ramex carnosus.

Ramices mulierum.

Vmbilici ruptura

Ramicibus opportuni.

Prognosticum.

COLIS.

vitis.

GERON, Primùm colis, licet valdè rarum: quo ipse citra veneris desiderium assiduè erigitur, contrâque naturam, increfcit, & quasi rigore quodam distenditur: interdum cum inflammatione, interdum sine illa, nobis inuita Colis erectio, græcis ab effectu *πρωιανισμός* nuncupatur. MATHETES, Qua ex causa hoc vi-

Causa priapismi.

5 tium prouenit? GERON, Ex spiritu flatulento, qui Colis arterias, neruūque fistulosum abundè replet. MATHETES, Vnde spiritus iste nascitur? GERON, Ex crasso, glutinoso que humore, aut acquisito calore: vt quibusdam accidere consuevit, qui supini decumbunt. vbi enim lumbi ob supinum decubitus exalfacti sunt, a- 10 deò vt Coles extendatur, etiam si nullum libidinis desiderium vigeat, nequaquam priapismus dicitur: sed par est, vt lumbis calfactis etiam arterie calidiores reddantur, eoque ora earum magis pateant. Quare tunc non exiguum spiritus portionem in fistulosum neruum effundunt: qui paulatim impletus colem extendit, 15 sic ut calor ob supinum decubitus acquisitus ad venerem instiget. MATHETES, Quibus affectus iste incidit? GERON, Iis, qui antea veneri indulgere soliti, nunc longo tempore ab ea abstinentes, multo semine aliàs abundantes: præsertim vbi corpus non satis exercent: unde sanguinis abundantia dissipetur: adhuc illi, qui 20 cibis mali succi & acribus vsi sunt, quique antea corpus cingere non solebant, nunc spatio quodam temporis sine cingulo procedunt. MATHETES, Quàm ob causam potissimùm ex hisce iam comprehensis coles arrigi dicitur? GERON, Ideo, quòd arteriarum ora in ipsis ni ipsis nimium sint patefacta, alijs ob humorum copi-

Priapismo ebri-
xij.

25 am, seu vitiositatem, & acrimoniam, alijs ob spiritum flatuosum tum inordinatè, tum violenter vacuetur. MATHETES, Estne affectus hic coli proprius, an arteriarum ora quacunque ex causa patefiunt? GERON, Minimè, sed ex consensu, & lege consortij. qui verò ex spiritu flatuoso prodierit, is primarius ac peculiaris censeri debet. Sed non multis priapismus iste contingit, isque iuuenibus magis quàm alterius ætatis hominibus. MATHETES, Quid 30 de laborantibus eo præfagire licet? GERON, Nisi celeriter discutiat, ægri subito intereunt. atque tunc venter eorum inflatur, sudor que toto corpore erumpit. In nonnullis etiam coles post obitum rigidus deprehenditur. 35

Præfagias.

Satyriasis.

Simile huic vitium est, quod græcis *αἰσχυρία* vocatur, nisi quòd coles in hoc non inuitus, sed lasciuia quadam libidinis tentatione arrigatur. Non solum autem viris, sed etiam mulieribus: quanuis rariùs accidat, ex falso humore, & acri effluente contr- 40 etum: ob quem illi adeò magnum in genitali pruritus, dolorè que sentiunt, vt manum locis naturalibus continuè admoueant, & in:

& ingenti veneris desiderio contabescant,

Contrarium superioribus vitium sequitur, imbecillitas par-
tium genitalium, quam græci aliàs *παθος ἀπὸ ἀκρίων μορίων*, aliàs *ἀδυνα-*
μίαν τῆ ἀφροδίσμου nuncupant. *Naturalium im-*
becillitas. MATHETES, Vnde ipsa contrahi-

5 tur? GERON, Ex naturalis facultatis offensione: per quam fit, ut
cum ad venerem incitamur, coles neque attolli, neque protinus

distendi queat. atque affectio hæc symptoma est generalis fun-
ctionum naturalium noxæ, ac propriè genitalis eiusdem abolitio:
ob quam hoc malo affecti frigidi in venerem, ignauiq; fiunt. MA-

10 THETES, Quæ igitur præcipuè mali huius causæ sunt? GERON,
Genitalis resolutio, ex frigida quadam intemperie in eo exorta,
vel ob seminis inopiam, quæ ex senio, vel ex morbo, vel ex alijs

incepsit, quæ spiritum insitum, & virilitatem adimunt, vel ex in-
cantamentorum maleficijs, vel ex medicamentis, quæ semen geni-

15 tale aut vi propria insitq; aut qualitate manifesta imminuunt.
potest etiam idem hic affectus ex renum, aut cæterorum mem-
brorum principum consortij lege fieri. MATHETES, Ex quibus

dignoscam, num vitium hoc ex seminis penuria, an ex colis reso-
lutione procreatum sit? GERON, Non modò ex ijs, quæ adsunt, sed

20 etiam ex illis, quæ antecesserunt, indicijs, si corporis naturam, tem-
peramentum, ætatem, antecedentem victum perspectum habe-
as. MATHETES, Quæ igitur præcipua impediunt, cur semen non

emittatur? GERON, Magna vasorum illius obstructio, & partium
naturalium resolutio. hac enim laborantes, licet veneris libidine

25 tententur: tamen illam ob membrorum huic seruientium imbe-
cillitatem, excernere nequeunt. Quibus autem seminaria vasa ob-
structa sunt, ij neq; ruunt in venerē, neq; eius desiderio afficiuntur.

Est adhuc aliud circa naturalia vitium, quod græcis *γονόρροια*, *Seminis profusio.*

30 contra voluntatem sine venere, sine nocturnis imaginibus, sine
colis erectione continenter effluit. MATHETES, Quæ partes in
hoc affectu malè habent? GERON, Sola vasa semini dicata, non co-

lis meatus, per quem illud veluti iter excernitur: idque vel leui
quodam, vel nullo delectationis sensu, vel voluptatis titillatio-

35 ne. MATHETES, Quale id semen est, quod ita fertur? GERON,
Crudum, aquosum, liquidum, ac tenue, non prorsus album. in
mulieribus autem cum aliquo locorum naturalium irritamento,

pruritu, & titillatione exit. in eisdem illius profluuium in hoc
vulvæ fluori conuenit, quòd humor hic assiduè profluat: in illo

40 contrà dissidet, quòd multò hic sit crassior, quòdque vlcus ab acri
virulentòque excremento natum semper illam ferè affligat: adhæc
quod seminis profusio menstruïs fluentibus non desinat: vteri

Seminis profusio.

*Partes affectæ in
gonorrhœa.*

*Seminis proflua-
uij. & vulvæ flu-
oris differentia.*

Profusionis seminis causa.

uteri autem fluor in ipsis menstruis, & paulò post ea cessare solet. **MATHETES**, Vnde seminis profusio accidit? **GERON**, Ex vasorum seminariorum facultatis retentricis imbecillitate, seu potius resolutione: qua illud vel concoqui, vel retineri nequit, donec mature scat, crassescatque. Partes enim seminariae, in quas humores abundantes longa consuetudine descendunt, imbecilles red-
duntur. **MATHETES**, Quos malum hoc frequentius inuadit. **GERON**, Eos, qui natura semine abundant: qui que olim veneri sæpè indulserunt: sed postea continentius vitam degerunt: præcipuè verò illos, qui ad eò acri, ac tenui semine scatent, vt retentrix fa-
cultas id continere nequeat: quod colorem pallidum, aut flauum repræsentat, cuiusque ardor acris inter exeundum percipitur, naturaliaque rodit.

*Varie species profusio-
nis seminis.*

Præter hanc seminis profusionem, alia quædam species inuenitur: qua illud leuissima etiam occasione, veluti solo clysteris
vfu, aut alui deiectione excerni solet. Reperiuntur etiam, qui ex longa profluuij consuetudine per insomnia, atque imagines purum sanguinem non minori voluptate, quàm semē profundunt. Differunt igitur dictæ iam seminis profluuij species in hunc modum: aliæ ob retentricis facultatis imbecillitatem fiunt, cole non
intento: aliæ eodem rigido, vt in distentione quadam, vel in morbo comitali aliquando accidit: quanuis minimè absurdum fuerit, eiusmodi affectum in vasis seminarijs, ipsæque solis interdum excitari: cum scilicet aliquid distentioni simile patiuntur. Non
solum igitur corpus, sed aliæ quoque partes, vt manus, aut pedes, aut digiti interdum distenduntur. **MATHETES**, Quibus indicijs hoc secundum seminis profluuium à priore dignoscitur? **GERON**,
Primum est proprium, ac verum: alterum autem improprium: quo semen cole extento, quanuis etiam contra voluntatem, emit-
titur: & cum id citra morbum comitalem, aut aliam generalem distentionem fiat, nulla ex prædictis affectio indicatur, sed sola
vafa seminaria vitium distentioni simile experiuntur: eò quòd non alia ratione quæuis singularis distentio generari possit: maxi-
mè verò à spiritu flatuoso trahit originem. **MATHETES**, Acciditne adhuc alio modo seminis profluuium?

*Tertium seminis
profluuium, &
eius causa.*

GERON, Vtique, per libidinis insomnia, aut attentam veneris cogitationem: sub hoc semen largiter emanat, idque non
crudum, aquosum, & sine sensu, vt in vera seminis profusione, sed magna cum voluptati exit: & in mulieribus cum aliquo partium naturalium pruritu, & titillatione. **MATHETES**, Quid hanc seminis profusionem excitat? **GERON**, Abundantia ipsius, vel calor, & acrimonia naturam concitans, vel ingens partium seminariarum
robur.

robur: eò quòd illud iucunda voluptate semper excernatur.

Præterea aliud nouum, huic finitimum contagiosumque nostro seculo accessit, de quo supra mentio facta est: vnde lues venerea contrahitur: sicut hæc quoque illud progignit, eòque sc-

Seminis profusum non genus nouum ac contagiosum.

5 dum virulentumque appellatur. MATHE TES, Quomodo ab alijs

dignoscitur? GERON, Virus in eo album, aut modicè atrum è vasis seminarijs, tum per vigilias, tum per somnum ægris nescijs excidit.

Causa peculiaris seminis profusuij

MATHE TES, Ex qua peculiari causa malum istud oritur? GERON, Ex vasorum seminalium testiumque imbecillitate: non ea

10 quidem simplici, sed quàm venenata lues peperit. hæc enim, quicquid in vasis hîc colligitur, in fœdum, tetrumque virus conuertit: quod deinde quemlibet alium contagio inficit, inquinatque, virus hoc temporis processu putridum, & acre efficitur, canalèq; colis transitu exedit, atque vlcerat. MATHE TES, Quid vlcus iam

Vlcus colis notæ

15 factum esse ostendit? GERON, Dolor, qui colem sic afficit, vt cum is erigitur, veluti fune substringi videatur: nec non adeò pungit, vt cum vrina reddi incipit, vel desinit, difficultas eius, vel calculus subesse putetur. Idem vlcus tam altè interdum depascitur, vt in summam colis partem foràs erumpat: vbi virulentus fluor præter rationem suppressus fuerit, abscessus sæpe intus colligitur, modò in plexu vasorum supra testiculum sito, modò in parte scrotum & anum intercedente: qui, rupta seu adaperata cute, materiam profundit. MATHE TES, Quæ tandem facultatis retentricis imbecillitatem efficiunt, vnde seminis profusio contingit? GERON,

Quæ imbecillitas retentricis facultatis pariat.

25 Omnes intemperaturæ excellentes, præsertim humida, aut calida, seu quæ ex his conflatur. MATHE. Ex quibus signis id distinguere licebit? GERON, Ex ijs, quæ propriè easdem intemperies notant: nec non ex totius corporis natura, & antecedente victus ratione: interim ex seminis ipsius copia: quæ eandem vasorum seminari-

30 nariorum retentricem facultatem adeò grauatur, vt semen ipsum ab ea retineri prorsus nequeat, & sic contra voluntatem excernatur: idque in ijs potissimum, qui crebriore vt concubitu, & postea continentius viuere consueuerunt. At non solum humor abundus, sed etiam acris & tenuis id præstare potest: dum facultatem nuper dictam irritat, quod rosionis, feruorisque in semine excernendo sensus ostendit. MATHE TES, Cum igitur variæ sint profusuij seminis species, earumque causæ, præcipuè autem retentricis vasorum seminariorum facultatis imbecillitas, & adhuc affectio, quæ similiter ac naturalis ipsa vis excretor, partes moue-

Variæ profusuij sanguinis causæ.

40 repotest: dic obsecro, quid de malo hoc curando, vel sperandum, vel metuendum censes? GERON, Prima interea dum adeò diuturna & larga existit, vt interposito spatio hominem tabe consumat,

Prognosticon.

Corpus enim paulatim corrumpitur . quia cū alijs in locis omnibus, tum maximè circa lumbos emacrescit . ægri hoc vitio laborantes, os ventriculi habent languidum, toróque corpore sicci, graciles, pallidi, cauisque oculis apparent. *MATHETES*, Quæ ætate hoc seminis profluuium oboriri consuevit? *GERON*, Qualibet: maximè verò post pubertatem: quæ quartumdecimum annum exceſſerit. *Galenus* prodidit, mulierem vterinis morbis obnoxiam, copiosissimum crassissimūq; semen prius in vuluam, deinde ex ea foras emisisse. *MATHETES*, Quare semen tam diu in vtero retentum erat? *GERON*, Quia mulier longiore tempore videri 10
 dua manserat. quando autem illud emittebat, lumbi, manus, ac pedes ipsius quodammodo distendebantur, quasi comitiali spasmus afficeretur. *MATHETES*, Quid de colicis vlcere præſagis? *GERON*, Diuturnum esse solet, & vix vnquam spontè conſanescit. Quare si id negligatur, vel tuberculum carnosum, verrucæ 15
 modo succrescit: vel congregatæ sordes in callum obdureſcunt. non vno autem canalis eius loco, sed duobus, aut plarunq; tribus. *MATHETES*, Quæ id tuberculum, seu callum indicant? *GERON*, Vrina suppressa, eaque tenuis: eò quòd illa non pleno cursu ac fluore, sed exili quodam ceu filo prodeat. Tuberculum du- 20
 rum cole compressoprehenditur, & demissa fistula fit obuium, quasiq; offendiculum obſistit. *MATHETES*, Viriles partium naturalium morbos interpretatus, similiter iam muliebres enumeres. *GERON*, Iam iam eos aggrediar. ac grauissima vuluæ inflammatione 25
 principem locum habet, quæ non solum eius ceruicem, quamuis sæpius, sed etiam totam ipsam occupare solet. *MATHETES*, Quæ sunt eiusdem indicia? *GERON*, Vehemens pulsansque muliebrum locorum dolor: & si prior eius regio affecta est, pubes excruciat: quædam urinæ difficultas & stillicidium vrget. si posterior, lumbi dolent: aluus astringitur. quòd si in late 30
 re vitium subſtet, inguen intenditur, crura grauiægrè mouentur: febris acuta semper adest: nec non multus capitis dolor, præfertim in priore ipsius parte, & circa oculorum radices moleſtat. adhæc venter imus, pubes, coxæ, & vicinæ hisce partes affliguntur, distenduntur, grauanturque: lumbi valde æſtuant: stomachus dolore, nausea, & singultu conuelli incipit. Porro ipsa mulier adeò incommode in quamlibet corporis partem mouetur, vt 35
 neque sedere, neque surgere, nisi summa cum difficultate: neque pedibus ingredi, nisi claudicatione quadam possit: difficulter & moleſtè in latus integrum cubat. Si vuluæ ceruix inflammatione 40
 laboret, quod crebrius accidit, abdomen dolet: & si os ipsius digito per ceruicem indito attingatur, prematurque, valde indoleſcit, du-

*VULVÆ IN-
 flammatio.*

Signa.

- cit, durumque feruidum, & periculofum occurrit. MATHETES, Quæ causæ malum hoc vuluæ efficiunt? GERON, Partim interiores, partim exteriores. illæ quidem, vt tenuis ac feruens sanguis, ex caua vena, per exiles eius propagines, in ipsammet vuluam, non eius ceruicem effusus, ardoremque & putredinem expertus: mensium suppressio: vuluæ eiusdem vlceraatio, hæ verò, vt ictus: multus concubitus, abortus, fœtusque sinistrè editus: durior sella: longa intentaque ambulatio: flatus quoque & frigus: quæ vuluam adedò astringunt, vt transitum impediunt. Porro eadem vuluæ inflammatio, interdum tumorem durum, sensusque expertem facit: rariùs cancrum: sæpiùs abscessum. hic simulatque fieri incipit, dolorem pullantem, febresque adauget, atque hæ frequentius cum horrore sub vesperam incurfant, & accessiones inordinatas habent, intendunturque. Pure iam confecto, statim hæ ipsa remittunt, atque iterum, vbi abscessus rumpitur, inualescunt: ac tum quidem modò vrina, modò aluus, modò vtrunque supprimitur, nonnunquam pubes intumescit, & profluentis cuiusdam rei ceu inundatio percipitur, vbi abscessus maior fuerit. MATHETES, Quæ inflammationem neque solutam esse, neque in abscessum abiisse, sed in scirrhi naturam degenerasse significant? GERON, Febris, dolorque, & leuiora symptomata remissa: sic tamen, vt tumor, & renixus, grauitasque permaneant, totumque corpus non solum crura ad omnes vitæ actiones segniter moueantur. MATHETES, Quid de inflammationis curatione, & abscessus prædicari potest? GERON, Quæ ceruicem, aut os vuluæ obsidet, ratione quadam sanari: quæ totam affligit, nulla potest. quæ fundum, siue sinum eiusdem occupat, magis periculosa est, sicut etiam, quæ plures vuluæ partes, quàm quæ pauciores infestat. Si pus album, læue, æquale, & non fœdi odoris foras per vuluæ ceruicem prodit, salutem fœminæ portendit. si verò virulentum, fœtidum, & variè coloratum exierit, vitam in periculo versari indicat. MATHETES, Quid si non inflammatio, sed erysipelas vuluam in grauida excruciet? GERON, Mortiferum est: quanquam vera inflammatio modo sit exigua, minùs periculi signet: imò neque acutam febrem habet coniunctam, licet ea in iocinore, ventriculo, aut septo transuerso sit procreata. MATHETES, Quod vitium rupto vacuatòque abscessu sequitur? GERON, Vlcus vel simplex, vel sordidum. MATHETES, Quæ vtrunque notant? GERON, Primum humor paucus, æqualis, crassus, & albidus ex eo affluens: alterum autem plus quidem humoris, sed minore cum dolore exiens. Eadem hæc vlcera vuluæ interdum maligna redduntur, quòd illa excrementis, & putredini pateat. sæpe ipsam inuadunt, quæ pro-

*Inflammationis
causæ.*

Præsignum.

Vuluæ vlcus.

Signa.

*Nomen.**Causa.*

ximas partes depascendo serpunt, græcis *vouçai* appellantur. atque tunc multò magis sordida, foetida, atque contumacia quàm antea existunt, vel in carcinomata degenerant. MATHETES, Vnde vlcera prædicta omnia oriuntur: GERON, Non vna ex causa. nonnunquam enim vulua ab acribus medicamentis: nonnunquam ex partu difficili, foetu excusso, aut corrupto vlceratur: frequenter etiam ex abscessu rupto, aut succorum rodentium fluxione: vt ex ægris ipsi mulieribus, aut ex earum familiaribus, aut ex hisce que comitantur, vel ex tuo ipso ingenio animaduertere poteris.

CANCER vulua.

Præter hæc vitia, etiam cancer tum sub hoc casu, tum sub duro, longo, diuturnoq; vuluæ tumore oboriri solet: quando dolor circa inguina, imò ventrem, abdomen, & lumbos percipitur: moles intus, veluti pondus aliquod, grauis esse videtur: febrisq; ei iungitur, non tamen adeò ardens, vt in eiusdem vuluæ inflammatione. non celeriter malum hoc sanari potest, sed valdè est diuturnum. Quòd si ei exulceratio accesserit, non solum dolor partem affectam excruciat, & durus est: sed etiam oræ adsunt prætumidæ, & sordibus concretis liuidæ, horridæque: pus ex eo defluens, grauissimi odoris est, tenue, nigrum, seu fuluum. Si roges num malum hoc citò sanari queat, respondeo ex Hippocratis sententia, nulla illud medicina subtrahi posse. MATHETES, Quomodo exulceratio deprehenditur: GERON, Specillo oriculario: altius autem condita, per humores excrementitios indicatur. MATHETES, Quid in vlceribus vuluæ medendis spei habendum putas: GERON, Non multum, nisi summa maturaque diligentia eis adhibeatur. Cùm enim illa totius corporis recrementa excipiat, naturaque sit neruosa, haud facilè, præsertim inueterata vlcera curationem recipiunt: quanquam ea, quæ in conspectum veniunt, celerius, quàm quæ in alto sunt: puraque, aut etiam sordida faciliùs curentur, quàm depascentia.

SCYRRHVS veri.

MATHETES, Quis alius tumor, prætereos, quos retulisti, vuluæ obuenire solet: GERON, Qui græcis *σκιρπος* dicitur, nunc totam illam, nunc alteram eius partem obsidens: tactu durus, & renitens percipitur: dolorem nullum, aut certè obscurum mouet, vrinam vel aluum reddit difficilem. cùm foemina recta consistit, graue pondus tanquam foras prolapsurum in naturalia decumbit. quando autem sedet, aut cubat, rectum intestinum pondere suo premit. Cæterùm grauius incedit, totumque corpus, præsertim inferius languescit, vt vix moueri queat. MATHETES, Vnde tumor iste contrahitur: GERON, Ex humore crasso, iterumque per vuluæ spatium diffuso, concretoque, vel ex inflammatione, neque resoluta, neque in abscessum conuersa.

MATHE-

- MATHESES, Qui alij casus vtero superuenire solent? GERON, Cùm vterus fœtus concipiendj, alendique sit instrumentum, natura ei sanguinem ex toto corpore transmittit, cuius melior pars fœtui si adest, nutriendo communicatur: deterior singulis mensibus expurgatur, idque plurimis anno ætatis quarto decimo: quinquagesimo autem fluere desinit. nonnullis ijsq; paucis à duodecimo, & ante decimumtertium incipit, duratque ad sexagesimum: non autem vniuersis eodem tempore mensuræque, & totidem diebus prodit, nam plærisque ad duos, aut tres: pluribus vsque ad quinque, alijs ad septem: paucis ad duodecim dies expurgatur. MATHESES, Quantum sanguinis fœminæ singulis vicibus excernere solent? GERON, Complures minùs quàm duas heminas diebus quatuor reddunt. MATHESES, Quando repetit menstruorum purgatio? GERON, Singulis viginti duobus, aut
- 15 summum triginta diebus: nonnullis tardiùs erumpit, & citiùs deficit, præsertim obæsis: quibus à trigesimo quinto anno vt plurimum cessare incipit. id quod tum naturæ, tum victus diuersitas efficit: vnde etiam alijs ea purgatio copiosior, alijs paucior emanat. MATHESES, Quæ idonea, & naturæ familiaris esse dicitur? GERON, Quæ opportuna, mediocris, æqualisque, & boni coloris singulis temporibus, & ijsdem ferè mensium diebus fertur: quæque vbi desijt, neque vires imbecillas, neque grauatas relinquit. MATHESES, Quandiu sanguis iste menstruus, vbi inceperit, augetur? GERON, Vsque ad ætatis florem, idque paulatim: deinde
- 25 æqualis aliquandiu permanens, modicè admodum crescit, aut imminuitur: etate declinante, rursus sensim minuitur, donec ex toto deficiat. MATHESES, Omnèsne fœminæ ex naturæ præscripto hac purgatione destitui solent? GERON, Nequaquam: sed aliæ naturaliter, vt quæ infra quartum decimum annum subsistunt, vel
- 30 quinquagesimum exceßerunt: nec non grauidæ, in quibus sanguis ad alimentum fœtus retinetur: sicut etiam cantatrices, & saltatrices, quibus id quod in eis est superfluum, nimia exercitiij vehementia consumitur. adhæc quæ calidiore temperamento sunt prædite, & validis vtuntur exercitijs, vt plærunque agrestes, parum purgantur: sic tamen, vt nulla inde, vel totius corporis, vel vteri molestia afficiantur: cùm alijs, quibus erumpunt, horrores, lassitudines, capitis grauitates, & cervicis dolores incidunt, aliæ contra naturam non purgantur, vtpote quibus menses rariùs, quàm alijs, & parciore quàm naturæ & victu ratio exigit, profuunt. MAT. Quibus menstrua mulieri suppressa esse indicantur?
- 40 GERON, Lumborum, scapularum, capitis, præsertim in prioris eius parte: denique totius corporis grauitate, & dolore, tan-

Sanguis quantum fœminæ excernant.

Menstrua purgatio quæ idonea.

SUPPRESSIO menstruorum.

quam tensoriæ laxitudinis: qui etiam ad ceruicem & oculorum radices perueniat. foemina à menſtruis defecta: ſepè inareſcit: ac ſi conceperit, ſæpiùs nauſeat, cibumque ſtudit: frequenter etiam febricula vrgetur, triſtisque ipſa, & inquieta eſt: crebrò viri conſuetudinem concupiſcit: vrinę eius craſſe ſunt, turbidæ, rubicundæ, & nonnunquam nigricantes: ex quibus tandem graues, ac diuturni morbi proueniunt. *MATHETES*, Quæ menſtrua impediunt, ſupprimuntque, ne rectè atque ordine ex naturæ præſcripto fluant? *GERON*, Cibus, potuſque minutor, labor ingens, ſudor, immodica ſanguinis, vel ex naribus, vel ex hæmorrhoidibus, vel è vena ſecta profuſio: vomitio, aut largior alui deiectio, corporis extenuatio, ex quocunque morbo ſit contracta. adhæc curæ, ac mœrores, magnus timor. idem etiam efficiunt cauſæ interiores in partibus principalibus, vt in iecore, liene, ventriculo, aut pulmonibus: alię in toto corpore, alię in ſolo vtero. *MAT.* Quę autem ſunt huiuſmodi cauſę? *GER.* Intemperies frigidior, in illis contracta, multa obſtructio, aut ſcirrhoſa durities: vt in arquato, malo habitu, aqua ſubter cutem, ſuſpirio, ſeu aſthmate, & in alijs affectibus: quorum vitio ſanguis venarū labefactatur. Preter hæc craſſorum viſcoſorumque ciborum vſus, aut larga frigide potio, aut vita otioſa, frigidus, craſſuſque, & glutinoſus ſanguis, menſtruum purgationem remorantur. *MATHETES*, Quando vterus eandem impedit? *GERON*, Vbi refrigeratus eſt, aut obſtructus per ſe, vel ex tumore, ſiue ſcirrho, ſiue inflammatione. adhæc ſi idem vterus ſit peruerſus: aut ſi os eius obturatur ſanguine concreto, vel carne excrescente, vel adipe copioſa, vel pellicula circa ceruicem eius adnata: vel à cicatrice vlceris poſt abortum malè inducta, vel à vitioſa figura ipſius in origine contracta. Quibus mulieribus hæc contingit, eæ, licet nunquam menſtrua, vel alia quædam ex vtero ferantur, incolumes tamen aliquando perſiſtere poſſunt. *MATHETES*, Quæ poſt menſtruorum retentionem comitari ſolent? *GERON*, Grauiſſimi affectus, vt furor, melancholia, morbus comitialis, ſanguinis reiectio, & ſyderatio, reruorum reſolutio, caligo oculorum, tuſſis, difficilis ſpiratio, vteri ſtranguilatus, duri tumores viſcerum, aqua ſubter cutem, cholera, palpitatio cordis, ſyncope, & id genus alię. Quæ de cauſa niſi maturè euacuentur, maximè ſi à partu fuerint ſuppreſſa, grauiſſima pericula inuehunt. quia non modò humorum abundantiam: ſed etiam inſignem eorū prauitatem pariunt. At quibus vlcerum poſt abortum cicatrices, vaſorum vteri oſcula excæcarunt, eorūq; menſtrua fuerint retenta, nullam prorſus curationem recipiunt, ſicut etiam illæ, quibus membranula quædam ori vuluę oppoſita fuerit,

*Cauſe menſtrua
impedientes.*

*Quæ menſtruorum
retentionem
ſequantur.*

Prognſticum.

rit, nisi statim ab initio perforetur. **MATHESES**, Quibus notis scemina à mensruis defecta esse cognoscitur? **GERON**, Quæ lachabet: non autem nuper peperit, neque grauida est: & si cum diu sic manet, acerbissimos in capite dolores percipit, vel alia quæpiam pars morbo affligitur, cui interea sanguis è naribus profluit, ea planè secura est. Porro quæ mulier non peperit, ea grauius, & citius quàm quæ peperit, mensruorum retentione laborat.

Nota.

MATHESES, Solèntne eadem mensrua etiam largiùs aliquando profluere, quàm natura postulat, sicut aliquando parcius, vel nullo modo ferri iam dixisti? **GERON**, Indubiè, non rariùs hoc quàm illud malum æquè horrendum infestare consuevit. non solum autem mensrua vberius profluunt, sed etiam aut diutius, aut crebrius, aut non statò circuitu: græcè vocatur *κατὰ φύσιν*, hoc est purgatio, quæ iustum naturæ modum excedit. **MATHESES**, Quæ ergo ex naturæ præscripto, & moderata est? **GERON**,

MENSTRUORUM nimia profusio.

In qua, cum mulier sana est, duæ heminæ sanguinis mensruui, aut paulò plures, aut pauciores, idque in duobus, aut tribus diebus, profluunt. quanquam eadem mulieribus albis, ac mollioribus, vtpote copiosiore, & tenui sanguine præditis, etiam per sanitatem diutius perduret. in nigris autem, duris, ac gracilibus non item. **MATHESES**, Quot modis fit nimia mensruorum purgatio? **GERON**, Tribus. primùm cum celerius fit, quàm antea: deinde vbi copiosior: tertio cum à partu, aut abortu. At cum mensruorum profluuium, ob grandiore partum incidit, minùs periculosum est, & sua sponte propemodum desinit: vbi abortum comitatur, sceminam exanimat, & in præceps rapit exitium. Si grandior vena rupta, aut patefacta nimis fuerit, sanguis largissimè profunditur: si verò minor, parcius, & paulatim ille manat. Si quæ vena crofa fuerit, non modò sanguis pedetentim, sed etiam

Nimia mensruorum purgatio quot modis fiat.

cum sensu doloris fertur. *Sceminæ humidiores, mensruis diutius laborant, eoque citò, si illa cessent, intumescunt.* **MATHESES**, Quæ mali huius notæ sunt? **GERON**, Totum corpus infirmum redditur: calor eius vitiatur: cibi cupiditas, & concoctio intercidit: febriles ardores crebri sunt: deinde pedes molli tumore, qui grecis *οἰδημα* dicitur, instantur: nouissimè totum corpus intumescit: unde aqua inter cutem subit. **MATHESES**, Quæ immoderata mensrua excitant? **GERON**, Vasorum ruptura, aut apertio: item quæ sanguinem adeò calefaciunt, & extenuant, vel quomodocunq; exagitant, vt venarum ora adaperiant, & ille adeò efferatur. Vt naturæ vi, &

Nota.

robore vix cohiberi possit. Quinetiam nimius mensruorum fluor, ab omnium ex æquo humorum plenitudine fieri solet, quæ plerunque adeò magna est, vt non solum venarum ora patefaciat,

Cause.

sed etiam ipsâmet, præsertim tenues interdum disrumpat: id quod his ferè contingit, quibus menstrua diù suppressa, deinde simul, & concitatus erumpunt: item quibus abortus factus est: aut veri, aut irriti foetus, quauis ex causa sunt editi. Insuper largius etiam profluuium efficit partus laboriosus, & difficilis: cum vel grandior infans, vel obliquè situs, nimio conatu excluditur: in quo venæ vel rumpuntur, vel nimium dehiscunt. Nam si grandior vena plus iusto patefacta fuerit, sanguis largissimè profunditur: si verò minor, paruus, & paulatim ille exit. at si quæ vena erosa fuerit, non modò sanguis pedetentim, sed etiam cum grauissimi doloris sensu fertur. *MATHESES*, Vnde cognoscam, sanguinem ex vasis ruptis profundè? *GERON*, Ex antecedente frigore, vehementi motu, illius abundantia, dolore. *MATHESES*, Quæ notant ex apertis venis menstrua ferri copiosius? *GERON*, Calida corporis affectio præcedens: vt si mulier crebris, eisque calidis balneis vsa fuerit, & regionem inhabitet calidam: tempusque tale intercesserit: nec non cibi, & potiones similes assumptæ, sic vt nullus dolor sentiat. *MATHESES*, Quando purgatio nimia ex erosione vasorum excitata esse dicitur? *GERON*, Cum sanguis non vniuersè, sed modicè, & paulatim, summòque cum dolore fertur. *MATHESES*, Quid parit erosionem, largioris illius floris menstrui causam? *GERON*, Vitiosi humores toto in corpore abundantes, nempe biliosi, aut pituitosi, falsiq: id & reliqua eorundem humorum indicia propria, & sanguinis menstrui color testantur. *MATHESES*, Quid periculi, aut spei in hisce menstruorum profluuijs expectari solet? *GERON*, Quædam ex his in aquam subter cutem incidunt: sicut etiam, cum menstrua purgatio in totum cessarit: cum vtrunque sceminam ad summum frigus perducatur. Quæ menstruorum profluuia, partus grandiores sequuntur, non ad eò periculosa sunt: imò plærunque sponte sua desinunt. quæ verò abortum comitantur, sceminam exanimant, & in præceps rapiunt exitium. Quacunque ex causa immoderatus menstruorum profluuium euenerit, animi defectionem, & syncopen, interdum etiam mortem minatur, vt in alijs sanguinis fluoribus accidit. *MATHESES*, Semelne tantum in vno quoque mense purgatio ista sanguinis incidere solet? *GERON*, Vtique, si scemina sana est: aliàs bis, aut ter in mense, easdem ob causas redit: eò quod copiosior fuerit, quàm & nature ordinem, ac mensuram in ea seruare possit. Atque tot modis immoderata menstruorum purgationes vniuersæ, ac subito fiunt.

Note sanguinis ex vasis ruptis nimium profusi.

Ex erosione vasorum.

Vnde erosio, quæ largioris menstrui floris pars est.

Præsignia.

VTERI STILLICIDIUM.

Alia quædam etiam his contraria nonnunquam incidunt, quæ vteri stillicidium, seu fluxio diuturnior dici potest: sub hac quoque

etiam sanguis parcior, ac paulatim absque ordine destillat: nunc purus, nunc serosus, & veluti saniosus: aliàs asiduò, aliàs breuio-
 re interuallo. *MATHESES*, Vnde hæc fluxio prouenit? *GERON*, *Causa.*
 Ex venarum erosione, vel simplici, vel coniuncta vlceri: quod
 5 modò vterum, modò ceruicem eius infestat. *MATHESES*, Quid *Nota.*
 erosionem ostendit? *GERON*, Ardor aut nullus, aut obscurus.
MATHESES, Quid vlcus? *GERON*, Manifestus ac vehemens cru-
 ciatus, qui plærunque digito demisso deprehenditur.

His alius fluor vteri accedit, qui græcis *γυναικίος πόϋ*, nobis *FLUXIO*
 10 fluxio muliebris, vel profluuium nominatur: sub quo totius cor- *muliebris.*
 poris recrementa per vterum expurgantur. Quimadmodum en-
 nim menstrua vitio corporis aut supprimuntur, aut parcius, aut
 æquo largiùs profluunt: ita vitiosi humores, ac excrementiij il-
 lius, per hunc fluorem excernuntur. idque continuò, absque vllò
 15 ordine, & circuitu. *MATHESES*, Quæ pars corporis in hoc malo
 affecta est? *GERON*, Nulla certa: quanquam vterus toti corpori
 euacuando inferuiat, sicut interdum etiam renes. *MATHESES*,
 Quibus notis muliebris fluxio ab alijs differt? *GERON*, Id quod *Fluxio muliebris*
 excernitur, nunc liquidum est, albicans, lactis sero, aut ptisanæ *quibus notis ab*
 20 cremori simile, à pituitoso sanguine proueniens: quo corpus a- *alijs differat.*
 bundat, & sine dolore prodit: nunc luteum, aut pallidum, nunc
 subuitride, adeòque acre, & rodens, adurènsque, vt quamcunque
 partem attigerit, erodat, aut leuiter vlceret, bilis amaræ soboles.
 atque id rursus aliàs tetri grauisque odoris, aliàs nullius est. Loci
 25 muliebres continuè madent humoribus, colore varijs: ægra co-
 lorem decorèmq; amittit: alimentum non sentit: cibum fasti-
 dit: inter ambulandum difficulter spirat: oculos habet prætumi-
 dos, modò cum dolore, modò sine illo: aut cum exulceratione,
 aut absque illa, siue inflammata, siue sordida, siue pura. præter hæc
 30 tristitia summa vrget, tumorque pedum. in quibusdam destilla-
 tio perpetuò continuatur: in quibusdam per interualla redit. At
 si purus sanguis, vt ex vena incisa, isque cum dolore profluat: vte-
 ri erosionem fluoris huius auctorem esse testatur. hic autem non
 muliebris fluor dicetur, vt in quo vterus affectus non sit: sed in
 35 hoc peculiari morbo, nempe ipsius erosione laboret. *MATHESES*,
 Vnde vitium hoc contrahitur? *GERON*, Ex humoribus vitiosis: *Causa.*
 qui non solum in vulua, sed etiam in principibus partibus ali-
 quando consistunt, vel à retentrice facultate imbecilla, vel ab ex-
 pultrice nimium concitata: vel ab vtrisque læsis, tum copia, tum
 40 qualitate: aut quòd totus sanguis tenuis, serosusque sit redditus.
MATHESES, Quando talis efficitur? *GERON*, Vel cùm facultatis
 sanguificæ munus deficit: vel eius, quæ tenue & serosum separat:

vel cum retentrix facultas actionem suam nimium vrget, cutis-
que inspissatur, & renes sunt occlusi. Quinetiam alia causa, sed ra-
rior hunc morbum efficit: nempe vel frigida ferè vteri intempe-
ries, vel imbecillitas, ab vteri gestatione, partu, contusione, casu-
um exteriorum vi contracta: vel erosio, vel vlceratio ex inflam-
matione, vel ex abscessu relicta. Si fluor iste parcius fuerit, solus
vteri affectus est: si amplior, vesicæ totiùsq; corporis vitia illum
gignunt. MATHETES, Quæ mulieres huic vitio potissimum sunt
obnoxie? GERON, Complures: sed peculiariter hæ, quibus hy-
drops conspicuus singulis mensibus per vterum expurgatur. non
solum autem hic affectus fœminas ætate maturas, sed etiam puel-
las octodecim, aut pauciores annos natas malè coloratas inuadit.
Cæterum rubra fluxio, mulieres ætate vigentes ferè infestat: de-
clinantes, alba. MATHETES, Quid de curatione huius floris præ-
sagis? GERON, Si vterque ætati, in qua oriri solet, responderit, fa-
cilè sanatur: si ab illa dissidet, difficulter. Porro in quouis fluore
muliebri, os vteri aperitur, velutique relaxatur. nonnullis etiam
vulua ipsa ad naturalia vsque procidit. Qua de causa affectio ista
diligenter est curanda: sic tamen, vt non protinùs illa remedijs lo-
co inductis reprimatur. nam quædam in hydropem: quædam in
nervorum affectus, aut oris ventriculi, aut capitis molestias col-
labuntur.

SEMINIS
profusio.

Huic fluori muliebri affinis est seminis profusio, quæ simili-
ter frequentiusque fœminas ac viros, exercet, græco nomine
γυνώρροια dicta. semen harum crudiùs, minùsque dilutum subsistit.
id à vasis seminarijs, non ab vteri sinu in eius ceruicem, citra vllam
veneris voluptatem profluit: non autem assiduè, nec quotidie, vt
in vterino fluore: sed per quædam interualla: non fœdi odoris,
non acre, sed planè modicum. Eadem causa hanc seminis profu-
sionem, quæ virorum excitare consuevit.

VIRULEN-
tium seminis pro-
fluuium.

Longè crebrius ea est, virulentum quoddam seminis pro-
fluuium: quod contagiosa, impuræque venus progignit, vt antea
de virorum fluore est comprehensum. MATHETES, Quale semen,
& quomodo in hoc vitio profluit? GERON, Multò crassius, inter-
rim album, interim flauum, aut viride, odore fœdum, acre, &
erodens: non autem continuè assiduèque, vt in vterino fluore
excernitur: eoque rarò citra naturalium vlcus infestare depræ-
henditur. Maximè verò hæc seminis profusio à muliebri fluxu
distinguitur: quod ipsa non ab vtero, vt hic, sed à seminarijs vasis
procedat. adhæc, quod eadem menstruis emanantibus non desi-
nat, sed simul cum eis, & postea perseveret: muliebri autem pro-
fluuium cesser, quando menstrua feruntur, & breui interuallo
post

Quomodo à mu-
liebri fluxu dis-
tinguitur.

post illa. Præterea hoc discriminis inter seminis fluorem, & vterinum intercedit, quòd in illo morbi gallici indicia: in hoc autem nulla apparcant, vt antea, cùm de virorum seminis profluuiò egimus, tractatum est.

5 MATHETES, Cùm vterus seminis tum maris, tum foemine concipiendi ad fœtus procreationem sit instrumentum, quæ functionem ipsius interdum impedire solent? GERON, Non paucum sanè partium naturalium, quæ ad concubendum sunt accommodatæ, offensio, à primo ortu contracta: vt si puellæ non

CONCEPTIO
nis impeditur, causa.

10 pubescant: mares non barbati fiant: deinde si in ætatis processu plenior corporis habitus ex liberaliore alimento proueniat: postea si ex morbo viri semen frigidum humidumque emittant: item si mulierum purgationes menstruæ sint vitiatæ: nouissimè etiam intemperies conceptionem impediunt. Nam vteri bona tempe-

15 ratura præditi, ad concipiendum sunt idonei: mala verò, si parum à bonitate recedant, ægrè concipiunt. Quare illæ nisi tum ex calidi & frigidi, tum ex humidi & sicci mistura temperatæ fuerint, fœcundæ esse nequeunt. Nam intemperies adeò frigida, vt vterum spissiore efficiat, fœcunditati resistit: quia ora vasorum ad vte-

20 rum ipsum pertinentia, tam angusta redduntur, vt neque secundæ eis possint adnasci: neque si hoc aliquando fiat, fœtus benè ali possit: tum quòd eiusmodi mulieres vel nullas purgationes menstruas, vel omnino paucas, easque vitiosas habeant, dum sanguis solus tenuior, aquosiorque fertur: tum quòd eadem vasorum o-

25 ra, & natiuæ angustię gratia obstruantur, tum quòd mulieres istę picuitosum magna ex parte humorem colligant. nam corpus vniuersum vtero propemodum respondet. Præterea semen virile, nisi natura calidissimum existat, in eiusmodi vteris refrigeratur.

MATHETES, Quæ vteri conceptum ob frigidam intemperiem
30 impediri ostendunt? GERON, Si menstrua eius supprimantur, aut parcè fluant, si quæ decolorati: item lumborum, pubis, & crurum stupor. quandoque etiam impotentia: adhæc si frigidior, ac succi crassi victus antecesserit: & si vterus frigidior euaserit: mulier nul-

Notæ impedito-
rum conceptuum
ex intemperie fri-
gida.

35 lam venerem appetit: & vteri ipsius os est contractum, vt semen viri difficulter intromitti possit. MATHETES, Quid humidam vteri naturam conceptus impedimentum esse nunciat? GERON, Humor in concubitu destillans, à quo semen viri extinguitur: tenui-
40 que & copiosa menstrua. At vteri calorem sterilitatis causam esse, similis totius corporis intemperies nimia testatur: nec non

Ex humida.

mensuorum paucitas: quæ cum dolore sic procedunt, vt naturalia muliebria exulcerent, colore nigriora: & quia nimium pun-
gunt, nullum seruant ordinem. mulieres huic intemperaturs ob-

*Ex, siccis.**Alia conceptus
impedimenta, et
vniuersæ notæ.**Causæ eorū, quæ
conceptum impe-
diunt.*

noxiæ ad venerem sunt procliuēs, & salaces, corpūsque vniuersum
siccus obtinent. **MATHE TES**, Quæ notant siccitatem vteri con-
ceptum impedire. **GERON**, Si nullus in concubitu humor destil-
let, menstruaque pauca, & sicciora existant. **MATHE TES**, Cur sin-
gulæ istæ intemperies vterum conceptioni minus reddunt ido-
neum? **GERON**, Quia frigida sanè vterum spissiore densiorēque
efficit, ne semen commodè applicari ipsi possit: humida autem,
quia semen viri extinguit, alimentum consumit, eoque deficien-
te illud corrumpitur. **MATHE TES**, Quæ præter intemperies
iam dictas conceptui sunt impedimento, & quibus notis demon-
strantur? **GERON**, Mulieres nimium tenues, si grauidæ sint, abor-
tiunt, antequam crassescant. similiter supra naturæ modum cras-
sæ: vt quibus omentum os vteri comprimat, priusquam extenu-
entur, non concipiunt. adhuc si menstrua pauca ferantur, cum ma-
xima alimenti pars in pinguetudinem transferit. Quando igitur
duo hi corporis habitus, nempe tenuis & crassus naturæ contra-
rij fecunditatem impedian, tu ipse cognoscere poteris. **MATHE**.
Cur pingues, & macri seu extenuati nimium liberis procreandis
non sunt idonei? **GERON**, Quia illi priuatim genitalibus se mu-
tuò contingere commodè nequeunt: ambo autem communiter
paululum seminis emittunt, tum viri, tum mulieres. **MATHE TES**,
Ob quam aliam causam mulier interdum concipere nequit? **GE**-
RON, Ob vitiosi humoris abundantiam: qui qualis sit, antea ex-
plicatum est: nec non si ob cicatricem vlceri vuluæ inductam va-
sa fuerint obcæcata, ipsumque ob vlcus, & membranam ori vul-
uæ obtensam: præterea ob nimiam eiusdem oris angustiam, vel
amplitudinem, siue propter obliquum cervicis situm, qui ex ob-
stetricibus percipi potest. Impediunt quoque conceptum men-
strua retenta, vel pauciora quam conuenit, vel æquo largiora.
idem faciunt etiam flatus in vtero contenti: quos pectinis imic-
ventris tumor, extensioque: cui interdum dolor adsit punctori-
us, & ad vtrunque, vel ad alterum inguen frequenter tendens, si-
gnat. lidem flatus, qui in vtero conceptionem remorantur, sæpe
per naturalia erumpunt, sic, vt mulieres ipsæ percipiant, sicut
etiam aliquando strepitum sonitumque. interdum per medica-
mentum aliquod assumptum, conceptus impeditur, vt mulier, &
familiares eius animaduerrere possunt. Quinetiam mulieres ex in-
uito concubitu concipere semen nequeunt. nam amor semen
conciliat, eoque feminæ amantes sæpe pariunt. Insuper ætas fe-
minæ iunioris, vel prouectioris, inelegansque illius forma ad
concupiscendum parum est accommodata. **MATHE TES**, Quod con-
cumbendi concipiendique tempus opportunum est? **GERON**,
Cum

Tempus ad concipiendum quod opportunum.

Cum menstrua fluere vel incipiunt, vel desinunt: reliquum autem totum, quo illa expurgantur, quanuis ora venarum tunc sint aperta, prorsus est ineptum: eò quod tunc semen in vulua permanere nequeat, sed ab influentis sanguinis copia eliciatur. Vbi vero illa vel cessant, vel incipiunt, tum ora vasorum aperta sunt, tum menstrua non larga, neque vniuersa, sed pauca, & paulatim effluunt: vnde semen ob asperitatem vuluæ adhæret, alimentique satis ex sanguinis affluentis paucitate habet. MATHETES, Cur conceptio antequam menstrua accedant, fieri nequit? GERON, Quia semen & alimento caret, & vuluæ leni adhærere nequit: cum aspera magis quam leuia ad coalescendum idonea existant. MATHETES, Quæ alia præter enumerata conceptus sunt impedimenta? GERON, Aliis vteri genitaliumque partium, aliàs viscerum vitia, tum viris tum mulieribus communia. primum imberum, atque senum ætas: eò quod semen tenuè, aquosum, languidumque habeat: deinde morbi in confirmata ætate, vel acuti, vel etiam longi: qui aut humores, aut spiritus corrumpunt: post hæc manifesta corporis, actionumque vitæ offensio, & abdita principalium partium, ventriculi, iecoris, lienis, ac pulmonum in temperies, obstructio, aut scirrhus, præsertim si vel malus habitus, vel aqua inter cutem, quæ græcè λευκοφλεγμῶσα dicitur, vel arquatus, vel tabes, & corporis extenuatio, vel lenta febris, vel alia quædam ex vitiosis humoribus excitata. MATHETES, Cur vitia ista conceptum impediunt? GERON, Ob hæc duas causas: primum quod viri eis laborantes, aut nullum semen, aut minus efficax emittunt, vt quod neque ex vtili materia, neque ex benignis spiritibus sit conflatum: deinde quod mulieres affectæ semen viri vtero non concipiant: aut concepto eo, ipsarum proprium non commisceatur: sed statim excidat, aut retentum nobiliorum partium vitijs obrutum, ilico, aut paulò post tempore extinguitur. MATHETES, Quæ naturalium membrorum vitia fecunditatem abolent? GERON, In viris sanè, genitalis resolutio, infirmitas, seminis profusio, vasorum seminariorum obstructio: angustia, & contusio: adhæc testiculorum & membri genitalis exilitas: & mala cuiusque partis ad conceptionem necessarias conformatio. MATHETES, Quæ in mulieribus illi obsistunt? GERON, Eadem vt in viris, testium, & seminalium vasorum incommoda, vt nimia oris vteri, & cervicis eius amplitudo: vel angustia, obstructio, situs obliquus, peruersio. atque hinc oritur menstruorum suppressio: quæ per se cognosci potest, & percipi. MATHETES, Quæ mulier ad concipiendum idonea censetur? GERON, Quæ ad venerem non est ignauior, sed in ea mediocritatem retinet.

Mulier ad conceptionem idonea.

Conceptionis indicia.

MATHESES, Quæ sunt conceptionis iam factæ indicia? GERON, Si mulier, ubi cum viro concubuerit, semen magna voluptate ac oblectatione simul cum illo, aut paulò post emittat. siq̃ id exceptum retineatur, non autem excidat, neque loci muliebres humore madescant: adhæc, si mulier eodem die, aut læuiter inhorrescat, aut vterus titillatione quadam contrahatur, donec semen arctius comprehendat: aut si dolor leuis inum ventrem vrgeat, siq̃ue os vteri interius adedò arctè claudatur, vt ne specilli quidem mucronem, seu acum summam admittat: ac idem rursus temporis interuallo interius retrahatur, & sursum remeet, vt vix immisso obstetricis digito attingi possit. Inter hæc grauida minus venere delectatur: à menstruis defecta est, nisi sanguis primis, aut nouissimis mensibus, non ex ipsa quidem vulua, sed ex ijs venis, quæ ad ceruicem eius pertinent, sicut in virginibus, nullo fœtus incommodo, feratur. Secundo mense natura etiam si quid ex menstruis profluat: tamen nonnihil eius in superiores pectoris sedes reponit, venasque ipsius adedò implet, vt mammae inturgescant, durestantque. deinde fœtus augetur, & latera lumbique extenduntur, ac venter totus citra vllam ponderis molestiam, ac grauitatem intumescit: in quo Mola, vt statim audies, & vteri hydrops à conceptu differunt. Eodem hoc tempore, facies maculas habet, siue citreas, siue liuidas: item lenticulas: vel oculorum ambitus languido aspectu liuescit, vel alij casus vrgent. MATHESES, Qualis vrina tunc in mulieribus apparet? GERON, Citrea, vel subliuida, crassa, & leuiter turbida: quæ modicè concussa bullat, vel granula è summa corona demittit: subsidencia illius crassa sunt, lanæ carptæ instar, non benè cohærent. Si eidem vrinæ vinum admisceatur, ipsa fabarum elixarum iuri respondet. Posthæc fœtus concepti indicia certissimum illud quoque accidit, si leniter, blandè, & ordinatè, non grauiter & molestè, sed muscæ volantis modo dimoueri incipiat, sic vt manus calens admotâ persentiscat: quod alijs citius, alijs tardius, plærisque omnibus vt tardissimè in medio grauiditatis tempore contingit. Quòd si etiam ex rebus externis certior fieri de conceptu voles, mulsam crudam, ex aqua cœlesti, sub somnum mulieri potui exhibeto. hinc si illa ventris torsiones experiatur, grauida: si non affligatur, à fœtu libera existit. MATHESES, Quomodo internoscitur, masculusne an fœmella in vtero gestetur? GERON, Illo grauida benè colorata est, & hilaris: hac autem, &ecolor, & tristis. adhæc mares magna ex parte dextra vteri regione continentur: fœmellæ sinistra. Præterea si mas gestatur, dextra grauidæ mamma est amplior, tumidiórque, ac papilla eius nigrescit: firma, erectaque, & citius stillat: omnem

tum

Vrina grauidarū.

Conceptus an falsus sit.

Conceptus experimentum.

Maris & fœmellæ situs in vtero.

- tum venæ, tum arteriæ dextræ magis quàm sinistræ, præsertim sub lingua plenæ, ac tumidæ apparent. Similiter pulsus in dextra manu euidentior, maior, ac vehementior, quàm in sinistraprehenditur. Si verò scœmella gestatur, sinistra omnia valentiora, & magis conspicua: papillæ autem flaccidiôres existunt. Insuper si masculus in vtero geritur, lac multû: id si aque instilletur, diutiùs coheret, & in summo persistit: sin autem scœmellæ, quia illud tenue, & dilutum est, protinus diuellitur. **MATHETES**, Dum fœtus sic in vtero continetur, nihilne incommodi sustinet, priusquam
 10 absoluator, & in lucem prodeat? **GERON**, Si mulier, quæ fœtum tempestiuè conceperit, eumque viuûdum gestet, integra sanitate fruitur, nihil molestiæ, ac incommodi toto grauiditatis curriculum percipit: sin autem veletudinaria, ac vitio cuidam ante illam obnoxia fuerit, id secundo, tertiôque mense (quando pur-
 15 gatio menstrua iam diu subsistit, nondum tamen in fœtus alimentum absumpta) percipere incipit: imò quicquid antea in corpore latuit, hoc tunc in apertum prodit: sicut etiam in mulieribus non grauidis accidit, cum menstruorum tempus imminet. Eius igitur mulieris, quæ antea vel humorum vitio, vel ciborum copia laborauit, corpus lassitudinem his mensibus sentit: lumbi, inguina, & scœmora grauantur, dolentque: somnus grauis interdum ipsas accedit. inter hæc autem, cibi desiderium imminuitur: ingens vrget nausea: quæ modò est irrita, modò vomitionem bilis, vel pituitæ circum præcordia hærentis excitat. Quòd si illa non
 20 erumpat, illico fit difficilis respiratio, vertigo, animique anxietas, & breuis eius defectio. Quòd si humores vitiosi tunicis ventriculi infarcti fuerint, affectio, quam superius græcè *κίβλη*, ac *μαλακίαν* nominaui, absurdæque rerum alienarum, vt terræ, carbonum, testarum, & salforum vel acidorum, vel acrium ciborum cupiditas
 30 ad quartum quintumue mensem vsque adest.

Quomodo grauida valeat, intem dum parit.

- MATH.** Quæ alia grauidas incommoda, dum vterum gestant, infestare solent? **GERON**, Immaturi fœtus exclusio, quæ latinis abortus, seu abortio, græcis *εκτρωσις*, vel *εκτρωμη* nuncupatur. Excutitur enim aliàs viuus, aliàs mortuus, extinctusque. **MATHE T.**
 35 Quando viuus? **GERON**, Cum acetabula violenter sunt resoluta: mortuus autem, cum eadem sunt valida, & firma. **MATHE TES**, Quæ causæ hoc malum excitant? **GERON**, Tum interiores, tum exteriores. illæ quidem sicut cibis æquo largior: omnium humorum repletio, quæ fœtum strangulat, extinguitque: succus mucosus, acetabula vuluæ opplens: qui ligamenta ipsius adeò emollit, dissoluitque, vt ipsa fœtum continere nequeant. adhuc cibis mali succi, humorumque vitiositas inde contracta: quæ faciunt, vt
 40

ABORTVS.

Abortus cause.

foetus propè alimento destitutus, paulatim elanguescat, & emoriatur. Præterea morbi acuti: vnde foetui maius vitæ periculum, quàm matri imminet: tum principum partium, tum vteri ipsius affectiones, quarum nuper mentionem fecimus. *MATHESES*, Quæ causæ externæ, seu evidentes foetum interimunt excutiuntque: *GERON*, Syncope, timor, & tristitia: item quæcunque odoratu, vel natura sunt virulenta. adhuc, quæ alimentum foetui subtrahunt, vt inedia, vel immodica purgatio, sanguinis profluuium è naribus: nec non ex venis in ano extantibus, aut alijs ex locis illius excretio. nam mulier sanguine profuso abortum facit, præsertim, si foetus est auctior. Aliæ causæ sunt, cum acetabula relaxantur, per quæ foetui alimentum suppeditatur, vt exercitatio violenta, saltatio, durior equitatio, vectura, grauioris oneris gestatio, casus impetu violento concutiens, ventris ictus foetum contundens. *MATHESES*, Quæ mulier citra causam euidentem abortire solet: *GERON*, Quæ vel totius corporis, vel solius vteri vitio laborat. *MATHESES*, Quæ foetus in vtero mortui sunt indicia: *GERON*, Nulla motio intus percipitur, quæ antea fuit crebra: venter grauis est, adeò vt iam quasi sit prolapsurus: intumescit æquè ac hydropica, distenditurque: nec non refrigeratur, sicut etiam latera ipsius, quæ antè caluerant: magno dolore circa vmbilicum afficitur: stomachus roditur: spiritus foedum odorem reddit: oculi minuuntur: dolent nares, aurèsque frigescunt: tota facies malè colorata est: frequens horror grauidam inuadit: animi defectio torquet: nonnunquam accessione tanquam comitiali distenditur. semper autem ferè illa vigilijs cruciatur. *MATHESES*, Quæ sunt abortus futuri notæ: *GERON*, Lac è mammis spontè effluens, præsertim aquosum. quia foetum imbecillum esse testatur: sic etiam mammae vltro extenuatæ. In ea, quæ gemellos gestat, si dextra eius mamma gracilescat, de masculi vita periculum est: si verò sinistra, de foemella: latera, ventérque superior coarctantur: lumbi coxæque grauantur, & ad motum sunt tardiores, segniorésque. vbi foetus iam moueri incæperit, id deinde fit rarius languidiúsque. Cum abortiendi tempus in propinquo est, aqua primùm saniosa profluit, carniū loturæ similis: deinde cruenta, mox purus sanguis, postea grumi, nouissimè foetus ipse, aut formatus, aut informis excluditur. *MATHESES*, Quæ foetum iam extinctum in vtero demonstrant: *GERON*, Omnia superius commemorata conualescunt: nec non stomachi rosis vget: animi defectio: capitis & oculorum dolor: frequens horror febrilis: spiritus foedus, & grauius olens, venter grauis, ac veluti procidens, & ad tactum frigidus, sicut etiam ceruix ipsius digitis immisissis depre-

Abortus sine causa.

Mortui fetus signa.

Abortus futuri notæ.

Fetus extincti in vtero signa.

- deprehenditur. MATHETES, Quomodo foetus sani partus tempestiuus accidit? GERON, Magis laboriosus in pingui mulieri est, quam in tenui ac macra: magis in puella edenda, quam in masculo. porro etiam abortus ferè plus negotij, quam partus maturus facessit. MATHETES, Quid est partus difficultas? GERON, Eiusmodi casus, quo foetus conceptus, diutius quam natura postulat, in vtero continetur. MATHETES, Quæ illius causa est? GERON, Noxa facultatis naturalis, aut retentricis, aut expultricis, siue infantis, siue grauidæ. interdum aliæ sine hac, causæ, seu affectiones naturæ contrariæ exoriuntur. at vniuersæ, vel euidentes, vel abditæ existunt, illæ quidem vt nimium frigus, quod vuluam densauerit, aut calor immodicus, qui vires resoluit, aut alius quidem casus superueniens: hæc verò, vt parientis, aut foetus, aut membrarum culpa. parientis sanè, si crassa sit, & obesa, dolorumque imperita: aut timidiuscula: aut natura imbecillis, vt infantem nequeat propellere: aut etiam si ante tempus pariat: aut si inflammationem in locis genitalibus, aut alia in parte experta fuerit: aut alio vitio laboret: aut si vulua ipsius sit nimis exigua, aut ceruix eius obliqua: aut caro eidem, vel ori ipsius sit adnata: aut si abscessus, vel durities illam obsideat. Quinetiam si ossa pubis nimium conserta fuerint, nam cum in partu dilatari nequeant, pariendi difficultatem efficiunt. adhæc grauida ægrè parit, si vesicæ calculo laboret: vel si excrementorum copia in recto intestino, aut vesica fuerit retenta: aut si prouectior ætate: aut puella nondum nubilis, neque robusta. Præter hæc difficilis partus fit, ob nimiam lumborum cauitatem, quæ vuluam comprimit, foetus ratione partus fit difficilis: si ille inusitatae magnitudinis, vel exiguae, & modicæ grauitatis, seu magni capitis, vel monstruosus, vel mortuus, aut viribus quidem, sed adeò imbecillis, vt foras prodire nequeat. Eadem difficultas in partu accidit, si foetus plures fuerint. similiter figura foetus naturæ contraria, difficilem partum efficit, vt si obliquus, aut in pedes procedat. MATHETES, Quæ est naturalis foetus prodientis figura? GERON, Prima, vt rectè in caput manibus ad vtrumque foemur extentis prodeat: proxima huic, vbi in pedes conuersus est, præsertim, si manibus super vtroque foemore expansis exeat: relique omnes figuræ naturæ sunt contrariæ, vt si caput in dextram, vel sinistram vteri partem declinet, aut altera, aut vtraque manus exeratur: vt crura intus inter se diducantur: aut si altero pede intus detento, altero infans excludatur: quanuis hi exitus minùs sint improbandi. MATHETES, Cur in caput procedit secundum naturam? GERON, Quia superiores partes grauiissimæ ipsi sunt, si ex vmbilico per-

Partus tempestiuus.

Partus difficilis unde fiat.

Foetus prodientis figura.

*Partus difficil.
inf.*

pendantur. Atqui si fœtus obliquum, aut tranſuerſum ſitum habeat, aut caput ante, vel manum exerat, quod raro accidit, difficilem, alijs membris exitum reddit. **MATHEſES**, Quando membranarum vitio grauida difficulter parit? **GERON**, Quando ſecundæ, quibus infans integitur, ob craſſitiam non facile auelluntur, aut priuſquam opus fuerit, ob ſubtilitatem, ſimul cum alijs membranjs fœtum ambientibus abrumpuntur. humore ſiquidem euacuato, infans præ ſiccitate ægrè deuoluitur, ac per vuluæ os, & ceruicem, difficiliùs delabitur. Nam humor ille, qui in fœtus membranjs continetur, non ſolum hiſce fabricandis: ſed etiam ad vteri ceruicem maxime dilatandam conducit. atque hæc ſunt præcipuæ partus difficultates. quanuis autem tam multæ exiſtant: non tamen difficulter à medico cognosci poterunt. à foris quidem ex aſtantium, ſeu puerperæ colloquio: intus autem ex propria medici inueſtigatione: nec non ex ipſarum parientium ſiue obſtricticum interrogatione. **MATHEſES**, Vnde prænoſci poteſt, qualis partus futurus ſit? **GERON**, Inter parientes primò fœtu grauidæ acerbius in eo edendo cruciantur: eò quòd huiusmodi doloribus antea non ſint aſſuetæ. **MATHEſES**, Qua parte dolent? **GERON**, Toto corpore, præſertim lumbis, ac coxis, vt quæ diſparentur. at quæ iam antea quoque pepererunt, minùs primiparis dolent: quæ verò ſæpiùs partum ediderunt, multò minùs. Adhæc in quibus infans obliquus, aut in pedes procedat, hæc non ſolum difficulter pariunt, ſed complures, vel ipſæ, vel infantes, vel ambo ſimul intereunt. Si ei quæ difficulter parit, ſternutatio ſuperueniat, benè proficit: quia hæc naturam concuſſu vehementiori, atque ſeruore partim excitat, partim excernit, quæ partibus corporis firmiùs adhæreſcunt.

SECUNDA.

Accedit etiam parienti periculofa quædam affectio, ſub qua membrana, quæ velamentum infantis intus fuit, poſt fœtum in vtero diutiùs relinquitur: latini ſecundas vocant, quòd poſt infantem editum prodeant: ob quod etiam græci aliquando appellant *ὑστερον*, ſeu *ὑστερίον*. **MATHEſES**, Quæ pars in hoc vitio afficitur? **GERON**, Vterus ipſe: quia inuolucrum hoc fœtus, ſecundas contra naturam retinere cogitur. **MATHEſES**, Qua de cauſa? **GERON**, Quia ille vteri fundo vaſorum in hunc diſtendentium commercio adhuc connexæ ſunt. & licet ſeiunctæ fuerint: tamen circum partem aliquam vteri pilæ modo conuolutæ, vel quod os vteri clauſum ſit, aq̃ eò vt ipſe forâs prodire nequeat. **MATHEſES**, Quid de ſecundis in vtero relictis prænoſci licet? **GERON**, Quòd ſi diutiùs quàm par eſt, in vulua retineantur, magnam noxam cerebro, cordi, & ſtomacho inferunt, dum vitioſi vapores ex illis ad viſ-

ad viscera modò citata attolluntur. si statim ac violenter extrahantur, procidentia vteri, de qua postea, periculum imminet.

- Accidit etiam vtero, vt nunc spiritibus, nunc materia aquosa, nunc mole carnosà inflatur: ideo vitijs inde contractis sua singulis nomina sunt imposita. ac primum græcis *εμφυσιασμός* dicitur, quod nos inflationem interpretati sumus. MATHETES, Vnde inflatio generatur? GERON, Ex copiosis flatibus: qui aut foetu edito in sinum irrupuerunt, aut alia ex causa illic procreati congregantur. MATHETES, Quibus indicijs malum hoc cognoscitur? GERON, Imus venter valdè intumescit, extenditurque, & dolore afficitur, qui ad septum transuersum, & stomachum vsque pertingit: nec non latera vtraque molestat: frequenter inguen alterutrum excruciat: aliquando vtrumque. adhæc vmbilicum, lumbos, & pectinen: consortij autem lege ipsummet caput prærunque affligit: venter digito percussus, tympani instar, sonum efficit: præsertim si flatus amplum vteri sinum impleuerint. Similiter etiam murmura, strepitusque intus, quando corpus flectitur, exaudiuntur. Sæpe flatus per naturalia seminarum manifestò erumpunt. MATHETES, Quibus hoc malum magis obuenire solet? GERON, Puerperis maximè, idque non sine periculo. MATHETES, Quid igitur de finiendâ inflatione ista vteri præfagis? GERON, Non facile discutitur: sed quia tam diu perseverare solet, vt in nonnullis per omnem vitam perduret: & si flatus meatibus inhærescat, dolores grauissimos excitant, difficiliusque remedi-
- 25 istolluntur. MATHETES, Quid est hydrops vterinus?

- GERON, Collectio aquarum, quibus totus vteri sinus scaturit. MATHETES, Quæ huius sunt indicia? GERON, Ea quæ inflationem notant: maior autem ventris grauitas percipitur in hoc vitio. etsi ille in partem aliquam conuersus fuerit, aquæ in eo fluctuantis sonitus eliditur. MATHETES, Quæ causa huiusmodi hydropem generat? GERON, Quæ etiam id genus hydropis, quo velut in virem multa aqua contrahitur, parit, nempe iecoris & lienis vitiati. Sed tamen etiam aqua, ex sinuosa abdominis regione proueniens, cæco, & latente itinere in vterum: interdum, sonum sanguinis serum ex vena caua eodem destillat. Luteciæ olim mulier quædam à plerisque visa est, quæ huiusmodi hydropelaborat: sic autem, vt cum menstrua appropinquarent, vniuersa aquarum feruentium lutei coloris colluies ex vtero per ceruicem eius expurgaretur, eaque copiosa, quæ sex aut octo pelues replet, dum venter totus subsideret. deinde statim menstrua nature præscripto, subsequabantur: post mensent exactum, æqualis colluies statò rursus tempore profluebat. Eadem mulier hoc mor-

bolcuata vterum gestare coepit, & fortum benè vitalem peperit.

MOLA.

MATHESES, Quid de mola refers? GERON, Proprium vteri vitium est: nempe inutilis, formæque expers caro: quæ non ipsomet vtero, sed in ipsius sinu contrahitur, cute, vel membranis circumdata: mollis & confusa: intus etiam venis compluribus res-
5
persa, sed absque visceribus, intestinis, & ossibus: nunc firmiter, nunc leuius acetabulis cohaerescit. ac per venas stirpium modo nutritur, adeoque increfcit indies, vt ventrem totum repleat, in-
tendatque, vt octomestrem foetum gestare videatur. Huic molæ conceptus irriti, & inutiles propemodum accedunt: qui frequen-
10
ter euenire solent: multi interdum cum illa simul in vtero gestan-
tur, edunturque. interdum cum legitimo foetu prodeunt.

MATHESES, Cur huic vteri vitio molæ nomen imponis? GERON, Quia huius instar ventrem grauat, & ægrè mouetur, MATHESES. Quare carnem esse inutilem dicis? GERON, Quòd aliena sit à na-
15
tura, aut foeminæ incommoda, dum ipsam generat, molestatque, & menstrui purgationem impedit, vt generis propagationi minús sit idonea. MATHESES, Quare molam, carnem informem appellas? GERON, Eò quòd artificiosa humanaque forma careat, quamuis non solum vnā quandam figuram, sed varias pro ma-
20
teriae, ex qua conflatur diuersitate, & opificis ratione obtineat.

Mole indicia.

MATHESES, Quæ sunt molæ indicia? GERON, Si menstrua sistantur: mammae turgescant: cibi vrgeat fastidium: facies decolor sit: ventérque indies magis ac magis grandescat, vt magna inde foetus concepti sit suspicio. Verùm hæc cum grauiditate sunt com-
25
munia: propria verò, quòd moles eius durior quàm foetus existat, firmitérque inhærescat, figaturque: adeò vt nullo intus motu cieatur, nisi cum aut premitur, aut foemina in latus se conuertit. tunc enim non leui blandoque, vt legitimus foetus, motu, sed impetuose agitur. corpus in eo vitio extenuatur: grauiter ince-
30
dit, sic vt pondus aliquod propendere videatur. Proximè ad molam accedunt foetus irriti, & inutiles, qui sæpè cum illa simul gestantur, edunturque: interdum eadem cum vero ac legitimo partu eliditur.

Fœtus irriti.

Mole cause.

MATHESES, Vnde mola generatur? GERON, Ex modico viri semine, aut vitioso, aut quauis ratione debili, copiosis
35
menstruis commixto: quod alimentum quidem ad se trahere, non autem conformare potest. At qui molam ex solo sanguine menstruo, aut semine muliebri, vt oua subuentanea dicta gigni posse affirmant, ægro aberrant: eò quòd nulla vnquam mulier, illam sine communione viri concepisse literis est proditum. Hoc
40
annotandum etiam videtur, non modò carnem informem in vtero progigni posse: sed etiam multum sanguinem cum humori-
bus in-

bus intus, flatuque frequenter commoueri excludique, adhuc dolores ex eo, & compressione, quales inter pariundum esse solent, infestare. **MATHESES**, Quid de huiusmodi mola praesagire consueuisti?

Praesagila.

GERON, Plurisque omnibus tertio quartoque mense excluditur, omnemque grauiditatis, seu praegnationis spem falso conceptam praecidit: nonnullis quarto, aut quinto anno foras excidit: nonnullis per totam vitam tuto intus manet, donec mulier affecta cum ea consenescat, ac simul commoriatur. Cum autem affectus hic augetur, & iecur simul affici incipit, in aquam subter cutem degenerat: interdum etiam insanabilis magna ex parte red-
ditur. ob quod Hippocrates curationem eius tentandam non esse, aut certe cum praedictione periculi suadet. alij recentem tantum curari posse confidunt, eoque desperandum non esse. **MATHESES**, Quomodo malum istud per initia dignosci poterit?

GERON, Cum menstrua sine certis grauiditatis notis retinentur, simulque venter sine hydropo intumescit, sciendum est, aliquid in vtero, quod contra naturam sit, inesse, nempe vel irritum conceptum, vel molam, vel flatum.

MATHESES, Quid est vuluae procidentia? **GERON**, Eius-

tia vteri.

modi symptoma, siue casus, sub quo vterus deorsum a propria sua sede adeo euertitur, vt foras promineat: graecis *περόσσωσις*, latinis procidentia, seu prolapsus vteri dicitur. Interdum, licet raro, totus a ligamentis, & appendicibus suis resolutus procidere solet: id quod olim in Ducatu Lutzelburgensi in muliere quadam
vidi, nam vterus sacculi longi figura, trium digitorum latitudinis instar, extra naturalia propendebat. quidam negant sic vterum prolabi posse.

MATHESES, Quibus signis cognoscam, vterum procidisse? **GERON**, Vbi prolapsus est, ouum anserinum magnitudine representat, aut maior minorue apparet, pro vt violenter

Signa vteri prolapsi.

euersus fuerit: sanguis largior erumpit: deinde praecordiorum, lumborum, imi ventris, ac naturalium dolor subsequitur: & metus est, ne locis mulieribus perfrigeratis, distentio neruorum superueniat. quanuis processu temporis, vbi malum inualefcit, & loci euaserint callosi, neque distentionis periculum imminet, neque dolor infestat.

MATHESES, Quae hanc vteri procidentiam efficiunt? **GERON**, Tum exteriores, tum interiores causae: illae sanè cum mulier ab alto deciderit, in coxasque delata fuerit: aut cum membranulae, ac ligamenta, quae vterum continent, ac vicinis partibus connectunt, disruptae sunt. adhuc, vel secundae violentè extractae fuerint: quod magna ex parte in abortu accidit. item quando vehementior pariundi conatus est: quo vterus foetum, & secundas excludit, & se inuertens praecipitat. interdum impru-

Causae procidentiae exteriores.

dentis obstetricis temeritas, vterum cum foetu, aut secundis inuertit, detrahítque. nonnunquam spiritus retentio: immoderata oneris eleuatio: aut plaga ipsius vteri: insuper vehementiores animi affectus, vel ob liberos amissos excitati, vel ob nuncia de hostium incurfu: vel ob nauigationem periculofam, vel ob alias id
 5 genus causas: quibus mulieres toto corpore ita resoluuntur, vt vterus simul procidat. MATHETES, Quæ interiores huius vitij

Interiores cause.

causæ sunt? GERON, Largi lentique humoris defluxio: partus crebriores: ob quos ligamenta, ex quibus vterus dependet, laxantur, soluunturque. interdum etiam membranarum & muscolum, quæ vterum sustinent, laxatio, seu resolutio: quæ in ætate
 10 declinante maximè euenire solet. Has causas inuicem dignoscere tu ipse poteris: aut ægra astantésque tibi indicare. MATHETES, Quid in restituendo vtero spei habendum putas? GERON, Quacunque ex causa symptoma hoc eueniat, cum recens adhuc est, rectè vterus contrahitur. Nam per initia facilè dirigitur,
 15 & in locum suum restitutus, in eo permanet, idque potissimum in ætate vigenti: in proejectiore autem, quanius etiam contrahatur, tamen ex leui occasione rursus procidit.

MATHETES, Sempérne vterus hoc vno tantum modo à sede sua dimouetur, an etiam alijs. GERON, Procul dubio aliis quoque. nunc enim ascendit, nunc descendit. interdum in hoc,
Vteri ascensus. interdum in illud latus inclinat. In nonnullis adeò vehementer ascendit, vt veluti globus quidam etiam ad ventriculum attollatur, eumque grauiter premat: atque inde in sedem suam manu re-
 25 pelli queat. Galenus, eiusque sectatores, vterum, aut nihil, aut parum commoueri, sed ligamentorū & appendicum, quibus annectitur, vitio, affirmant: dum illa ob materiam copiosiore distenta contrahuntur, reddunturque breuiora: Plato contra, tam varios eius esse motus, vt animal dici possit, MATHETES, Quæ indi-

Ascensus notæ.

cant vterum ascendere? GERON, Ægræ præcordiorum dolores: spiritus difficultas: animi defectio: mente incolumi & omninò
Descensus. salua. MATHETES, Quæ vterum descendere signant? GERON, Cum mulier erecta est, ille tanquam pondus in naturalia prouoluitur, quod obstetrix digito immisso obuium percipit: si vterus
 35 hoc pacto diu persistit, vix vllum præsidium periculo subtrahit: cum supina est, aut aluum deijcit, rectum intestinum tanquam onere vrgetur: cum illa prona decumbit, vrinam difficulter reddit, & viri concubitus non facilè admittit. Quòd si vterus in alterum inguen sinistrum, vel dextrum contorqueatur, vehemens
 40 hunc, ac sæpius coxam dolor exercet: & si hic augefcat, furor vteri appellatur, totumque crus, maximè scemur stupefcit, frigetque:

idem

idem dolor, si magis adhuc excruciet, neruorum distentionem accersit. *MATHESES*, Quibus scēminis tot vteri motus, errorēque, & quibus ex causis proueniunt? *GERON*, Illis duntaxat, quibus vteri appendices ex graui ipsius gestatione, vel ex casu ac
 5 contusione, vel ex copiosi humoris profusione, laxiores euaserint. Quibus ergo hoc accidit, his vterus, quoties irritatur, aut sursum deorsumque, aut in alterutrum latus se conuertit. *MATHESES*, Quæ motus vteri causa est? *GERON*, Vel interior, vel exterior *sa.*
 ipsi molesta. nam cum ille laeßsitur, indignaturque, proprio è loco decedit: aliàs in aliam sedem oberrans, vt infestum, ingratumque fugit: amicum autem & familiarem amplectitur. *MATHESES*.
 10 Qualis vteri motus est, naturalisne an voluntarius? *GERON*, Naturalis, quemadmodum etiam cordis & ventriculi. Sicut enim hic àre quadam infestatus, magno conatu hanc vomitione ex-
 15 pellit: aut cum per inediam exinanitus grato cibo auidè occurrit, eumque exceptum vndique arctiùs comprehendit, ipsique con-
 coquendo totus incumbit: ita vterus in concubitu primùm semen virile concipit: deinde conceptum ad nouem menses retinet: tandem his exactis, fœtum iam maturum excludit, tanquam
 20 ratione præditus. Vnde Plato hunc ipsum vterum animal esse existimauit. quanquam autem id verum non sit: tamen etiam *Galenus in eo minùs rectè docuisse videtur, quòd vterus aut nihil, aut parum commoueatur.*

Post omnia hæcenus commemorata vuluæ mala, vnum ad-
 25 huc insigne restat, quod varijs modis scēminas afficere consuevit. græcis *πνιγὴ στέρων*, vel *ὀστέα*, latinis suffocatio, seu strangulatus dicitur. non solū enim ipsa in hoc morbo offenditur: sed etiam principes corporis partes, quæ cum ea habent communionem: sicut cor quidem arteriarum, cerebrum verò membranarum, sping, &
 30 neruorum, iecur autem venarum consortij lege condolefcit. *MATHESES*, Quid autem est suffocatio vuluæ? *GERON*, Recursus ad superiora. siue autem tota vulua sursum equaliter, siue ad latus inæqualiter trahatur, tanquam ad elatiores partes ascendisse videtur. *MATHESES*, Quæ pars in hoc malo offenditur? *GERON*, Ipsa
 35 met vulua: vt inde colligi potest, quòd huiusmodi affectus, solis viduis, & ijs, quæ à menstruis defectę sunt, obuēniant. *MATHESES*, Qualis affectus propriè est suffocatio? *GERON*, Qualis ex incommodo situ, & vitiosa figura consistit. non solum autem ex retractione, seu peruersione vteri, sed etiam alia ex causa, nempe ex im-
 40 moderata ipsius intemperie, præsertim frigida generatur: quæ primùm nobilioribus vuluæ partibus: deinde toti corpori fuerit communicata. Semper itaque yulua in hoc affectu intemperie

*Motus vteri caus.**Naturalis vteri motus.**Platonis & Galeni sententia de vtero.**VTERI SUFFOCATIO.**Pars affecta.*

nimum frigida laborauit. quare etiam vitium hoc vulgè non inflammatio, sed potius flatuosa refrigeratio appellatur. verum vterus non solum inflatur: sed etiam è sede sua interdum mouetur, figuramue alienam sortitur, idque pro causarum, ex quibus traxit originem, varietate, & magnitudine. MATHEſ. Quæ sunt 8
Suffocationis signa. ipsius suffocationis indicia? GERON, Cùm ipsa in propinquo est: ægra multa premitur nausea: deinde cibi vrgetur fastidio, & ventris murmure: quauis hæc duo non semper comitentur. Post hæc spiritus difficilis, ac breuis esse incipit: pectus & fauces adeò arctantur, vt quasi vinculo sint præclusæ, magno suffocationis 10 metu. Inter hæc anima leuiter deficit: sic vt pulsus vix immutetur: deinde malum hoc caput inuadit, mentemque rationalem cum timore, & similibus affectibus perturbat. interdum illam sensumque, & vocem intercipit. Plæruncque ægra in altum soporem incidit: sub eoque ipsa obmutescit, totaque pallefcit, & oculis clausis prolabitur, & tanquam attonita, sensu motuque defecta iacet. interdum etiam sic exanimatur, vt tanquam comitiali morbo prosternatur. Verum hic casus à comitiali morbo distat, eò quòd neque oculi vertantur, neque spumæ profluant, neque nerui distendantur. Cùm autem suffocationis huius accessio remittit, corpus restitui incipit: vulua paulatim laxatur, humorisque aliquid emitit, ita, ut tactu percipiatur: intestina murmurant: oculi aperiuntur: malæ rubescunt: mens, sensus, motusque ægris redeunt, sic vt omnium ferè meminerint, quæ ipsis interea euenerunt. obstetrices ceruicem vuluæ inclinatam manu deprehendunt: interdum totam illam sursum: interdum ceu ad latus tractam esse percipiunt. Plæruncque frigus nunc per ceruicem in scapulas, & brachia peruenit, quod stuporem, motumque difficilem efficit, & resolutionis quandam speciem excitat: quæ breui post dissipatur. Varij sunt vteri suffocationum ordines, ac formæ, quæ 30 comitialis morbi instar, circuitu in alijs sceminis frequentius, in alijs rarius repetunt, donec causæ ipsorum distributæ fuerint.

Causæ peculiares suffocationum. MATHEſ, Quæ peculiares causæ suffocationem pariunt? GERON, Menstrua retenta, vel semen potius suppressum, vt quod magna vi sit præditum. sicut enim in mulieribus humidius, sic etiam frigidius existit. nam id paulatim in vtero collectum, aut etiam menstrua vitiantur, refrigeranturque. ex his vterus quoque simili refrigeratione afficitur: ab hoc deinde frigus ad cerebrum, ac cor, processu temporis transmittitur. hinc tandem vniuersum corpus celeriter immutatur, refrigeraturque, & superiora expellitur symptomata, sic vt vel tenuis vapor, tanquam aura ab eisdem excrementis per venas, & arterias ad principes partes ascen- 40 dat: vel

Suffocatio & comitialis morbus differentes.

Causæ peculiares suffocationum.

Semen sceminis.

- dat: vel vt venenata qualitas alijs membris distributa partium
 quas attingit, facultatem offendat, earumque functiones interci-
 piat. *MATHESES*, Qualis naturæ vapor existit? *GERON*, Plurimo-
 rum venenorum conditione frigidus, & melancholicus. *MATHE*.
 5 In qua parte consistit? *GERON*, In vulua, vbi sanguis menstruus,
 vel semen conclusum, vel alius quiuus humor in hac venenosa
 malignitate corrumpitur. Quemadmodum igitur morbus co-
 mitialis sæpè etiam in grauida ab vtero excitatur, è quo humor
 venenatus tetrum vaporem in cerebrum exhalat, idemque affe-
 10 ctus cum partu finitur, ita quoque suffocatoria vteri symptoma-
 ta eueniunt. *MATHESES*, Possuntne ea ab alijs dignoscit? *GERON*,
 Grauià facili: leuià difficulter, eò quòd melancholicis & cardia-
 cis ferè consimilia sint. Non solum igitur symptomata eiusmodi
 15 ex sanguine menstruo, & semine retento, sed etiam ex alio humo-
 re quodam venenoso, in vulua corrupto, similem vaporem
 exhalante, nascuntur: quia etiam ille mulieres plerumq; suffocatu
 laborant, quæ mensuris legitimè purgantur, vterumque gestant,
 & virorum commercio fruuntur. Proinde quilibet humor in v-
 tero sic corruptus, similem vaporem è loci natura venenatum ex-
 20 halat: qui efficit, vt viri quoque, licet sanguinis profusionem ex
 ani venis, *αἱμορροΐδας* græci vocant, diu experti non sint, aut à ve-
 nere abstinerint, nulla tamen eis symptomata vterinis similia su-
 perueniant: nisi humorum vitiositas veneni instar partes nobi-
 liores inuaserit: quamuis exigua illorum sit portio. Sicut totum
 25 corpus à phalangij, & scorpionis ictu exiguo veneno, ac breui
 tempore, canisq; rabidi sputo per morsum iniecto afficitur, ad-
 hæc etiam humores in nobis ipsis adeò corrupti, vt veneni qua-
 litatem, & vires æquent similes affectus ijs, qui veneni periculosi
 potu excitantur, generare possunt. Cùm igitur semen vitiatum,
 30 & menstrua retinentur, partes principes, vt dixi, ab istis inficiun-
 tur: deinde ex his totum corpus temporis processu affligitur:
 aliàs alio symptomatum genere. *MATHESES*, Obsecro te, expli-
 ces, quibus causis singula sunt symptomata orta? *GERON*, Si ner-
 ui distendantur, crassa, vel acris materia infestat: si tristitia ægrum
 35 afficit, atra bilis in causa est: si animi defectiones vrgeant: et sensus
 & motus aboleantur, pulsus autem sit paruus, obscurusq; & tan-
 dem intercipiatur: aut si in nonnullis sensus quidem, & motus rati-
 oque adsit, spiratio autem difficilis: & quibusdam vox suppri-
 matur, artusque contrahantur, vehemens extensio, refrigeratio,
 40 & stomachi affectus, arteriarumque contractio, auctores sunt.
MATHESES, Quando vteri suffocatus ex mensuris suppressis ge-
 neratur? *GERON*, Hæc ipsa quidem ad vterum perueniunt, inte-

*Vapor vuluæ.**Semen & men-
strua vitiata prin-
cipes partes infici-
unt.**Causæ symptoma-
tum.**Suffocatus ex
mensuris sup-
pressis.*

riora verò ipsius ingredi nequeunt: id quod duplici sit ratione: prima, quia illa sunt crassiora, quàm vt per vasorum ora penetrare possint: secunda, quòd hæc venas, in quibus sunt accumulata occlusæque, extendant, ligamentæque eis vicina humectent: vnde uterus etiam peruertitur. Nam partes repletæ, in latum quidem, & altum extenduntur, sed breuiores euadunt: ob quod protinus vulua retrahitur. Quòd si id vndique fiat, æqualiter, rectè, ac citra inclinationem transmutatur: sin autem inæqualiter, vehementius ad partem inclinat. Atque in hac suffocatione ex menstruis retentis contracta, ægræ spiratione non destituuntur, neque animi defectione, aut alijs symptomatibus modò recitatis grauius laborare videntur. *MATHE TES*, Quomodo suffocatio ex semine suppresso noscitur? *GERON*, Maius incommodum, quàm vt ex menstruis orta corpori inducit: eoque in illa spiratio, & pulsus intercipitur: nerui distenduntur: animus deficit, aliæque id genus symptomata infestant, idque in viduis sæpius, & in sceminis coelibatum profectis: etiamsi menstruis optimè purgentur, præsertim si natura multo semine scatuerint, aut concubitu, quo antea frequenter vsæ fuerunt, prorsus abstineant. Sæpè tales suffocationes etiam citrà vteri peruersionem fiunt: quando semen retentum, aut tenue & paucum fuerit. Interdum simul cum conuersione seu retractione: quando scilicet idem semen tum copiosum, tum crassum eodem modo, quo menstruus sanguis, vasa ac ligamenta replet, extendit, & madefacit. Idè etiam Galenus in opere de locis affectis mulieris cuiusdam meminit, quæ cùm longo tempore vidua fuisset, neruorumque distentione præter alia incommoda laborasset, eiusque partes naturales obstetrix manibus tractasset, calidisque medicamentis fouisset, crassum tandem, multumque semen cum labore, & titillatione, vt in coitu euenire solet, excreuisse, ac sic molestia fuisse alleuiatam. *MATHE TES*, Soletne hic affectus ex alia etiam causa excitari? *GERON*, Solet vtrique, vel ob vterum refrigeratum, dum menstrua prodeunt, vel ob abortum, vel ob sanguinis ab utero eruptionem, ex re quadam subito suppressam: id quod ab astantibus perdisci potest. *MATHE TES*, Quæ sceminæ potissimum huic vitio sunt obnoxie, & quando? *GERON*, Calidæ & humidæ puellæ, ac viduæ etiam, quæ præter earum consuetudinem veneris vsu diutius caruerunt: item illæ, quæ ob certa quædam medicamenta, non ob ætatem steriles euaserunt. *MATHE TES*, Quo anni tempore potissimum sceminæ hoc affectu tentantur? *GERON*, Hyeme magis quàm autumno, idque per intervalla quædam, tanquam circuitus, sicut etiam morbus comitialis. *MATHE TES*, Quæ sunt vterinæ suffocationis præla-

Suffocatio ex semine retento.

Suffocatio ex refrigeratione, & alijs.

Suffocationi obnoxie.

præfagia: GERON, Prima eius species, quæ ex semine retento pro-
 uenit, grauior, difficiliôrque existit, quàm quæ ex menstribus con-
 tracta fuerit, molestâque magis symptomata inducit. adhæc illa,
 in qua spiratio, & pulsus intercidit, periculosior est, nam quædam
 5 mulieres eadem laborantes intereunt, licet quædam etiam super-
 stites maneant. Vbi hic affectus inuadere assueuerit, multis cre-
 bro repetens, vti comitialis perpetuus est: & quanuis tutus esse
 videatur: singulis tamen accessionibus non eodem duntaxat die,
 sed etiam paucis post horis in vitæ discrimen præcipitat. In eo-
 10 dem hoc malo spiritus difficillimè per initia trahitur: pulsus est
 frequens, & inordinatus, licet ex toto interdum, sicut etiam sen-
 sus motûsque aboletur: totum corpus sudore frigido digeritur:
 deinde vires omnes deficiunt, & mors propinqua est. Minus pe-
 riculosa est suffocatio: in qua casus quidem commemorati ad-
 25 sunt, sola verò spiratio manet integra. MATHESES, Cur benè spe-
 ras, cum ægra in hoc casu spirare potest? GERON, Quoniam, quæ
 spirat, viuere: & quæ viuít, spirare potest. MATHESES, Quomo-
 do autem in suffocatu viuere potest, vbi spiratio non deprehen-
 ditur? GERON, Non solum ea, quæ ab ore fit, & naribus: sed etiam
 30 illa intelligi debet, quæ in toto corpore à corde & arterijs perfici-
 tur: græcis nominatur *ἀσπνοή*. Nam sæpè mulieres, quæ hoc vitio
 laborant, mortuæ prorsus apparent, quòd per os, & nares spirare
 prorsus nequeant. Porro læuior adhuc est suffocationis species,
 in qua non solum spiratio: sed etiam sensus, motûsque saluus est.
 35 in vniuersum illa, salutem futuram denunciat, in qua sternutatio
 superuenit. MATHESES, Quo alio morbo præterquàm suffoca-
 tione vulua laborare solet?

*Spiratio quid
 commodi adse-
 rat.*

GERON, Aliquando etiam vulneratur. MATHESES, Vnde
 hoc noscitur? GERON, Inde, quòd inguina, coxæ, & fœmora do-
 30 leant: sanguis partim per vulnus, partim per naturale exeat: vo-
 mitûsque bilis insequatur. Quædam mulieres ex hoc casu obmu-
 tescent: quædam mente labuntur: quædam sui compotes manent:
 neruorum oculorûmque dolore se vrgeri consueunt: morien-
 tesque tandem eadem quæ corde vulnerato patiuntur.

35 Atque hic nunc de internis totius corporis agere desinam:
 deinceps inde ad extremarum illius partium, quæ articulis inter
 se conferuntur, affectus digrediar, initiumque ab eo faciam, qui
 omnes articulos obsidere solet, græcè *ῥέθρις*: latinè morbus arti-
 cularis dicitur. MATHESES, Quot eius sunt diffidentiae? GERON,
 40 Tres duntaxat, ex quibus duo in manibus pedibûsque articulo-
 rum sunt vitia, ac græcis, latinisque *ῥεγνῆα*, & *ῥεγνῆα* vocantur: *Chiragra*.
 tertia verò græcis tantum *ῥεγνῆα*, hoc est coxarum dolor appellatur. *Podagra*.

*Arthritis, mor-
 bus articularis.*

*Chiragra.
 Podagra.*

*Articularis mor-
bi indicia.*

Chiragrae signa.

Podagrae indicia.

*Coxae dolorum
notae.*

*Podagrae obno-
xij.*

at qui affectus seu dolor cuiuscunque articulo intus inciderit, generali nomine articularis, græcis ἀρθρῶνδης nuncupatur. MATHE T. Quæ communia morbi articularis sunt indicia? GERON, Diu ille trahit, & per intervalla propè reuertitur, grauibz tormentis ægrum conficiens: interdum is ipse, repente in omnes articulos irruit: sæpius paulatim accedit, leuisque chiragra, vel etiam podagra oritur, calidis natura hominibus dicata. Ab his partibus dolor longo spatio cæteros articulos, quos infestare solet, inuadit. Quinetiam cum malum hoc inualefcit, spinæ vertebræ afficiuntur, genæq; dolent: atque nonnunquam ipsum guttur: imò omnia ferè ossa, quæ inuicem connectuntur, huiusmodi dolore cruciantur. ac quæcunque pars huic vitio opprtuna est, leni occasione æqualiter, siue frigore, siue calore offenditur. MATHE TES, Quomodo singulæ morbi huius species distinguuntur? GERON, Dolores alij alias partes affligunt, si ossium membranas, aut musculos, aut nervos, aut medias regiones occupant: illi articulos tantum infestant. In chiragra manum, vel eius & brachij iuncturam, quæ græcis χάρωος dicitur: vel partem exteriorem, vel digitorum articulos, ac ligamenta: atque plærunque ei adest etiam tumor, rubor, calor pulsansque, & venæ plenæ, turgidæq; apparent. In podagra verò dolor talos, vel plantas: præcipuè pollicis articulum inuadit. Tumor quoque in hac, sicut in chiragra extat, partisque affectæ, & venarum ipsam ambientium rubor, calor, dolorque pulsans deprehenditur. In coxarum affectu cum vehementissimus dolor sentitur, maximè in eo articulo, quo fœ- moris caput coxe vsque ad nates summas inseritur: qua nerui à lumbis & ossè sacro emergentes in crura feruntur. Cruciatu autem non tantum in coxa persistit, sed etiam in fœmur, suram, pedemque extremum pertingit, quocunque tandem neruus ab affecta coxa profectus, pertineat. aliquando circa inguina inhærescit: & vesica offensa, vrinæ difficultatem parit. ipsum verò crus, nunc calidum, nunc frigidum existit. Hoc vitium ferè post longum morbum materia in coxam inclinata, gignitur. pars affecta non sæpè in illo tumescit, rariùs calet, aut rubescit: eò quòd nullæ propemodum vene in summa cute extent. MATHE TES, Quomodo affectus humeri cognoscuntur? GERON, Dolor quidem in eius articulo sentitur, nullus autem insignis tumor, rubor, vel calor, sicut neque in coxa est manifestus. MATHE TES, Qui potissimum infestari podagra solent? GERON, Pleniorè habitu præditi: renum imbecillitate, & calculo affecti, rarò autem castrati, vel pueri ante veneris vsum. non sæpè mulieres, quæ menstruis adhuc purgantur. Quanquam ego Argentinæ viderim etiam nonnullas, quæ licet

licet menstruis purgarentur, eo vitio laborasse. aliàs solum illæ, quibus menstrua suppressa sunt, podagra laborare solent. MATH.

Quæ proxime causæ, articulare vitium generant? GERON, Si tu-

*Articularis mor-
bi causæ.*

mor euident est, humor naturæ contrarius, crassiorque illis in-
5 hærescens, mali huius auctor est: si exiguus conspicitur, tenuis a-
liquis ac paucus eum generat: qui ligamenta, & membranas ex-
trema ossa foris ambientes, nec non tendines eò directos pene-
trat. Id inde cognoscetur, quòd humor sæculentus, qui vulgò
tartarum dicitur, renibus, & articulis communis in calculum con-

10 cretus, in chiragra, & podagra, callosa nodosaque, si cutis aperta
aut rupta fuerit, è digitorum articulis extundatur, ligamine saluo
& incolumi. Hac de causâ coxæ dolor, etiam longè est vehemen-
tior: quia humor illum excitans, in coxæ acetabulo non recondi-
tur, neque tam latè diffunditur: adhæc quia idem humor non

*Coxæ dolor cur
vehementior.*

15 tam varius, vt dici solet, existat, neque enim sanguineus, neque bilio-
sus, neque melancholicus vnquam est: sed omninò vel pituitosus,
vel serosus. MATHE. Si hoc ita habet, vnde rubor, aut calor inter-
dum, præsertim in chiragra, vel podagra prouenit? GERON, Non

*Articularis mor-
bus ex solo frigi-
do humore.*

ex morbi materia, sed ex doloris vehementia contrahitur: qui ru-
20 borem, caloremque, & febrim nonnunquam procreat: idque po-
tissimum in calido valdè habitu, & pleniore donatis, & qui leui
occasione febris conflitantur. Frigidus igitur humor: & tenuis,
dum articulorum ligamenta, membranas, aut tendines replet, di-
stenditque, aut ferit, dolorem concitat, hic autem ruborem, calo-

25 rem, atque febrim parit: quæ humorem distendentem, aut feruen-
tem comitantur. MATHE TES, Continentem seu proximam arti-
cularij doloris causam explicasti, quæ est primaria, siue antee-
dens? GERON, Humor, qui aliunde in articulos imbecilles, vel in

fluit, vel influxurus est: quo autem ex loco, & per quas vias, nulli
30 satis exactè est compertum. Ob quam causam morbus iste articu-
laris, à medicorum turba desperatus, & relictus censetur. MATHE

*Articularis mor-
bus cur despera-
tus dicatur.*

TES, Quæ igitur illius origo est? GERON, Caput, è quo tenuis pi-
tuitosus humor in articulos profluit. MATHE TES, Cur non ex ce-
rebro, aut ex interiore eius ventriculo, in quibus excrementum

35 pituitosum accumulari consueuit? GERON, Quia id foràs, vel per
nares, vel per palatum, in asperam arteriam, atque pulmones, aut
in ventriculum, sed èsque interiores illabitur. Doloris itaque ar-
ticularis origo sunt, externæ capitis partes, extrâque caluariam si-

*Articularij dolo-
ris origo.*

te, è quibus humor superuacaneus, per summum corpus sub cute
40 deorsum defluit, manetque ibi diutius: eò quòd is ob crassam den-
samque capitis cutem, non facillè expirat, sed magis magisque col-
ligitur. MATHE TES, Quæ copiam eius indicant? GERON, Capitis

*Tumoris extre-
mentis in sum-
mo capite notæ.*

grauitas, somnolentia, dolor externus: qui dum ipsum contingis, pedesque inuertis, inualefcit. adhuc tumor ceræ instar mollis, qui græcis *οἰσμημα*, dicitur, cuti iuxta occipitium subiectus. Porro immodicus humor sæpè, aut æstus, aut frigoris, aut fricationis gratia, aliàs spontè etiam, in partes subditas delabitur. Cùm autem aquæ, & feri instar tenuis existat, qualem tempestate frigidiorè è cerebro per nares defluere deprehendis, non per spinæ medullam, vt in resolutione accidit, neque per neruos, & musculos, verùm sub cute in extimas corporis regiones faciliè influit. Idem interea ob tenuitatem, in solis articulis ceu compactis densisq; non autem in medijs sedibus, amplis, laxisque subsistit, hæretque. **MATHESES.** In quod corporis latus humor ille superueniens præcipuè fertur: **GERON.** In illud, ceu corpus frequentius incumbit, verbi gratia, si ipse iam concitatus in dextrum latus tendit, dolor humerum brachiũque dextrum affligit. si in sinistrum inclinât, sinistrum impetit. si in dorsum profluit, ceruicem, scapulas, coxas, vel crura molestat. **MATHESES.** Qua ratione homines articulario morbo laborare incipiunt: **GERON.** Primum humor è capite fertur: deinde subito in extremos pedes, latenter, & sine sensu influunt: idque faciliè, cùm per initia admodum sit tenuis, & in calidiore orbis regione. Vbi verò is humor, temporis spatio crassiusculus iam euaserit, præsertim in regionibus frigidis, & in senioribus, non ilicò in extrema profluit, sed in medijs hæret regionibus: quando etiam tum mali origo, tum propagatio est manifesta. **MATHESES.** Quomodo: **GERON.** Dolor è ceruice vel per humeros in cubitus, & manus: vel per dorsum in coxas, genua, & pedes pertingit: sic vt frigus interdum percipiatur, quo corpus totum perhorrescit. **MATHESES.** Obsecro te dicas, num dolor, vt è supernis partibus ad inferiores, ita etiam ab infernis sursum ascendat: **GERON.** Minimè, imò neque ex dextris ad sinistras, aut contrà, ab his ad illas commigrat. **MATHESES.** Quid si dextri dolor, sinistri cruciatum comitetur: **GERON.** Tunc non loci permutatio, sed noua defluxio illum generat. notandum autem omnem humorem, cùm defluit, aliquanto esse tenuiorem: cùm autem articulo iam impactus est, caloris natiui, & vehementium medicamentorum vi eundem concrefcere, & subtili eius portione dissipata discussâque, sæculam quandam terrestrem reliquam manere: quæ crebro influxu coagmentata, in euidentem tophum, & calculum in articulis, præsertim digitorum coalescere. Atque hic est morbus articularis, nodosus, quo articuli disiliunt, distorquentur, & motu abolito incuruescunt. **MATHESES.** Quæ sunt huius vitij causæ euidentes: **GERON.** Eædem, quæ fluxionis. vna liqui-

*Articularius mor-
bus nodosus.*

Causæ euidentes.

siquidem est, humoris abundantia: altera verò, imbecillitas articularum. neutra seorsim, sed ambæ simul concurrentes, hoc malum efficiunt. MATHETES, Vnde imbecillitas artuum aestimari debet? GERON, Tum ex ligamentorum membranarumque laxitate, tum ex transitu viarumque amplitudine. MATHETES, Vnde ergo vitia ista proueniunt? GERON, Vel ex imbecillo parentum semine (atque hac ratione morbus est hæreditarius) vel ex causis euidentibus, vt ex crebro veneris, balnearumque vsu: & exterioribus, quæ arterias contundunt. MATHETES, Quæ humoris

Artuum imbecillitas.

abundantis causæ sunt interiores? GERON, Imbecillitas, & frigida humidæque intemperies cerebri, & capitis vniuersi. nam humor etiam si alimenti vice in capite sit exceptus, dum vitia illa urgent, totus elaborari conficitur non potest: eoque excrementum necessariò temporis processu gignitur, augeturque. MATHETES,

15 Quomodo? GERON, Si euidentes causæ adhuc illis accesserint, quæ fluxionis materiam adaugent: cuiusmodi sunt cibi iusto pleniores: omnis potio, præsertim vini liberalior: somnus æquo largior, maximè secundum cibum statim: ocium, exercitationes intermissæ: solitarum vrinarum, sudorumque excretiones suppressæ, vel saltem imminutæ. MATHETES, Quæ de morbo hoc articu-

Præfagia.

20 lulari communiter, prædici possunt? GERON, Vbi ad senectutem vsque inueterauerit, aut saltem in ea oriri cœperit: aut si ante ætatem hanc, callum, nodumue contraxerit, nunquam ex toto sanescit. Iuueni semper facilius succurritur, qui laboris cupidus est,

25 probaque victus ratione vititur, & aluum habet facilem: maximè si morbi materia non ex diuersis conflata sit humoribus. atque hæc si non omnia fausta pollicentur, certè eam spem faciunt, vt nullus nodus interea generetur. Tormina & aluus quomodocunque fluens, omnium maximè huic morbo succurrit: vinum contra, &

Aluus fluens commenda morbo articulari.

30 venus immodica sunt nocentissima. febris & generare, & fouere articularum vitia potest. varices nati, aut vrina crassa, multaque excreta, salutem portendunt. Quæcunque pars tum in podagricon, tum in chiragricon vitio affecta est, ea debilior est, & emacrescit. Podagrici dolores, vbi inflammatio remiserit, intra quadra-

Vinum & venus articulariis noxia.

35 ginta dies conquiescunt: siquidemque magis in autumno, quam in vere mouentur. Coxendicus dolor, cum sit grauissimus, longior etiam cæteris existit, vt qui nequaquam anno finiatur: si ingens torpor subsit, & crus, coxa, & lumbi valdè frigeant, aluiusque non nisi sollicitata respondeat, & nihil præter motum excrementi-

Coxendicus dolor.

40 tium reddat: si denique genitalia arrigi nequeant: & ætas annum iam quadragesimum superauerit. In verè, & æstate hoc malum facilius, quam hyeme & autumno curari potest. Dolor in eodem

Coxæ doloris tempus.

Præfagia.

isto vitio perinde grauis, in iunioribus ac in senioribus: non autem æquè longa ipsius spatia existunt. nam iuuenes ante diem quadagesimum liberantur. torpores etiam in his minùs vehementes fiunt, cruræque ac lumbi minùs frigescunt. Quòd si dolor sub eodem affectu latens, à lumbis ac coxis ad inferiora descendat, benè sperandum est: contra si coxis, lumbisque adhuc affectis dolor ad superiora tendat, res in periculo versatur. si vitio inueterascente, foemoris caput extra coxam elabatur, protinus id contabescit, & æger nisi vltus fuerit, claudicabit. non rarò hydrops, ex hoc coxæ dolore nascitur. Podagræ & coxæ vitia facillè reuertuntur, reliquorum autem articularum, non item consueuerunt. Vbi articularis cruciatus in humerum decumbit, nullus euidentis tumor vel calor, vel rubor apparet. Quando ille cubitum, aut genu obfidet, multum & doloris, & tumoris: parum autem ruboris, calorisque exhibet. **MATHETES**, Cur obsecro quælibet articularij morbi species difficillima, vel desperata curatio esse dicitur? **GERON**, Quòd varijs modis generetur, & ægrè dignosci possit. Nam si constaret, quæ, & quales eius sint differentia, quæque propria remedia, & conueniens victus ratio: in primis autem si ægri per omnia obtemperarent, faciliùs curarentur. Habes nunc omnia, quibus interiores corporis affectus cognoscere possis: tempus nunc est, vt me ad exteriora corporis vitia, conuertam.

Podagræ & coxæ præsigna.

Cur articularij morbi desperata curatio dicatur.

EXTERNI affectus tumores

Inflammationis notæ.

Causa inflammationis.

MATHETES, Quænam obsecro sunt? **GERON**, Tumores, tubercula, pustulæ, abscessus, vulnera, vlcera, & postremò ossa fracta, luxata, aut aliter vitiata. **MATHETES**, Quæ sunt singulorum species? **GERON**, Tumorum inflammatio, & bubo phygethilon: tuberculorum phyma: pustularum carbunculus, & furunculus. **MATHETES**, Quibus notis inflammatio indicatur? **GERON**, Pars affecta tumet, digitòque prementi renititur, tenditur, calet, rubetque, & pulsanti dolore vrgetur. **MATHETES**, Quæ res illam excitat? **GERON**, Sanguis è venis prodiens, non soli cuti, sed etiam carni subiectæ impactus. Cum enim venæ arteriæque maiores immodico sanguine distenduntur, hunc ille grauata in minores: ex his tandem in minimas deponunt. Quando autem sanguis per illarum oras, ac tunicarum meatus cohiberi non potest, in spatia musculorum, venarum, arteriarum, neruorum, & membranarum effluit, elabiturque. hæ verò partes, dum fluxione perfunduntur, implenturque, sanguinis abundantia distentæ, quasi diuelluntur, ac ardore illius incalescunt, doloremq; pariunt. nam sanguis extra vasa contentus (sic vt libero perspiratu diffusi nequeat) necesseario putrescit, inflammaturque. Quòd si is purus fuerit, exquisitas inflammationes excitat: cuius species sunt, lippitudo, angina,

gina, & alia, quæ aures, aut gingiuas, similesque partes affligere solent. Si verò non syncerus sanguis, sed aliorum quoque humorum particeps fuerit, minùs exquisita inflammatio gignitur, quales græcis nominibus erysipelades, oedematodes, & scirrholes
 5 appellantur. *MATHESES*, Quid de finienda inflammatione sperari potest? *GERON*, Aut materia eius latenter resoluitur, quod salu-
 tiferum est: aut maturatur, & pus mouetur: quod bonam spem ostendit. interdum sine his maligna esse incipit: quod pestiferum existit. aliquando etiam cùm malè curatur, in durum, sensùsque
 10 expertem tumorem degenerat: id quod bonum non est. *MATHE.*

Quid est phygethlon? *GERON*, Glandularum tumor non al-
 tus, sed latus: in quo sanè quiddam pustulis simile apparet: latinis
 pannus ad figuræ similitudinem vocatur: frequenter in ceruice,
 aut in alis, aut in inguinibus nascens, iam dictis minor, pleniorque:

15 minùs autem rubens, ac dolens, vt qui ex sanguine, & pauca pituita sit conflatus. *MATHESES*, Quæ signa phygethlon indicant? *GERON*, Dolor, distentióque vehemens, ac maior, quàm pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricula: idque tarde matu-
 rescit: neque magnopere in pus conuertitur. *MATHESES*, Qui-

20 bus ex causis contrahitur? *GERON*, Ex iisdem, quibus inflamma-
 tio: atque id ferè post febres, aut partis alicuius dolores, maxi-
 mèque eos, qui ventrem infestarunt, & materiæ fluxionem in
 glandulas prouocarunt. Sepius oculis expositum hoc est vitium.
 nam latius aliquando intumescit, rubetque cum calore, & paulò
 25 post cum duritie, magisque innocenter indolescit, & sitim vigi-
 liamque exprimit. Interdum tamen horum nihil in cute depre-
 hendi potest: maximèque vbi pus altius mouetur: sed punctio-
 nes aliquæ intus, cum siti vigiliæque sentiuntur: & quod de subi-
 to durius non est, melius est: & quanuis non rubeat, coloris ta-
 30 men aliter mutati est: quæ signa iam pure oriente nascuntur. tu-
 mor ruborque multò antè incipiunt.

MATHESES, Quid phyma dicitur? *GERON*, Tumor glandularum ad suppurationem spectans, vel in abscessum degenerans: id quod ex Hippocrate cognosci potest, dum in hunc mo-
 35 dum scribit: In quibus phyma meatum vrinarium obsidet, hi ab-
 scessu in vomicam erumpente, liberantur. Caterum vitium hoc
 rotundum phygethlo minùs, pleniusque est, rubens, dolens.
MATHESES, Vnde oritur? *GERON*, Ex eo sanguine, cui pituitæ
 aliquid sit admistum, veluti inflammatio cedematis particeps.

40 *MATH.* Quale vitium est bubo? *GERON*, Inflammatio ingui-
 num, vel alarum, vel ceruicis, quæ modò ictibus, modò dolori-
 bus, modò alijs vlceribus: maxima autem ex parte lvi pestilentiali,

aliquando veneno superuenit. MATHETES, Qui alij calidi affectus præter hos restant.

ERISIPELAS.

GERON, Qui summam cutem vehementi ardore affligunt: inter quos principem locum obtinet, qui græcè *ερυσίπτελας*, dicitur, sub hoc neque tumor manifestus eminet, neque partem attollit, distenditque, neque carnem subditam penetrat: sed latius diffunditur, nulla materia coaceruata definitus. quemcumque verò locum apprehendit, valdè rodit vritque. color eius rubro flauus, qui digitis prementibus euanesceat: ipsædem remotis, statim reuertitur. adhæc neque dolorem pulsantem, neque admodum vehementem inducit, sed ex vna sede in aliam serpendo migrat, ac per initia sanè cum horrore inuadit, febrem mouet, & semper minus doloris ac tumoris, quàm inflammatio adfert. Duæ eius species habentur: simplex, & exulcerata. illa veluti ardor ac deflagratio quædam rubicunda, sine vlcere existit. Hippocrates *ἰνφλογισμα*: vulgares à caloris rubri similitudine Rosam, & Pulchellam nominarunt: hæc Celso ignis sacer dicitur: sub qua summa aliàs cutis afficitur, in eaque crustulæ tanquam fursuracæ oriuntur: aliàs tota exulceratur, & ruptis pustulis saniem purulentam reddit.

Erysipelas duplex.

Ignis sacer.

Ignis sacer duplex.

Pars affecta.

Erysipelas vnde.

Erysipelati obnoxia corpora.

Præfagia.

Hæc vlcerata rursus duplici constat differentia. in priore summa cutis exulcerata sine altitudine lata, subliuida, inæqualiter tamen apparet, mediūmque sanescit extremis procidentibus. Altera est, sub qua exulceratio altius cutem penetrat: ex qua sanies purulenta ruptis pustulis prodit. MATHETES, In qua parte versatur potissimum erysipelas? GERON, In facie, eamque serpendo subinde occupat, & multum attollit, latiusque expandit. MATHETES, Vnde simplex erysipelas oritur? GERON, Ex sanguine feruido & tenui, seu bilioso. Exulceratus autem ex eo, cui bilis excrementitiæ, & incalcescentis aliquid sit admistum. MATHETES, Vnde hic prouenit? GERON, E venis tenuioribus, eoque in carne non subsistit hæretque, sed ob ipsius tenuitatem in cutem fertur, euanesceatque: quæ cum sit densior, ac compactior, ipsum retinet, & remoratur: humor autem cum sit tenuis, facillè dissipatur, & nullum tumorem excitat. Hoc totum erysipelatis genus exquisitum est: inflammatorium autem, seu *φλεγμανώδες* græcè dictum, tumorem quidem magis conspicuum, sed minus feruidum efficit, multo autem minus id quod *οιδηματώδης* græcè appellatur. MATHETES, Quæ corpora huic malo magis sunt opportuna? GERON, Seniores, aut quæ mali habitus sunt, præcipuè in cruribus. MATHETES, Quæ præfagia de hoc vitio habes? GERON, Nisi statim remedijs ei succurratur, rapere etiam hominem strangulatu potest. Hippocrates hoc vitium per anginam pestiferū esse prodidit, si postquam

(temel)

semel in pectore exortum est, subito rursus intrò reuertitur. Prauium quoq; esse, quod propter os contractum, aut nudatum prouenit. Si ab interiore parte ad externam vertitur, semper est salutare: si ab hac ad illam declinet, pestiferum existit. Putredo, aut
 5 suppuratio ab eodem vitio suborta, malum indicat, id quod simplici erysipelati nunquam ferè potest accidere, vt quia magis latenti cutis perspiratu dissipatur.

Huic simile est vitium, quod latinis papula, græcis *ἰσγῆρις* appellatur. Eius duo sunt genera: alterum simplex ac mitius est, in

PAPULA.
Simplex.

10 quo cutis per minimas pustulas nullo similes exasperatur, rubet, leuiterque roditur, & prurigne sollicitatur: medium habet paucillo leuius, tardè serpit: idque vitium maximè rotundum incipit, eademque ratione in orbem procedit. Alterum seuius est, unde græci *ἀγέρον*, quasi ferum nuncupatur, & papulas ferè habet,

Feru.

15 quas græci *ἰσθρῖδες* vocant: eò quòd totam cutem excedant. in hoc cutis quidem similiter, sed magis exasperatur exulceraturque, ac vehementius & roditur, & rubet: interdum etiam pilos remittit.

MATHESES, Videtur ex narratione tua papula exulcerata, erysipelati esse finitima: GERON, Est quodammodo, sed hoc intercedit

20 discriminis: quòd hoc manifesta fluxione de subito emergit: illa verò sensim, longòque tempore, non palàm conspectui patet. Papularum pustulæ aridæ sunt, è quibus ruptis neque sanies, neque

Papularum pus-
tulae.

pus exit. erysipelatis autem magnæ exulceratæ, & humidæ, saniosum pus effundentes. Rursus papula pruritu, erysipelas dolo-

25 re, & ardore cruciat. denique omnis papula diuturna est, febris omninò expers. MATHESES, Quæ causâ vtranque papulæ speciem gignit? GERON, Bilis sincera, excrementitia, eaque ardentissima, vt porracea, vel æruginosa, quæ paulatim è venis expurgata, partes omnes, præsertim carnosas, ob tenuitatem suam transiit,

Causæ papularum.

30 donec cutem densiorem attingat. Quia verò illa crassior viscosiorque est, quàm in igne sacro, diutius tenaciùsque in cute subsistit. sin autem maior simul fuerit, pustulas mouet: quibus ruptis, cutèque exulcerata, papula fera, seu herpes exedens excitatur. si tenuior bilis cutem permeat, & in sola summa cuticula remora-

35 tur, ita vt sudoris modo eam transire nequeat, tunc eam erodit, & pustulis intercurrentibus exedit. MATHESES, Quid præsis de vitio hoc papularum? GERON, Hæ inter omnia vlcera, quæ depa-

Prænotio.

40 scendo serpunt, minimè periculosæ sunt. nam laeues, & rotundæ inter ipsas, etiamsi ieiuna tantùm saluâ quotidie defricentur, sanescunt. Quæ verò minùs rotundæ existunt, & facilem, longamque curationem habent. nisi enim sublata fuerint, in impetiginem, de qua postea, vertuntur.

CARBUNCULUS.

Similis ferè affectus est, qui græcis *ἀνθράξ*, latinis carbunculus nominatur. Sub hoc pars offensa primùm prurit: deinde rubore picis, aut bituminis instar, splendescit, maximòque dolore cruciatur: ac statim pustulæ plures excitantur: vel saltem vna, eaque flagrantissima, colore nigra, interdum liuida, & pallida, quæ non multum eminet. hac rupta, vlcus cum crusta gignitur: quale à ferramentis candentibus inuri solet. reliqua eius caro feruida inflammatione cingitur: quæ græcis *φλόγσις*, dicitur: crusta ipsa modò cinerei coloris, modò nigra est, sic vt ipsa carni inferiori continuè adhærescat, & quasi affixa sit, vt inde diduci diuidique nequeat: partes vicinæ omnes, calorem dolorémque consensuone quadam percipiunt: subinde æger horrescit, ac febricitat, nauseat: acceditque somni cupiditas, & cordis tremor: tumor in hoc malo nunquam suppurat. vbi autem carnis corruptæ ob exustionem particula tandem excidit, cauum sordidumque vlcus generatur. Oritur hoc malum ex sanguine crasso, nigro, feruente, & corrupto. MATHE TES, Quid de hoc malo sperari potest? GERON, Nihil boni: vt quod acutum sit, & ex toto pestiferum: præsertim si febrim excitauerit: et nō longè à principalibus absit visceribus, vt in alis, & inguinibus. Timendum enim est, ne id faciliè intro reuertatur: quia cùm id acciderit, eger in certo vitæ periculo versatur, præcipuè, si plura mala signa etiam comitentur. Solet idem malum, cùm circa stomachum, aut fauces prouenerit, spiritum subitò elidere: at rubens carbunculus, pallidusque minùs terribilis est: niger in totum perniciosus. denique omnis ferè carbunculus grauià pestilentia tempore, & antecedere, & comitari solet: idémque tunc prorsus est exitialis. qui verò alio tempore oboritur: is licet maximis quoque doloribus terreat, curatu tamen est facillimus. MATHE TES, Quid est furunculus?

FURUNCULUS.

GERON, Tuberculum acutum, dimidij oui magnitudinem rarò explet, nunquam excedit: græcè *σολιῶν*, vocatur, phymate minùs latè patet. maior autem inflammatio & dolor in eo sentitur, maximè vbi iam in pus vertitur. Quando ille ad apertus est, & exit, super apparet pars carnis in pus versa, pars corrupta, subalbida, subrubra. Differt à simplici carbunculo: eo quòd perinde ac inflammatio suppuret. MATHE T. Vnde contrahitur? GERON, Ex crasso vitiosoque sanguine, non tamen exusto, vt in carbunculo: rarò simplex ac solus erumpit, sed complures similes summam corporis cutem inficiunt. MATHE TES, Quid de curatione eius expectari potest? GERON, Nullum periculum, etiamsi nulla curatio adhibeatur.

GANGRÆNA

Vbi inflammatio grandior extiterit: gangræna, atque sphacelus

celus subinde consequuntur: in illa pars emori incipit, calorq; na- *Sphacelus.*
 tius extingui: nec non color inflammationis amittitur, simulq;
 dolor, & pulsatio vrget, in hoc, qui latinis etiam syderatio voca-
 tur, pars affecta, sensum motumq; & vitam ipsam tota amittit, eua-
 5 ditq; prorsus nigra, mollis, putris, malè olens, & cadauerosa. hoc
 malum nisi pars corrupta maturè præcidatur, præceps adfert exi-
 tium. MATHE T. Calidos affectus exposuisti: quinam sunt frigidi?

GERON, Primus græcis *oedema* dicitur, laxus, mollis, albidus, *OEDEMA*
 coloris, dolorisq; expers, qui digito prementi cedit, vestigiū-

10 que relinquit. Duplex eius species est. vna ex mera pituita: altera
 ex pituitoso sanguine gignitur: nec non illa frequens est pedibus,
 alijsq; nonnullis partibus. hæc toti corpori communis, eorum
 præcipuè, quos aqua inter cutem, aut tabes, aut malus corporis
 habitus consumpsit, ex pituitoso sanguine ducens originem. Sæ-

15 pè hæc resoluta conquiescit, ac in nodos quosdam tuberâque ex-
 crescentia degenerat. MATHE TES, Quando istud, & quibus acci-
 dit? GERON, Promptius per hyemem luxui deditis, & senibus.

MATHE TES, Vtrum exquisitum oedema dici potest? GERON, *Oedema exquisi-
 tum.*
 Quod ex pituita superflua generatur, quæ tantum vel aquosa sit,

20 vel mucosa, quacunque ex parte in locum affectum deferatur.
 plærunque tamen hæc ex capitis destillatione prouenit, quæ cre-
 bro in genua, aliquando in humeros, aliâsque partes deferitur.

MATHE TES, Sûntne alij tumores hisce similes? GERON, Sunt a- *Tumores aquei.*
 quosi, quibus vel aqua citrea, seu lutea, vel serum sanguinis con-

25 tinetur: sicut hydrops, qui ab eo, quod aqua tanquam in vtre
 comprehenditur, *ἀσκήτης*, græcè nominantur, hydrocephalon, &
 hydrocele, seu ramex aquosus, aliâque his similia vitia sub cutem
 extrantia. Huius generis sunt etiam tumores flatulenti: vt in qui-

bus flatus aliqui naturæ contrarij continentur, vt hydrops tym- *Tumores flatu-
 lenti.*

30 panites, ramex flatulentus: aut alij, qui aut sub cute, aut sub osi-
 um membranis, aut in musculis, vapore partem instante excitan-
 tur: raro autem soli flatus sine humoribus permisti, tumores ge-
 nerant. Id genus tumorum nullum dolorem gignit, nisi membra
 nas magna vi diuellat, distendâtque.

35 Post hoc, sequitur alius tumor contra naturam durus, reni- *SCIRRHVS.*
 tens, sensus expers, coloris inter rubrum & nigrum medijs, græ-

cis *σκληρός*, appellatur. Duæ eius sunt species: vna tanquam incipi-
 ens, nondum confirmata, nec legitima: in qua cum premitur, do-

40 lor sentitur, atque hæc tumor oedematodes vocari potest. Altera
 verum oedema, & exquisitum, omnis tum doloris, tum sensus ex-
 pers. MATHE TES, Vnde vtraque species conflat? GERON, Ex
 crasso viscosoque humore, qui parti membræue impactus inser-

- tūsq; eius spatij ita obduruit, vt non nisi difficulter resolui, discuti que possit. *MATHESES*, Qualis humor est? *GERON*, Vel pituita vitrea, & gypsea, vel naturalis humor melancholicus, qui sæx est sanguinis, in parte quadam accumulatus. principio malum hoc exiguum est: paulatim grandius euadit. *MATHESES*, Quæ partes hoc vitio magis infestantur? *GERON*, Sæpius iecur: sæpius lien: idq; non sine certo grauissimorum, ac exitialium morborum metu tentatur: nonnunquam aliæ etiam partes, cum inflammatio, vel erysipelas male in ipsis curata fuerit: cum scilicet medicorum istorum materiam plus æquo refrigerarint, astrinxerintque: aut cum tenuis eius portio discutientibus medicamentis dissoluta fuerit, crassior remanet, ac subsistit. *MATHESES*, Quid futurum solet in scirrho accidere? *GERON*, Recens, si premitur, exiguum quidem doloris sensum aliquem affert, medicinae tamen locum facit: absolutus, sensu penitus caret, nec ullis tolli remedijs potest. sic etiam in alijs scirrhus resoluitur: alijs perpetuo durus manet: nonnullis etiam in cancrum degenerat.
- STRUMA.* Huic vitio finitimus tumor est, qui græcis *χοιρᾶς*, latinis struma, barbaris scropula dicitur, glandularum modo durus, præsertim in ceruice, in qua longa serie dispositus cernitur: inde nunc ad alas: nunc in pectus: nunc ad fœminarum mamillas: aliàs ad inguina peruenit. interdum simplex est, equalis, rotundus, circumscriptus, non vehementer durus, vt scirrhus: aliàs per omnia ei similis: inflammationis & doloris expers. vbi in vetustatem inciderit, grauisque factus est, in vlcus malignum, serpens erodensq; degenerat: vnde ipsa quoque glandula, qua comprehenditur, & loca vicina exeduntur: interdum adeò maleficum euadit, vt parum à cancri natura differat: tumet inæqualiter: febris in eo mouetur, & dolores pulsantes: venæque ipsæ turgescunt. *MATHESES*. Vnde ipse contrahitur? *GERON*, Ex pituita non simplici, sed ob caloris vim, ac putredinem acri: quæ ab extrema capitis parte per ceruicis tendines, glandulasque adeò lentè defluit, vt origo eius sæpe percipiatur. Interdum ea ipsa pituita atræ bilis mistura ferocior redditur, vt struma carcinomatis naturam imitetur: vnde carcinodes struma appellari potest. *MATHESES*, Qui strumæ magis sunt obnoxij? *GERON*, Pueri, quibus etiam minus nocet, præcipuè breui ceruice, pressisq; temporibus, & longis maxillis predicti. rarò quidem adultiores, & magis qui ad prouectiorem ætatem peruenerunt. *MATHESES*, Quid in struma curanda sperari potest? *GERON*, Si mapibus contrectetur, multò fit deterior, & per totum vitæ curriculum perseuerat: quoniam nunquam facile maturefcit, siue ferro, siue medicamentis curetur: plærunque iterum
- iuxta

iuxta cicatrices ipsas resurgit, deterior quoque est, quæ dolore caret: qualiscunque autem fuerit, difficillimè tollitur.

MATHE. Quis huic succedit tumor? GERON, Qui in omnibus ferè totius corporis partibus oriri consuevit, præcipuè in foeminarum mammis, quoniam naturæ fungosæ sunt, & inanes: ab CANCER.
animale cancro nomen sortitus est. apud græcos καρκίνος, latinis cancer. MATHE TES, Quibus notis dignoscitur? GERON, Durus est tumor, rotundus, inæqualis: magis nigricans liuidusque, quàm inflammatio, minùs autem feruens. vicinæ eius partes latius vndique dolent, induratæque sunt: venæ circa eum interdum vel plenæ, vel pallidæ, vel liuidæ tenduntur, & veluti canceri animantis pedes diductæ, incuruantur. Per initia hoc malum ciceris instar exiguum est, durum, rotundum, obscurique doloris, cum dolore & calore, nunc sine his: tempore interposito crescit, sic vt modò
fabam, modò nucem iuglandem, aut aliquid maius magnitudine æquet. Idem tumor aliquando vlceratus est, aliquando vlceris expers. vbi hoc infestat, pars eius assiduè exeditur, & rodendo altius penetrat, carnis corruptæ modo: à qua sanies pestifera, tenuis, nigra, aut fulua, odoris grauissimi prodit: vlcus ipsum inæquale est, labris tumidis, duris, inuersisque, concreta humorum eluuiæ plenum. in hoc quoque febris lenta assiduè vrget: anima crebrò deficit, præsertim si malum hoc cordi vicinum sit. interdum copiosus sanguis ex vlcere ob venam exeam profluit. MATHE TES, Quid de illius sine prænosci potest? GERON, Tam diù id crescent
do serpit, donec ægrum occidat. Vbi cancer recens est, nec per Presigia. vetustatem membro alicui penitiùs infederit, sanationis spem aliquam præbet. Cum verò inueterauerit, aut altius inhæserit, nullo remedio tollitur, præsertim etiam, si vlcus simul accefferit. quinetiam curando magis exacerbescit, quàm iuuetur. Si ferro
aduratur, multò magis irritatur, ferociorque euadit, & certi interitus causam præbet: nec non si scalpello excisum fuerit, post cicatricem inductam reuertitur, augeturque, donec vitam è medio tollat. quanquam aliqua hodie inuenta sint medicamenta, quibus ritè adhibitis, si non in totum sanari, certè mitigari potest, modò
maturè adhibeantur.

Post hæc vitia solent etiam alia in varijs corporis partibus oriri. primùm hoc, quod græcis σάρκωμα dicitur: eo quòd caro in illis excrescat, idque aut intus, aut foris, cum exulcerata est. MATHE. SARCOMA.
Vnde contrahitur? GERON, Ex partis cuiusque alimento, non autem humorum affluxu. nam caro illa excrescens, continua nutrimenti ipsius accessione, diffunditur augeturque. Frequenter ex venis & arterijs in eam pertinentibus, alimentum assumit: sæpè

etiam caro in vlceribus malè curatis excrescit: vt polypus in nari-
bus contusis. sic tubercula quædam in gingiuis dolentia oriun-
tur, ad dentium radices, græcis παρούλιδες, dicta. Similiter vitium
quod græcis à fici similitudine σύκοις, nominatur, his insidens par-
tibus, quæ pilis conteguntur, nascitur: sub quo etiam caro excres-
cit. Duplex eius species existit. prima vlcus durum, & rotundum
est: altera humida & inæqualis. ex duro exiguum quiddam, & glu-
tinosum: ex humido plus, idque mali odoris exit. Illud sanè, quod
callosum & rotundum est, barbam maximè infestat: quod humi-
dum, capillum præcipuè: sapius etiam anum cruciare dicitur, cer-
uicem, alas, inguinum glandulas, quarum partium caro circum-
scripta, non faciliè in tumorem attolli potest. MATHESES, Vnde
oriri dicitur? GERON, Ex eo, vnde inflammatio, nempe ex sangui-
ne feruente, non copioso, sed paulatim affluente, quantum par-
tibus alendis sufficiat.

ANEURISMA

Huic verò simile est, quod græcis ἀνέρισμα, vocatur: tumor
tactu blandus, digitis cedens. Galenus arteriæ apertæ seu dilata-
tæ affectum esse dicit. MATHESES, Quomodo cognoscitur? GE-
RON, Arteriarum pulsus, imò prementibus nobis in totum eua-
nescit: nonnunquam partes externas, vt manus, alas, ceruicem, pec-
tus, inguina, pedes, artus, vel caput infestat: nonnunquam ar-
terias interiores, præsertim sub pectore circa lienem, & mesente-
rium: vbi magna pulsatio sæpè deprehenditur. MATHESES, Vnde
gignitur? GERON, Ex sanguinea, spirituosaque materia, quæ
cum tumor premitur, intrò statim subterfugit. MATHESES, Rum-
pitur in hoc affectu vena, aut arteria? GERON, Minimè. si enim
sanguis ex vena, aut arteria proflueret, non magis illic consisteret,
sed statim corruptus computresceret, & alterius generis tumor
oriretur.

VARIX

Finitimus huic tumori est Varix, qui græcis κίρσος, nomina-
tur: immodica scilicet venæ dilatatio, crura magis quam cæte-
ras partes infestans. MATHESES, Quibus notis agnoscitur? GE-
RON, Cum vena multo & crasso sanguine impletur, pars aut liue-
scit, aut nigricat: atque etiam citra dolorem tumet. tumor autem
digitis pressus, quàm primum cedit, & paulò post redit. MATHESES, Vnde
generatur? GERON, Ex ictu, contusione, nimio conatu, la-
bore, & peregrinatione, nonnunquam ex corporis plenitudine:
vti in plerisque mulieribus grauidis.

SCABIES.

MATHESES, Quæ reliqua sunt cutis vitia? GERON, Pri-
mum est scabies, quæ græcis ζυομύς, appellatur. MATHESES, Quo-
modo nascitur? GERON, Durior in ea cutis aspretudo, rubicun-
dior apparet, & pustulæ oriuntur nunc humidiores, nunc siccio-
res,

res, sitq; ex his continua exulceratio pruriens, serpitque rodendo: in quibusdam citius: ea sanie expurgata, crustulæque tecta, obdurefcit: in alijs ex toto desinit: in alijs verò certo omni tempore reuertitur. quò asperior est, quòque magis prurit, & plures partes
 5 occupat, somniumque magis impedit, eò difficilius tollitur: quæ græcis *ἀγρία*, hoc est, fera nuncupatur. *MATHESES*, Quid de ea prænoscere poteris? *GERON*, Quodd ægerrimè in senibus sanescat, & deterrima in capite esse soleat. *MATHESES*,

Nunc, si placet, impetiginem interpreteris. *GERON*, Ipsa *IMPETIGO*.
 10 quoque dura, aridæque cutis aspretudo est, multæque pruriginemolesta: scabiei ferè similis, sed grauior. nam & rubet, duriórque & exulcerata est, roditque. Distat autem ab ea, quòd magis exulcerata sit: pustulasque habeat varis similes, & quòd in ea quasi bullulæ quædam esse videantur: ex quibus squamulæ tempore
 15 interposito resoluuntur: & quòd ipsa certioribus temporibus reuertatur. *MATHESES*, Quas partes infestare consuevit? *GERON*, *Quatuor genera impetiginis.*
 Vel manus, vel pedes. ac quatuor constat generibus: primum scabiei (cuius mentionem feci) representat. in hac cutis asperata rubet, duræque est, & acri pruritu lacessitur: vnde communiter
 20 prurigo dici solet. Alterum peius est, simile papule feræ, sed asperius, rubicundiúsque, figuras varias obtinens, magisque rodit, celerius & latius procedit: squamulæ ex summa cute descendunt, certioribus temporibus nonnunquam prior & fit, & desinit: græcè *λεχλεύς*, Celsò rubrica appellatur. Tertium etiánum dete-
 25 rius est, quod græcis *ψώρα* dicitur, à scabie diuersum: in quo cutis crassior, sicciór, duriórque, ac magis tumida, variæque existat, & serpentibus pustulis asperior. ipsum quoque squamosum, sed nigrum procedit, latè & tardè eminùs serpit: summa cutis finditur, vehementiúsque roditur, & furfuracea quædam nigra ex se
 30 remittit, ex atra bile originem trahens: non faciliè discuti, neque sanescere potest. *MATHESES*, Quas partes hoc impetit? *GERON*, Tempora, & in his aut oritur, aut desinit, neque in totum tollitur. Celsus nigrum cognominat. Quartum pessimum est, subalbidum, recenti cicatrici simile: græcis *λίπα* nuncupatur: cutem ro-
 35 dit, atque altè depascit: squamulas habet pallidas, quasdam subnigras, quasdam lenticulis similes: quibus demptis, nonnunq; sanguis profluit: præterea humor eius albidus est, cutis dura, ac diffissa, proceditq; latius. *MATHESES*, In quibus omnia ista genera maximè oriuntur? *GERON*, In pedibus, manibus, atque vngues
 40 quoq; infestant. *MATHESES*, Superius (si bene memini) retulisti, impetiginem cum scabie aliquid habere commune? *GERON*, Dixi quidem primam illius speciem hanc representare: sed in hoc

*Causa.**Præfagia.**VITILIGO.**Tres eius species.**Vitiliginis obno-*
*xi.**Malum mortu-*
*um.**Causa.**Præfagia.*

differunt inter se, quòd illa pustulas habeat siccas, omnis humo-
ris & saniei expertes: hæc autem è contrario. MATHETES, Vnde
trahit originem? GERON, Ex atra bile, aut ex pituita tenui, eaque
putrida, aut falsa, & quæ sub summa cuticula coërcetur, eamque
exedit. MATHETES, Quid de curanda illa speras? GERON, Negle-
cta in scabiem, & hæc in lepram vertitur: & qui hac semel labora-
runt, paulatim ferè tabescunt marcescuntque.

Huic finitimum est aliud vitium, quod latinis vitiligo dici-
tur: sub quo totum corpus alieno colore, maculisque non conti-
nuatis, sed variè dispersis fœdatur. partis affectæ sensus in eo vel
torpescit, vel ex toto amittitur. Tres sunt eius species. prima græ-
cis ἀλφῶ vocatur: sub qua summæ cutis color albus est, ferè sub-
asper, & non continuus, vt quædam quasi guttæ dispersæ esse
videantur: interdum etiam latius, & cum quibusdam intermis-
sionibus serpit. Altera græcis λευκὴ dicitur, quæ simile quiddam
albo habet, sed magis albida est, & altius descendit: ita vt etiam
carnem ad ossa vsq; afficiat. pili in ea albi, seu cani sunt, & langu-
ini similes. omnia hæc serpunt: sed in alijs celerius, in alijs tardius.
Tertia μελας græcis appellatur: quia nigra est, & ymbræ similis:
in cæteris eadem sunt. In hoc inter se differunt, quòd ἀλφῶ vix
vnquam, nisi cùm inueterauerit, cutem penetret: nec non quòd
in eodem pili sint naturales. Leuce, quem locum occupauit, non
facile dimittit: albus & melas in varijs temporibus, & oriuntur,
& desinunt. MATHETES, Qui vitiliginis vitio magis sunt op-
portuni? GERON, Omnes qui in malo corporis habitu consistunt.
Exoritur interdum alia quædam vitiligo rubri, aut fusci, aut liui-
di coloris: sub quo sensus, aut stupidiior est, aut in totum perit.
hoc vitium vniuersum, iuniores malum mortuum appellant.
MATHETES, Vnde species istæ omnes generantur? GERON, Ex
atra bile. reliqua vitia ex humore, quem fœdus color representat.
MATHETES, Quid de curatione trium istorum præfagiri potest?
GERON, Alphas & melas, non difficilimam recipiunt: leuce vix
vnquam sanescit. ac si quid ei vitio demprum est, non tamen ex
toto sanus color redditur, sed prauū aliquod seu vitiosū vestigium
remanet. Ex vno horum vitiorum siue alphi, siue mela sanguis
exit, vbi cutis inciditur, aut acu pungitur, in ijs remedio locus est.
si humor albidus, sanari non potest, sicuti in leuce accidit, quæ san-
guinem aquosum duntaxat obtinet. Alphas & melas quantū
initio sint sanabiles, tamen cùm inueterauerint, nulla medicina
tolluntur, præsertim si multas corporis partes occupent, siq; al-
tius intra carnem subiuerint, sic vt locus affectus pristinum calo-
rem amiserit: nec cutis aspero panno perfricata eum recuperat.

MATHET.

MATHESES, Restantne alia adhuc cutis vitia? GERON, Vtique, vt pustulæ: sed aliæ insigniores, aliæ leuiiores.

MATHESES, Quæ igitur sunt pustulæ? GERON, Aspredines quædam, modò totum corpus: modò partem obsidentes. ac
5 plura sunt earum genera. quædam similes his, quæ ex vrtica, vel sudore nascuntur: eæquæ nunc rubent, nunc colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures Varis similes oriuntur: nonnunquam maiores pustulæ liuidæ, aut pallidæ, aut nigræ, aut aliter naturalis colorè mutato: humórque his subest. vbi hæ ruptæ sunt, caro
10 infra quasi exulcerata apparet: id quod græcis *ἐλκῶδες* nominatur.

Ex his quædam græcis *ἐπινύκτις* vocatur: eò quòd noctu potissimum affligat. MATHESES, Quæ eius sunt indicia? GERON, EPINICTIS.
Vehemens inflammatio, & cum ad aperta est, exulceratio mucosa: color humori suo respondet, subruber, & quodammodo liuescens, ex eaque sanies leuiter cruenta emanat: carbunculo ferè similis, sed leuior, minórque, & nullius pestilentiaë particeps. faba maior non est, nec supra magnitudinem eius dolorem affert, idque in partibus eminentibus.

Huius generis sunt pustulæ, græcis *φλυκταῖναι*, aut *φλυκτιδές*
20 dictæ, quæ bullarum instar lucidæ: atque nō quæ a feruente aqua, vel ab igne sunt, similes apparent: non tamen cum manifesto dolore graues. his ruptis humor subflauus effluit, crustulisque obducuntur, donec sanescant. MATHESES, Vnde contrahuntur? GERON, Ex bile feruentissima, quæ igni viribus similis est: vnde
25 vulgò ignem syluestrem appellant. *Ignis syluestris.*

His respondet pustula nigra, quæ græcis *τερμινθ*, nobis terminthus dici potest, in extrema parte apparēs: quibusdam cutis
excrecentia vocatur rotunda, nigrouiridis terebinthum referens: quæ si scalpello aperitur, pus erumpit, ex feruido assatòque
30 sanguine contracta. *TERMIN-
THVS.*

Incidunt interdum aspredines quædam, pustulis ex vrtica vel sudore similes, græci *ἐξανθήματα* vocant. hæ vbi intūs quidem remorantur, nondum tamen foràs erumpunt, huiusmodi euadunt. Sub his totum corpus grauatur, & punctiones quasdam
35 sentit: dolorem vehementem in capite, aliquando in pectore, faucibus, & dorso. sputum crassum, ore sicco vix redditur: oculi tumidi cernuntur: nares pruriunt: vox rauca est: spiritus difficulter, & crebrò trahitur: facies ardescit, rubetque: inter hæc magna somni cupiditas est: febris, continua siue syncho ferè similis affligit. Quando hoc malum foris in cute prodit, omnia quæ
40 superius dixi, crescunt, præsertim capitis dolor: spirandi difficultas: pulsus etiam perinde vt antea, creber, velox, ac vehemens

remanente: quando ferè in facie materiæ intus hærentis fit eruptio, crebras maculas, crebrósque tumores habet; qui statim humore subeunte, vel in altû aguntur, vel latè expanduntur. atq; illa sublimia exanthemata: hæc lata vocantur: priora exulcerant, mouentque pruritus: lata non item. Hæc vitia vel corrupti excrementi deiectione, vel copiosis sudoribus finiuntur. **MATHE.**

*Omnes semel in
vita exanthema-
tis laborant.*

Qui hoc vitio plærunque infestari solent? **GERON.** Nemo inter omnes homines extat, qui non vel semel ante legitimam ætatem eò laboret. magis autem exanthematis pueri expositi sunt: seniores rarissimè, & non nisi cum summo vitæ periculo affliguntur. **10**

Prænotia.

MATHE. Quo anni tempore malum hoc grassari solet? **GERON.** Quouis, magis tamèn vere, & sub autumnii finem, præsertim in humidis corporibus. **MAT.** Quid de euentu exanthematum prænotoscere possumus? **GERON.** Quæ citò emergunt, tutiora sunt. nonnullis enim protinus erumpunt: nonnullis tertio, vel quarto die interdum quotidie, ab infirma valetudine, si in cute eminent, maturescunt: rubra magnâq; & non sibi mutuo contigua: adhuc quæ non vehementem febrem mouent, vbi hæc decesserit, finiuntur. Mala portendunt, quæ lentè prodeunt, magisque si violacei sint coloris: quia sub his frequens virium resolutio, quæ *συνωπνι* græcè dicitur, incidit. nihil quoque boni indicant, quæ vel liuidi coloris, vel viridis, aut atrii sunt: nec non quæ iteratis vicibus nunc emergunt, nunc rursus celantur. pestifera quoque sunt: quibus febris ingens accedit: & si magna spirandi difficultas, corporis inquietudo, multa sitis, & imbecillæ naturæ vires **50** vrgent, ægri magna ex parte intereunt, magisque si exanthemata fuerint latiora. quòd si ægri in syncopen incidunt, & vrina viridis, sub virium imbecillitate existat, mortis est indicium. vrina nigra post cruentam reddita, etiam perniciem testatur. si vox & respiratio benè habent, magna salutis spes est: si violatæ, dubia. Qui ab hoc malo vincitur, tanquam ex angina præfocatus, emoritur, aut certè, vbi natura ob intestinorum tormina, aluique profluvium labescit, exanimari solet. **MATHE.** Sempérne exanthemata periculum minantur? **GERON.** Minimè: sed etiam sæpè sine vilo vitæ discrimine, sinèque pestilentia nota, paulatim aëris vitio grassantur: plærunque hæc ipsa pestem malâsque febris sanguineæ crises comitantur. eminentia siue sublimia rarò aliquem, late multos è medio tollunt.

*HIDRO Apu-
stula sudatoria.*

Inueniuntur etiam paruulæ & aquosæ pustulæ in cute exstantes, quæ à sudando *ιδρωα* nuncupantur: emergunt subito in corpore vniuerso, hinc illic dispersæ: frequentius autem in manibus pedibûsque, milij magnitudine, aqua plenæ, ruboris, dolorisque

risque expertes. *MATHE TES*, Vnde nascuntur? *GERON*, Ex sudoribus sub cuticula retentis: qui per latentes cutis meatus minime dissipari possunt, papulæ sudorum quibusdam nominantur.

EPHELIDES.

Tales sunt etiam Vari, lenticulæ, & quæ græcis *ιφελιδες* dicuntur, pustulæ adeò leues, vt Celsus ineptias vocarit. Vari quidem, exigua sunt in facie tubercula vulgo nota. rarior species existit lenticula: rubicundior, & inæqualior. *Ephelides* nihil sunt aliud, quàm asperitates quædam, & durities mali coloris, alijs tamen aliquanto maiores, rubræ, ac feruidæ, leui cum dolore: ex quibus ruptis, albus humor lactis instar emanat, sequiturque scabies. Origo eius est, ex sanguine impuro feruentique, sub cutem effuso. *MATHE TES*, Quas partes singulæ ex his inficiunt? *GERON*, Cætera non nisi faciem: lenticulæ etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. Sunt adhuc alia, quæ vocantur *psyratium*, faui, & manantia capitis vlcera. *MATHE TES*, Quid est *psyratium*? *GERON*, Pustula durior, subalbida: acuta, ex qua ipsa, quod exprimitur, humidum est. Fauus tumor est, in cute foraminibus peruius: per quæ sanies mellis instar crassa excernitur: græcis *κηρην* inde vocatur.

Vari.
Lenticula.
Ephelis.

Origo eius.

Psyratium.

Fauus.

Simile vitium est, quod capitis cutem infestat, tenuissimis foraminibus glutinosam saniem emittens: latini manans vlcus: græci *αχνη* nominant. *MATHE TES*, Quæ hæc scabiei genera procreant? *GERON*, Pituita nitrosa, salisæque, aut melancholica sub cute computrescens: tamque maligna est, vt cum radicibus capillorum copiosior inherescat, cutisque capitis quàm aliarum partium densior sit, vix tota auferri possit. Pueris præcipuè ob humoris perniciem contagiosum est, & vlcus difficulter sanescit.

ACHOR.
manans vlcus.

Causa.

Extant etiam sæpè aliæ cutis eminentiæ exiguæ, doloris expertes, callosæ, rotundæ, angusta plurimum basi, vt suspensæ esse videantur. vnde quædam ex ipsis græcis *ακροχρόδων*, quasi verruca pensilis vocatur. hæc enim infra tenuior, ad cutem latior existit. Plures sæpè non vna tantum eodem tempore, præsertim in puerorum manibus & pedibus nascuntur, eæquæ nonnunquam subito desinunt: nonnunquam mediocrem inflammationem excitant: quædam in pus conuertuntur. Vt autem varia eius sunt vitia, ita & nomina diuersa ei imposita sunt, primæque eius species verruca dicitur, dura, aspera, modica, vt rarò fabæ magnitudinē excedat. altera *Thymion*, à thymi floris colore nominatur: quæ super corpus, quasi verrucula eminet, ad cutem tenuis, supra latior, subdura, & in summo peraspera. ea faciliè finditur, & cruentatur: aliàs aliquantum sanguinis funditur. modò vna, modò plures, vel in talis, vel in palmis, vel in inferioribus pedum partibus

Verruca pensilis.

Thymion.

Myrmecia.

nascuntur: pessimè tamen in obscenis: præsertim vbi sanguinem fundunt. Alia ex verrucis Myrmecia vocantur, humiliora Thy-
mio, durioraq; lupini magnitudinis, infra lata, supra tenuia, quæ
minùs sanguinis emittunt. Nascuntur hæc quoque aut in palmis,
aut in inferioribus pedum partibus: radices altius exigunt, maio-
rèmq; dolorem mouent. Nascitur etiam vitium nonnunquam,
quod græcis ἦλος, latinis Clauus vocatur, maximè in pedibus, id-
que ex contuso: quamuis interdum etiam alio modo, dolorèmq;
mouer: si non aliàs, tamen ingredienti. MATHETES, Quo-
modo finiuntur: GERON, Ακροχρόδαν, hoc est, verruca sessilis, & thy-
mion: sæpe etiam per se desinunt, & quò minora sunt, eò magis
myrmecia, & clauus sine curatione vix vnquam terminantur. Cal-
lus his quoque additur, summa cutis obdurata, clauo similis colo-
re, & materia, quæ ex labore in palmis, aut in partibus pedum in-
ferioribus succrescit, sine alta tamen radice, eoque prorsus dolo-
ris expers est.

*ECCHYMO-
ma.*

Est vitium etiam, quod græcis ἐκχυρῶμα, quasi sanguis per
cutim effusus dicitur: quod inde fieri solet, vbi caro à graui quo-
dam pondere, quod extrinsecus superinciderit, confusa, venisq;
exiguïs ibi diuisis sanguine perfunditur: qui ex illis, vel ob ipsius
copiam, vel ob tenuitatem, vel ob acrimoniam, vel ob saluæ eru-
ptionem, vel ob vasorum adapertionem subsiliendo perrupit, eò
peruenit: vnde tanquam tumor mollis, cedens, liuidus, & magna
ex parte doloris expers comitatur. frequentius autem venæ, vel
ex labore immodico, vel ex contusione ex ictu, seu casu rumpun-
tur. Species ecchymomatis sunt suggillata, & liuores ex ictu, qui
græcè ἱσχυρῶμα dicuntur. primum cutis liuescit, ac vitium
tunc græcè μελῶμα vocatur: inde etiam interdum nigrescit, ac gre-
cis tunc μέλασμα dicitur: nobis vtræque hæc vitia suggillata nun-
cupantur. Quinetiam cutis maculis punctorum, decoloratur, ac
vitium εἶγμα vocatur: atque sic etiam defædiatur flagris, ac græ-
cis μάλαρες, nobis fibices nuncupari possunt.

ABSCESSES.

MATHETES, Quid post tumores, tubercula, pustulas, & a-
lios affectus reliquum adhuc est: GERON, Cuiuscunque materiæ
in pus, aut in alterius rei speciem conuersio, quæ græcis ὑπόστημα,
latinis abscessus appellatur: in inflammatione quidem sanguis ex-
tra venas putrescit, idque adeò, vt si à natiuo calore vinci neque-
at, in gangranam sæpe degeneret. sin autem superet, concoctio-
ne in pus transeat: cuius collectio ferè abscessus est. MATHETES,
Quæ hunc fieri notant: GERON, Cum pars, in qua subsistit, ma-
gis humida, quàm antea, dura, rubicunda, feruida apparet, & do-
lor eam vehementior, pungensque, & lancinans excruciat: et si
vbi

*Abscessus inci-
pientia nota.*

vbi locus insignior fuerit, febricula, rigórque sine ordine, prefer-
tim noctu moleſtet. MATH. Quæ abſceſſum iam factum notant?
GERON, Quòd omnia miteſcant, tumorq; in acutum ſaſtigietur, *Abſceſſus facti.*
cutiſq; prurigo excitetur. MATHE. Fiuntne abſceſſus ſemper ex tu-
moribus calidis? GERON, Non ſolùm, ſed etiam ex frigidis, duris,
& inueteratis: quorum materia neq; inflammatur, neq; ſuppurat.
MATHE. Quid ex his educitur? GERON, Non pus, ſed aliena quæ-
dam materia, ex humore frigido concoctionis vi contracta. Nam
ſi hi vel ſcalpello, vel medicamentiſ aperiantur, maximè inuete-
rati: reperiuntur in ijs vel grumus, vel os, vel vnguis, vel pilus, vel
lapis, vel glans, vel lignum, vel carbo, vel lutum. hæc in carnoſa
parte ſuccreſcunt, ſed nulla veſicula obducta. Quinetiam alij quo-
que abſceſſus fiunt, quorum materies veſica & tunica includitur.
Atheromati nanque ſubeſt, quaſi tenuis pulcicula, meliceridi li- *Atheroma.*
quidior humor: ideòq; preſſus circūfluit ſteatomati pingue quid- *Steatoma.*
dam, quaſi ſeuum. MATH. Vbi hæc progignuntur? GERON, In ca-
pite potiſſimum: quia huius cutis denſa materiam diù retinet,
dum in alienam naturam degeneret. Omnia hæc ex paruulo inci-
piunt, & diù paulatimq; increſcunt, ac tunica ſua includuntur.
quædam etiam ex his dura ac renitentia, vt lapilli, aut concreti
connexiq; pili: quædam mollia, cedentiaq; ſunt, vt tenui pulcicu-
læ ſimilia: quædam ſpatio nudantur, vt quaſi raſa cartilago: quæ-
dam teſta capillo ſuo permanent.

Post abſceſſum purgatum, manet plæruncq; intus capacitas
quædam, quæ ſubiectis partibus non coaleſcit: greci κόλπος, latini *SINVS.*
ſinum nominant. MATHE T. Quomodo hic accidit? GERON Vbi
ſanguis in inflammatione, aut alia in abſceſſus materia putreſcens
contagione vicinam quoq; carnem, & nonnunquam neruorum,
venarumq; ſibras corrumpit, exeditq;. Si in ſuperiorē partem in-
clinat, facilè ſanies per os emanat: ſi in inferiorē, illa proximam
partem aliquam intus erodit, ſinúſq; relinquitur. Quòd ſi hic in
longum vergat, & pus vlteriùs emittat, ſinus arctior oblongiorq; *FISTULA.*
redditur: & deinde fiſtula nuncupatur, quæ callo obducta eſt, do-
loris ferè expers, in plurimis naſcens particulis: magna verò ex
parte ex abſceſſibus parùm dextrè curatis. Eſt autem hæc nunc
ſimplex, nunc varia, quaſi in ramos diſtincta: modò recta: modò
tortuoſa, flexuoſaq;. Callus verò, quo ſinus obducitur eſt, caro *CALLVS.*
continua, albida, humoris doloriſq; expers, ad quam neque vena,
neque neruus pertinet. Porro ſinus interim ſiccuſ: interim humi-
duſ eſt: aliàs humor ex eo continuè fluit: aliàs certis temporibus
remittit, dum os ipſius repletum eſt, iterq; inque adaperitur.

Super eſt, vt nunc de vñionis diuortio agamus, quæ greciſ *Vñionis diuor-
tium.*

*Vulnus.
Vlcus.*

*Punctura.
Contusio.
Fractura.
Ruptura.*

*Aliæ vulneris
species.*

*Partis affectæ
notitia.*

*VEN. & vulneris
signum.
Arterie,
Nervi.*

Tendinum.

Ligamentorum.

Ossis.

*Partes internæ
percussæ.*

*Membrarum
capitis.*

ῥαῖμα, latinis vulnus, *ἔλκε*, seu vlcus illis nominatur: vtriusq; parti-
bus tum simplicibus, tum compositis commune: cuius multæ
sunt differentiæ. Prima vulnus, altera vlcus dicitur. illa verò
propriè, cùm pars carnosa inciditur: si ab acuto telo pungatur,
punctura: si à re graui collidatur, contusio: si os diuidatur, fractu-
ra: si membranæ, nerui, venæq; diuellantur, ruptura: sicut antea
quoq; dictum est. Rursus alię multę vulneris species existunt. ali-
ud enim simplex est, aliud cauum. simplex rursus, aut in summo
est, cùm solam cutem occupat: aut altum, cùm in carnem, aliàsque
partes subiectas penetrat. item aliud longū, aliud breue: nec non
hoc altum, & illud latū: quoddam rectum, quoddam obliquum:
æquale, vel inæquale: vt cùm hîc summum, aut angustum: illic
altum, aut latum. Preterea aliud visui, & tactui expositum est: ali-
ud abditum & occultum. adhæc differunt inter se materia, quæ
ipsa excitarit: idq; non vna figura, sed vel acuta, vel obtusa, recta,
vel curua, angulosaq; sic vt vires eorum interdum simplici quali-
tate, aut venenata infectę sint. Quinetiam vulnera interdum non
antea simplicia manent, sed etiam vel intemperiem, vel dolorem,
vel inflammationem, vel pruritus coniunctum habent. *MATHE.*
Quibus notis coniectare licet, quæ corporis pars in quouis vul-
nere potissimum sit affecta. *GERON.* Si vena incisa est, sanguis lar-
giter effluit, & quò illa grandior fuerit, eò largius. sanguis autem
crassiusculus continuè, & æqualiter, nō subsiliendo ex illa eru-
pit. ex arteria tenuis, flauus, feruensq; cum pulsu quodam saltuq;
prorumpit. cùm neruus vel punctim, vel celsim vulneratus est,
motum, & interdum sensum amittit, aut minus acrem retinet,
partesq; vulnere subiectæ torpescunt, dolor multus excruciat: in-
flammatio exercet: in gangrænâ aliquando desinens: febris &
delirium sæpè ex cerebri consensu superuenit: nec non conuulsio,
præsertim cùm neruus punctus magis, & quodammodo sectus
quàm præcisus fuerit. Si tendines vulnerati sunt, aut membranæ
caluariam, aliæq; ossa ambientes, eadem signa apparent, magis ta-
men obscura: multò autem magis, si ligamenta articularum incisa
fuerint. Vbi os lęsum, nudatumq; est, scabrum & exasperatum
cum nullo dolore percipitur, specillo indito: nisi fortè illud mem-
branæ eius durius inducatur. *MATHE.* Quomodo nosci-
tur, pars quædam interior percussâ? *GERON.* In membrarum ca-
pitis vulneribus dolor grauissimus inest, qui, dum manditur, ma-
xillęq; abducuntur & spiritus agitur, augefcit: vomitio frequẽs
repetit: sanguis intrò effusus, vel per nares, vel etiam per aures,
vel per oculos exit: quod undam sensus obtunduntur, appellariq;
ignorant, & nerui distenduntur: febris & delirium non multò
pòst

- post accedit, præsertim vbi inflammatio adfuerit: ante mortem
 plærique, fascias quibus caput deligatum est lacerant, ac nudum
 vulnus frigori obijciunt. Si cerebrum ipsum leditur, quod facile
 fieri solet, cum in plenilunio totus caluariæ sinus repletur: agri
 mente labuntur, omniâq; symptomata grauiora experiuntur: læ-
 5 pè cerebri portio cum vitæ discrimine excidit. quod si cerebri si-
 nus oblesi penitus, aut oculi transfossi fuerint, mors subita, perin-
 de ac corde percusso, sequitur. illic enim facultas animalis: in hoc
 spiritus sanguisq; confertim effluit. Pulmone ictō, sanguis ex ore
 10 spumans: ex plaga rubens, simulq; etiam spiritus cum sonitu fer-
 tur: in vulnus inclinare iuuat: quidam sine ratione consurgunt:
 multi si in ipsum vulnus locati sunt, loquuntur, si in aliam partem
 obmutescunt, ac febris marcōq; egrum sensim conficit. Corde
 15 lēso, extremæ partes frigent, venę languescunt: color pallidissi-
 mus est: sudores frigidi, maliq; odoris oriuntur, ac matura mors
 comitatur, si vulnus sinum ipsius penetrauerit. Vbi arterię & ve-
 nę ampliores vulneratę fuerint, magna sequitur sanguinis pro-
 fusio, viriūmq; deiectio: sudores frigidi & fœtidi mortis indices
 erumpunt. Septo transuerso percusso, præcordia conuelluntur,
 20 summa adest spiritus difficultas, delirium, mentis alienatio, inter-
 ius tulsis: cruentum sputum: deniq; tabes, atq; interitus: præser-
 tim cum mediā eius pars, quæ neruosa est, & exanguis, continuē
 agitur. Vbi stomachus vulneratus est, singultus & bilis vom-
 itus insequitur: si quid cibi aut potionis assumptum est, citō red-
 25 tur: arteriarū motus elanguescunt: sudores tenues oriuntur, per
 quos extremę partes frigescent. Ieiuni intestini, & ventriculi vul-
 nerati communes notę sunt, quod cibis & potus per vulnus e-
 xeant, præcordia indurescant: nonnunq; bilis per os reddatur. Ce-
 30 tera intestina ista, vel stercus, vel odorem eius exhibent. in spinæ
 medulla discissa nerui resoluuntur, aut distenduntur. Iecoris vul-
 nus, multus sanguis sub dextra parte præcordiorum profusus in-
 dicat: item præcordia ad spinam reducta: nec non in ventrem cu-
 bandi dulcedo: deniq; punctiones, doloresque ad iugulum vsque
 & latus scapularum ei iunctum: os intentum, quibus etiam vom-
 35 itus biliosus nonnunquam accedit. Liene ictō contrā sanguis ni-
 ger è sinistra parte prodit: præcordia cum ventriculo ab eadem
 parte indurescunt: sitis ingens oritur: dolor ad iugulum pertin-
 git: in vtroq; viscere cruentę fiunt vomitiones, deiectionesq; late-
 rum punctiones, animi defectiones, febres, alui profluvia: vnde
 40 tandem corpus, alimento destituitur, contabescit, & consumitur,
 si vulnera fuerint altiora, sudore frigido, mors acceleratur. Reni-
 bus percussis, dolor ad inguina, testiculōsq; descendit: vrina diffi-

Cerebri.

Sinuum cerebri
lesorum indicia.

Pulmonis.

Cordis.

Arteriarum &
venarum an-
phorum.

Septi transuersi.

Stomachi.

Ieiuni intestini
& ventriculi.Intestinarum a-
liorum.
Spinę medulle.
Iecoris.

Lienis.

Renum.

Vesica.

culter redditur, eaq; vel cruenta est, vel cruor ipse fertur: interdū
vrina sub abdomine collecta, aquæ subter cutem speciem quan-
dam repræsentat. Vesica vulnerata, inguina dolent: quod super
pubem est, intenditur: pro vrina sanguis, aut ex ipso vulnere vri-
na descendit: stomachus afficitur. itaq; ægri, aut bilem vomunt, &
aut singultunt, delirantq; & refrigerantur, ac mors tandem se-
quitur. Cū vulua percussa est, dolor in inguinibus, coxis, & fæ-
moribus sentitur: sanguinis pars per vulnus, pars per naturale des-
cendit. vomitus bilis insequitur: quædam obmutescunt: quædam
mente labuntur: quædam sui compotes, nervorum oculorumq; 10
dolore vrgentur, ac eadem morientes patiuntur, quæ corde vul-
nerato. MATHE. Quæ continuationis solutio vlcus est? GERON,

VLCS.

Quæ internam, & ex corporis vitio habet originem: aut quæ pus,
seu putredinem contraxit. nam & inflammatio manifesta, & vul-
nus, quod negligentia sordidum ac putridum euasit, specie muta- 15
ta sic nominatur. Est itaq; impura vnionis diuisio: non ex sangui-
ne, vti vulnus, sed vel ex humoris vitio, vel ex sanie hinc genita,
vel ex pure, vel ex quauis alia corruptione: non à foris, sed ex
vulnere ipso procreata. MATHETES, Quæ eius causa existit?

Vlceris causa.

GERON, Interior, eaq; duplex, antecedens, & proxima. Illa quidem 20
corporis impuritas, & succi vitiositas, quæ vel ex malo victu, vel
ex praua viscerum affectione contracta est. proxima causa est vi-
tiosus humor, putridusq; in affecta parte consistens. Differt itaq;
vulnus ab vlcere. illud absq; causa solitarium existit: hoc semper

*Vulneris & vlc-
ris differentia.*

suam habet coniunctam, quæ quod peperit, etiam nō fouet. MAT. 25
Vnde sumuntur vlcere differentia? GERON, Præcipuè tum ex
his, quæ effluunt, tum ex causarum varietate. aliud sanè vlcus, si-
cut & vulnus, magnum, aut paruum: aliud aut summum, aut in al-
titudine: aliud rectum, vel obliquum: aliud æquale, vel inæquale.

*Vulnerum diffe-
rentia.*

Ab ijs autem quæ in vlcere succrescunt, species hæc sumuntur, vt 30
hoc vlcus sit saniosum, illud virulentum, aut sordidum, aut puru-
lentum, aut verminosum. MATHETES. Quæ sunt, & qualia, quæ ex vl-
ceribus defluunt. GERON, Sanguis, sanies, pus, sanguis nulli igno-
tus est. sanies hoc est tenuior, variè crassa, glutinosa, & colorata.

*Sanies.
Pus.*

pus crassissimum, albissimum, glutinosius, & sanguine, & sanie. 35
MATH. Vnde singula exeunt? GERON, Sanguis ex vulnere recenti,
aut iam sanescenti: sanies intra vtrunq; tempus: pus ex vlcere iam
ad sanitatem spectante. Rursus saniei & puris distinctæ quædam
species apud græcos habentur, vt Celsus docet. est enim quædam
sanies, quæ illis vel *χλωρ*, vel *μελαγχρία* nominatur. est etiam pus quod 40
ελεώδες, dicitur. MATHETES. Qualis est *χλωρ*? GERON, Tenuis, subalbi-
dus, ex malo vlcere exiens, præsertim vbi neruo læso inflamma-
tio

- tio secuta est. Meliceria crassior, glutinosior, subalbida, & mellī albo sublimilis fertur. atq; hæc quoq; ex malis vlceribus exit, vbi nerui circa articulos læsi sunt, & inter hæc loca, maximè ex genubus. Pus *ιλεώδες* tenue, subalbidum, quasi vinctum colore, atq; pinguedine, oleo albo non dissimile: idq; in magnis vlceribus sanefcentibus apparet. Sanguis nimium tenuis, aut crassus, colore vel *Sanguis optimus quis.* liuidus, vel niger, aut pituita mixtus, aut varius, malus est, calidus autem rubens, modicè crassus, non glutinosus, optimus est. *MAT.* Quid sperandū metuendūue est, vbi singula hæc excernuntur? *Prognostica.*
- 10 GERON, Vulneris magis expedita curatio est, ex quo sanguis bonus effluxit: item postea spes in his maior est, ex quibus melioris generis quæproueniunt. sanies igitur mala est multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum vlcus, & iunctam ei carnem erodit. melior non
- 15 multa, modicè crassa, subrubicunda, aut subalbida. *ιζωα* autem peior est, multus, crassus, subliuidus, aut subpallidus, glutinosus, atter calidus, mali odoris. tolerabilior est subalbidus, qui cetera omnia contraria prioribus habet. meliceria mala etiam multa & percrassa: melior, quæ & tenuior, & non nimis copiosa est. Pus inter
- 20 hæc optimum est. sed id quoq; peius est, multum, tenue, dilutum, magisq; si ab initio tale est: item colore sero simile, pallidum, liuidum, foeculentū, malicq; odoris, nisi locus hunc exciter: melius est, quò minus est, quò crassius, & quò albidius: adhæc si leue est, si nihil olet, si æquale est, modo tamen, & magnitudine vulneris, &
- 25 tempore conuenire debet. nam plus ex maiore, plus nondū solutis inflammationibus naturaliter fertur. *ιλεώδες* quoq; peius est, multum & parum pingue, quo minus etiam, quòq; id ipsum pinguius, eò melius. *MATHE.* Quæ alię vlceris differentię subsistunt? GERON, Aliud phlegmonodes, aut erysipelatodes, aut œdematodes,
- 30 aut carcinodes, quæ ex tumore quodam fiunt, adaperto: aliud exedens, malignum, & putridum, quæ ex humore, aut parte corrupta, sine tumore concitantur: aliud vicinas partes depascitur, unde græcè *νομήδες* appellatur: quia non solum affectam partem exuat, sed etiam vicinas integras absumit. Huius generis est, Phagedæna, quæ cutem solam, non carnem subiectam rodit, ac depascitur. *MATH.* Quæ omnium eiusmodi vlcerum causa est? GER, Humor biliosus, acris & rodens, modò crassus, modò tenuis vniuersę parti infusus. succedunt autē ea vlcera herpeti, & erysipelati: nonnunquam etiam vulneri, quod acriori medicamento fertur acceptum. Sub his continentur maligna, & curatu difficilia, quæ veteribus telephia nominantur, aut chironiæ: quæ ampla quidem sunt, sed non putrida, nec foetida: non etiam depascunt, neq; do-

Putridum vlcus.

lore cruciant, sed oris tumidis, & callosis prædita, eoque non facile
 sanescunt. Interdum tenui cicatrice obducuntur: mox autem dis-
 rupta renouantur, sicut cancer ferè exulceratus, nisi quòd in ambi-
 tu tumore careant. Huiusmodi vlcera generat etiam occulta que-
 dam malignitas, qualis ex pestilentia contrahi solet. *MATH.* Quid
 putridum vlcus existit? *GERON.* In quo non solum quod exit, sed
 etiam vlceris caro computrescit, mollisq; glutinosa, cadauerosaq;
 redditur, & odore foeda: id nisi prohibeatur, in sphacelum dege-
 nerat. *MATHE.* Vnde tale vlcus oritur? *GERON.* Interdum ex sola
 humoris pernicie, frequentius autem inde, quòd nativus partis
 calor, vel ab arteriarum obstructione, vel alia quavis ex causa sit
 extinctus, vt partis naturam & integritatem tueri nequeat. *MAT.*
 Vnde igitur cuiusq; vlceris species & materia nosci poterit? *GE-*
RON. Ex ipsorum natura, essentia, colore, duritie, tumore. Adhæc
 antecedens causa etiam explorari debet, vt intemperies naturæ
 contraria, inflammatio, omnisq; tumor: item varix, contusio, vel
 alia carnis corruptio: adhæc viscerum, præsertim iecoris, atq; lienis
 affectio: deniq; totius corporis habitus accuratè perquiri debet.
 Explicatis iam morbis, qui tum medicamentis, tum victus ratio-
 ne curantur. necessarium etiam videtur, vt tandem de his quoq;
 aliquid adijciam, quæ solum manus administrationem requirunt,
 sicut ea sunt, quæ ad ossa pertinent.

*FNIONIS
ossium solutio.*

MATH. Quænam existunt ossibus peculiaria? *GERON.* Cum
 & vnionis diuortium pati, & loco moueri soleant, vlceri finitima.
MATH. Quomodo soluuntur? *GERON.* Si frangantur, aut collidan-
 tur, aut perforentur, aut findantur: imò etiam si vitientur, quod
 accidit, si vel nigrescant, vel à ferro candente vrantur: si maligno
 vlcere, fistula, cancroq; inficiantur: vel si pinguis molliâq; vel e-
 tiam cariota fiant: ex quibus non solum colorem amittunt, sed e-
 tiam robur, & soliditatem: quæ in nudatis satis est manifesta: in
 contactis autem specillo tenui in vlcus immisso, vsq; dum ipsa at-
 tingat, vitium percipitur, vt cum os nimis molle aut asperum fue-
 rit. *MATH.* Quomodo ossa colliduntur, contundunturq;? *GERON.*
 Cum summa illorum pars ex ictu solum cum nulla diuisione exa-
 speratur: interdum, cum integra continuatione inflectuntur, vt
 costæ, & cartilagines: propriè verò cum ad interiora impelluntur,
 fiunt ea concaua, sicut etiam vasa plumbea, aut ænea cum illidun-
 tur. Hoc autem vitium ijs est peculiare, in quibus ossa etiamnum
 sunt tenella, vt in infantibus. nam in his caro summa contusa est,
 & os sub ea depressum & cauum tactu deprehenditur. *MATHE.* 4.
 Quando ossa forata cognoscuntur? *GERON.* Si cum tenui specillo
 demisso explorantur, solidiora vndiq; deprehenduntur. *MATHE.*

*Ossium collisio,
& contusio.**Ossa forata.*

Quo

Quo pacto ossa finduntur? GERON, Rectâ, ligni instar in longitudinem. MATHE. Qua ratione franguntur? GERON, Vel transuersim, vel obliquè. atque horum extrema nunc reclusa, nunc acuta sunt. atq; hæc sæpius carnem, aut neruum vulnerant. interdum etiam fragmenta tenuia ab his cum punctura & dolore recedunt.

Fractura sump.

5 MATHE. Quomodo ossa fissa aut fracta noscuntur? GERON, Si fragmenta illorum sedibus suis moueantur. alia nanq; super alia afficiuntur, eòq; asperitas inæqualitâsq; tangenti occurrit, partiscq; figura interim mutatur. cum autem fragmenta in sedibus suis persistunt, quod aliquando contingit, tunc vitium est obscurius. 10 quanquam inde coniecturari possit, si pars contactu doleat, siq; officio suo perfungi nequeat, totaq; intumescat, & plærunque caleat: nec non si euidentes ictus causæ antecesserint. Hæc quidem omnibus ossibus corporis communiter eueniunt. quæ verò singulis, nunc exequar. MATHE, Id facias obsecro: ne aliquid ex ossium affectibus desideretur.

Fissuram aut fracturam notio.

GERON, Caluariæ pertusæ notæ sunt, si sanguis per nares, auræ sue effluxerit, siue bilis vomitio, & vertigo insequitur, siq; neruorum vel resolutio, vel distentio succedit, & si homo conciderit, 20 sineq; sensu & voce quasi dormiens iacuerit. hæc non nisi osse fracto eueniunt: quanquam ea etiam interdum caluaria nondum fracta, sed cerebro duntaxat vehementius concussio, contingant. Certius fracture signum est, si specillo in plagam demisso, os asperum extra suturas occurrat. sin autem nihil, nisi leuum & lubricum 25 cum obueniât, integrum id videri potest. Quod si ea symptomata non statim ab ictu, sed longè post tempore superuenerint, ex inflammatione, vel ex humorum influxu originem trahunt.

Caluariæ pertusæ indicia.

In naribus tum os, tum cartilago frangi solet, & quidem aliâs aduersa, aliâs à latere. si aduersa fracta sunt, aut alterum ex his,

NARIS fracturam notæ.

30 nares desidunt: spiritus difficulter trahitur. si à latere os fractum est, is locus cauus est. si cartilago, in alteram partem nares declinantur. si maxilla fracta est, communia omnium ossium signa apparent. omne igitur os rectum ligni instar in longitudinem finditur: modò frangitur in transuersum: interdū in obliquum. atq; id

Cartilaginis Maxille.

35 ipsum reclusa habet capiat, nōnunquam acuta. MAT. Quod genus ex his est pessimum? GERON, Acutum: quia neq; facile committuntur, quæ nulli retuso innituntur, & carnem vulnerant. Insuper aliquando plura fragmenta à fragmento sunt: sed in alijs quidem ossibus, ex toto sæpè fragmentum à fragmento secedit. maxillæ 40 verò semper aliqua parte etiam vexata ossa inter se coherent. Iugulum, si transuersim fractum est, nonnunquam per se rursus rectè coit, & nisi moueatur, sanari sine iunctura potest: nōnunquam

Iugul.

Costa.

verò, præsertim vbi motus est, elabitur, ferèq; id quod à pectore, sub illud, quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur: quia per se nō mouetur, sed cum humeri motu consentit. Itaq; eo subsistente, humerus sub id agitur. Rarò verò admodum in priorem partem iugulū tendit. verum vt dissimilis yterq; casus est, sic dissimilia requirit. Costa si tota fracta est, præter communes has peculiare notas habet: sanguinis sputum, febriculam, dolorem grauissimum, suppurationem, spirandi difficultatem, vitæ periculum, si fracta tota non est, signa enumerata nō apparent. Contusa autem, & depressa, eadem quoq; , sed leuiora habet symptomata. Si id quod ex vertebra excidit, aliquo modo fractum est, locus quidem sit concavus, punctiones autem in eo sentiuntur: quia ea fragmenta spinosa esse oportet: quo fit vt homo in superiorem partem subinde nitatur. Humeris, brachijs, scemoribus, cruribus, digitis fractis, communia sunt indicia. nam ea media minimè periculose franguntur. quò propior fractura capiti vel superiori, vel inferiori, eò peior est. nam & maiores dolores adfert, & difficilius curatur. maximè tolerabilis est, simplex, transuersa; peior vbi fragmenta, atq; vbi obliqua: pessima vbi eadem acuta. Interdū fracta in his ossa, in sedibus suis remanent: multò sepius excidunt, aliudq; super aliud effertur. Si sedibus suis mota, resima punctio- nisq; sensum representant, tactu inæqualia sunt. si verò non aduersa, sed obliqua iunguntur, quod fit vbi loco suo non sunt, membrum in altero latere breuius est, & muscoli eius tument. ac de fractis ossibus quidem hætenus: nunc de ijs agam, quæ sedibus suis mouentur. MATHESES, Quot id fit modis?

*DE LUXA-
tis ossibus.*

GERON, Duobus. nam modò quæ iuncta sunt inter se, dehiscunt, vt cū larum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito, & in crure tibia à fura: interdum saltu calcis os à talo, quod tamen rarò accidit. modò articuli sedibus suis excidunt: quod vitium greci ἐξάρθρωμα: alterum παράρθρωμα vocant. illabitur autem os aut in partem priorem, aut in posteriorem: aut exteriori, aut interiori. MATH. Quibus ex causis? GERON, Ab externis, vt ab ictu, casu, aut alijs, quæ illud aut violenter propria sede mouent: aut vincula disrumpunt, laxantq;: idq; magis in pueris, & imbecillis, quàm in robustis. Interim ab internis causis, quæ ligamenta & articulos soluunt, infirmantq;: vt humor pituitosus, mucosus, ac lubricus. MATHE. Quod luxationis est indicium? GERON, Qua parte os excidit, articulus extuberat: aduersa, è qua recessit, sinum habet: figura membri peruertitur: recta non manet: articulus difficultè in eam partem flectitur, in quam os excessit: in aduersam, perfacilis. MATHE. Videntur ista luxatis omnibus

*Luxationum cau-
se.**Luxationis indi-
cium est.*

bus esse communia, quæ singulis artubus eueniunt. GERON, Ma-
xilla in partem priorem, & in alterutrū latus propellitur, sed mo-
dò altera parte, modò vtraq; : si altera, in contrariam partem ipsa
mentumq; inclinatur: dentes paribus non respondent, sed sub his
qui secant, canini sunt. at si vtraque totum mentū in anteriorem
partem promouetur, inferioresq; dentes longius, quàm superio-
res excedunt, intencq; super, musculi apparent. cum verò in latus,
mentum in contrariam partem mouetur, nec dentes inferiores
partibus respondent. Quod si vertebræ cervicis in posteriora
procidant, difficulter tum spiritus trahitur, tum cibus assumitur,
& locus inest sinuosus: si in exteriora, mentum præter hæc pecto-
ri committitur, & tumor in ceruice eminet.

*Maxille luxa-
tio.*

*Celsus ex Hippo-
crates.*

Maxilla mobilis.

MATHE T. Quomodo caput luxatur? GERON, Duobus pro-
cessibus, in duos sinus summe vertebræ demissus super ceruicem
continetur. hi processus interdum in posteriorem partem exci-
dunt: quò fit, vt nervus sub occipitio extendatur, eòq; mentum
pectori agglutinetur, neq; bibere is, neq; loqui possit: interdum
sine voluntate semen emittit, quibus celerrimè mors superuenit.

Capitis luxatio.

*Vertebrae luxa-
tio.*

MATHE T. Quomodo vertebræ in spina excidunt? GERON, Mo-
dò in posteriorem & priorem partem, supràq; septum transversum,
& infra. si in vtranq; partem exciderint, à posteriore parte vel tu-
mor, vel sinus oritur: si super septum id incidit, manus resoluun-
tur: vomitus, aut distentio nervorum insequitur: spiritus difficul-
ter mouetur: dolor vrget, & aures obtusæ sunt. si sub septo crura
resoluuntur, aut aluus, aut vrina supprimitur: interdum etiam si-
ne voluntate prorumpit. Ex huiusmodi casibus, vt tardius quàm
ex capitis, sic tamen intra triduum homo moritur. Nonnunquam
enim nervorum imbecillitas efficit, vt quanuis non exciderit ver-
tebra, parum tamen in priorem partem promineat: id non iugu-
lat, sed ab interiore parte non contingit quidem posse. ab exte-
riore, si propulsum est, plærunque iterum redit, nisi (quod admo-
dum rarum est) vis nervis restituta fuerit.

MATHE T. In quam partem humerus excidit? GERON, Mo-
dò in alam, modò in partem priorem: si in alam delapsus est, & vi-
ctus cubitus recedit à latere, rursus iuxta eiusdem partis aurem
cum humero porrigi non potest, longiusq; altero id brachium
est. Si in priorem partem, summum quidem brachium extendi-
tur, minus tamen quàm naturaliter, difficiliusq; in priorem quàm
in posteriorem partem cubitus porrigitur.

Hamuli luxatio.

MATH. Quid de cubitu dicis? GERON, Si ab humero, cui anne-
xus est, excidit radius, qui adiunctus est, interdum trahitur, inter-
dum subsistit. in omnes autem quatuor partes excidere potest:

Cubitus luxatio.

sed si in priorem prolapsus est, extensum brachium est, neque recur-
uatur: si in posteriorem, brachium curuum est, neque extenditur,
breuiusque altero existit: interdum febrim vomitumque bilis mo-
uet: si in exteriorem, brachium totum intro spectat, estque altero bre-
uius, si in interiorem, brachium totum extra porrigitur, estque alte-
ro longius. rarius autem vel in priora, vel in posteriora luxatur.

Manus luxatio.

MATHE T. In quot partes manus prolabitur? GERON, In om-
nes quatuor: si in posteriorem excidit, porrigi digiti non possunt:
si in priorem, non inclinatur: si in alterum latus, manus in con-
trarium, id est, aut ad pollicem, aut ad minimum digitum con-
uertitur: reponi non difficillime potest.

*Palmæ ossa luxa-
ta.*

MATHE T. Possuntne palmæ ossa, interdum etiam sedibus su-
is promoueri? GERON, Proculdubio: nunc in priorem partem:
nunc in posteriorem. In latus enim moueri paribus ossibus op-
positis, non possunt. At tumor in ea parte apparet, in quam os
venit. sinus autem in ea, à qua recessit.

Digiti luxati.

MATHE T. In quas partes digiti tum manus tum pedum ex-
cidunt? GERON, In omnes: communisque notas habent, quia neque
naturalem figuram retinent, neque in eam partem, in quam pro-
labuntur, flexi possunt.

*Femoris luxa-
tio.*

MATHE T. In quot partes femur promouetur? GERON, In
omnes quatuor. sepius in interiorem: deinde in exteriorem:
raro admodum in priorem, aut posteriorem. si in interiorem par-
tem prolapsus est, crus longius altero, & vastius est: nam pes ul-
timus extra spectatur. si in exteriorem, breuius rarumque fit, & in-
tus inclinatur. Calx ingressu terram non contingit, sed planta ima,
meliusque id crus superius corpus, quam in priore casu fert, mi-
nusque baculo indiget. si in priorem crus extensum est, implicarique
non potest, alteri cruri ad calcem par est, sed ima planta minus in
priorem partem inclinatur: dolorque in hoc casu præcipuus est, &
maxime vrina supprimitur. Vbi cum dolore inflammatio quieuit,
commodè ingrediuntur ægri, totusque eorum pes est. Quinetiam
si crus in posteriorem partem extendi non potest, breuiusque est, v-
bi constitit, calx quoque terram non contingit. Magnum autem
femori periculum est, ne vel difficulter reponatur, vel repositum
rursus excidat. Hæc sunt omnia quæ ad medicinæ cognitionem
necessaria esse putavi, eoque illa equi bonique consulas, dum ad eius
faciundæ, exercendæque rationem, explicandam me præpara-
uero. Quauis autem omnia superius comprehensa, breui com-
pendio sim persecutus: nihil tamen spero præteritum ne-
glectumque esse, quod ad adolescentem de re
medica informandum requiratur.

INDEX EORVM QVÆ IN hoc Commentario continentur.

Numerus prior paginam, posterior
lineam significat.

A

Abdomen	140. 29	Aetatum dissimilitudo	276. 17
Abortus, eiusque causæ	765. 32	Affectuum corporis notitia & causa	13. 24
Abortus futuri nota	766. 27	Affectuum cerebri appellatio	602. 21
Abortus ex sanguine bilioso	162. 9	Affusio qua in parte veri sua sit	162. 35
Abcessus	796. 33	Agglutinatio	280. 26
Abcessus oculorum	618. 8	Albugo	613. 16
Abcessus in qua parte, & in quibus orianitur	563. 35. 564. 6	Alimentum quid	44. 20
Abcessus futuri nota	562. 25	Alimentum calidum quem gignat humorem	311. 33
Abcessuum dissimilitudo	564. 15	Alimentum cuiusque partis	215. 24
Accretio quid	237. 20	Alimenti in sanguinem conuersio,	325. 30
Acetabulum	128. 28	Alimenti distributio in partes sin- gulas	324. 36
Achor	795. 20	Aluus	39. 15
Actio simplicium compositarumque partium quibus absoluitur	6. 5	Alteratio siue immutatio quomo- do fiat	25. 5. 39. 15
Actionis læsio vnde	412. 20	Alutrix saculas	236. 30
Actiones naturales	32. 26	Aluus astricta	479. 25
Actiones naturales cerebri	76. 8	Aluus astricta quid indicet	467. 23
Actiones corporis an eiusdem na- turæ	290. 18	Alui tarda deiectio	706. 29
Actiones singularum partium	5. 10	Alui profluuium in febris quando et vnde	571. 5
Actiones quomodo perficiantur	351. 20	Amentia	584. 8
Actionum genera	5. 41	Analeptica ratio	26. 5
Actionum singularum læsiones	441. 5	Anatome quatenus perscrutanda	261. 40
Actu & potestate esse quæ dican- tur	53. 25	Anatome vna	260. 26
Adeps vnde gignatur	57. 2	Anatome cognitio necessaria	262. 30
Adnata quid notent	449. 32		265. 5
Ær sanitatem conseruans cur mor- borum auctor	427. 40	Aneurisma	790. 16
Ær quomodo corrumpatur, & vn- de	539. 33. 540. 11	Angina, eiusque species	634. 1
Ær pestilens quid	542. 10	Anima quid	283. 3
Ær infectus quomodo pestilentia gignat	551. 20	Anima cur è corpore migret.	303. 14
Æris elaboratio, distributioque	363. 15	Anima seu mens.	294. 2
Æris essentia quot modis corrup- tatur	428. 12	Anima sentiens	291. 35
Æris corrupti indicia	557. 3	Animæ essentia	284. 17
Aetatum numerus, differentia, & temperamenta	59. 27	Animæ appetitiones	303. 24
		Animæ facultates cur separatae	301. 20
		Animæ functiones principes	76. 6
		Animæ genera & species	283. 10

INDEX.

Animæ naturalis opera	285. 18	Arteria aspera	235. 9
Animæ partes, earumq; facultates,		Arteria aspera cur exanguis	183. 37
285. 1		Arteria coronalis	181. 25. 252. 15.
Animæ sentientis domicilium	298. 15	Arteria venosa quando dicatur,	
Animæ sentientis sedes	350. 40	179. 15	
Animæ sentientis instrumentum,		Arteria ad brachium	252. 42
350. 40		Arteria ἀορτῆς, eiusq; radix	179. 110
Animæ sentientis actiones	352. 28	181. 10	
Animæ vires animantibus propriæ		Arteriæ ἀορτῆς diuissio	181. 30
291. 32		Arteriæ ἀορτῆς partitio	252. 12
Animal quomodo emoriatur	269. 20	Arteriæ aortæ diuissio	181. 30
Animalia obæsa quæ	69. 30	Arteriæ ἀορτῆς truncus maior	256. 12
Animales functiones	350. 40	Arteriæ aortæ ad crura propaga-	
Animus vnde	342. 2	tio	257. 35
Animus sine spiritus natura con-		Arteriæ asperæ tunica	184. 29
stare nequit	43. 20	Arteriæ asperæ circuli	183. 4.
Animi affectus	432. 25	Arteriæ asperæ situs	364. 3
Animi deliquium quomodo mor-		Arteriæ lævis situs	364. 3
tem adferat	272. 15	Arteriæ alaris distributio	252. 25
Animi defectio quid	668. 2	253. 28	
Animi defectiois causa	568. 31	Arteriæ motus quando suppri-	
Ant musculi	232. 28	matur	375. 36
Ani vitia	710. 21	Arteriæ vulneratæ nota	798. 24
Ani abscessus	712. 18	Arteriæ cerebri & cerebelli	254. 10
Ani condyloma	712. 35	256. 2	
Antifissura	712. 27	Arteriæ dentium radices ingredi-	
Antifistula	712. 12	entes	253. 23
Ani inflammatio	711. 40	Arteriæ colli	253. 40
Ani inflammati notæ	712. 2	Arteriæ carotidis distributio	253. 11
Ani prolapsus	712. 40	Arteriæ duæ sub pectore	253. 35
Appetitionis functiones	354. 5	Arteriæ vmbilicales quid præsent-	
Appetitiones animæ	303. 24	170. 20	
Appetitionum differentie	296. 12	Arteriæ vmbilicales	256. 35. 257. 27
Appetitus sedes	298. 4	Arteriæ seminales	160. 32. 161. 2. 256. 30
Appetitus sentiens	296. 22	Arteriæ emulgentes	256. 28
Appetentia duplex	306. 10	Arteriæ hæmorrhoidicæ	256. 41. 257. 2
Appetentia canina	676. 41	Arteriæ hæmorrhoides	257. 22
Appetendi facultas	295. 41	Arteriæ vnde alantur	315. 40
Appositio	289. 26	Arteriæ cur vesicam ingreditur,	
Apoplexia	597. 3	159. 22	
Apoplexia ab epilepsia quomodo		Arteriarum cum nervis societas	
differrat	598. 23	394. 35	
Apoplexia quibus respondeat mor-		Arteriarum in mesenterio officium	
bis	598. 23	151. 35	
Apoplexiæ obnoxij	598. 2	Arteriarum eleuatio & summissio	
Aphthæ	628. 29	vnde, & quis eorum vsus	361. 24
Aque inter cutem nota	478. 28	Arteriarum solutio quomodo indi-	
Arquatus niger	727. 21	cetur	472. 20
Arquatus quando generetur	725. 28	Arthritis quid	777. 28
		Asimi-	

INDEX.

Ars presagiendi	21. 25	Bilis atra quid	321. 16
Artis munus	357. 7	Bilis atra quocumplex	321. 28
Assimilatio	289. 14. 309. 26	Bilis atræ differentiæ	333. 35
Aspera arteria	183. 4	Bilis atræ redundantis indicium	436. 1
Aspera arteria eiusque cartilagines	135. 6	Bilis atræ morbus futurus	477. 10
Asperæ arteriæ vlcus	655. 34	Bilis atræ excretio	335. 25
Asteria	641. 5	Bilis flaua	309. 33. 317. 34
Astrictio quomodo fiat	416. 41	Bilis flaua superuacanea	321. 3
Atheroma	797. 14	Bilis flaua exuperans quomodo euacuanda	25. 25
Atrophia	572. 8	Bilis flauæ materia	83. 35
Atrophia quid proprie	654. 29	Bilis flauæ abundantis notæ	485. 2
Atrophia eiusque causa	450. 28	Bilis atræ & flauæ origo	309. 31
Atrophia & malus habitus quid differant	573. 4	Bilis vtriusque excretio quid notet	464. 32
Attraxatrix facultas	28. 22	Bilis pallida	321. 10
Auditus vitiosus	623. 8	Bilis lutea deiectionem irritans	321. 5
Auditus instrumentum	292. 36	Bilis porraceæ origo	83. 34
Auditus instrumenta	190. 20	Bilis lingulæ vires & sedes	312. 38
Aures	199. 24	Bile atra exuperante quid agendum	25. 26
Aures earumque musculi	199. 24. 219. 26	Brachium eiusque ossa	121. 25
Auris arteriæ	254. 35	Brachiale	123. 27
Auris foramen & ossicula	94. 2	Brachiale eiusque partes	123. 27
Aurium cartilagines	134. 10	Bubo	783. 40
Aurium dolor	620. 2		
Aurium sonitus	621. 23. 622. 14		
Auulsio quæ dicatur	420. 15		
B		C	
Bilis natura qualis	17. 5	Chylia quid	654. 32
Bilis quomodo ad ventriculum confluat	82. 31	Chylia eiusque notæ & origo	572. 18
Bilis retenta quid denunciet	467. 5	Cacochymia	490. 37
Bilis alimentaria	320. 40	Cæcitas nocturna	611. 29
Bilis origo	331. 20	Calculus vesicæ	738. 16
Bilis causæ	312. 20	Calculi nota	450. 35
Bilis vesicula vnde nutriatur	310. 5	Calculi indicia	479. 14
Bilis meatus ex iecore qualis	82. 36	Calculi nascentis notæ	733. 36
Bilis ad intestina deiectio	310. 8	Calculi vesicæ nota	473. 15
Bilis in ventriculo & iecore oritur dignotio	84. 2	Calculi renum & vesicæ quomodo differant	739. 25
Bilis differentia	330. 40	Caligo	613. 11
Bilis species	331. 16	Caligatio	611. 40
Bilis atra	309. 33	Callus	796. 13. 797. 37
Bilis atra cur per corpus totum dispergatur	335. 1	Calor ætate	275. 2
Bilis atræ origo & sedes	334. 25	Calor in ætate quomodo dijudicandus	621. 15
Bilis atræ collectio	731. 9	Calor an semper sibi respondeat	274. 25

INDEX.

Calor non semper sui similis	266.	Cancer	789. 5
20		Cancer vuluæ	754. 10
Calor in parte aliqua quid signet		Cancro nota	458. 3
468. 8		Canum sectio	260. 31
Calor natiuus vnde & quid	265. 7	Capitis incidendi ratio	190. 3
Calor natiuus veteribus quid		Capitis ossa	92. 27
278. 35		Capitis figura concinna	75. 17.
Calor natiuus an temperatus	276. 29	101. 13	
Calor natiuus frigidi particeps		Capitis ossium foramina	103. 13.
265. 40		105. 10	
Calor natiuus vbi cōtineatur	270. 20	Capitis motus	213. 14.
Calor natiuus hyeme cur abundet		Capitis excrementa quomodo de-	
277. 15. 278. 15.		stillent	602. 15
Calor natiuus quomodo conseruetur		Capitis dolor futurus quomodo	
extinguaturue	360. 6.	prædicetur	477. 6
Calor natiuus quomodo extinguitur	277. 8	Capitis habitum quæ indicent	75. 6
Calor natiuus quomodo euincatur		Capitis luxatio	805. 13
268. 15		Carbunculus	786. 2
Calor natiuus quomodo suffocetur		Carbunculus vnde erumpat	554. 35
435. 5		Carbunculus qua parte oriatur	
Calor natiuus in vrina quid agat		554. 35	
510. 9		καρδιακός à καρδιά quid differat	
Calor insitus quid	274. 22	674. 25	
Calor insitus quomodo refrigeretur	266. 30	καρδιακός quid	674. 17
Calor naturalis quis	515. 20	Caro iulsi reiecta quid signet	
Calor vitalis vnde deriuetur	273. 32	655. 27	
Calor proprius & ascitiuus diiudicandus	68. 36	Carnis temperamentum quale	56. 7
Calor febris vnde incendatur	516. 5	Carnis species	57. 12
Calor naturalis contrarius quid agat		Cartilago quid	133. 37
quæque eius sint species	515. 26	Cartilago mucronata	118. 38. 119. 15
Caloris pro temporum regionumque		171. 40	
varietate mutatio	277. 15	Cartilago mucronata quid præstet	
Caloris innati essentia	273. 18	228. 40	
Caloris mutatio in qua parte	315. 35	Cartilago mucronata septum tuer-	
Caloris & humoris innati societas		tur	175. 30
276. 32		Cartilaginis vsus & differentie	134. 1
Caloris insiti actiones & necessitas		Cartilaginis fractæ nota	803. 31
266. 5		Cartilagines in ossibus	134. 38
Caloris naturalis munera quæ		Cartilagines asperæ arteriæ	135. 6
60. 15		Cartilagines qua vi obeant functio-	
Caloris natiui essentia vnde	274. 20	nes	291. 25
Caluarie ossa quot & quæ	92. 30	Carus quid propriè	403. 25
Caluarie administratio	190. 12	Carus eiusque notæ & differentia	
Caluarie pertusæ nota	803. 17	585. 25	
Caluities quid notet	67. 41. 74. 2	Castatio quid præstet	339. 5
Calx qualis existat	132. 20	Cataleptis siue catocoe	586. 21
		Cararrhus quid	602. 26
		Causa morbi difficulter cognoscitur	24. 18
			Causa

INDEX.

Causæ morborum	424. 18	Chyli distributio	308. 32
Causæ morborum interiores	434. 30	Chyli excrementa	309. 27
Causæ morborum humores	24. 10	Chylosis	216. 20
Causæ abditæ & evidentes quæ	32. 20	Cibus potusque quomodo morbos	428. 26
Causæ morborum non necessariæ	433. 32	Cibi fastidium	679. 11
Causæ morborum quomodo inue-		Clauus	796. 7
stigandæ	420. 25	Clauicula oculorum	613. 38
Causarum genera & species	424. 18. 427. 24	Coccyx eiusque particulæ	114. 5
Causarum morborum usus	426. 30	Cœliacus	692. 21
Causarum euidentiũ vires	436. 15	Coles eiusque musculi	231. 32
Cephalæa	579. 34	Coles eiusque origo & essentia	163. 5
Cerebrum	190. 18	Colis vitia	748. 1
Cerebrum omnium neruorum		Coles cur ligamenti & arterijs do-	163. 15
principiũ	5. 30	natus	
Cerebrum interiorum motionum		Colis musculi eorũque officium	163. 23. 231. 32
instrumentum	351. 15	Colis arteriæ	257. 9
Cerebri sinus	191. 21	Colis integumentum	163. 38
Cerebri ventriculi	192. 15	Colis exulceratio	743. 3
Cerebri membranæ	191. 1	Colis vicerati nota	751. 14
Cerebri infundibulum	193. 40	Colicus dolor	703. 12
Cerebri gemelli	193. 25	Colici doloris genera duo	703. 25
Cerebri eiusque neruorum tempe-		Colici doloris causæ	704. 29
ramentum	57. 18	Color quos morbos indicet	470. 5
Cerebri robur quæ indicent	23. 5	Columellæ & vuar differetia	633. 30
Cerebri excellentia & natura	190. 20	Columella siue vuar, eiusque usus	158. 12
Cerebri naturam quæ notent	76. 4	Κώμα ἀγρυπνον	586. 22
Cerebri interna structura qualis	192. 10	Κώμα siue κατὰ Φορὰ	587. 24
Cerebri motus	192. 5	Comitialis morbus	594. 32
Cerebri motus assiduus	299. 4	Compositio deprauata qualis exi-	472. 32
Cerebri recrementa quæ, & vbi	601. 35. 602. 2	stat	193. 36.
Cerebri recrementorũ morbi	601. 29	Conceptio quid propriè	345. 10
Cerebri genera quinque	75. 2	Conceptio quando fiat	167. 12
Cerebri structura quibus indicetur	75. 22	Conceptio quãdo fieri solet	344. 12
Cerebri læsi signum	799. 3	Corporum status tres	9. 36
Cerebelli boni habitus indicia	75. 25	Κορῶνον processus	220. 1
Chiragra	778. 17	Costæ quomodo insinuantur	117. 12
Cholera cur dicta	691. 3	Costæ fractæ notæ	804. 6
Chylus quid	305. 30	Costarum numerus, figura, usus, &	116. 1
Chylus humorum origo	312. 25	sinus	
Chylus expurgatus quò feratur	313. 17	Costarum intervalla	173. 40
Chylus à chymo quid differat	320. 23	Coxa	127. 22. 128. 24
		Coxæ dolores	778. 24
		Coxarum processus & sinus	129. 8
		Crisis futuræ indicia	560. 40.
			566. 13.

INDEX.

Crisis quo pacto fiat	561. 40	Delirium & phrenitis quomodo differant	581. 20
Crisis perfecta quæ	565. 1	Delirium eiusque species	483. 4
Crisis quibus euacuationibus perficiatur	561. 40. 564. 39	Delirij febricitantium causa	569. 28
Cruditatis signa	448. 28	Dentes quot & vnde	98. 31. 99. 5
Cruditatis ventriculi	687. 1	Dentes quousq; crescant	98. 32
Cruditatis ventriculi vnde	82. 26	Dentium alueoli	98. 23
Cruditatis causa	559. 35	Dentium dolor	629. 31
Cruditatis notæ	478. 21	Derivatio quibus conveniat	19. 15
Cruditatis nomine quid intelligendum	13. 40	Destillationes, earumque appellationes & causæ	602. 21
Crus quot ossibus constet	131. 6	Destillationum præsagia	604. 39
Cubitus	121. 25	Destillationum singularum dignotio	604. 22.
Cubitus eiusq; laxatio	805. 40	Diarrhœa in hæcticam pestilentem transitus	559. 10
Cupiditatis partes	304. 2	Διαβήτης	737. 14
Cupiditatis actio eiusque partes	354. 10	Diaphragmatis situs, figura & usus	174. 39
Curatio ex quibus fieri oporteat	10. 24	Diarrhœa eiusdemque causæ	698. 27. 700. 6
Curationis indicatio vnde petenda	12. 2	Dies contemplatorij siue indices	567. 7
Curationis ratio in singulis partibus servanda	13. 5	Dies decretorij optimi	566. 36
Cutis hirsuta & nuda pilis vnde	70. 37	Dierum decretorum ratio	566. 18
Cutis violatis nervis cur non sentiat	207. 27	Digitus cur inæquales inter se	126. 28
Cutis temperamentum nota	56. 3.	Digitorum ossa eorumque ordo	126. 10
Cutis differentia	140. 10	Digitorum luxatio	806. 17
Cutis incisio quomodo ordiendâ	141. 10	Discernendi facultas	294. 10
Cuti subiecta quæ	140. 2. 6.	Dissentio	592. 2. 593. 34.
Cuticula ἐπιδερμὶς dicta	140. 22	Distributio quomodo fiat	308. 5
Cuticula qualis	258. 5	Dysuria	743. 38
D		Diuortium partis quid dicatur	410. 3
Decubitus ægri quid	15. 8	Dolor ex quibus fiat	39. 30.
Defluxionis frigidæ indicium	469. 35	Dolor quomodo partem affectam indicet	452. 12
Defluxionis humorum indicia	643. 10	Dolor capitis pulsatorius vnde	579. 20
Defluxiones earumq; causæ & materia	603. 13	Dolor capitis vnde in febrî	569. 7
Defluxionum causæ, materia, & decubitus	438. 41	Dolor capitis quomodo contrahatur	578. 30
Defluxionibus obnoxij	603. 35	Dolor lateris pro inflammatione variat	15. 15
Delirium quid, quæq; eius notæ	580. 27	Doloris nota	455. 3
		Dolor	

INDEX.

Dolores capitis quæ præſagiant	Epinyctis	793. 11	
530. 2	Epiphora	614. 34	
Dolores capitis quid notent	Erysipelas	784. 3	
458. 20	Erysipelas quid	415. 3	
Dolores capitis quomodo diffi-	Erysipelatis nota	458. 2	
rant	579. 23	Essentia totius partis quid	415. 23
Dolores reſoluentes vires	493. 25	Essentia ſolida carnoſaque quid	272
Dolorum capitis notæ.	578. 33.	36	
579. 13	Essentia carnoſa quomodo immi-	nuatur	273. 22
Dolorum capitis diſcretio	84. 11	Essentiæ qualitatium expertes	44.
Dulcedo vnde	322. 37	26.	
Dysenteria	693. 40	Euacuatio ubi fieri conueniat	18. 35
Dysenteria hepatica	715. 13	Euacuatio quomodo fieri debeat	25. 15
Dysenterix cauſæ & præſagia	696. 5	Excreatio cruenta	651. 12, 653. 49
Dysenterix differentiæ	694. 4	Excretionis impedimenta	440. 5
Dysenterix & tenefimi differentiæ	697. 32	Excretrix facultas	306. 17
Δύσπνοια	640. 40	Excrementum alui	317. 20
E		Excrementa ſingularum partium	318. 18
Εκχυμώσις	796. 17	Excrementa humorum duo	23. 30
Eſſigici ſimilitudo	349. 5	Excrementa ſiue ſuperflua quæ	429. 27
Elementum nullum purum	43. 25	Excrementa virium indices	22. 40
Elementi exuperantis ſpecies quo-	43. 20	Excrementa concoctionum	317. 16.
modo deprehendantur	37. 17	318. 3	
Elementa quæ dicantur	7. 40	Excrementorum ſpecies diſjudican-	17. 22
Elementa carnis quot	37. 25	Excrementorum retentio quid in-	dicet
Elementa hominis cur impura	39. 8	Excrementorum retentio & quali-	tas vitioſa
Elementa hominis propria	43. 30	Excretum quid eiùſque modus	454. 22
Elementa omnia inuicem miſceri	37. 35	Excreta retentâque quibus ſubijci-	antur cauſis
Elementorum formæ an ſeruentur	38. 22	Exanthemata	793. 32
Elementorum permiſtio quomodo	9. 10	Εξανθήματα vnde	335. 34
fiat	573. 38	Expergeſactio duplex	403. 30
Elementorum temperaturæ	574. 35	Expulſrix facultas	288. 37
Elephanta eiùſque indicia	645. 34	F	
619. 2	Enanthiſ	Faciei oſſa	95. 19
Εμφύλης quid	591. 10	Faciei oſſa quomodo iungantur	102. 49
Ephelides	795. 4	Faciei vitia	618. 12
Epiglottis	135. 25	Facultas rationalis	290. 9
Epiglottis quid	185. 15	YY	4
Epileſia quid	594. 32		
Epileſiæ & apopleſiæ differentiæ	598. 23		
Epileſiæ cauſæ, differentiæ & no-	595. 5		

INDEX.

Facultas excretrix caloris indiga 269. 28	Febris continuæ conclusæ materia, 525. 38
Facultas vitæ pulsusque quomodo differat 364. 40	Febris continua, eiusque species, 521. 10
Facultas quomodo distrahatur, & vnde elanguescat 387. 38	Febris continua ardens 521. 38
Facultatis animalis motus qui fiat, 356. 2	Febris pestilens continua, vel con- tinens 552. 30
Facultatis bonitas quando indice- tur 389. 5	Febris continens putrida 510. 3
Facultatis animalis partes 304. 5	Febris continens non putrida 518. 40
Facultatis procreatricis munus 286. 12	Febris continens, siue synochos 519. 39
Facultatis ex cerebro descendentis via, nervus 2. 25	Febris vera ardens 517. 17
Facultates animæ internæ 293. 40	Febris acuta, longa, & tertiana con- tinua 517. 5
Facultates auxiliariæ 288. 16	Febris lenta, eiusque notæ & speci- es 522. 15. 524. 5
Facultates animæ naturalis tres 258. 15	Febris pestilens quæ 517. 36
Facultates animæ ubi consistent 304. 8	Febris pestilens putrida vnde 559. 19
Facultates quomodo intercidant, & fiant 302. 16	Febris propriè pestilens quæ 533. 27 545. 9
Facultates vnde regantur 69. 15	Febris maligna quæ & vnde 538. 24 545. 8
Facultates an intereant 285. 38	Febris putrida intermittens qualis, 517. 20
Facultates quibus alimentis indi- geant 298. 24	Febris putrida intermittens 517. 19
Facultates altrici inferuientes 288. 26	Febris simplex, composita, & con- fusa 517. 20
Facultatum sedes 69. 18	Febris non omnem inflammatio- nem comitatur 14. 25
Facultatum naturalium partes 286. 7	Febris futuræ nota 479. 23
Facultatum differentiæ 301. 4	Febris epiala, eiusque causa 530. 25
Facultatum mutua opera 302. 1	Febris quotidiana spuria 534. 20
Facultatum singularum actiones, 304. 25	Febris tertiana ardens 521. 38
Facultatum varietas vnde 358. 31	Febris tertiana legitima & illegiti- ma 532. 5 534. 19
Facultatum offensio 359. 8	Febris semitertiana 535. 25
Facultatum altricis & auctricis dif- ferentia 288. 10	Febris tertiana, eiusque humor, & & notæ 521. 38. 530. 35
Famē qui facilius ferant 36. 3. 153. 23	Febris tertiana duplex vnde 535. 2
Fastidium cibi 679. 11	Febris quartana, eiusque accessio 532. 12
Fastidium cibi, eiusque causæ & dif- ferentiæ 679. 17	Febris quartana falsa 534. 23
Fastidium cibi quando oriatur 570. 30	Febris quartana duplex vnde 535. 5
Fauus 795. 17	Febris quotidiana & quartana con- tinua 517. 17. 521. 35
Febris quid, quæque eius sint species, & causæ 515. 18. 516. 14	Febris hectica qualis, eiusque origo, differentia, & notæ 516. 28. 536. 1
Febris continua 516. 40. 521. 10	Febris
Febris continua duplex 516. 49	
Febris continua triplex 521. 10	

INDEX.

Febris lipyrias	524. 6	Februm intermittenrium & continuarum differentia	528. 5.
Febris synochi differentia	520. 15	534. 34	
Febris ardentis nota	469. 28	Februm symptomata qualia, eorumque causæ	567. 38. 568. 27
Febris recidiva quando timenda,	476. 35	Februm ardentum à tertianis differentia	268. 7.
Febris synochos putrida	519. 3	Februm pestilentium accessiones quales	554. 5
Febris synochus an ex sanguine putrido	520. 25	Februm accessio cur reuertatur	528. 38
Febris quotidianæ humor proprius	528. 10	Februm omnium sedes	528. 15
Febris diariæ origo, indicia, quæ ei opportuni	516. 24. 517. 40. 518. 15	Februm singularum notæ	526. 11.
Febris diariæ in alias transitus	518. 20	529. 24	
559. 9		Februm pestilentium notæ propriæ	546. 25
Febris quotidianæ in quartanam degeneratio	310. 26	Fibræ cordis propriæ	58. 32
Febris tertianæ accessio & circuitus	531. 15	Fibrarum genera	290. 36
Febris hæctica symptomata	555. 5	Fibrarum sanguinis separatio	319. 25
Febres intermittentes	522. 46	Fingendi facultas	294. 10. 295. 11
Febres complicata, vagæ, & errantes	523. 7	Fistula	797. 33
Febres intermittentes quomodo implicantur	535. 20	Flamma quot modis extinguatur	266. 35
Febres implicitæ quæ & quomodo fiant	534. 26	Flammæ materia	270. 28
Febres compositæ quæ & quot	534. 8	Flatus ex pituita	484. 35
Febres confusæ	534. 10	Femur eiusque processus	129. 41
Febres quartanæ simplices quomodo variant	533. 25	130. 15	
Febres pestilentes ab alijs quid differant	548. 24	Femoris motus	233. 1
Februm materia vnde & ubi	516. 24	Femoris luxatio	806. 21
524. 15. 528. 15		Fœminæ viris cur pinguiiores	69. 30
Februm putridarum species	516. 34	Fœtor quos affectus notet	470. 15
Februm synochorum appellatum ratio	519. 34	Fœtus vnde nutriatur in vtero	169. 34
Februm compositarum accessio	535. 12	Fœtus quomodo per initia formetur	46. 23
Februm per crism solutio	561. 46	Fœtus in vtero quomodo formetur	346. 25
Februm per abscessus solutio	562. 20	Fœtus quando moueatur	347. 10
Februm continuarum & intermittentium complexus	523. 38	Fœtus in vtero quibus indigeat	170. 10
		Fœtus conformationis indicium	314. 2
		Fœtus conformatio	346. 13
		Fœtus formatio in vtero, qualisq; eius situs	167. 8

INDEX.

Fœtus motio, ad exitum præpara-	
tio	347. 12
Fœtus prodientis figura	767. 34
Fœtus sudor & vrina	168. 41, 169. 6
Fœtus excrementa	168. 2
Fœtus mortui signa	766. 18
Foramina ossium	103. 12, 105. 10.
	96. 6, 110. 5
Fractura	798. 5
Frigus extremarum partium quid	
notet	469. 12
Frontis os	92. 38
Frontis musculi	216. 24
Frontis contractio quomodo fiat	
	216. 25
Furoris futuri indicium	476. 40
Furunculus	786. 30

G

Gangrena	786. 42
Gemellivnde	350. 5
Generationis ordo	44. 35
Generationis partium hominis or-	
do	61. 2
Gingivarum affectus	631. 25
Glandula pinealis	255. 32
Glandulæ <i>magis</i> dictæ	187. 17
Glandulæ parastatæ	159. 7
Glandulæ in quibus bubones fieri	
solent	251. 10
Glandulæ semen continentes	232. 12
Glandulæ oculorum, earumque	
usus	196. 17
Glandularum utilitas	161. 40
Glandularum in mesenterio usus,	
	151. 29
Glandularum inflammatio	187. 38
Gonorrhæa	799. 33, 760. 21
Grauedo quid	602. 26
Gustatus vnde offendatur	632. 24
Gustus quomodo fiat	352. 14
Gustus quando offendatur	441. 20
Gustus instrumenta	199. 31
Gustandi facultas ubi consistat	292. 5
Gurgulio	633. 8
Gurgulio quæ pars oris dicatur	188. 8
Guttur quid	634. 10
Guttur caput arteriæ asperæ	135. 4
Gutturis offensus notæ	655. 38

H

Habitus bonus vel malus quis	52. 25
Hæmatosis	216. 30
Hæmorrhoids quid	710. 25
Hæmorrhoids cæca	710. 41
Hæmorrhoides suppressæ quid no-	
tent	467. 20
Hæmorrhoidum sanguis qualis	710. 25
Hæmorrhoidum symptomata	711. 10
Hæmorrhoidum suppressio	711. 24
Hallucinatio	613. 26
Hemicrania	579. 36
Herniæ species	745. 13
Herniæ cuiuslibet differentiæ	147.
	148. 2
Herpes	415. 8
Hidroa	794. 39
Homo vnde gignatur, augeatur, &	
nutriatur	48. 8
Homo ex quibus elementis consistet	
	43. 10
Homo ex elementis quomodo gignatur	43. 40
Homo temperatissimus quis, quæ	
que eius notæ	54. 32
Hominis temperati indicia	63. 34
Horror februm vnde	571. 22
Humerus, eiusque partes	120. 17
Humeri luxatio	805. 33
Humor primogenius	271. 27
Humor primogenius quid	274. 24
Humor primogenius vnde deriuetur	273. 32
Humor calorem nativum nutriens,	
	271. 21
Humor nativus quomodo exting-	
guatur	277. 9
Humor sanguineus qualis	16. 40
Humor alimentarius	271. 15
Humor elementarius	272. 2
Humor suum quisque medicamen-	
tum postulat	47. 10
Humoris communis appellatio	320. 16
Humores cur elementa dicantur	
	46. 15
Humores qui, quales & quot	309.
	25
Humores rerum omnium tres	
	271. 6

Humo-

INDEX.

Humores quomodo cognoscendi 56. 18	Humorum diuersa portio 324. 36
Humores quomodo differant 490. 24	Humorum infectarum notæ 549. 5
Humores quot modis concoquantur 325. 35	Humorum excrementa duo 23. 30
Humores an simul generentur 309. 24	Humorum expurgandorum ordo 47. 18
Humores vnde propriè generentur 373. 10	Humorum educendorum ratio 19. 35
Humores ex concoctione qui 317. 16	Humidi primogenij & caloris so- cietas 276. 32
Humores vnde vitiantur 559. 30	Humidi primogenij imminutio 273. 22
Humores quæ inficiant 435. 16	Hydrops vterinus 769. 16
Humores prauis quando putrescant 543. 2.	Hydrophobia, quæq; eius notæ 583. 30
Humores prauis vnde generentur 543. 8	Hyperfarcoma 626. 6
Humores quando ab externis in- trò recedant 432. 17	Hypochondriaca affectio 730. 25
Humores an omnes simul redun- dent. 450. 33	I
Humores abundantes quomodo e- uacuandi 25. 20	Icterus 725. 23
Humores quando & quomodo e- ducendi 20. 1	Iecur 153. 30
Humorum generatio 309. 24 311. 15	Iecur fons sanguinis 154. 14
Humorum materia diuersa 459. 22	Iecur venarum omnium origo & & radix 154. 12
Humorum differentia 56. 12	Iecur quibus partibus sit annexum 156. 12
Humorum trium differentia 272. 19	Iecur calidum qualem gignat hu- morem 311. 34
Humorum color cur varius 335. 41	Iecur temperatum quem humorem gignat 311. 34
Humorum mistura 336. 32	Iecur inflammatum quid notet 476. 22
Humorum concoctionum distribu- tio 318. 1	Iecur hominis cur integrum 154. 2
Humorum immoderatio in quibus 337. 17	Iecur quomodo alatur 309. 15
Humorum collectio quomodo fiat 439. 1	Iecur quana carne præditū sit 58. 22
Humorum varietas vnde 312. 10	Iecoris essentia qualis 154. 10
Humorum ventriculi notæ 685. 3	Iecoris situs & figura 153. 33
Humorum motus qualis 459. 40	Iecoris inflammatio 719. 1
Humorum perniciosissimus 16. 35	Iecoris inflammatio 661. 1
Humorum in corpore abundantia um notæ 481. 35	Iecoris obstructio 722. 17
Humorum copiae excessus defectus que 337. 22	Iecoris scirrhus 723. 38
Humorum copia qualitatum indi- cia 630. 36	Iecoris inflammatio erysipelacea 719. 31. 721. 26
Humorum copia & prauitas vnde noscat 24. 20	Iecoris in temperies 715. 35
	Iecoris imbecillitas, eiusque notæ 714. 15
	Iecoris affectus nota 450. 12
	Iecoris imbecillitatis causæ 715. 35
	Iecoris repletio vitiosa 717. 20
	Iecoris temperamentum vnde no- scatur 80. 24
	Iecoris

INDEX.

Iecoris calidi, aut frigidi notæ	468. 22	Inremperies composita quot mōs dis fiat	414. 14
Iecoris inflammati indicia	720. 2	Intestinum duodenum	150. 15
Iecoris vulnerati nota	799. 30	Intestinum ieiunum	149. 72
Ignis facer	784. 18	Intestinum llium	149. 40
Ignis sylvestris	793. 25	Intestinum cæcum	149. 33
Iliacus morbus	745. 41	Intestinum colon	149. 26
Ileus morbus	701. 29	Intestinum rectum	149. 23
Ilei morbi præfagia	702. 37	Intestini recti arteriæ	256. 39
Imaginatio quomodo fieri soleat	352. 33	Intestina eorūmq; situs	149. 6
Imaginationis sedes & essentia	300. 25	Intestinatorum tunicæ cur duplices	152. 2
Impetigo	791. 9	Intestina vnde nutriantur	307. 7
Incubus quid	591. 15	Intestinatorum ramex	746. 20
Infans quomodo in lucem prodeat	171. 5	Intestinatorum obstructio	707. 7
Infantis in vtero situs & forma	171. 1	Intestinatorum laxitas	693. 2
Infantes qua forma prodeāt	348. 20	Intestinatorum viceratorum signa	694. 28
Infantium & parentum similitudo	349. 5	Intestinatorum lęsorum nota	799. 29
Infantium monstra quomodo fiant	170. 38	Intestinatorum vulnere nota	713. 4
Inflammatiō partium	19. 1	Iſchuria	743. 37
Inflammatiō vnde fiat	15. 40	Iugulum quale	119. 40
Inflammatiō ex quibus fiat humori bus	554. 39	Iuguli fracti nota	803. 40
Inflammationis materia vbi	15. 36		
Inflammationis notæ	14. 20		
Inflammationis materia quomodo educatur	16. 1		
Inflammationis notæ & causæ	782. 2		
Inflammationis in abscessum con- uersæ signa	721. 35		
Inflammationem cur sequatur fe- bris	14. 25		
Inflammationum origo	658. 31		
Inflatio ventriculi	690. 1		
Insania seu furor	583. 15		
Insaniæ genera triplicia	580. 17		
Insaniæ futuræ nota	476. 27		
Insomnium	295. 31		
Insomnium qua ratione fiat	353. 12		
Instrumentum quot modis vitietur	386. 31		
Intelligentiæ facultas	303. 10		
Intelligentiæ functiones quæ	356. 16		
Intemperies morbos parietes	414. 26		
		Labra eorūmq; musculi	188. 34. 1
		Lactis generatio	317. 9. 326. 20
		Lactis partes quæ	46. 30
		Lac in mammis vnde	348. 25
		Lactis deficientis notæ	671. 39
		Lactis abundantia	672. 19
		Lacrymarum via	104. 35
		Laqueus infanibus obductus	170. 33
		Larynx asperę arterię caput	184. 40
		Larynx ex quibus constet	185. 2
		Laryngis musculi	185. 30. 222. 24
		Lassitudo quotuplex	457. 30
		Lassitudinis causa	571. 20
		Laterum inflammatio	658. 10
		Laterum inflammationis præfagia	662. 20
		Laxitas intestinatorum	693. 2
		Laxitatis & asperitatis vitia	416. 25
		Lenticula	795. 7
		Lentigo	618. 27
		Lepra eiūsq; nota	573. 39. 574. 36
		Lethargus	584. 28
		Lien	

INDEX.

Lien eiusq; figura & essentia	156. 24.	Malarum ossa	96. 31
Lien quomodo atram bilem attrahat conficiatq;	310. 15	Malum mortuum	792. 28
Lienis caro qualis existat	58. 20	Mali habitus indicium	477. 15
Lienis vasa vnde oriantur, eorumque usus	156. 36	Malus habitus eiusque notæ & origo	572. 18
Lien quibus membris coniungatur	157. 11	Mammæ earumque substantia, vasa, & usus	172. 3
Lienis usus	157. 15	Mammæ suffusæ quid notet	476. 40
Lienis tumor	729. 22	Mammarum affectus	671. 26
Lienis inflammatio	729. 15	Mammarum inflammatio	673. 5
Lienis inflammati indicium	478. 23	Manus interior pars cur sensu predata	206. 20
Lienis inflatio	729. 5	Manus luxatio	806. 7
Lienis scirrhus quid	729. 35	Marcor ex senio	538. 7
Lienis affecti nota	450. 14	Marcor & tabes quid differant	655. 15
Lienis vulnerati nota	799. 34	Materia partis restituendæ quæ	12. 20
Lyenteria	692. 24	Materia immoderata quæ	414. 25
Ligamenta qualia existant	136. 10	Materiæ vitia quæ	412. 40
Ligamentorum varietas	136. 22	Maxillæ ossa	96. 31
Ligamentorum usus	137. 15	Maxillæ motus & musculi	219. 34
Ligamentorum vulneratorum nota	798. 33	Maxillæ tuberculū ac foramen	97. 5
Ligula	135. 25	Maxillæ luxatio	805. 2
Ligula in homine quid sit	223. 10	Maxillæ fractæ nota	803. 32
Lingua eiusque figura	186. 15	Maxillarum morbi	631. 39
Lingua vnde gustus sensum habet	221. 33	Meatus urinaris quid	163. 35
Lingua: caro & musculi	186. 25	Meatus urinaris exortus	249. 38
Lingua: arteriæ, nervi & ligamenta	187. 7	Meatus urinaris quales	158. 11
Lingua: ligamentum infantibus incidendum	221. 23	Medicus absolutus quis	4. 1
Lingua: vicia	632. 4	Medici officium	4. 5
Lippitudo	615. 5	Medici & naturæ opera mutua	12. 15
Lippitudo scabiosa.	619. 9	Medico futuro quæ necessaria	3. 20
Lippitudinis futuræ nota	477. 11	Medicorum sectæ	31. 30
Lippitudo quid	733. 21	Medicina quid	29. 30
Lumborum dolor vnde	571. 15	Medicina à Deo cur data	4. 40
Lumbrici	707. 40	Medicina scientiarum præstantissima	2. 10
Lumbricorum notæ & causæ	708. 9. 709. 18.	Medicina ex quarum artium genere	4. 35. 27. 13
Lumbricorum differentia	708. 21	Medicina auctior perfectiorque est	2. 30
Lumbricorum indicia	708. 10	Medicine partes	36. 15
Luxata ossa	804. 27	Medicine aliarumque artium differentia	27. 20
Luxati membri notæ	473. 20	Medicina: finis, forma, & materia	29. 35
M		Medicine auctiores	30. 35
Macies eiusq; causa	450. 29	Medicamenta si plus iusto purgent	48. 30
Malarum iunctura qualis	103. 9	Medica-	

INDEX.

Medicamenta in viscerum affectibus qualia esse debeant	21. 5	Mesenterium	850. 40
Medicamenta suum singula humorem trahere	47. 28	Mesenterij usus	151. 23
Medicamenta pro partium affectionum sibi exhibenda	20. 17. 21. 5	Mesenterij vitia	713. 17
Medicamentorum facultatem familiaria attrahere	43. 20	Mesenterij tumor	713. 33
Medendi artis duo capita	13. 15	Mesenterij inflammatio	714. 8
Medium interiectum quid	351. 34	Menstruum quid	342. 27
Medulla spinæ	192. 14	Menstrui circuitus causa	343. 18
Medulla ossium qualis	59. 13	Menstrui retenti incommoda	343. 35
Medullæ habitus nota	75. 26	Menstrua vnde egrediantur	250. 23
Medullæ spinæ origo	192. 30	Menstruorum suppressio	755. 41
Medullæ cerebri & spinæ differentia	192. 19	Menstruorum retentio quid indicet	467. 10
Melancholia quid	321. 16	Menstruorum nimia profusio	757. 8
Melancholia hypochondriaca	582. 26	Menstruus sanguis qualis	755. 2
Melancholia eiusque species	581. 41	Menstruus sanguis ubi colligatur	343. 10
Melancholici humoris differentia	333. 35	Menstrua purgatio idonea	755. 20
Membrana cerebri tenuis speculum	193. 20	Mēla	613. 34
Membrana costas succingēs	176. 20	Mola	350. 11
Membrana succingēs duplex	15. 15	Mola	770. 2
Membrana ossa ambiens	258. 30	Morbus eiusque sedes quomodo cognoscatur	16. 25
Membrana carnosa cur dicta	258. 15	Morbus nullus per se solus	438. 12
Membrana κωροειδής	193. 36	Morbus ex motu, & quiete quomodo fiat	403. 29
Membranæ capitis læsæ nota	798. 37	Morbus ex quibus quorūq; causis fiat	426. 11
Membranæ costarum inflammata nota	14. 20	Morbus consequens qui dicatur	440. 10
Membranæ trifida in corde	180. 12	Morbus in qua materia consistat	424. 23
Membranæ fetus vnde	346. 15	Morbus suum quisq; terminum habet	24. 1
Membranæ in mesentericarum finibus	158. 17	Morbus gallicus	458. 35
Membranæ intersepientes	176. 25	Morbus gallicus eiusq; signa	574. 1
Membranæ in vteri ceruice	165. 12	Morbi essentia siue formæ	415. 29
Membrarum sensus	299. 5	Morbi formæ	413. 5
Membrarum temperaturæ	59. 1	Morbi magnitudo vnde noscatur	22. 35
Memoria	295. 2	Morbi natura vnde cognoscenda	458. 32
Memoria intelligentiæ	357. 26	Morbi causa	13. 39
Memoriæ sedes & essentia	300. 25	Morbi notitia vnde petenda	13. 33
Memoriæ officium	352. 40	Morbi magnitudinem & naturam quæ notent	16. 30. 17. 10
Memoriæ interitus	357. 36	Morbi solutio quando prædicetur	22. 20
Memoriæ amissio	584. 8	Morbi gallici contagio, & species	576. 30. 577. 3
Memoriæ & recordationis differentia	357. 30		
Mens quid, eiusq; functiones	356. 16		
Mentis alienationis indicium	476. 37		

Morbi

INDEX.

Morbi gallici & articularij dolor quid differant	578. 2	Motus voluntarius	299. 35
Morbi gallici indicia, eiusque recidiva	458. 35. 463. 40	Motus in rigore qualis	267. 34
Morbi ex tota partium essentia	413. 30	Motus in tremore qualis	267. 15
Morbi ex cerebri essentia	412. 11	Motus voluntarius in musculis vnde	213. 2
Morbi ex vitata conformatione	416. 9	Motus arterie impedimentum	392. 16
Morbi ex coeli anniq; statu qui pre-dicentur	474. 7	Motus artieriarum & cordis differ-entia	364. 25
Morbi venientis signa	24. 32	Motus sedes, eiusque instrumenta	298. 4. 299. 5
Morbi ex interperie qui fiant	468. 3	Motus causa, & quomodo is perficiatur	355. 8
Morbi eloquentia non curantur,	2. 35	Motus differentie	430. 30
Morbi hereditarij	425. 14	Motus voluntarij noxæ	441. 23
Morbi partium instrumentariarum	416. 5	Motus voluntarij	362. 24
Morbi quomodo inuestigandi	457. 25	Motio partium quomodo fiat	20
Morbi sicci & humidi vnde fiant,	429. 12	Motioni necessaria	6. 5
Morbi similium proprij	411. 34. 413. 33	Motionum interiorum instrumen-tum	351. 15
Morbi quomodo finiantur	560. 31	Mouendi facultas	297. 10
Morbi compositi	418. 29. 421. 4	Mulieres quomodo concubitum appetant	164. 7
Morbi compositionis	417. 41	Musculus quid	212. 10
Morbi magnitudinis	417. 15	Musculi essentia, formæ & origo	212. 14
Morbi receptaculorum qui	417. 6	Musculi propria actio & status	356. 8
Morbi ex victu, corporum immu-tatione & humorum qui	476. 15	Musculus ceruicem vesicæ ambi-ens	159. 19
Morbi cauendi ratio	25. 5	Musculi aurium	219. 26
Morborum origo	411. 35. 436. 21	Musculi capitis	213. 12
Morborum genera duo	411. 23	Musculi superciliorū & palpebra-rum	218. 1
Morborum summa genera	414. 18	Musculi oculorum	218. 30
Morborum cause	266. 24	Musculi oculorum vnde oriuntur	195. 39
Morborum casus, eorumq; differ-entie	639. 24	Musculi faciei	216. 19
Morborum differentie	422. 2	Musculorum labororū motus	189. 2
Morborum casus siue symptomata quot	14. 5	Musculi labororum	217. 15
Morborum signa	447. 40	Musculi nasus	216. 36
Morborum futurorū signa	473. 40	Musculi laryngis	222. 24
Morborum causa, eorumq; indicia,	13. 39. 14. 5	Musculi lingue	221. 20
Morborū ex pulsu cognitio	492. 21	Musculi maxillæ quot existant	219. 32
Morborū ex vrina cognitio	499. 31	Musculi os moeantes	159. 14
Morborū ex vicia	584. 5	Musculi laui in collo	217. 7
Mors in quibus consistat	272. 8	Musculi ceruicis	214. 37
		Musculi respirationi dicati	362. 40
		Musculi scapulis dicati	224. 1
		Musculi	

INDEX.

Musculi spinæ octo	215. 22	Nerui	199. 43
Musculi thoracis	172. 34. 226. 21	Nerui eorumq; differentia	138. 1
Musculi humero inseruientes	224. 37	Nerui cerebri, eorumq; paria	200. 1
Musculi manus	240. 21. 242. 7	Nerui sensus & motus quomodo differant	203. 20
Musculi cubito inseruientes	239. 28	Nerui optici	200. 14
Musculi digitorum manus	245. 5	Nerui oculorum musculis inserti	196. 14
Musculi pollicis	244. 40	Nerui lingue musculis inserti	221. 30
Musculi intercostales, eorumque vsus	173. 38	Nerui pulmonis tunicam attingentes	184. 25
Musculi intercostales	227. 25	Nerui spinæ medullæ, eorumq; paria	203. 28
Musculi abdomini dicati	229. 16	Nerui manus quid, & qui existant,	205. 2
Musculi abdominis	141. 41. 229. 16	Nerui thoracis	207. 29
Musculi femur mouentes	232. 40	Nerui lumborum	208. 37
Musculi testiculorum	231. 21	Nerui septum transversum ingredientes	228. 18
Musculi suram construentes	236. 35	Nerui ossis sacri, ac pedis	210. 14
Musculi tibiæ mouentes	234. 26	Nerui cur vesicam ingrediantur,	159. 22
Musculi extremo pedi inseruientes	236. 25	Nerui omnibus musculis inseruntur	212. 2
Musculi pedum digitis dicati	238. 28	Nerui recurrentes	202. 10
Musculi neruis non carent	213. 5	Nerui temperaturæ	59. 8
Musculorū tendines quales	212. 34	Nerui in mesenterio vsus	151. 38
Musculorum incidendorum ratio,	144. 2	Nerui structuram probam quæ indicent	75. 22
Mydriasis, eiusque causa	609. 1	Nerui imbecillitas vnde	594. 20
Myocæphalus	613. 32	Nerui totius corporis maximus	210. 16
Myrmecia	796. 2	Nerui quali temperamento præditus	56. 7
N			
Nares	199. 13	Nerui à tēdine quid differat	212. 37
Narium cartilagines	134. 20	Nomæ in vulua	754. 1
Narium vitia	625. 2	Notiones rerum	357. 17
Narū obstructio vnde fiat	445. 24	Nubecula	613. 15
Narium vlcus	625. 32	Nutritio quid	304. 26
Narium fracturæ notæ	803. 28	Nutritio vera quid	315. 10
Nasus quibus musculis claudatur,	217. 4	Nutritio quod duplex	286. 40
Natura quid	281. 39	O	
Naturæ essentia	281. 1	Obscuritas oculorum	611. 29
Naturæ robur & imbecillitas vnde noscatur	21. 40	Obstructio quo pacto fiat	417. 3
Naturæ tria aduersantur	13. 30	Obstructionis curatio	18. 35
Naturæ & medici opera mutua	12. 15	Obstructiones quibus aperiantur.	26. 5
Naturalia muliebria	164. 5	Obstructionum notæ	722. 42
Naturalium imbecillitas	749. 2	Obstructi	
Nausea quid	684. 9		
Nauseam quid generet	570. 35		
Nephritis quid	731. 43		
Nerui visorij rupti notæ	606. 36		
Nerui vulnerati nota	798. 25		

INDEX.

Obstructi visceris nota 24. 20
 Oculi imminutio 619. 5
 Oculi imbecillitas 611. 25
 Oculorum musculi 218. 30
 Oculorum arteriæ 255. 17
 Oculorum arteriæ & venæ 198. 26
 Oculorum membranæ 196. 21.
 197. 01
 Oculorum humores 197. 35. 605. 32
 Oculorū fabricatio & partes 195. 36
 Oculorum administratio 198. 29
 Oculorū actio immutata quomodo noscenda 473. 29
 Oculorum motus 218. 38
 Oculorum temperamentorum indicia 78. 22
 Oculorum affectus 605. 17
 Oculorum abscessus 618. 8
 Oculorum frigiditas vnde 196. 27
 Oculorum tabes 609. 37
 Oculorum dolores graues 618. 2
 Occipitis os 93. 10
 Occipitiij partes depressæ acuminatæ 75. 28
 Odor quos morbos significet 470. 19
 Odoris foramina 96. 6. 103. 39
 Odoratus instrumenta 199. 4
 Odoratus quo pacto fiat 351. 41
 Odoratus sedes 292. 29
 Odoratus vitia 625. 2
 Oedema 415. 9. 690. 15 787. 9
 Omentum quale 148. 11
 Omenti figura, situs, & origo 148. 19
 Omenti ramex 746. 20
 Omenti vsus 148. 42
 Ορθόπνοια 641. 6
 Oris ventriculi affectus 673. 42
 Os pectorale 117. 20
 Os coccygis in partu patitur 169. 30
 Os cordis ceruini vbi inueniatur 131. 18
 Os cubicum 132. 30
 Os hyoides vel lambdoïdes 106. 32
 Os iugale 113. 1
 Os illud quale 127. 20
 Os sacrum 107. 30. 112. 32
 Os scaphoides 132. 38
 Os sesamoides 125. 4

Osis læsi signum 798. 34
 Osis hyoïdis musculi 220. 42
 Osis fracti nota 472. 25
 Ossa quomodo sentire dicantur 258. 29
 Ossa quomodo functiones obeant, 291. 25
 Ossa infantium qualia 93. 5
 Ossa arterijs non carent 257. 40
 Ossa sesamina 125. 16. 127. 2
 Ossium luxatorum indicia 804. 38
 Ossium varietas 92. 20
 Ossium vnionis diuortium 802. 23
 Οσσεολογία quæ 91. 14
 Otium quos excitet morbos 431. 27
 Ozena 625. 37

P

Palma ossa 123. 31
 Palma ossium luxatio in quas partes fiat 806. 12
 Palpebrarum vitia 619. 15
 Palpitatio cordis 665. 20
 Palpitatio cordis quomodo fiat 395. 20
 Palpitationis & tremoris differentia 395. 3 666. 5. 8
 Papula 785. 8
 Pars simplex vnde 9. 4
 Partes corporis principes 279. 36
 Partis affectæ notitia 13. 39
 Partes corporis tum simplices, tum compositæ quales 5. 1
 Partes similes in infantibus cur aliquando ampliores 350. 25
 Partes simplices ex quibus consistunt 272. 32
 Partes corporis vnde alantur 273. 9
 Partes corporis imbecillæ 439. 2
 Partes extremæ cur frigida exanguiaq; 269. 20
 Partes singulæ quomodo formentur 346. 13
 Partes quæ reperiuntur, quæ non possint 7. 20. 12. 5
 Partes ex consensu & primario quomodo lædantur 453. 5
 Partium simplicium & compositarum actiones bonæ & malæ 10. 5

INDEX.

Partium simplicium temperatura,	Pellicula	140. 22
9. 10	Περικάρδιον	177. 10
Partium simplicium actio in quibus	Περικαρδίου	190. 3
9. 20	Περικαρδίου	190. 10
Partium singularum actiones quæ	Περικαρδίου	643. 32
5. 10	Peritonæum, eiusque origo	145. 36
Partium extremarum frigus quid notet	145. 6	
Partium compositarum morbi	Peritonæi essentia, figura, usus, & ruptura	147. 6
Partium singularum morbi quomodo fiant	Peritonæi ruptæ nota	746. 10
436. 26	Pestilens hæctica	551. 20
Partium corporis motio actiue quomodo fiat	Pestilentia vera, eiusque causæ & notæ	536. 20. 544. 40.
5. 20	Pestilentia materia quam partem inuadat	552. 5
Partium compositarum morborum genera	Pestilentia vera notæ	547. 35
7. 10	Pestilentia præsentis aut futuræ indicia	556. 5
Partium similium essentia	Pestilentia notæ communes alijs febribus	545. 24.
Partium principum differentia	Pestilentia signa communia	550. 36
Partium singularum temperatio,	Pestilentia opportuni	557. 25
64. 2	Pestilentia quæ superuenire solent	552. 41. 555. 10
Partium singularum temperamenta	Phlegmone quæ	415. 7
56. 6. 75. 2	Phlyctenæ	793. 20
Partium temperamenta vnde cognoscantur	Phrenitis	580. 35
68. 15	Phrenitis & delirium quomodo differant	581. 20.
Partium functionum causæ	Phygethlon	783. 18
Partium differentia	Phyma	783. 32
280. 10	Phlogis, eiusque species	654. 32
Partium curatio ex quibus fiat	Pica quid propriè	678. 20
Partium singularum facultas propria	Pili cuticulæ ad quid nati	258. 23
215. 27	Pili in alijs cur facilius, in alijs difficilius crescant	73. 26
Partium similium compositarumque temperamenta diuersa	Pili vnde generentur	70. 6
Partium singularum communis status	Pilorum varietas vnde	71. 26
10. 12	Pilorum color	73. 16
Partium simplicium diuortium	Pilorum temperamenta	59. 17
Partium distinguendarum ratio	Pinguedo cur cuti subiecta	258. 10
17. 35	Pituita quid	311. 2. 321. 24.
Partium compositarum integritas, vitium & morbus in quibus	Pituita quomodo tollenda	25. 35
6. 25	Pituita interdum sicca	85. 18
Parotis	Pituitæ auctor	39. 24.
624. 6	Pituitæ generatio	318. 26
Partus difficilis nota	Pituitæ origo	310. 39
767. 7	Pituitæ species	322. 5. 327. 8
Partus facilis & fortunati signum	Pituitæ retentio quid notet	466. 38
169. 20	Pituitæ	
Parturientium dolores tam graues vnde		
169. 25		
Patella		
130. 29		
Pecten		
127. 24		
Pectinis ossa		
129. 26		
Pectus		
115. 40		
Pedis ossa		
132. 1		
Pedum tumores quid indicet		
479. 26		

INDEX.

Pituitæ abundantis indicia	493. 33	Pulmonis caro qualis existat	38. 18
Pituitæ calor, eiusque saporum cauſa	336. 14	Pulmonis habitus & vſus	182. 3
Pituitæ excretio quid indicet	463. 25	Pulmonis leſi nota	799. 9
Pituitæ futura nota	477. 12	Pulmonis inflammati præſagia	662. 20. 684. 24
Pituitæ in alios humores conuerſio	329. 20	Pulmonis affecti nota	450. 25
Pituitæ in ſanguinẽ mutatio	324. 30	Pulmonis vena cur arterioſa venoſaque	184. 9
Pituitæ nota & vires.	328. 11	Pulmoni nulla arteria	256. 5
Pituitæ natura qualis	17. 5	Pulmones cur attollantur	362. 2
Plantæ oſticula	133. 5	Punctura	798. 5
Plenitudinis notæ	491. 14.	Pulſus quid eiùſq; cauſa	301. 10
Plethora eiùſque ſpecies	490. 34	Pulſus caprizans	370. 40
πλευρις	658. 10	Pulſus formicans	370. 20
Pleuritis ex atra bile	465. 24	Pulſus hæcticus	372. 22
Pleuritis veræ, & falſæ notæ	660. 20. 664. 37	Pulſus myurus quæ	367. 32
Pleuritidis ſigna	660. 20	Pulſus ſpasmodes	371. 24
Pleuriticorum ſymptomata	659. 5	Pulſus ferratilis	371. 10
Plexus reticularis	195. 18	Pulſus vibratus	371. 31
Podagra	778. 21	Pulſus vndofus quæ	369. 38
Podagræ futurę nota	479. 26	Pulſus ſtrepens	372. 29
Pollex pedis & manus quomodo differant	133. 21	Pulſus vermicularis	370. 11
Polypus	626. 10	Pulſus tremulus	372. 13
Præputium	163. 40	Pulſus inflammationis commutatio	15. 5
Præſagia futurorum vnde ſumenda	22. 1. 473. 40	Pulſus reſpirationisq; vſus	362. 31
Præſiſmus eiùſque cauſa	748. 5	Pulſus temperamenti calidi	396. 34
Principia quę dicantur	37. 10	Pulſus deficientis, intercurrentis, intermittẽſq;	368. 5
Procreatio quid	287. 20	Pulſus laudatiſſimus quæ	366. 9
Procreatrix facultas	286. 22	Pulſus gracilis 385. 25. longus ibid.	
Procreandi facultas ex quibus	340. 40.	33. turgidus ibid. 37. brevis ibid.	
Profluuium muliebre	759. 10	42.	
Προγνωστική	21. 25	Pulſus anginæ 496. 18. apoplecticorum	498. 1. aſthmatis 496. 24. catalepticorum 497. 40. dolorum
Prophylacticę ratio duplex	25. 5	493. 17. empyematis 494. 40. epilepticorum 498. 1. febris continuæ 493. 32. grauidarum 495. 19.	
Πρόβλεψις	613. 31	hydropicorum 498. 5. icteri ibid.	
Prudentia quę	357. 2	12. inflammationis 494. 11. marcoris 495. 17. morbi gallici 495. 16.	
Psydratium	795. 15	paralyticorum 497. 36. plethoræ	
Pulmo eiùſque fibre & figura	181. 36	493. 35. parencheticorum 495. 39.	
Pulmo vasis intertextus	182. 30.	pleuritidis 494. 25. ſtomachicorum 496. 18. ſuppurationis 494.	
184. 13		40. vteri ſuffocati 497. 8. veterinoſorum ibid. 17.	
Pulmonis & cordis officia	182. 27	Pulſus facultatis affectę	387. 15
Pulmonis ſitus	181. 36		
Pulmonis inflammatio notę	644. 14		
Pulmonis affectus	643. 32.		
Pulmonis & arterię vlcera quomodo diſcernantur	655. 35		

INDEX.

Pulsus vires irritantium 493. 1. resol
uentium grauantiumq; 492. 25
Pulsus per quos partium affecta-
rum morbi norantur 494. 10
Pulsus quid eiusque vsus 359. 25
Pulsus in vitroq; sexu quales 398. 3
Pulsus ætatum singularum quales
398. 39
Pulsus ex exercitijs quales 404. 12
Pulsus singuli quomodo cogno-
scendi 372. 39
Pulsus ex balneorum vsu qui
405. 1
Pulsus motus proprii qua manu
percipiantur 374. 10. 376. 15
Pulsus proprii, inseparabiles, & fa-
miliares qui 381. 41. 388. 2
Pulsus impares citati qui, eorū-
que genera differentiar, & causæ
389. 22
Pulsus dormientium expurgiscen-
tiumq; quales 402. 9. 403. 28
Pulsus perturbationum animi qua-
les 470. 18
Pulsus concubitus proprii 408. 41
Pulsus humorum intemperiem
qui testentur 493. 35
Pulsus ex cibo & inedia potioneque
qui fiant 406. 49
Pulsus pro temporum & regionum
ratione diuersi 400. 15. 402. 2
Pulsuum causæ 393. 27. 396. 15
Pulsuum singulorum causæ 388. 21.
390. 14. 392. 30. 393. 27. 396. 15.
403. 37
Pulsuum differentiar 365. 12
Pulsuum abolitio & defectus 380. 2
387. 35
Pulsuum extremitates 383. 36
Pulsuum causæ quæ existant 380.
27. 385. 1
Pus excreatum quid 654. 12
Puris & saniei distinctio 800. 33
Puris effluentis notæ, essentia &
qualitas 162. 25
Puris notæ 656. 16
Pustulæ 793. 4
Pustulæ faciei 628. 14
Pustulæ quædo & cur rubræ 553. 17

Postulæ sudatoriar 794. 39
Pustulæ purpureæ vnde 335. 34
Putredinis ratio & causæ 524. 10
Πυρρὸς 641. 2

Q

Qualitates secundæ quid possint
45. 23
Qualitates tactiles earūque diffe-
rentia 45. 28
Qualitates tactiles & effectrices 8. 11
Qualitates singulæ quod præsentent
8. 15
Qualitates essentiam mutantes
44. 15
Qualitatum corpora 8. 27
Qualitatum differentia 45. 15

R

Radius 121. 29. 122. 25
Ramex quid eiusq; species 745. 13
746. 20
Ramices mulierum 747. 27
Ranunculus 632. 5
Ratiocinatio quomodo fiat 352. 38
356. 34
Rauitas quæ dicatur 602. 28
Recrementa virium indices 22. 40
Recordatio & memoria quomodo
differant 357. 30
Remedia pro partium situ quæ ad-
hiberi debeant 20. 15
Remediorum vsui necessaria 18. 1
Renum situs qualis 249. 20
Renum situs, figura, & color 157.
40. 158. 1
Renes 157. 40
Renes exulceratos quid noiet
479. 2
Renum abscessus 732. 32
Renum calculus 733. 20
Renum calidiorum nota 468. 38
Renum caro qualis existat 58. 22
Renum exulceratio 735. 27
Renum inflammatio 731. 35
Renum obstructio 733. 3
Renum officium, 158. 5
Renum vulneratorū nota 799. 42
Renum vulneratorum signa 737. 9
Renum

INDEX.

Renum cum colico dolore consen-
sus 704. 2
Resolution vera quid 599. 3
Resolutio omnium partium vnde
600. 8
Resolutionis sedes 600. 2
Resolutionis causæ & signa 600. 39
Resolutioni obnoxij 599. 26
Resolutoria docendi ratio 4. 35
Respiratio quibus partibus perfici-
atur 363. 2
Respiratio quid, eiusq; vsus 359. 32
499. 26
Respirationis discrimina 641. 25
Respirationis necessitas ac origo
361. 37. 362. 34
Respirationis differentia & causæ
409. 14
Retentrix facultas 289. 4
Retentionis morbi 446. 2
Reuulsio quibus medeatur 19. 10
Rhyas oculi 613. 40
Rhythmī quatenus noscantur
379. 15
Rhythmorum causæ & species
386. 5
Rigor quomodo propriè fiat 268. 35
Rigor neruorum 592. 17
Rigoris causa qualis 268. 22
Rigorū differentia 270. 5
Ructus nidorolenti aut acidī quid
signent 470. 33
Ruptio in oculis 613. 27
Ruptura 798. 6

S

Sagacitas & solertia quæ 357. 6
Sanguis cur concresecat 319. 19.
320. 2
Sanguis quid eiusque differentia
318. 41. 319. 15. 324. 27
Sanguis melancholicus duplex
321. 18
Sanguis menstruus quid propriè di-
catur 170. 5
Sanguis hæmorrhoidum qualis
750. 25
Sanguis iecoris & lienis quomodo
differat 310. 20

Sanguis mēstruus in grauidis 169. 38
Sanguis quomodo putrescat 520. 26
Sanguis à quibus corrūpatur 435. 24
Sanguis redundans quomodo eua-
cuandus 25. 25
Sanguis quot modis reijciatur 653. 8
Sanguinis differentia 323. 33. 710. 30
Sanguinis distributio 69. 25.
314. 16. 363. 26
Sanguinis instrumenta 323. 27
Sanguinis natura qualis 322. 27
Sanguinis temperamentum 323. 3
Sanguinis in humores alios muta-
tio. 326. 9
Sanguinis notæ 325. 4
Sanguinis materni diuisio 348. 26
Sanguinis color quomodo variet
46. 32
Sanguinis melancholici recremen-
tum quò deferatur 310. 27
Sanguinis excretio quid notet, &
quomodo fiat 160. 10
Sanguinis abundantis indicium
481. 39
Sanguinis principia & sedes 324. 7
Sanguinis profusio in partu 168. 23
Sanguinis boni auctor 326. 31
Sanguini varia partes insunt 46. 25
Sanguinis fluor à sputo quid diffe-
rat 651. 26
Sanguinis pro partium situ prorum
pentis indicia. 651. 36. 652. 1
Sanguinis permistio vbiq; 320. 8
Sanguinis fibræ vnde contrahan-
tur 319. 34
Sanguinis confectio 316. 30
Sanguinis profluuium 626. 20
Sanguinis sputum post tussim
640. 15
Sanguinis vomitus quid indicet
654. 5
Sanguinem in renibus quid reti-
neat 249. 27
Saniei differentia 800. 33
Sanitas ex quibus constet 337. 11
Sanitatis tuendæ ratio 26. 30
Sapientia quæ 356. 49
Sapore quomodo morbus innot-
escat. 470. 40

INDEX:

Sarcoma	789. 36	Septi tranſuerſi muſculus eiſque	
Satyriſis	748. 37	uſus	218. 8
Scabies	790. 39	Seriſpecies	318. 8
Scapulæ	119. 20	Signorum ſumma genera	448. 2
Scapularum proceſſus	110. 20	Similitudinis differentiæ in homine	
Scirrhus	415. 11. 787. 35		349. 29
Scirrhus in iecore	723. 35	Similitudinis in effigie cauſa	349. 9
Scirrhus lienis quid	729. 35	Simulacra quomodo ſeruentur	
Scirrhus vteri	754. 31		357. 20
Scirrhii differentia	723. 36. 730. 15	Singultus quid	582. 2
Scirrhii notæ	724. 8. 729. 40	Singultus & vomitus quomodo	
Scrodi inflammatio	745. 3	different	682. 5
Secundæ	769. 29	Singultus cauſa	571. 10
Semen quid ſit	338. 8	Sinus	797. 25
Semen vbi fiat & vnde	217. 10	Sinus oculorum	618. 18
	338. 20	Sitis quid, quæque eiſ cauſa	680. 2
Semen quomodo elaboretur	339. 20	Sitis à viſceribus orta ſigna	82. 18
Semen quomodo albeſcat cogaturque	341. 18	Somnus quid	295. 20
Semen quomodo excernatur	159. 10	Somnus quomodo fieri ſoleat	353. 2
Semen muliebrequale	342. 5	Somnus quomodo morborum au-	
Semen viri cur non ſemper contine-		ctor	431. 35
atur in vtero	167. 25	Sonus quomodo fiat	251. 40
Seminis eſſentia & vires	341. 33	Sopor vigil	596. 22. 587. 40
Seminis natura	341. 10	Sopor grauis	587. 24
Seminis profuſio	749. 33. 760. 21	Sopor à morbo attonito quid diffi-	
Seminis profuſio eiſque ſpecies		rat	598. 28
	750. 14. 799. 33.	Spasmus	592. 2
Seminis virulenta fluxio	651. 2.	Sphacelus	787. 1
	760. 31	Spina qualis	106. 40
Semine concepto quid primum na-		Spine medulla, eiſque temperamen-	
ſcatur	167. 30	tum	57. 29. 192. 14
Senes quibus recreandi	26. 6	Spinæ offa	106. 40
Senſus communis vbi	294. 17	Spinæ vulneratæ nota	799. 29
Senſus in quibus rebus fallatur		Spinæ medullæ habitus vnde no-	
	441. 12	ſcatur	75. 26
Senſus quinque	292. 12	Spiritus animæ inſtrumentum	
Senſus inſtrumenta	298. 20		354. 26
Senſus meſusque amiſſio	207. 20	Spiritus an motum ſemper efficiat	
Senſus principis facultates	294. 30		355. 8
Senſuum communia	293. 23	Spiritus vitalis generatio	361. 10
Senſuum dolor vnde	447. 35	Spiritus vitalis quomodo in anima	
Sentiendi facultas vnde	299. 8	lem muteur	354. 32
Sentientis anime ſed	294. 2. 298. 16	Spiritus in ſemine preſtâtia	346. 20
Septum tranſuerium	174. 39	Spiritus naturalis officium	281. 20
Septi tranſuerſi ſitus, figura, & uſus		Spiritus difficultas in inflammatio-	
	175. 14	ne vnde	14. 37
Septi tranſuerſi laſi nota	799. 9	Spiritum quænam inſiciant	435. 15
	671. 20	Spiritus eſtuentes	280. 2
		Spiritus vnde mutantur	669. 16
		Spiri-	

INDEX.

Spirituum animalium usus 192. 26
 Spirationis & vocis officina 202. 15
 Spirandi difficultas 640. 40
 Spirandi difficultatis species, & signa 641. 15
 Spirandi difficultas in febribus vnde 569. 2
 Spirationes singulae quibus perficiantur 363. 2
 Sputum optimum 661. 33
 Sputum nigrum in febris ardore 330. 33.
 Sputum nigrum quid portendat 455. 24
 Sputum cruentum quid notet 653. 34
 Sputum retentum quid notet 467. 26
 Sputi facili nota 17. 10
 Sputi color in laterum inflammatione 16. 10
 Spura quid indicent 16. 20 451. 37
 Staphyloma 613. 34
 Steatoma 797. 15
 Stomachus eiusque partes 185. 42
 Stomachi vulnerati nota 313. 4
 Stomachi laesi nota 799. 24
 Strangulatus causa 568. 37
 Stranguria 743. 36
 Struma 788. 18
 Substantiae qualitatum expertes 44. 26
 Sudor cur per somnum emanet 432. 24
 Sudor cur sequatur rigores 267. 40
 Sudor quid denunciet 466. 18
 Sudor frigidus vnde 668. 15
 Sudor suppressus quid praedicet 467. 30
 Sudoris in febribus causa 571. 26
 Succorum nomenclatura & differentia 320. 16
 Succorum excrementa 320. 32
 Suffocatio vteri 773. 24
 Suffusio, eiusque causa, species & nota 607. 4
 Suffusionis colores 608. 8
 Suggillatio 617. 22
 Suggillata 796. 26
 Superfatio 350. 17

Suppuratio eiusque species 645. 33
 Suppurationis tempus 664. 13. 663. 15
 Suppurationis notae 663. 477. 28. 26. 646. 32
 Sura eiusque appendices 131. 5
 Surae ossa 131. 9
 Surditas aurium 621. 20. 623. 8
 Suturae calvariae 100. 14
 Sutarum usus 102. 24
 Symptomata quid 436. 30
 Symptomata nulla solitaria 455. 17
 Symptomatum differentiae, genera & causae 439. 30. 440. 33. 444. 6
 Syncope quid 667. 37
 Syncope stomachica 676. 20
 Syncope dignotio 678. 33
 Sincopae causae 669. 9
 Syncipitis figurae 75. 37
 Syncipitis ossa 92. 1

T

Tabes eiusque species 654. 25
 Tabes & marcor quid differant 655. 15
 Tabes oculorum 699. 37
 Tabes pupillae 640. 7
 Tabis causae 656. 35
 Tabis confirmare indicia 656. 23
 Tabem futuram quid noceat 477. 18
 Tactus eiusque differentia 283. 35
 293. 7
 Tactus quando corrumpatur 441. 25
 Tactus quomodo fiat 352. 22. 354. 25
 Tactus instrumenta 299. 31. 299. 34
 Talus tibiae appendix 131. 40
 Tangendi vis 293. 9
 Temperamentum quid 49. 15
 Temperamenta singularum partium 56. 6
 Temperamenta partium & totius corporis quomodo aestimanda 68. 13
 Temperamentorum species 49. 35
 Temperamentorum differentiae 64. 34
 Temperamentorum notae 53. 22
 65. 5. 75. 2
 Temperamentorum notae quomodo variant 84. 30

INDEX.

Успаш

INDEX.

Vena iugularis	248. 5	Venæ spinæ medullam nutriendas	245. 35
Vena humeraria, siue cephalica, e- iûsq; cum iecoraria vnio	246. 2	Venæ peritonæum alentes	250. 38.
Vena cordis coronalis	245. 24.	Venæ per quas vterus cum mama millis vnitur	250. 40
Vena iecoraria, basilica dicta	246. 2	Venæ ad abdominis musculos ten- dentes	247. 20
Vena in angina incidi solita	248. 12	Venæ umbilicales quid præstent	170. 20
Vena umbilicalis	250. 35	Veng cur vesicam ingradientur	159. 22
Venacoxa, siue coxendicis	251. 41	Venæ ventriculo inserte	153. 14
Vena caua	179. 1	Venæ vnde nutriantur	315. 40
Vena mirabilem sinum constituens	248. 27	Venæ per quas menstrua purgan- tur.	251. 5
Vena poplitis	252. 1	Venæ vertebrae nutriendas	245. 35
Venamusculos glandulasq; laryn- gis nutriendas	248. 5	Venæ seminarie	160. 9. 161. 2
Vena emulgens	160. 11	Veng in inflammatione incidenda	19. 20
Vena saluatella Arabibus dicta	246. 16	Venarum materia	526. 2
Vena quæ duræ membranæ inferi- tur	248. 17	Venarum vsus	324. 14.
Vena saphena in vteri morbis seca- ri solita	251. 20	Venarum cerebri vsus	191. 34.
Venæ portarum distributio	154. 27	Venarum spatia quomodo alantur	214. 24
Venæ portarum vsus	155. 18	Venarum rami in ventriculum cur spargantur	154. 35
Vena communis dicta, e iûsq; exor- tus	19. 20. 246. 30	Venarum in cerebrum propagatio	248. 30
Venæ arteriosæ officium	154. 4	Venarum in mesenterio vsus	151. 30
Venæ vulneratæ nota	798. 20	Venarum seminalium differentia	250. 5
Venæ arteriosæ eleuatio & situs	363. 41	Venarum emulgentium diuisio & vsus	249. 12
Venæ cauæ origo, essentia & pro- cessus	155. 40	Venarum solutio quando accadat	472. 10
Venæ cauæ distributio ad partes in- feriores	250	Venarum & arteriarum tunica quomodo differat	179. 25
Venæ cauæ propagatio	245. 18	Venarum in mammis vnio & ori- go	172. 23
249. 7		Venarum mesentericarum officium	307. 12
Venæ seminalis ortus	249. 42	Venarum ruptura vnde	653. 30
Venæ sine coniuge exortus	245. 25	Venarum vtilitas	252. 9
Venæ cerebri essentiam alentes	248. 22	Ventris inferioris administratio	157. 18
Venæ capitis musculis inseruien- tes	247. 35	Ventriculus	172. 8
Venæ principales in iecore	154. 25		
Venæ alares, siue axillares	245. 40		

INDEX.

Ventriculus vnde nutrimentum sumat.	153. 5	Vesicę musculi	232. 10
Ventriculus vnde alatur.	36. 6	Vesicę tunicę & ceruicę	159. 12
Ventriculus vnde infirmetur	676. 4	Vesicę arterię	257. 15
Ventriculus cur interdum minüs concoquat	82. 25	Vesicę affectus	739. 16
Ventriculi partes	673. 23	Vesicę vlcus	745. 39
Ventriculi actiones	305. 25	Vesicę vulneratę signa	800. 3
Ventriculi facultates & officium	152. 40	Vesicę inflammatio	740. 17
Ventriculi figura, ortus & situs	152. 15	Vesicę calculi causa	739. 17
Ventriculi essentia ex quibus	152. 28	Vesicę exulceratio, eiusque nota	478. 42. 741. 30
Ventriculi connexus	153. 25	Veternũ siue lethargus quãdo	483. 11
Ventriculi orificia qualia	152. 17	Videndi facultas	292. 22
Ventriculi tunicę	152. 30	Vigilia quid	295. 20
Ventriculi attractio, retentio, excre tioque	305. 7	Vigilia quę pariat incõmoda	432. 38
Ventriculi tẽperaturę indicia	81. 40	Vigiliarum causa	569. 20
Ventriculi morbi	673. 31	Vinũ cur faciliẽ distribuat	307. 47
Ventriculi intemperies	677. 10	Virium resolutarum causa	568. 22
Ventriculi affecti signa	674. 37. 685. 40	Viscerum caro qualis	58. 28
Ventriculi abscessus	678. 8	Visio vt fiat	352. 5
Ventriculi inflatio	690. 1	Visionis affectus duplices	607. 2
Ventriculi noxę	442. 37	Visionis lęsio quot modis fiat	603. 36
Ventriculi inflammatio	678. 2	Visus istrumentum	292. 23
Ventriculi frigus quid notet	469. 4	Visorum copia vnde	353. 33
Ventriculi vulnerati notę	713. 4	Vita in quibus consistat	272. 8
Verrucę	799. 26	Vitę & pulsus diuersa facultas	364. 40
Vertebrę ceruicis quales	795. 30	Vitalis facultas	301. 3
Vertebrę quot existāt	107. 14. 110. 12	Vitalis vis quibus distribuatur	365. 2
Vertebrę lumborum	111. 36	Vitales actiones quales & quot sint	359. 16
Vertebrę costarum quales	110. 12	Vitiligo	732. 8
Vertebrarum ceruicis processus	805. 20	Vlcus	798. 1. 800. 18
Vertebrę ceruicis quomodo con nectantur	108. 3. 110. 4.	Vlcus vteri	458. 41
Vertebrarum ceruicis structura	109. 10	Vlcus ex abscessu quid	722. 5
Vertebrarum connexio & proces sus	108. 30	Vlceris causa	800. 19
Vertebrarum foramina cur facta	108. 3. 110. 4.	Vlcera renum & vesicę quid disse rant	742. 38
Vertigo	589. 18	Vlcerum notę	471. 39
Vertiginis à comitali differentia	590. 12	Vnguis oculorum	614. 14.
Vesica	159. 35	Vmbilicus ex quibus constet	166. 35
Vesicę situs, figura & essetia	158. 40	Vmbilici ruptura	747. 30
Vesicę vsus peculiaris	159. 25	Voluntas	357. 9
		Voluntatis imperium	355. 25
		Vomit	684. 3
		Vomit	153. 11. 654. 4.
		Vomit	83. 4
		Vomit	83. 4

INDEX.

Vomitus & nausæ causæ	685. 26	Vrinæ odores qui, quidq; indicent	507. 2
Vomitus niger quando	335. 33	Vrinæ colores vnde	507. 22
Vomitum quid generet	570. 35	Vrinę hypostasis, eneorema, & nubeculę quid, & vnde fiant	509. 33
Vomitiones quæ ciant	446. 35	Vrinæ incontinentia, difficultas, suppressio, & stillicidium	743. 31
Vomica quid	6; 0. 23	Vrinę contenta quomodo se habeant	510. 20
Vomicarum præfagium	477. 21	Vrinæ retentio quid præfagiat	467. 34
Vox grauis vnde emittatur	223. 22	Vrinæ excretio	463. 3
Vocis officina	205. 15	Vrinę crassę species, eiúsque merdiocritas	504. 9
Vrina vnde	213. 22	Vrinæ suppressæ nota	450. 35
Vrina quæ, quando, quomodo, & ubi inspicienda	500. 17. 501. 10	Vrinę cruentæ causę	736. 32. 744. 13
Vrina palsea, vinea, viridis, cærulea, liuida & plumbea quid	508. 33	Vrinę albæ tenues, perspicuæ, & aqueæ quid	507. 34. 514. 30
Vrina cruenta è renibus	736. 22	Vrinæ colorē quę immutent	509. 14
Vrina rubida seu lutea, turbida	505. 15	Vterus, e iúsque situs & figura	164. 10
Vrina confusa	505. 20	Vterus quibus tegatur membranis	165. 18
Vrina citrina, cruenta, subpallidæque	508. 2	Vterus an alimento indigeat	166. 14
Vrina purulenta, nigra, mucosæque vnde	744. 13	Vterus conceptui idoneus	345. 30
Vrina crassa quæ, vnde & quid notet	503. 26. 507. 40	Vteri sinus	164. 25. 164. 26
Vrina perspicua quæ	504. 16	Vteri ceruix quis propriè dicatur,	169. 2
Vrina capillamentis plena vnde	744. 35	Vteri musculi	232. 4
Vrina optima quę	501. 32. vera, 63. 10	Vteri membranę	232. 6
Vrina cruenta	741. 10	Vteri foramen, eiúsque officii	164. 18
Vrina copiosior vel paucior vnde & quid	506. 2	Vteri ligamenta	166. 5
Vrina cui pingue insidet quid nunciet	469. 2	Vteri procidentia	771. 20
Vrina quomodo excernatur	214. 3	Vteri suffocatio	773. 24
Vrina quomodo segregetur	499. 35	Vteri ascensus descensusque	772. 20
Vrina cur tenuis & quid indicet	503. 21	Vteri stillicidium	758. 41
Vrina quæ nam turbida quotuplex & vnde profluat	504. 25. quid indicet 505. 4	Vteri inflatio in partu	769. 7
Vrina masculorum à foeminarum quantum discrepet	501. 40	Vteri strangulatus ab apoplexia differt	598. 38
Vrina grauidarum	764. 23	Vteri frigus quid	469. 7
Vrina senum qualis	592. 10	Vuæ & columellę differentia	633. 30
Vrinæ species quomodo differant,	502. 9	Vuę affectus vnde	633. 20
Vrinæ fluor	737. 14	Vulnus, e iúsque species	798. 1
Vrinæ circulus, spuma, bullulæ & alia ei cõmixta quid notent	512. 6	Vulneris & vlceris differentia	800. 23
		Vulug vira	753. 36
		Vulug inflammatio	752. 24
		Vulug vulneratę nota	777. 28
		Y	
		Υγρότης siue υγρόν quid	310. 16

FINIS.

Errata


Operarum incuria commissa, sic restituitur. primus
numerus paginam : secundus li-
neam significat.

Pag. 17 lin. 7 portendit. 18. 33 transmittitur. 19. 7 eos. 19. 9 collectos. 19. 10 qui,
20. 25 inspicit. 20. 30 fuerint. 40. 20 impatibilibus. 55. 6 tangenti. 59. 3 μήνυτες. 100. 8
proximi, una: tres. 101. 19 hæc. 113. 12 Quot ponis. 131. 22 tibia. 164. 10 sub abdomine inter
vesicam. 164. 11 tanquam validissimus. 194. 18 medullaris est. 249. 25 ad suum. 255. 30
quo superius. 256. 40 extremum. 262. 15 anatomes. 266. 16 viuunt: contra. 290. 31
concoctrix. 312. 14 temperatus. 327. 29 flatulentius. 329. 37 flauum. 332. 9 porrorum.
335. 38 excitat. 336. 30 qui & in quos. 343. 20 perpetuis. 349. 34 quæque genere.
357. 35 deleta. 359. 26 σφυγμός. 369. 35 spasmodem. 377. 7 potatoribus. 378. 32
leuis. 378. 41 coniunguntur. 385. 9 nascetur. 398. 37 talis. 391. 23 pulsus. 391. 27 con-
tinent sine. 394. 26 cum arteriis. 414. 2 siccitatem. 415. 40 purpureæq;. 419. 27 τσαύμω.
423. 39 recidiuamq;. 431. 31 reddunt. 450. 4 affectam. 453. 27 suscipere. 470. 22 polypus.
470. 42 in ore sapor. 481. 21 noticia ad causas. 498. 22 solent. 499. 31 χυλόν. 500. 43
aërem. 506. 22 potatoribus. 510. 4 cibi. 515. 8 inimicissimus. 519. 1 Huic. 519. 2 putri-
do. 519. 3 continencem. 520. 8 quod. 522. 11 periculosè. 523. 14 ita accessiones. 529. 15
inordinati fiunt. 535. 21 tertiana. 536. 40 sine. 539. 33 quæ. 540. 20 statiuus. 543. 19
pifis. 547. 25 materia. 552. 32 σπινθηρ, σπινθηρ. 556. 40 præcordiorum. 561. 15 cubili.
570. 37 vim. 571. 28 vi adacta. 574. 9 residet. 577. 29 suppurari. 579. 17 leuiori-
bus. 583. 42 solent. 599. 37 vitrag; 608. 23 medio. 612. 35 illum. 623. 22 solet. 625. 40
vt simile. 626. 20 patefacto. 636. 6 præfagis. 636. 32 concitatur. 642. 8 eliditur. quan-
do. 644. 19 doloremq;. 649. 18 Quæ. 660. 39 antecedente. 667. 40 animi. 671. 8 si acre.
671. 17 irrorato. 675. 19. rodentibusque. 677. 31 concoquere. 677. 32 sitiunt. 678. 6
continuo per. 681. 33 caloris vis. 684. 42 abundantia. 684. 9 imbutæ. 684. 11 ventri-
culi. 686. 11 ventri. 686. 40 omnis. 687. 14 causa. 687. 35 qualitatium. 690. 2 retentrix.
690. 11 retentrix. 693. 35 retineri. 697. 20 quàm alij. 697. 40 descendit. 702. 36 Ex-
teriores. 714. 20 partium vitia. 717. 2 intemperaturis. 730. 2 inambulatione. 733. 7
obstructio. 746. 20 nominatur. 747. 23 Varicosi duri. 759. 11 Quemadmodum. 762.
24 vuluæ. 763. 10 vuluæ leui. 736. 20 habitus. 765. 13 valetudinaria. 765. 15 sub-
stitit. 769. 24 inbarefcant. 770. 21 ratione. 771. 2 compressiones. 783. 4 erysipelato-
des. 784. 28 vlcera. 792. 17 lanugini. 794. 37 lata. 795. 38 altera thymion. 796.
17 sanguinis. 806. 32 sanguinis erupit. 799. 29 intestina icth. 803. 35 capitæ.

~~LIBRARY~~
~~FORBES~~

Ob. G. W. 892





1783

Received of the Honble the Secretary of the
Board of Trade and Plantations
the sum of one hundred and fifty pounds
sterling in full for the salary of the
Commissioner of the Customs for the
year ending at the 31st of December
1782

Wm Pitt

1783

